



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης



Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Γενική Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής
Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας
Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών

Έργο

Εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών, Σύνταξη Προεδρικών Διαταγμάτων Προστασίας και Σχεδίων Διαχείρισης για τις Περιοχές του Δικτύου Natura 2000 (Έργο ΕΠΜ)

Μελέτη 3

Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 Δυτικής Μακεδονίας (μέρους: Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Καστοριάς, Φλώρινας, Γρεβενών) και Κεντρικής Μακεδονίας (μέρους: Περιφερειακές Ενότητες Πέλλας, Ημαθίας, Πιερίας)

ΕΠΜ 1ης Ομάδας Περιοχών NATURA

Τεύχος Τεκμηρίωσης ΤΤΒ

Παράρτημα: Δάση και δασική διαχείριση

GR1210002 (ΣΤΕΝΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ, GR1250001(ΟΡΟΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ),
GR1250002 (ΠΙΕΡΙΑ ΟΡΗ), GR1250003 (ΟΡΟΣ ΤΙΤΑΡΟΣ), GR1320002
(ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΓΡΑΜΜΟΣ), GR1340006 (ΟΡΟΣ ΒΕΡΝΟΝ - ΚΟΡΥΦΗ
ΒΙΤΣΙ)

Ανάδοχος:



Μαυρομματαίων 15, Αθήνα 10434
Τ: 2108843267 E: fra@otenet.gr



Σύμβουλοι - Μελετητές
Ανάπτυξης & Υποδομών

Πλ. Ιπποδρομίου 7, Θεσσαλονίκη 54621
Τ: 2310250601 E: yetos@otenet.gr

Έκδοση 2^η, 10/10/2025

Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο της Μελέτης 3 «Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 Δυτικής Μακεδονίας (μέρους: Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Καστοριάς, Φλώρινας, Γρεβενών) και Κεντρικής Μακεδονίας (μέρους: Περιφερειακές Ενότητες Πέλλας, Ημαθίας, Πιερίας)», με Αναθέτουσα Αρχή το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ), και Διευθύνουσα Υπηρεσία το Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών της Διεύθυνσης Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας

Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 (ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)” και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΕΤΠΑ).

Η πλήρης αναφορά στο παρόν κείμενο είναι:

Μπούσμπουρας Δ., Μ. Βραχνάκης, Σ. Μπουρδάκης, Λ. Γεωργιάδης, Π. Τσιτούρα, Ι. Καζόγλου, Γ. Φωτιάδης, Λ. Σιδηρόπουλος, Ε. Navarrete, Η. Στραχίνης, Ο. Πετρίκη, Κ. Βιδάκης, Λ. Κώτσιος, Γ. Ρακκάς, Α. Σπυρίδης, Β. Κουτάλου 2025. "Μελέτη 3 Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 Δυτικής Μακεδονίας (μέρους: Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Καστοριάς, Φλώρινας, Γρεβενών) και Κεντρικής Μακεδονίας (μέρους: Περιφερειακές Ενότητες Πέλλας, Ημαθίας, Πιερίας)". Τεύχος Τεκμηρίωσης ΤΤΒ: αράρτημα δάση και δασική διαχείριση για τις περιοχές GR1210002 (ΣΤΕΝΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ, GR1250001(ΟΡΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ), GR1250002 (ΠΙΕΡΙΑ ΟΡΗ), GR1250003 (ΟΡΟΣ ΤΙΤΑΡΟΣ), GR1320002 (ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΓΡΑΜΜΟΣ), GR1340006 (ΟΡΟΣ ΒΕΡΝΟΝ - ΚΟΡΥΦΗ ΒΙΤΣΙ). Ανάδοχος: Plas A.E. - YETOS A.E., Φορέας Ανάθεσης: ΥΠΕΝ/ Γενική Δ/ση Περιβαλλοντικής Πολιτικής/ Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας/ Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών, Αθήνα, 174 σελ.

This document may be cited as follows:

Bousbouras D., M. Vrachnakis, S. Bourdakakis, L. Georgiadis, P. Tsitoura, I. Kazoglou, L. Sidiropoulos, E. Navarrete, H. Strachinis, O Petriki, K. Vidakis, L. Kotsios, G. Rakkas, A. Spiridis, V. Koutalou 2025. "Study 3 Preparation of Special Environmental Studies and Management Plans for the NATURA 2000 sites of Western Macedonia (part: Regional Authorities of Kozani, Kastoria, Florina, Grevena) and Central Macedonia (part: Regional Authorities of Pella, Imathia, Pieria)". Documentation Volume TTB: Annex Forest and forest management for sites GR1210002 (STENA ALIAKMONA, GR1250001(OROS OLYMPOS), GR1250002 (PIERIA ORH), GR1250003 (OROS TITAROS), GR1320002 (KORYFEΣ OPOYΣ ΓΡΑΜΜΟΣ), GR1340006 (ΟΡΟΣ ΒΕΡΝΟΝ - ΚΟΡΥΦΗ ΒΙΤΣΙ). Consultant: PLAS S.A. & YETOS S.A. Contracting Authority: Ministry of Energy and Environment/ General Directorate of Environmental Policy/ Directorate of Biodiversity and Natural Environment Management/ Department of Protected Areas, Athens, 174 p.

Μελέτη 3 "Εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) και Σχεδίων Διαχείρισης (ΣΔ) για τις περιοχές Natura 2000 Δυτικής Μακεδονίας (μέρους: Περ. Ενότητες Κοζάνης, Καστοριάς, Φλώρινας) και Κεντρικής Μακεδονίας (μέρους: Περ. Ενότητες Πέλλας, Ημαθίας, Πιερίας)"

ΕΠΜ 1ης Ομάδας Περιοχών NATURA
Τεύχος Τεκμηρίωσης ΤΠΒ

Παράρτημα: Δάση και δασική διαχείριση

GR1210002 (ΣΤΕΝΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ)
GR1250001 (ΟΡΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ)
GR1250002 (ΠΙΕΡΙΑ ΟΡΗ)
GR1250003 (ΟΡΟΣ ΤΙΤΑΡΟΣ)
GR1320002 (ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΓΡΑΜΜΟΣ)
GR1340006 (ΟΡΟΣ ΒΕΡΝΟΝ - ΚΟΡΥΦΗ ΒΙΤΣΙ)

Ανάδοχος:

PLAS I. ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ - Α. ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Α.Ε.
ΥΕΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Αριθμός Πρωτοκόλλου Ανάδοχου:		
Ηλεκτρονική Υπογραφή -Για τη σύμπραξη-		
Αντώνιος Φραντζεσκάκης, Νόμιμος εκπρόσωπος		
Υπεύθυνος Σύνταξης	Υπεύθυνος Ελέγχου	Υπεύθυνος Έγκρισης
Δημήτρης Μπούσμπουρας	Δημήτρης Μπούσμπουρας	Μασίκα Κωνσταντίνα Αμαλία Μητσόπουλος Ιωάννης Δρακουλάκος Ιωάννης
Κωδικός παραδοτέου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία:
		10-10-2025

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Όνομα	Ειδικότητα	Αντικείμενο
Μπούσμπουρας Δημήτρης	Βιολόγος	Συντονιστής Μελέτης
Βραχνάκης Μιχάλης	Δασολόγος, Ph.D.	Ειδικός επιστήμονας ΠΕ, με αποδεδειγμένη εμπειρία στη χλωρίδα / τύπους οικοτόπων
Μπουρδάκης Στρατής	Δασολόγος	Ειδικός επιστήμονας ΠΕ, με αποδεδειγμένη εμπειρία στην ορνιθοπανίδα
Γεωργιάδης Λάζαρος	Βιολόγος	Ειδικός επιστήμονας ΠΕ, με αποδεδειγμένη εμπειρία στην πανίδα (πλην ορνιθοπανίδας)
Τσιπούρα Παρασκευή	Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος, MSc.	Ειδικός επιστήμονας ΠΕ, με αποδεδειγμένη εμπειρία στη χλωρίδα / τύπους οικοτόπων
Καζόγλου Ιωάννης	Γεωπόνος, Ph.D.	Μέλος Ομάδας Μελέτης (χλωρίδα / τύποι οικοτόπων)
Σιδηρόπουλος Λαυρέντης	Οικολόγος, M.Res.	Μέλος Ομάδας Μελέτης (ορνιθοπανίδα)
Navarrete Barranco Elisabeth	Βιολόγος, Περιβαλλοντολόγος M.Sc.	Μέλος Ομάδας Μελέτης (ορνιθοπανίδα)
Στραχίνης Ηλίας	Βιολόγος	Μέλος Ομάδας Μελέτης (αμφίβια / ερπετά)
Πετρίκη Όλγα	Δασολόγος, Ph.D. Ιχθυολόγος	Μέλος Ομάδας Μελέτης (ιχθυοπανίδα)
Λαζαρος Παμπέρης	Εντομολόγος	Συνεργάτης για την καταγραφή των λεπιδοπτερών
Σπυρίδης Άνθιμος	Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, M.Sc., Ph.D.	Μέλος Ομάδας Μελέτης (υδρολογία / γεωλογία / ποιότητα νερών/ υποδομές)
Βιδάκης Κώστας	Δασοπόνος, M.Sc.	Μέλος Ομάδας Μελέτης (χλωρίδα / τύποι οικοτόπων περιοχή Γράμμου)
Λάζαρος Κώστας	Δασολόγος, M.Sc.	Μέλος Ομάδας Μελέτης (δάση Ολύμπου, Τίταρου, Στενών Αλιάκμονα)
Κουτάλου Βασιλική	Γεωλόγος, M.Sc.	Μέλος Ομάδας Μελέτης (υδρολογία / γεωλογία / ποιότητα νερών/ υποδομές/ Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών - GIS)
Ραγκάς Γεώργιος	Κοινωνιολόγος, Ph.D.	Μέλος Ομάδας Μελέτης (χωροταξία / οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα)

Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 Δυτικής Μακεδονίας (μέρους: Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Καστοριάς, Φλώρινας, Γρεβενών) και Κεντρικής Μακεδονίας (μέρους: Περιφερειακές Ενότητες Πέλλας, Ημαθίας, Πιερίας)
Τεύχος ΤΠΑ Παραδοτέα TB1 & TB2 Περιοχές GR1210002, GR1250001, GR1250002, GR1250003, GR1320002, GR1340006

Σπυρίδης Ιορδάνης	Ειδικός GIS	Μέλος Ομάδας Μελέτης (Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών - GIS)
Ταμτάκου Σοφία	Ειδικός GIS	Μέλος Ομάδας Μελέτης συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών - GIS)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

2.2.5 Δάση και δασική διαχείριση	7
ΣΤΕΝΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ: ΕΖΔ GR1210002	7
ΟΡΟΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ: ΕΖΔ – ΖΕΠ GR1250001	13
ΠΙΕΡΙΑ ΟΡΗ: ΕΖΔ GR1250002	69
ΟΡΟΣ ΤΙΤΑΡΟΣ: ΕΖΔ GR1250003.....	103
ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΓΡΑΜΜΟΣ: ΕΖΔ – ΖΕΠ GR1320002	124
ΟΡΟΣ ΒΕΡΝΟΝ - ΚΟΡΥΦΗ ΒΙΤΣΙ: ΕΖΔ GR1340006	161

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

Πίνακας 2.2.5 -1 Συγκρότηση δασικής βλάστησης στη περιοχή Στενών Αλιάκμονα	7
Πίνακας 2.2.5 -2 Συγκρότηση δασικής βλάστησης στη περιοχή Ολύμπου	13
Πίνακας 2.2.5 -3 Συγκρότηση δασικής βλάστησης στη περιοχή Πιερίων	69
Πίνακας 2.2.5 -4 Συγκρότηση δασικής βλάστησης στη περιοχή Τίταρου	103
Πίνακας 2.2.5 -5 Συγκρότηση δασικής βλάστησης στη περιοχή Γράμμου	124
Πίνακας 2.2.5 -6 Συγκρότηση δασικής βλάστησης στη περιοχή όρους Βέρνον.....	161

2.2.5 Δάση και δασική διαχείριση

Οι πίνακες είναι πολύ μεγάλοι και παρατίθενται σε ξεχωριστό παράρτημα.

Ακολουθούν πίνακες για τις δασικές συστάδες με τα είδη που συγκροτούν τη δασική βλάστηση, την συγκρόμωση, την μέθοδο διαχείρισης και το ξυλαπόθεμα σύμφωνα με την τελευταία δασική διαχειριστική μελέτη κάθε δάσους, καθώς και οι προτεινόμενες επεμβάσεις στην τελευταία δασική διαχειριστική μελέτη.

Τα στοιχεία που παρατίθενται προέρχονται από διαφορετικές δασικές διαχειριστικές μελέτες και χρησιμοποιούνται διαφορετικές εκφράσεις και ιδιοματισμοί. Αυτά διατηρήθηκαν στην στήλη «Παρατηρήσεις» όπου παρατίθενται στοιχεία για την εφαρμοζόμενη διαχείριση.

ΣΤΕΝΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ: ΕΖΔ GR1210002

ΥΠΟΜΝΗΜΑ:

Δασοπονικά Είδη: Δ= Δρυς, Μ.Π.= Μαύρη Πεύκη, Λ.Π.= Λευκόδερμη Πεύκη, Ο=Οξυά, Ε=Ελάτη, Γ.= Γαύρος, Λ.= Λεύκη Κ.= Καστανιά, Φιλύρ.= Φιλύρα, Οστρ.= Οστριά, Λ.πλ.= Λοιπά πλατύφυλλα, Λ.Φ.= Λοιπά φυλλοβόλα, Φ.πλ.= Φυλλοβόλα πλατύφυλλα, Α.πλ.= Αείφυλλα πλατύφυλλα, Αν. κων.= Αναδασώσεις κωνοφόρων, Θ.= Θαμνώνες Διασ. ατ.= Διάσπαρτα άτομα, Β.=Βραχύκορμα

Διαχειριστική, μορφή: Πρεμν.= Πρεμνοφυής, Σπερ= Σπερμοφυής, Διφ.=Διφυής

Δασοπονική μορφή: Ομήλ.= Ομήλικη, Ανομ./Ανομηλ.= Ανομήλικη, Αν.= Αναμοιόμορφη, Ομ.= Ομοιόμορφη, Πλ. Αν.= Πλήρως Αναμοιόμορφη, Ακαν.= Ακανόνιστη, Υποκηπτ.= Υποκηπευτή, Κηπ.= κηπευτή, Αθρ.= Αθροίσματα, Τμ.= τμήμα

Ηλικία: Ηλ.= Ηλικία, Υπερωρ.= Υπερώριμα, Ωρ.= Ώριμα, Νεαρ.= Νεαρά, Γηρ.= Γηραιά, Υπεργ. Ατ.= Υπέργηρα Άτομα, Παρ.= Παρακρατήματα, Υλोट. Εκτ.= Υλοτομημένη Έκταση, Ανωτ.= Ανώτερη, Κατώτ.= Κατώτερη, Ακαθορ.= Ακαθόριστη, Μεμ.= Μεμονωμένα, Επικρ.= Επικρατούσα, Μερ. Δασ.= Μερικώς Δασοσκεπής

Συγκρόμωση: Συμπ.= Σύμπυκτη, Οριζ.= Οριζόντια, Κλιμ.= Κλιμακωτή, Κλ.= Κλειστή, Φωτ.= Φωτεινή, Χαλ.= Χαλαρή

Κοινές συντομεύσεις: Ανομ./Ανομηλ.= Ανομήλικη, Επικρ.= Επικρατούσα, Κατώτ.= Κατώτερη, Ανωτ.= Ανώτερη, Διασ. ατ.= Διάσπαρτα άτομα

Πίνακας 2.2.5 -1 Συγκρότηση δασικής βλάστησης στη περιοχή Στενών Αλιάκμονα

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκρόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας / ha	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
1α	Δ.	0.5-0.9	Υλोट. έκτ.:5 Παρ...: 50-70	Πρεμν. ακαν.	-	-	-	-	-	Πλατύφυλλη δρυς. Παραμίγματα γαύρου, φράξου, σφενδάμου, άρκευθου. Συστάδα δρυός υποβαθμισμένη από τη βοσκή και τις λαθροϋλοτομίες του παρελθόντος με αυξημένο ποσοστό παραμιγμάτων. Υγεία ξυλώδους κεφαλαίου μέτρια. Δεν παρατηρήθηκαν λαθροϋλοτομίες και παράνομη βόσκηση. Υλοτομήθηκε το 2012 και παρήχθησαν 378,20 μ3 καυσόξυλων δρυός. Η συστάδα προστατεύεται με Δ.Α.Δ. Βοσκής μέχρι το 2022.	ΔΑΣΟΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΟΥ ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ (2020-2029)
1β	Δ.	0.5-1.0	Υλोट. έκτ.: 6-7 Παρ...: 50-70	Πρεμν. ακαν.	-	-	-	-	-	Πλατύφυλλη δρυς σε μίξη με άμισχη. Παραμίγματα γαύρου, φράξου, σφενδάμου, άρκευθου. Άτομα πλατάνου στα ρέματα. Συστάδα δρυός σχετικά συμπαγής στο βόρειο τμήμα της και διασπασμένη από τους αγρούς στην υπόλοιπη έκταση. Υλοτομήθηκε το 2011 και παρήχθησαν 778,99 μ3 καυσόξυλα δρυός. Η συστάδα προστατεύεται με Δ.Α.Δ. Βοσκής μέχρι το 2021. Εκτός διαχείρισης (2020-2029).	ΔΑΣΟΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΟΥ ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ (2020-2029)
1γ	Δ.	-	Μερ. δασ. 60	Πρεμν. ακαν.	-	-	-	-	-	Στις μερικώς δασοσκεπείς θέσεις πλατύφυλλη δρυς και παραμίγματα γαύρου, φράξου, σφενδάμου, άρκευθου. Η υγεία ξυλώδους κεφαλαίου στις μερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις σχετικά καλή. Δεν παρατηρήθηκαν λαθροϋλοτομίες και παράνομη βόσκηση. Η συστάδα εξυπηρετεί το κτηνοτροφικό κεφάλαιο της Τ.Κ. Πολυδένδρου. Εκτός διαχείρισης (2020-2029)	ΔΑΣΟΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΟΥ ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ (2020-2029)

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας / ha	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
1δ	Δ.	-	Υλοτ. έκτ.: 4 Παρ...: 50-70	Πρεμν. ακαν.	-	-	-	-	-	Πλατύφυλλη δρυς. Παραμίγματα γαύρου, φράξου, σφενδάμου, άρκευθου. Συστάδα δρυός διασπασμένη από τα αγροτεμάχια και έντονα συμπτώματα κακοποίησης του παρελθόντος , με αποτέλεσμα οπισθοδρομική εξέλιξη της βλάστησης στα μεγαλύτερα υψόμετρα και κοντά στον οικισμό. Υγεία ξυλώδους κεφαλαίου σχετικά καλή. Δεν παρατηρήθηκαν λαθροϋλοτομίες και παράνομη βόσκηση. Υλοτομήθηκε το 2014 και παρήχθησαν 629,75 μ3 καυσόξυλων δρυός. Η συστάδα προστατεύεται με Δ.Α.Δ. Βοσκής μέχρι το 2024. Εκτός διαχείρισης (2020-2029)	ΔΑΣΟΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΟΥ ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ (2020-2029)
1ε	Δ.	-	Υλοτ. έκτ.: 3 Παρ...: 50-70	Πρεμν. ακαν.	-	-	-	-	-	Πλατύφυλλη δρυς. Παραμίγματα γαύρου, φράξου, σφενδάμου, άρκευθου. Άτομα οξυάς στο ρέμα. Τεχνητή φυτεία με Τραχεία Πεύκη σε έκταση 3,5 Ha στις ψηλότερες θέσεις κοντά στον οικισμό. Συστάδα δρυός φωτεινή μέχρι αραιά, υποβαθμισμένη στη μεγαλύτερη έκταση με αυξημένο ποσοστό παραμιγμάτων λόγω των λαθροϋλοτομιών και της υπερβόσκησης του παρελθόντος. Υλοτομήθηκε το 2015 και παρήχθησαν 852,50 μ3 καυσόξυλων δρυός. Η συστάδα προστατεύεται με Δ.Α.Δ. Βοσκής μέχρι το 2025. Εκτός διαχείρισης (2020-2029).	ΔΑΣΟΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΟΥ ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ (2020-2029)
1στ	Δ.	0.5-1.0	50-80	Πρεμν.ακαν.	245	-	24,02	-	-	Πλατύφυλλη δρυς. Παραμίγματα γαύρου, φράξου, σφενδάμου, άρκευθου. Συστάδα δρυός διασπασμένη με έντονα συμπτώματα υποβάθμισης από τις ανθρωπογενείς επεμβάσεις του παρελθόντος. Υγεία ξυλώδους κεφαλαίου σχετικά καλή. Δεν παρατηρήθηκαν λαθροϋλοτομίες και παράνομη βόσκηση. Υλοτομήθηκε το 2018Εκτός διαχείρισης (2020-2029)Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΑΣΟΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΟΥ ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ (2020-2029)
2α	Δ.	0.7-1.0	70	Πρεμν. ακαν.	1187,5	-	38,68	-	-	Πλατύφυλλη δρυς. Παραμίγματα γαύρου, φράξου, σφενδάμου και πρίνου. Διασπασμένη στο ανώτερο τμήμα της σε γεινίαση με τους αγρούς. Άτομα κουμαριάς στο κατώτερο τμήμα της. Συστάδα δρυός υποβαθμισμένη με αυξημένο ποσοστό παραμιγμάτων και αείφυλλων πλατύφυλλων από τις λαθροϋλοτομίες και βοσκή του παρελθόντος. Διασπασμένη στο ανώτερο τμήμα της σε γεινίαση με τα χωράφια. Υγεία ξυλώδους κεφαλαίου μέτρια. Δεν παρατηρήθηκαν ζημιές κατά τα τελευταία χρόνια . Προτείνονται: αποψιλωματική υλοτομία της δρυός με παρακρατήματα σε ομάδες – λόγχμες σε ποσοστό 12% της συνολικής δασοσκεπούς έκτασης της συστάδας, στις καλύτερες θέσεις και στα ψηλότερα σημεία κοντά στους αγρούς. Καλλιέργεια – αρραίωση των παρακρατούμενων ενώσεων δρυός με στόχο τον εξευγενισμό του ξυλώδους κεφαλαίου με θετική επιλογή, χωρίς ο βαθμός συγκόμωσης να κατέρχεται κάτω του 0.8. Στα αποψιλούμενα υλοτομία θα γίνεται παρακράτηση 4-5 διάσπартων ατόμων μεγάλης ηλικίας αν Ha, για οικολογικούς λόγους. Υπολογισμός λήμματος: 767,5μ3 + 62,6μ3 × 2 έτη = 892,7 μ3 – 12% = 785 μ3 καυσόξυλων δρυός. Το λήμμα είναι ενδεικτικό ως προς την ποσότητα και ως προς την ποιότητα. Έτος υλοτομίας 2020 Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΑΣΟΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΟΥ ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ (2020-2029)
2β	Δ.			Δ.: πρεμν. ακαν.	468,60	0,00	22,00	0,00	0,00	Πλατύφυλλη δρυς. Οξύα στο ρέμα Βολύλακας. Παραμίγματα γαύρου, φράξου, σφενδάμου και πρίνου στις χαμηλότερες και πιο υποβαθμισμένες θέσεις. Συστάδα δρυός, διασπασμένη από τους αγρούς με μικροενώσεις πλατύφυλλου δρυός και πουρναριού στην μερικώς δασοσκεπή έκταση. Υγεία ξυλώδους κεφαλαίου σχετικά καλή. Δεν παρατηρήθηκαν λαθροϋλοτομίες και παράνομη βόσκηση. Υλοτομήθηκε το 2018. Ήδη εκδόθηκε η 37/2018 Δ.Α.Δ. Εκτός διαχείρισης (2020-2029) Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΑΣΟΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΟΥ ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ (2020-2029)
	Ο.	0.6-1.0	50-70	Ο.: διφ	411,90	48,75	137,30	16,25	11,84		
2γ	Δ.	0.8	50-70	Πρεμν. ακαν.	-	-	-	-	-	Πλατύφυλλη δρυς και πρίνος. Παραμίγματα γαύρου, φράξου, σφενδάμου, άρκευθου. Τη συστάδα συγκροτούν κυρίως εγκαταλελειμμένοι αγροί κατοίκων του οικισμού Πολυδένδρου. Υγεία ξυλώδους κεφαλαίου καλή. Πρόσφατες ζημιές δεν παρατηρήθηκαν. Στη συστάδα μέχρι σήμερα δεν έγινε καμία επέμβαση. Αποτελεί γεωργική περιοχή με εγκατάλειψη των καλλιεργειών λόγω οριακής απόδοσης, εκμεταλλεζόμενη σήμερα κτηνοτροφικά. Εκτός διαχείρισης.	ΔΑΣΟΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΟΥ ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ (2020-2029)
2δ	Δ.	0.7	50-70	Πρεμν. ακαν.	-	-	-	-	-	Πλατύφυλλη δρυς και πρίνος. Παραμίγματα γαύρου, φράξου, σφενδάμου, άρκευθου. Τη συστάδα συγκροτούν κυρίως εγκαταλελειμμένοι αγροί κατοίκων του οικισμού Πολυδένδρου. Υγεία ξυλώδους κεφαλαίου καλή. Πρόσφατες ζημιές δεν παρατηρήθηκαν. Στη συστάδα μέχρι σήμερα δεν έγινε καμία επέμβαση. Αποτελεί γεωργική περιοχή με εγκατάλειψη των καλλιεργειών λόγω οριακής απόδοσης, εκμεταλλεζόμενη σήμερα κτηνοτροφικά. Εκτός διαχείρισης.	ΔΑΣΟΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΟΥ ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ (2020-2029)

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας / ha	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
2ε	Δ.	-	50-70	Πρεμν. ακαν.	-	-	-	-	-	Πλατύφυλλη δρυς με παραμίγματα γαύρου, φράξου, σφενδάμου και πρίνου. Διασπασμένη στο ανώτερο τμήμα της σε γειτνίαση με τους αγρούς. Άτομα κουμαριάς στο κατώτερο τμήμα της. Συστάδα δρυός σε σχετικά καλή κατάσταση, με διάσπαρτες ενώσεις διαφόρων και αειφύλλων πλατυφύλλων. Διασπασμένη στο κατώτερο τμήμα της σε γειτνίαση με τα χωράφια. Υγεία ξυλώδους κεφαλαίου μέτρια. Δεν παρατηρήθηκαν ζημιές κατά τα τελευταία χρόνια. Η συστάδα υλοτομήθηκε το 2017 και παρήχθησαν 1405,78 m ³ καυσόξυλων δρυός. Η συστάδα προστατεύεται με Δ.Α.Δ.. Εκτός διαχείρισης (2020-2029)Απαγόρευση βόσκησης μέχρι το 2027.	ΔΑΣΟΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΟΥ ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ (2020-2029)
2στ	Δ.	0.5-1.1 Κατά θέσεις συμπ.	50-70	Πρεμν. ακαν.	-	-	-	-	-	Πλατύφυλλη δρυς και πρίνος. Παραμίγματα γαύρου, φράξου, σφενδάμου, άρκευθου. Τη συστάδα συγκροτούν κυρίως εγκαταλειμμένοι αγροί κατοίκων του οικισμού Πολυδένδρου. Υγεία ξυλώδους κεφαλαίου καλή. Πρόσφατες ζημιές δεν παρατηρήθηκαν. Στη συστάδα μέχρι σήμερα δεν έγινε καμία επέμβαση. Αποτελεί γεωργική περιοχή με εγκατάλειψη των καλλιεργειών λόγω οριακής απόδοσης, εκμεταλλευόμενη σήμερα κτηνοτροφικά.	ΔΑΣΟΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΟΥ ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ (2020-2029)
2ζ	Δ.	0.8	50-70	Πρεμν. ακαν.	-	-	-	-	-	Πλατύφυλλη δρυς και πρίνος. Παραμίγματα γαύρου, φράξου, σφενδάμου, άρκευθου. Τη συστάδα συγκροτούν κυρίως εγκαταλειμμένοι αγροί κατοίκων του οικισμού Πολυδένδρου. Υγεία ξυλώδους κεφαλαίου καλή. Πρόσφατες ζημιές δεν παρατηρήθηκαν. Στη συστάδα μέχρι σήμερα δεν έγινε καμία επέμβαση. Αποτελεί γεωργική περιοχή με εγκατάλειψη των καλλιεργειών λόγω οριακής απόδοσης, εκμεταλλευόμενη σήμερα κτηνοτροφικά. Εκτός διαχείρισης.	ΔΑΣΟΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΟΥ ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ (2020-2029)
13	Δ.	0.5-0.9	37-57	Πρεμν. ακαν. ανομ.	204	-	30	-	-	Πρίνος (56 Ha), δρυς, γαύρος κ.λπ. (6,8 Ha). Συστάδα υποβαθμισμένη λόγω έντονης βοσκής, λαθροϋλοτομιών κ.λπ. δυσμενών συνθηκών του παρελθόντος. Για λόγους προστασίας των προς κατάντη έργων (Εγνατία, Φράγματα ΔΕΗ): Εκτός διαχείρισης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΜΙΚΡΗΣ ΣΑΝΤΑΣ ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ (2018-2027)
	Α.πλ.				1120	-	20	-	-		
14	Δ.	0.5-0.8	37-57	Πρεμν. ακαν. ανομ.	195	-	30	-	-	Πρίνος (70,6 Ha), δρυς, γαύρος κ.λπ. (6,5 Ha). Παραποτάμια βλάστηση στα ρέματα (0,7 Ha). Συστάδα υποβαθμισμένη λόγω έντονης βοσκής, λαθροϋλοτομιών κ.λπ. δυσμενών συνθηκών του παρελθόντος. Για λόγους προστασίας των προς κατάντη έργων (Εγνατία, Φράγματα ΔΕΗ): Εκτός διαχείρισης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΜΙΚΡΗΣ ΣΑΝΤΑΣ ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ (2018-2027)
	Α.πλ.				1412	-	20	-	-		
1	Δ.	-	-	-	-	-	-	-	-	Αποτελείται εξ ολοκλήρου από απαλλοτριωθείσες εκτάσεις και δεν αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης.	ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΔΑΣΟΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΟΥ (2017-2026)
2α	Δ.	0,6-1,1	20-80	Πρεμν. ανομ.	2127	-	30	-	-	Δρυς 0,5- Αείφυλλα 0,5 (Αριά- Φυλίκη- Κουμαριά κ.λ.π.), σε σχεδόν αμιγή και διακριτή έκταση.Η ποιοτική κατάσταση του ξυλαποθέματος είναι κακή έως μέτρια, λόγω της έντονης λαθρουλοτομίας και υπερβόσκησης που υπέστη κατά το παρελθόν και κυρίως την περίοδο του πολέμου 1940-50 και μετά.Η συστάδα να παραμείνει ανυλοτόμητη και στην τρέχουσα 10ετία και για τους παρακάτω λόγους: α) Λόγω των μεγάλων κλίσεων υπάρχει κίνδυνος να έχουμε διαβρώσεις των εδαφών, με αποτέλεσμα την πρόσκωση των τεχνικών λιμνών της Δ.Ε.Η στον Αλιάκμονα. Για τον λόγο αυτό η Δ.Ε.Η κατασκεύασε στα ρέματα φράγματα διευθέτησης. β) Κακή ποιότητα ξυλαποθέματος γ) Διευκόλυνση του κτηνοτροφικού κεφαλαίου της Τ.Κ. Πολυδένδρου δ) Η περιοχή κατά μήκος του Αλιάκμονα προσφέρει Αισθητικές και λοιπές απολαύσεις στους πολλούς επισκέπτες της περιοχής και για αυτό και το Δασαρχείο Βέροιας έχει κατασκευάσει έργα αναψυχής κατά μήκος του δρόμου που διέρχεται την περιοχή και ενώνει του δύο Υδροηλεκτρικούς σταθμούς της περιοχής.	ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΔΑΣΟΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΟΥ (2017-2026)
	Α.πλ.				1925	-	25	-	-		

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας / ha	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
2β	Δ.	0,6-1,1	11 - 80	Πρεμν. ανομ.	255	-	30	-	-	Δρυς 0,1 εντοπισμένη σε τρεις αμιγείς θέσεις –Αείφυλλα Πλατύφυλλα (0,8) (Γαύρος – Αριά –Φιλύκι –Κουμαριά –Πρίνος).Διάφορα φυλλοβόλα (Γαύρος, Φράξος κ.λ.π.). Η ποιοτική κατάσταση του ξυλαποθέματος είναι κακή έως μέτρια , λόγω της έντονης λαθροϋλοτομίας και υπερβόσκησης που υπέστη κατά το παρελθόν και κυρίως την περίοδο του πολέμου 1940-50 και μετά. Η συστάδα να παραμείνει ανυλοτόμητη και στην τρέχουσα 10ετία και για τους παρακάτω λόγους: α) Λόγω των μεγάλων κλίσεων υπάρχει κίνδυνος να έχουμε διαβρώσεις των εδαφών , με αποτέλεσμα την πρόσχωση των τεχνικών λιμνών της Δ.Ε.Η στον Αλιάκμονα. Για τον λόγο αυτό η Δ.Ε.Η κατασκεύασε στα ρέματα φράγματα διευθέτησης. β) Κακή ποιότητα ξυλαποθέματος γ) Διευκόλυνση του κτηνοτροφικού κεφαλαίου της Τ.Κ. Πολυδένδρου δ) Η περιοχή κατά μήκος του Αλιάκμονα προσφέρει Αισθητικές και λοιπές απολαύσεις στους πολλούς επισκέπτες της περιοχής και για αυτό και το Δασαρχείο Βέροιας έχει κατασκευάσει έργα αναψυχής κατά μήκος του δρόμου που διέρχεται την περιοχή και ενώνει του δύο Υδροηλεκτρικούς σταθμούς της περιοχής.	ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΔΑΣΟΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΟΥ (2017-2026)
	Α.πλ. + Φ.πλ.				3298	-	25	-	-		
4α	Α.πλ. + Φ.πλ.	0,6-1,1	11 - 80	Πρεμν. ανομ.	1836	-	30	-	-	Μικτή συστάδα από φυλλοβόλα (Δρυς – Γαύρος – Φράξος – Χρυσόξυλο κ.λ.π.) και αείφυλλα (Αριά, Φιλίκι, Πρίνος, Κουμαριά). Η ποιοτική κατάσταση του ξυλαποθέματος είναι κακή έως μέτρια , λόγω της έντονης λαθροϋλοτομίας και υπερβόσκησης που υπέστη κατά το παρελθόν και κυρίως την περίοδο του πολέμου 1940-50 και μετά. Η συστάδα να παραμείνει ανυλοτόμητη και στην τρέχουσα 10ετία και για τους παρακάτω λόγους: α) Λόγω των μεγάλων κλίσεων υπάρχει κίνδυνος να έχουμε διαβρώσεις των εδαφών , με αποτέλεσμα την πρόσχωση των τεχνικών λιμνών της Δ.Ε.Η στον Αλιάκμονα. Για τον λόγο αυτό η Δ.Ε.Η κατασκεύασε στα ρέματα φράγματα διευθέτησης. β) Κακή ποιότητα ξυλαποθέματος γ) Διευκόλυνση του κτηνοτροφικού κεφαλαίου της Τ.Κ. Πολυδένδρου δ) Η περιοχή κατά μήκος του Αλιάκμονα προσφέρει Αισθητικές και λοιπές απολαύσεις στους πολλούς επισκέπτες της περιοχής και για αυτό και το Δασαρχείο Βέροιας έχει κατασκευάσει έργα αναψυχής κατά μήκος του δρόμου που διέρχεται την περιοχή και ενώνει του δύο Υδροηλεκτρικούς σταθμούς της περιοχής.	ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΔΑΣΟΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΟΥ (2017-2026)
4β	4β	0,7-1,1	11 - 80	Πρεμν. ανομ.	66	-	30	-	-	Μικτή συστάδα αποτελούμενη από φυλλοβόλα (Δρυς – Γαύρος – Φράξος – Χρυσόξυλο κ.λ.π.) και αείφυλλα (Αριά, Φιλύκι, Πρίνος, Κουμαριά), με την δρυ να καταλαμβάνει δύο σχεδόν αμιγείς εκτάσεις στο νότιο τμήμα της συστάδας. Η ποιοτική κατάσταση του ξυλαποθέματος είναι κακή έως μέτρια , λόγω της έντονης λαθροϋλοτομίας και υπερβόσκησης που υπέστη κατά το παρελθόν και κυρίως την περίοδο του πολέμου 1940-50 και μετά. Η συστάδα να παραμείνει ανυλοτόμητη και στην τρέχουσα 10ετία και για τους παρακάτω λόγους: α) Λόγω των μεγάλων κλίσεων υπάρχει κίνδυνος να έχουμε διαβρώσεις των εδαφών , με αποτέλεσμα την πρόσχωση των τεχνικών λιμνών της Δ.Ε.Η στον Αλιάκμονα. Για τον λόγο αυτό η Δ.Ε.Η κατασκεύασε στα ρέματα φράγματα διευθέτησης. β) Κακή ποιότητα ξυλαποθέματος γ) Διευκόλυνση του κτηνοτροφικού κεφαλαίου της Τ.Κ. Πολυδένδρου δ) Η περιοχή κατά μήκος του Αλιάκμονα προσφέρει Αισθητικές και λοιπές απολαύσεις στους πολλούς επισκέπτες της περιοχής και για αυτό και το Δασαρχείο Βέροιας έχει κατασκευάσει έργα αναψυχής κατά μήκος του δρόμου που διέρχεται την περιοχή και ενώνει του δύο Υδροηλεκτρικούς σταθμούς της περιοχής.	ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΔΑΣΟΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΟΥ (2017-2026)
	Φ.πλ.				1335	-	25	-	-		
7	Δ.	-	-	-	-	-	-	-	-	Αποτελείται εξ ολοκλήρου από απαλλοτριωθείσες εκτάσεις και δεν αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης.	ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΔΑΣΟΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΟΥ (2017-2026)
9	Δ.	-	-	-	-	-	-	-	-	Αποτελείται εξ ολοκλήρου από απαλλοτριωθείσες εκτάσεις και δεν αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης.	ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΔΑΣΟΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΟΥ (2017-2026)
9α	Λ.πλ.	0,5-0,9	50	Πρεμν. ακαν.	464	-	20	-	-	Πουρνάρι 0,8 και λοιπά φυλλοβόλα 0,2 κυρίως γαύρος. Θαμνώδης υποβαθμισμένη συστάδα αείφυλλων πλατύφυλλων, μέτρια κατάσταση φυλλοβόλων πλατύφυλλων. Η συστάδα δεν υλοτομείται τις τελευταίες δεκαετίες και διαχειρίζεται ως βοσκότοπος. Καμία επέμβαση την τρέχουσα δεκαετία.	ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΝΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ (2010-2019)

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας / ha	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
10α	Δ.	0,6-0,9	14	Πρεμν. ομήλ.	932,61	-	16,36	-		Δρυς 0,8 λοιπών φυλλοβόλων κυρίως γαύρος 0,1, πουρνάρι 0,1. Μέτρια κατάσταση. Δεν παρατηρήθηκαν ζημιές. Υλοτομήθηκε το '95 και το '96. Προτείνονται Αποψιλωτικές υλοτομίες με παρακράτημα 10-12% στις ενώσεις δρυός. Η παρακράτηση κατά ομάδες και λόχμες στις καλύτερες ποιότητες τόπου. Αποψιλωτικές υλοτομίες στα λοιπά φυλλοβόλα πλατύφυλλα και στα αείφυλλα πλατύφυλλα. Έτος υλοτομίας 2017. Απαγόρευση βόσκησης.	ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΝΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ (2010-2019)
1α	Α.πλ.	1	0-40	Πρεμν. ακαν.	1.889,10		62,97	-	-	Δρυς 0,6. Αείφυλλα και φυλλοβόλα 0,4 (πουρνάρι, φιλύκι, γαύρος, αριά, άτομα σφενδάμου και φιλύρας). Η δρυς εμφανίζεται συμπαγής στο ανώτερο τμήμα της συστάδας. Στο κατώτερο τμήμα (προς ποταμό Αλιάκμονα και κοντά στην Μονή) εμφανίζονται παραμίσγματα με αριά, φιλύκι, πρίνο και φιλύρα. Ο ανώροφος είναι κλαδονομημένος. Κατά θέσεις ζημιές από υπερβόσκηση. Γενικά υγιές ξυλώδες κεφάλαιο. Το βόρειο τμήμα της συστάδας υλοτομήθηκε αποψιλωτικά το 1986-87 και το νότιο αποψιλωτικά και αναγωγικά την περίοδο 1980 - 1981. Προτείνονται: Απόληψη του 15% του ξυλαποθέματος με καλλιεργητικές - αναγωγικές υλοτομίες. Θα αποληφθούν συνολικά 690 m3 καυσόξυλων δρυός, αειφύλλων και διαφόρων πλατυφύλλων. Οι υλοτομίες θα διενεργηθούν μέχρι το ύψος του ασφαλτοστρωμένου δρόμου που οδηγεί στους Υ.Η.Σ. Σφηκιάς και Ασωμάτων για λόγους προστασίας των κατάντη ταμιευτήρων. Απαγόρευση βόσκησης. Έτος υλοτομίας 2010.	ΔΙΑΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟ ΔΑΣΟΣ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ (2009-2018)
	Δ.				2.748,00	-	91,6	-	-		
1β	Δ .	0,8-1,1	0-60	Πρεμν. ακαν.	800	-	20	-	-	Αείφυλλα (πρίνος φιλύκι, αριά) 0,6 και δρυς, γαύρος, φράξος κ.λ.π. 0,4. Παρατηρούνται ενώσεις αειφύλλων πλατυφύλλων συνεχόμενες και διακοπτόμενες κατά θέσεις από μικροομάδες και λόχμες δρυός, γαύρου και φράξου. Γενικά το ξυλώδες κεφάλαιο αν και ελάχιστο είναι υγιές με εξαίρεση κάποιες ζημιές από την υπερβόσκηση. Εκτός διαχείρισης. Θα εκμεταλλευθεί ως βοσκότοπος.	ΔΙΑΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟ ΔΑΣΟΣ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ (2009-2018)
2α	Δ .	1-1,1	20-37	Πρεμν. ανομηλ.	3.467,52	-	54,18	-	-	Δρυς, γαύρος κλπ 0,7. Αείφυλλα και φυλλοβόλα πλατύφυλλα 0,3. Άτομα σφενδάμου, καστανιάς και φιλύρας. Ενώσεις δρυός με αρκετά παραμίσγματα κυρίως γαύρου και ενώσεις αειφύλλων και φυλλοβόλων πλατυφύλλων. Τα περισσότερα άτομα καστανιάς και φιλύρας είναι κλαδονομημένα. Γενικά υγιές ξυλώδες κεφάλαιο με κακόμορφα όμως άτομα και ζημιές λόγω υπερβόσκησης και λαθρούλοτομιών. Η συστάδα υλοτομήθηκε αποψιλωματικά και αναγωγικά το 1983-1984. Υπέστη ζημιές από την πυρκαγιά του 1985. Πλησίον του δρόμου για Πολυδένδρι υπάρχει το θερινό ποιμνιοστάσιο Χαρίση. Προτείνονται: αποψιλωτική υλοτομία με παρακρατήματα δρυός σε ομάδες και λόχμες, σε ποσοστό περίπου 20% του ξυλώδους κεφαλαίου. Απόληψη 2.774 m3 καυσοξύλων δρυός και αειφύλλων πλατυφύλλων. Τα παρακρατήματα θα αφορούν κυρίως άτομα δρυός και θα χωροθετηθούν στο όριο με την 2β και κυρίως στα ανάντη των παλαιών λατομείων και στα πρानή των δρόμων, για λόγους προστασίας. Έτος υλοτομίας: 2010.	ΔΙΑΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟ ΔΑΣΟΣ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ (2009-2018)
2β	Δ .	0,8-1,1	0-50	Πρεμν. ακαν.	1.470,38	-	19,87	-	-	Αείφυλλα πλατύφυλλα (πρίνος φιλύκι, αριά) 0,8 και δρυς, γαύρος, φράξος κ.λ.π. 0,6. Συμπαγείς ενώσεις αειφύλλων πλατυφύλλων με διάσπαρτες μικροομάδες και λόχμες δρυός, γαύρου κ.λ.π. Η συστάδα έχει αποκτήσει σημαντικό προστατευτικό χαρακτήρα λόγω της ύπαρξης των μεγάλων ορυγμάτων των παλιών λατομείων, της ύπαρξης των τριών δρόμων πρόσβασης και του ταμιευτήρα του Υ.Η.Σ. Ασωμάτων. Εκτός διαχείρισης. Η συστάδα θα χρησιμοποιηθεί μόνο ως βοσκότοπος.	ΔΙΑΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟ ΔΑΣΟΣ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ (2009-2018)
3α	Δ .	0,9-1,1	20-35	Πρεμν. ανομηλ.	5.587,92	-	93,13	-	-	Δρυς 0,6, γαύρος, φράξος, καστανιά κλπ 0,2. Αείφυλλα 0,2. Άτομα φιλύρας και καστανιάς διάσπαρτα, πλάτανος στο ρέμα. Ενώσεις δρυός με αρκετά παραμίσγματα γαύρου, φράξου κλπ, διακοπτόμενες και σε μίξη με ομάδες και λόχμες αειφύλλων πλατυφύλλων. Παρατηρήθηκαν ζημιές από βοσκή και λαθρούλοτομίες. Γενικά υγιές ξυλώδες κεφάλαιο. Η συστάδα υλοτομήθηκε αποψιλωτικά και αναγωγικά στην περίοδο 1982 - 1983. Προτείνονται: αποψιλωτική υλοτομία με παρακρατήματα δρυός σε ομάδες και λόχμες, σε ποσοστό περίπου 20% του ξυλώδους κεφαλαίου. Απόληψη 4.000 m3 καυσοξύλων δρυός και αειφύλλων και λοιπόν πλατυφύλλων. Άτομα πλατάνου εκτός υλοτομίας. Τα παρακρατήματα θα αφορούν κυρίως στα κατάντη του ασφαλτοστρωμένου δρόμου και στο ρέμα όριο με την συστάδα 3β. Απαγόρευση βόσκησης για 10 χρόνια. Έτος υλοτομίας: 2009.	ΔΙΑΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟ ΔΑΣΟΣ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ (2009-2018)

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας / ha	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
3β	Δ .	0,9-1,1	15-40	Πρεμν. ανομηλ.	4.435,20	-	98,56	-	-	Δρυς 0,6, γαύρος, φράξος, σφενδάμι 0,3. Διάσπαρτα άτομα καστανιάς και φιλύρας. Στο ρέμα εμφανίζεται πλάτανος. Συστάδα με γενικά υγιές ξυλώδες κεφάλαιο. Αυξημένα παραμίγματα πλατυφύλλων εντός της δρυός, λόγω οπισθοδρομικής εξέλιξης κυρίως κοντά σε δρόμους και προσβάσιμα σημεία. Παρατηρούνται ζημιές από λαθροϋλοτομίες και βοσκή. Υλοτομήθηκε αποψιλωτικά και αναγωγικά την περίοδο 1980 - 1981. Προτείνονται: απόληψη του 15% του ξυλώδους κεφαλαίου με εξυγιαντικές - αναγωγικές υλοτομίες. Θα αποληφθούν 675 m3 καυσοξύλων δρυός, γαύρος κλπ. Ο πλάτανος εκτός υλοτομίας. Απαγόρευση βόσκησης . Έτος υλοτομίας 2011	ΔΙΑΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟ ΔΑΣΟΣ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ (2009-2018)
3γ	Δ ..	0,8-1,0	0-50	Πρεμν. ακαν.	1.291,55	-	19,87	-	-	Αείφυλλα πλατύφυλλα 0,7. Δρυς, γαύρος, φράξος κλπ 0,3. Στα ρέματα πλάτανος. Ενώσεις αειφύλλων πλατυφύλλων με σημαντικό ποσοστό φυλλοβόλων. Ζημιές από υπερβόσκηση και λαθροϋλοτομίες. Γενικά ξυλώδες κεφάλαιο. Συστάδα με έντονο προστατευτικό χαρακτήρα λόγω των γεωργικών εκτάσεων και των δρόμων που την διασχίζουν, αλλά και της ύπαρξης των ταμιευτήρων στα κατάντη. Εκτός διαχείρισης. Θα χρησιμοποιηθεί ως βοσκότοπος.	ΔΙΑΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟ ΔΑΣΟΣ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ (2009-2018)
3δ	Δ .	0,8-1,0	0-50	Πρεμν. ακαν.	1.192,20	-	19,87	-	-	Αείφυλλα πλατύφυλλα 0,7. Δρυς, γαύρος, φράξος κλπ 0,3. Στα ρέματα πλάτανος. Ενώσεις αειφύλλων πλατυφύλλων με σημαντικό ποσοστό φυλλοβόλων. Ζημιές από υπερβόσκηση και λαθροϋλοτομίες. Γενικά ξυλώδες κεφάλαιο. Συστάδα με έντονο προστατευτικό χαρακτήρα λόγω των γεωργικών εκτάσεων και των δρόμων που την διασχίζουν, αλλά και της ύπαρξης των ταμιευτήρων στα κατάντη. Εκτός διαχείρισης. Θα χρησιμοποιηθεί ως βοσκότοπος.	ΔΙΑΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟ ΔΑΣΟΣ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ (2009-2018)
4γ	Α.πλ.	0,9	0-50		576,00	-	19,86	-	-	Αείφυλλα πλατύφυλλα (πρίνος φιλύκι, κουμαριά) 0,6 και δρυς, γαύρος, κ.λ.π. 0,4. Υγιές ξυλώδες κεφάλαιο με σημαντικές όμως ζημιές στις ενώσεις πλατυφύλλων, λόγω της υπερβόσκησης. Προτείνονται: αποψιλωματική υλοτομία με παρακρατήματα σε ομάδες και λόχμες, σε ποσοστό περίπου 20% του ξυλώδους κεφαλαίου. Απόληψη 1.300 m ³ καυσοξύλων δρυός, γαύρου και αειφύλλων πλατυφύλλων. Τα παρακρατήματα θα είναι περισσότερα κατά μήκος του ασφαλτοστρωμένου δρόμου Βέροιας - Πολυδένδρου και πλησίον των αγροτικών εκτάσεων για λόγους προστασίας. Απαγόρευση βόσκησης για 10 χρόνια. Έτος υλοτομίας: 2011	ΔΙΑΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟ ΔΑΣΟΣ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ (2009-2018)
	Δ.			Πρεμν. ακαν.	1.056	-	55,58	-	-		
4δ	Δ .	0,8-1,0	0-50	Πρεμν. ακαν.	2.750	-	25	-	-	Αείφυλλα (πρίνος φιλύκι, κουμαριά) 0,7 δρυς, γαύρος, κ.λ.π. 0,3 σε καλύτερες θέσεις που έχουν υπερβοσκηθεί. Μέτρια υγιεινή κατάσταση της δρυός, γαύρου κλπ. Κακή κατάσταση στα αείφυλλα (νανοποιημένες συστάδες) λόγω υπερβόσκησης, έντονη κλαδονομή. Εντός της συστάδας υπάρχει ποιμνιοστάσιο που λειτουργεί όλο το έτος πιέζοντας υπερβολικά κυρίως τις ενώσεις αειφύλλων πλατυφύλλων. Εκτός διαχείρισης λόγω της κτηνοτροφίας . Αυστηρή τήρηση βοσκοφόρτωσης.	ΔΙΑΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟ ΔΑΣΟΣ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ (2009-2018)

ΟΡΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ: ΕΖΔ – ΖΕΠ GR1250001

ΥΠΟΜΝΗΜΑ:

Δασοπονικά Είδη: Δ= Δρυς, Μ.Π.= Μαύρη Πεύκη, Λ.Π.= Λευκόδερμη Πεύκη, Ο=Οξυά, Ε=Ελάτη, Γ.= Γαύρος, Λ.= Λεύκη Κ.= Καστανιά, Φιλύρ.= Φιλύρα, Οστρ.= Οστριά, Λ.πλ.= Λοιπά πλατύφυλλα, Λ.Φ.= Λοιπά φυλλοβόλα, Φ.πλ.= Φυλλοβόλα πλατύφυλλα, Α.πλ.= Αείφυλλα πλατύφυλλα, Αν. κων.= Αναδασώσεις κωνοφόρων, Θ.= Θαμνώνες Διασ. ατ.= Διάσπαρτα άτομα, Β.=Βραχύκορμα

Διαχειριστική, μορφή: Πρεμν.= Πρεμνοφυής, Σπερ= Σπερμοφυής, Διφ.=Διφυής

Δασοπονική μορφή: Ομήλ.= Ομήλικη, Ανομ./Ανομηλ.= Ανομήλικη, Αν.= Αναμοιόμορφη, Ομ.= Ομοιόμορφη, Πλ. Αν.= Πλήρως Αναμοιόμορφη, Ακαν.= Ακανόνιστη, Υποκηπ.= Υποκηπευτή, Κηπ.= κηπευτή, Αθρ.= Αθροίσματα, Τμ.= τμήμα

Ηλικία: Ηλ.= Ηλικία, Υπερωρ.= Υπερώριμα, Ωρ.= Ώριμα, Νεαρ.= Νεαρά, Γηρ.= Γηραιά, Υπεργ. Ατ.= Υπέργηρα Άτομα, Παρ.= Παρακρατήματα, Υλोट. Εκτ.= Υλοτομημένη Έκταση, Ανωτ.= Ανώτερη, Κατώτ.= Κατώτερη, Ακαθορ.= Ακαθόριστη, Μεμ.= Μεμονωμένα, Επικρ.= Επικρατούσα, Μερ. Δασ.= Μερικώς Δασοσκεπής

Συγκόμωση: Συμπ.= Σύμπυκτη, Οριζ.= Οριζόντια, Κλιμ.= Κλιμακωτή, Κλ.= Κλειστή, Φωτ.= Φωτεινή, Χαλ.= Χαλαρή

Κοινές συντομεύσεις: Ανομ./Ανομηλ.= Ανομήλικη, Επικρ.= Επικρατούσα, Κατώτ.= Κατώτερη, Ανωτ.= Ανώτερη, Διασ. ατ.= Διάσπαρτα άτομα

Πίνακας 2.2.5 -2 Συγκρότηση δασικής βλάστησης στη περιοχή Ολύμπου

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm	Συνολικο ξυλαπόθεμα συστάδας / ha	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
1	Διασ.ατ. Λ.Π.	-	Ακαθορ.	-	-	-	-	-	-	Εκτός διαχείρισης. Η συστάδα δεν έχει ξυλώδη όγκο πέρα από τα διάσπαρτα άτομα λευκόδερμης πεύκης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ «ΠΥΡΓΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ» ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2016-2025)
2α	Μ.Π.	0.7-0.9	>30 & Υπερωρ. >100	Σπερ. υποκηπ.ακαν. & ανομ.	7.106,00	5.169,00	173,32	126,07	72,74	Μαύρη Πεύκη σχεδόν σε αμιγή κατάσταση σε έκταση 40Ha. Διάσπαρτα άτομα λευκόδερμης πεύκης και οξυάς με μίξη κατά άτομο. Στο ρέμα υπάρχει μικροσυστάδα οξυάς σε έκταση περίπου 1Ha.Στην κορυφή της ράχης και στα σημεία με ισχυρή κλίση εμφανίζεται μερικώς δασοσκεπής. Στο βόρειο και κεντρικό τμήμα της συστάδας κυριαρχούν τα ώριμα άτομα με ύψη ως 14μ. Κατά μήκος του ρέματος υπάρχει καλύτερη ποιότητα τόπου με πιο ψηλά άτομα. Λόγω του ισχυρού ανάγλυφου η μαύρη Πεύκη εμφανίζεται να υστερεί. Κατά μήκος του ρέματος εμφανίζεται η οξυά σε μικροσυστάδες καλής ποιότητας. Η υγεία της συστάδας είναι καλή, δεν καταγράφηκαν προσβολές και σημαντικές ζημιές παρά κάποιες ανεμοθλασίες. Η υγεία της συστάδας είναι καλή, δεν καταγράφηκαν προσβολές και σημαντικές ζημιές παρά κάποιες ανεμοθλασίες. Εκτός διαχείρισης Απαιτείται η διάνοιξη δασικής οδού για την ορθολογική διαχείριση της συστάδας και την εφαρμογή των διαχειριστικών μέτρων.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ «ΠΥΡΓΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ» ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2016-2025)
2β	Μ.Π.	0.6-1.0	Ακαθορ. έως 140	Σπερ., ανομ., υποκηπ.& πλ. αν.	5.127,00	2.324,00	197,19	89,38	45,33	Στο νότιο και δυτικό τμήμα της η συστάδα είναι υποβαθμισμένη με μερικώς δασοσκεπή τμήματα και βραχώδεις εξάρσεις. Κατά μήκος του ρέματος εμφανίζεται καλύτερη κατάσταση. Δεν έχουν καταγραφεί σημαντικές ζημιές πέρα από την υστέρηση ανάπτυξης λόγω του ανάγλυφου. Προτείνονται: Διαχείριση στο δυτικό τμήμα της συστάδας και κατά μήκος του ρέματος (6Ha) , λόγω ισχυρών κλίσεων και βραχωδών εξάρσεων. Καλλιεργητικές υλοτομίες στην μαύρη πεύκη ανάλογα με την κατάσταση στις επιμέρους ενώσεις. Αποφυγή επέμβασης σε υποβαθμισμένες ενώσεις. Απομάκρυνση των κακόμορφων και υπερώριμων ατόμων και ευνόηση των βέλτιστων ατόμων. Απομάκρυνση των ατόμων οξυάς ή πεύκης στις ενώσεις όπου υπάρχει μίξη κατά άτομο με χειρισμούς ανάλογους με την κατάσταση των επιμέρους ενώσεων. Στην αμιγή οξυά κατά μήκος του ρέματος υλοτομίες καλλιεργητικές. Απαιτείται η διάνοιξη δασικής οδού μέχρι το κεντρικό τμήμα της συστάδας. Έτος υλοτομίας: 2017 Απαγόρευση της βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ «ΠΥΡΓΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ» ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2016-2025)
	Ο.				525,00	250,00	43,75	20,83	47,62		
2γ	Μ.Π.	0.6-0.9	Από 30 έως >120	Σπερ., υποκηπ.& αν.	5.473,00	3.695,00	133,49	90,12	67,51	Μίξη κατά άτομο με λευκόδερμη Πεύκη και ελάτη. Προτείνονται: Διαχείριση στο δυτικό τμήμα της συστάδας και κατά μήκος του ρέματος (10Ha) , λόγω ισχυρών κλίσεων και βραχωδών εξάρσεων. Καλλιεργητικές υλοτομίες στην μαύρη πεύκη ανάλογα με την κατάσταση στις επιμέρους ενώσεις. Αποφυγή επέμβασης σε υποβαθμισμένες ενώσεις.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ «ΠΥΡΓΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ» ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2016-2025)

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας / ha	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
	Ο.				525,00	250,00	43,75	20,83	47,62	Απομάκρυνση των κακόμορφων και υπερώριμων ατόμων και η ευνόηση των βέλτιστων ατόμων. Απομάκρυνση των ατόμων οξυάς ή πεύκης στις ενώσεις όπου υπάρχει μίξη κατά άτομο με χειρισμούς ανάλογους με την κατάσταση των επιμέρους ενώσεων. Στην αμιγή οξυά κατά μήκος του ρέματος υλοτομίες καλλιεργητικές. Απαιτείται η διάνοιξη δασικής οδού μέχρι το κεντρικό τμήμα της συστάδας. Έτος υλοτομίας: 2016. Απαγόρευση της βόσκησης	
26	Ε.	0.8-0.9 κατά θέσεις	Ακαθορ.,υ περωρ.>1 20	Σπερ., υποκηπ. & αν.	1.055,00	0,00	131,88	0,00	0,00	Συντίθεται κυρίως από λευκόδερμη Πεύκη σε μίξη κατά άτομο με μαύρη Πεύκη και άτομα ελάτης. Στο ρέμα Κλεφτόβρυση εντοπίζονται άτομα οξυάς Η συστάδα παραμένει ανεκμετάλλευτη για πολλά έτη με αποτέλεσμα τη συγκέντρωση σημαντικού ξυλώδους όγκου. Καταγράφηκαν κάποια άτομα σημαντικού ύψους και με πολύ καλή ανάπτυξη. Παρατηρήθηκαν αρκετές ζημιές από χιονοθλασίες και ανεμοθλασίες και λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών ανάγλυφου. Ο πυρήνας Πεύκης μεγάλης συγκόμωσης δεν έχει επηρεαστεί από ζημιές. Εκτός διαχείρισης. Η συστάδα είναι απροσπέλαστη λόγω του ανάγλυφου και στερείται οδικής σύνδεσης καθιστώντας αδύνατη την εκμετάλλευση της.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ «ΠΥΡΓΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ» ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2016-2025)
	Μ.Π.				12.476,00	1.810,00	178,23	25,86	14,51		
2ε*	Μ.Π. + Λ.Π.	0.8-0.9 κατά θέσεις	Ακαθορ.,υ περωρ.>1 20	Σπερ., υποκηπ. & αν.	2.200,00	-	169,23	-	-	Λευκόδερμη πεύκη σε μίξη κατά άτομο και κατ' ομάδα με μαύρη Πεύκη και ελάτη. Στο ρέμα υπάρχουν και άτομα οξυάς. Η συστάδα εμφανίζει σημαντικά τμήματα γυμνά και μερικώς δασοσκεπή λόγω των ισχυρών κλίσεων και του βραχώδους εδάφους. Υπάρχουν τμήματα ανάμεσα στις χαραδρώσεις όπου εντοπίζονται πυρήνες με καλή δασοκάλυψη, όπου καταγράφηκαν πολύ ψηλά άτομα, καλής ανάπτυξης και υγείας. Εντοπίστηκαν ζημιές από χιονοθλασίες και ανεμοθλασίες και πτώση δέντρων λόγω κατακρημνίσεων. Εκτός διαχείρισης. Αδύνατη η πρόσβαση. Εκτίμηση του ξυλώδους όγκου με χρήση αεροφωτογραφιών και οπτική εκτίμηση.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ «ΠΥΡΓΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ» ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2016-2025)
2στ*	Μ.Π. + Λ.Π.	0.7-0.9	Ακαθορ.,υ περωρ.>1 20	Σπερ., υποκηπ. & αν.	2.600,00	-	162,50	-	-	Λευκόδερμη Πεύκη σε μίξη με μαύρη Πεύκη κατά άτομο και ομάδες. Στο βόρειο τμήμα εντοπίζεται έκταση με αμιγή μαύρη Πεύκη. Σε όλη τη συστάδα διάσπαρτα άτομα ελάτης και οξυάς, ενώ στα ρέματα υπάρχουν ομάδες ατόμων οξυάς. Η συστάδα σε πολλά σημεία λόγω έντονων κλίσεων και βραχωδών εξάρσεων εμφανίζει μορφή μερικώς δασοσκεπή και υποβαθμισμένη. Υπάρχουν τμήματα ανάμεσα στις χαραδρώσεις όπου εντοπίζονται καλά δασωμένες εκτάσεις με ψηλά και καλής μορφής άτομα Πεύκης. Οι έντονες κλίσεις και η αδυναμία πρόσβασης καθιστούν την συστάδα ανεκμετάλλευτη Εκτός διαχείρισης Αδύνατη η πρόσβαση. Εκτίμηση του ξυλώδους όγκου με χρήση αεροφωτογραφιών και οπτική εκτίμηση.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ «ΠΥΡΓΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ» ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2016-2025)
3α	Μ.Π.	0.6-0.9	Ακαθορ.,υ περωρ.>8 0	Σπερ., υποκηπ. & αν.	3.037,00	1.508,00	101,23	50,27	49,65	Μαύρη Πεύκη σε αμιγή σχεδόν κατάσταση σε έκταση 30Ha, διάσπαρτα άτομα οξυάς και ελάτης με μίξη κατά άτομο (10 Ha).Υποβαθμισμένη συστάδα ιδιαίτερα στο δυτικό τμήμα της όπου είναι αραιή. Ήχνη και επιπτώσεις από δασική πυρκαγιά. Σχετικά καλή η υγεία των εναπομεινάντων ατόμων. Πολύκλαδη συστάδα με αρκετά στρεβλά άτομα. Προτείνεται: Υλοτομία συστάδας με διενέργεια επιλογικών υλοτομιών στις ενώσεις Μ. Πεύκης και Οξυάς. Η υλοτομία θα γίνει στο δυτικό τμήμα (10Ha) πάνω από και κατά μήκος του δρόμου. Έτος υλοτομίας: 2017 Απαγόρευση της βόσκησης	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ «ΠΥΡΓΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ» ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2016-2025)
	Ο.				437,00	234,00	43,70	23,40	53,55		
3β	Μ.Π.	0.6-0.8	Ακαθορ.,υ περωρ.>8 0	Σπερ., υποκηπ. & αν.	2.088,00	1.146,00	104,40	57,30	54,89	Μαύρη πεύκη σε αμιγή μορφή σε έκταση 20Ha. Μίξη κατά άτομο με οξυά και άτομα ελάτης. Κοντά στο ρέμα ομάδες ατόμων οξυάς. Υποβαθμισμένη συστάδα λόγω ισχυρού ανάγλυφου και πετρώδους εδάφους. Υπάρχουν λωρίδες με τμήματα καλής συγκόμωσης	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ «ΠΥΡΓΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ»

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας / ha	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
	Ο.				390,00	167,00	48,75	20,88	42,82	και κατάσταση ξυλώδους αποθέματος που διακόπτονται από γυμνά και μερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις. Η υγεία της συστάδας είναι μέτρια προς καλή και δεν σημειώθηκαν σημαντικές ζημιές. Προτείνεται: υλοτομία συστάδας με διενέργεια επιλογικών υλοτομιών στις ενώσεις μ. Πεύκης και οξυάς. Υλοτομία στο Βορειοανατολικό τμήμα (10Ha) πάνω από και κατά μήκος του δρόμου. Έτος υλοτομίας: 2018 Απαγόρευση βόσκησης	ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2016-2025)
3γ*	Μ.Π. + Λ.Π. + Ε	0.8-1.0 κατά θέσεις	Ακαθορ.,υπεργ. ατ.	Σπερ., υποκηπ. & αν.	3.400,00	-	109,68	0,00	0,00	Μαύρη πεύκη σε μίξη με λευκόδερμη κατά άτομο και κατά ομάδες. Επίσης υπάρχει μίξη κατά άτομο με οξυά και ελάτη. Πολύξυλη συστάδα με πολύ καλή κατάσταση κυρίως στο νότιο τμήμα (ψηλότερα σημεία). Ικανοποιητική μορφή κορμών με μεγάλα ύψη. Στα χαμηλότερα υψόμετρα (βόρειο τμήμα) μέτρια προς κακή κατάσταση του ξυλώδους όγκου. Καταγράφηκαν αρκετές ζημιές λόγω ανεμοθλασιών και χιονοθλασιών. Εκτός διαχείρισης Αδύνατη η πρόσβαση. Εκτίμηση του ξυλώδους όγκου με χρήση αεροφωτογραφιών και οπτική εκτίμηση.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ «ΠΥΡΓΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ» ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2016-2025)
4α	Μ.Π.	0.7-0.9	Ακαθορ.,υπεργ. >120	Υποκηπ. & αν.Μ.Π. : Σπερ.Δ.: Πρεμν.	4.958,00	2.951,00	170,97	101,76	59,52	Ξυλαπόθεμα με άτομα ικανοποιητικών διαστάσεων, ευθυτενή και αποκλαδωμένα. Η κατάσταση υγείας είναι καλή χωρίς προσβολές και ζημιές. Προτείνονται: υλοτομία συστάδας με διενέργεια επιλογικών υλοτομιών, επί εκτάσεως (20Ha) και εξωδάσωση των παραχθέντων προϊόντων. Έτος υλοτομίας: 2019 Απαγόρευση βόσκησης	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ «ΠΥΡΓΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ» ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2016-2025)
4β	Μ.Π.	0.7-0.9	Ακαθορ. έως 130	Σπερ., υποκηπ. & αν.	8.742,00	4.655,00	178,41	95,00	53,25	Αμιγής μαύρη πεύκη με διάσπαρτα άτομα λευκόδερμης πεύκης κυρίως προς τα ανώτερα υψόμετρα. Ικανοποιητική κατάσταση ξυλώδους κεφαλαίου με καλύτερη ποιότητα στο νότιο τμήμα. Χοντροί κορμοί στα ψηλότερα σημεία, στα κατώτερα λεπτοί & κορμίδια. Λίγες ζημιές από ανεμοριψίες και χιονοθλασίες. Υλοτομητέα έκταση 7Ha. Έτος Υλοτομίας: 2018 Απαγόρευση βόσκησης	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ «ΠΥΡΓΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ» ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2016-2025)
4γ	Μ.Π.	0.8-1.0	Νεαρ. Έως υπεργ.>150	Υποκηπ.ακαν.	13.648,00	11.298,00	267,61	221,53	82,78	Μ. Πεύκη σχεδόν αμιγής (42 Ha). Λευκόδερμη Πεύκη σε μίξη με τη Μαύρη (9 Ha).Καλή κατάσταση ξυλώδους κεφαλαίου της οξυάς, πολλά υπέργηρα άτομα Πεύκης. Προτείνονται: καλλιεργητικές υλοτομίες για τη Μ. Πεύκη με απομάκρυνση των υπέργηρων ατόμων. Καλλιεργητικές υλοτομίες της Οξυάς και της Ελάτης. Η υλοτομία θα γίνει επί εκτάσεως (15Ha) και βασικά εκεί μπορεί να γίνει εξωδάσωση των παραχθέντων προϊόντων (στο βόρειο μέρος της συστάδας). Έτος Υλοτομίας: 2018 Απαγόρευση βόσκησης	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ «ΠΥΡΓΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ» ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2016-2025)
	Ο.				138,00	0,00	13,80	0,00	0,00		
	Ε.				300,00	0,00	30,00	0,00	0,00		
5α	Μ.Π.	0.7-0.8	40-80 & υπεργ.>100 κατά θέσεις	Σπερ., ανομ. έως υποκηπ. & αν.	10.941,00	6.351,00	206,43	119,83	58,05	Σχεδόν αμιγής συστάδα μαύρης Πεύκης. Μίξη κατά άτομο με οξυά και λοιπά πλατύφυλλα (γάβρο, φράξο και σφεντάμι). Η συστάδα κυριαρχείται από ώριμα και υπερώριμα άτομα μαύρης Πεύκης. Κατά θέσεις εντοπίζονται ομάδες νεαρών ατόμων και πυκνοφυτίες. Η μη διαχείριση της συστάδας και η σύμπυκνη κατάσταση κατά θέσεις έχει υποβαθμίσει την ποιότητα του ξυλώδους κεφαλαίου και δεν μπορεί να παραχθεί τεχνική ξυλεία. Η υγεία της συστάδας είναι καλή με μικρές διαφοροποιήσεις κατά θέσεις Εκτός διαχείρισης Η συστάδα στερείται οδικής σύνδεσης και δεν μπορεί να διαχειριστεί αν δεν προηγηθεί διάνοιξη δρόμου.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ «ΠΥΡΓΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ» ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2016-2025)

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας / ha	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
5β	Μ.Π.	0.7-0.8	Π.: >80 & Ο.:60-90	Σπερ., ανομ. έως υποκηπ. & αν.	22.324,00	13.540,00	289,92	175,84	60,65	Συστάδα μαύρης Πεύκης και Λευκόδερμης Πεύκης. Μίξη κατά άτομο με οξυά και ελάτη. Συνεχείς ενώσεις Πεύκης κυρίως στο βόρειο και ανατολικό τμήμα της συστάδας. Στα ανώτερα υψόμετρα (στο νότιο τμήμα) υπάρχουν μερικώς δασοσκεπείς και γυμνές εκτάσεις. Η οξυά κατά μήκος του κεντρικού ρέματος (ρ. Παπά) σε πολύ καλή κατάσταση. Εκτός διαχείρισης Η συστάδα στερείται οδικής σύνδεσης και δεν μπορεί να διαχειριστεί αν δεν προηγηθεί διάνοιξη δρόμου.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ «ΠΥΡΓΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ» ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2016-2025)
5γ	Μ.Π.	0.7-0.8	Μ.Π.: >80 & Ο.: υπερωρ.> 80	Σπερ., υποκηπ. & αν.	11.319,00	6.818,00	217,67	131,12	60,24	Αμιγές δάσος μαύρης Πεύκης σε έκταση 38Ha, μικτό δάσος μαύρης Πεύκης και λευκόδερμης Πεύκης σε έκταση 5Ha και ενώσεις οξυάς σε έκταση 9Ha κυρίως κατά μήκος των ρεμάτων. Στα προσήλια τμήματα της συστάδας μερικώς δασοσκεπής, γυμνή και άγονη. Οι ανήλιες θέσεις της συστάδας είναι δασοσκεπής. Στο κεντρικό και βόρειο τμήμα της συστάδας επικρατούν οι δασοσκεπείς εκτάσεις. Ποιοτικά το ξυλαπόθεμα εμφανίζεται καλό με ευθυτενή και ψηλά άτομα Εκτός διαχείρισης Η συστάδα στερείται οδικής σύνδεσης και δεν μπορεί να διαχειριστεί αν δεν προηγηθεί διάνοιξη δρόμου	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ «ΠΥΡΓΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ» ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2016-2025)
5δ	Μ.Π.	0.7-0.8	Π. + Ο.: >90	Υποκηπ.ακαν.	14.197,00	9.853,00	215,11	149,29	69,40	Αμιγής μαύρη Πεύκη με μίξη κατά άτομο με λευκόδερμη σε έκταση 51Ha, Οξυά σε έκταση 7Ha κυρίως κατά μήκος των ρεμάτων και μικτό δάσος Μαύρης και λευκόδερμης Πεύκης σε έκταση 15Ha. Η δασοσκεπής έκταση περιορίζεται στα βόρεια Εκτός διαχείρισης Η συστάδα στερείται οδικής σύνδεσης και δεν μπορεί να διαχειριστεί αν δεν προηγηθεί διάνοιξη δρόμου	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ «ΠΥΡΓΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ» ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2016-2025)
6α	Μ.Π.	0.7-1.0	Ακαθορ., >100	Σπερ., υποκηπ. & αν.	5.076,00	0,00	211,50	0,00	0,00	Μαύρη Πεύκη σε έκταση 24Ha, οξυά σε έκταση 15Ha, μικτή έκταση μαύρης Πεύκης και λευκόδερμης Πεύκης σε έκταση 38Ha. Μεμονωμένα άτομα ελάτης. Η συστάδα είναι απομακρυσμένη και το ανώτερο τμήμα της εμφανίζεται με διασπασμένη κομοστέγη λόγω κυρίως των κρημνωδών κλίσεων. Στα ανώτερα υψόμετρα εμφανίζονται τα ανώτερα υψόμετρα εξάπλωσης των δασικών ειδών στα όρια με την αλπική ζώνη. Στα χαμηλότερα υψόμετρα εμφανίζει σύμπυκτη κατάσταση στις ενώσεις μαύρης Πεύκης και ενώσεις οξυάς σε καλή κατάσταση. Εκτός διαχείρισης Η συστάδα στερείται οδικής σύνδεσης και δεν μπορεί να διαχειριστεί αν δεν προηγηθεί διάνοιξη δρόμου.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ «ΠΥΡΓΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ» ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2016-2025)
	Ο.				770,00	0,00	77,00	0,00	0,00		
6β	Μ.Π.	0.7-1.0	Ακαθορ.,υπερωρ.>100	Σπερ., υποκηπ. & αν.	4.560,00	0,00	182,40	0,00	0,00	Η οξυά εμφανίζεται σε έκταση περίπου 30Ha, Μαύρη πεύκη σε έκταση 25Ha. Εντοπίζονται ενώσεις λευκόδερμης πεύκης και ελάτη σε ομάδες και με μεμονωμένα άτομα. Στα κατώτερα υψόμετρα της συστάδας και κατά μήκος των μικροχαρδρώσεων πυκνές συστάδες μαύρης Πεύκης και οξυάς σε σχετικά καλή κατάσταση. Στα ενδιάμεσα υψόμετρα υπάρχουν μερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις και γυμνά σημεία λόγω των ισχυρών κλίσεων, με δασοσκεπείς εκτάσεις κατά μήκος των ρεμάτων και χαραδρώσεων. Στα μέσα ανώτερα υψόμετρα εμφανίζεται η οξυά στις βόρειες εκθέσεις στα όρια εξάπλωσης του είδους σε μέτρια όμως κατάσταση. Στα ανώτατα υψόμετρα εμφανίζεται η λευκόδερμη Πεύκη σε αραιή κατάσταση και με μεμονωμένα υπερώριμα άτομα. Υπάρχουν διάσπαρτα άτομα ελάτης. Εκτός διαχείρισης Η συστάδα στερείται οδικής σύνδεσης και δεν μπορεί να διαχειριστεί αν δεν προηγηθεί διάνοιξη δρόμου.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ «ΠΥΡΓΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ» ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2016-2025)
	Ο.				3.393,00	248,00	113,10	8,27	7,31		
7α	Μ.Π	0.7-0.9	Ακαθορ.,υπερωρ.>80	Σπερ., υποκηπ. & αν	3.093,00	384,00	140,59	17,45	12,42	Η οξυά εμφανίζεται σε έκταση περίπου 12Ha, Μαύρη Πεύκη σε έκταση 22Ha. Εντοπίζονται ενώσεις λευκόδερμης Πεύκης και ελάτη σε ομάδες και με μεμονωμένα άτομα. Η συστάδα εμφανίζεται δασοσκεπής κυρίως στο κατώτερο τμήμα κατά μήκος του ρέματος με μίξη Πεύκης και οξυάς. Στα μεσαία υψόμετρα οι δασοσκεπείς εκτάσεις διακόπτονται από μερικώς δασοσκεπείς και γυμνές βραχώδεις εκτάσεις. Υπάρχουν αρκετά ψηλά άτομα πεύκης με καλή ευθυτενία και αρκετά πληρόμορφα. Εκτός διαχείρισης	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ «ΠΥΡΓΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ» ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2016-2025)
	Ο.				1.375,00	0,00	114,58	0,00	0,00		

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας / ha	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
7β	Μ.Π.	0.6-0.8	Ακαθορ.,υπερωρ.>80	Σπερ., υποκτηπ. & αν	2.828,00	-	76,43	-	-	Μαύρη Πεύκη σε έκταση 25Ha και οξυά σε έκταση 12Ha. Η συστάδα είναι υποβαθμισμένη και σε μια ενδιάμεση κατάσταση ανάμεσα στη δασοσκεπή και μερικών δασοσκεπή μορφή λόγω των ισχυρών κλίσεων. Στα ρέματα και στα κοιλώματα του εδάφους εμφανίζονται πιο πυκνές ενώσεις Πεύκης και οξυάς. Η κατάσταση της οξυάς είναι πολύ υποβαθμισμένη και με μικρή ανάπτυξη. Εκτός διαχείρισης	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ «ΠΥΡΓΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ» ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2016-2025)
7γ*	Ο. + Μ.Π.	0.6-0.8	Ωρ. & υπερωρ. ατ.	Σπερ. ομ.	5.700,00	-	85,07	-	-	Αμιγής οξυά 40Ha. Εμφανίζεται με πυκνές ενώσεις λεπτών ατόμων και μόνο προς τα κατώτερα υψόμετρα εμφανίζει μεγαλύτερες διαστάσεις. Ενώσεις μαύρης και λευκόδερμης πεύκης στο υπόλοιπο της συστάδας (27Ha). Η μαύρη και λευκόδερμη Πεύκη με αντίστοιχα κακής ποιότητας και ανάπτυξης ενώσεις. Εκτός διαχείρισης Εκτίμηση του ξυλώδους όγκου με χρήση αεροφωτογραφιών και οπτική εκτίμηση	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ «ΠΥΡΓΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ» ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2016-2025)
7δ*	Ο. + Μ.Π.	0.7-0.8	Ωρ. & υπερωρ	Ο.: Ομηλ. & ομ. Μ.Π.: αν.	2.600,00	-	68,42	-	-	Η οξυά με υστέρηση ανάπτυξης εμφανίζεται λεπτόκορμη με καλύτερη ανάπτυξη κατά μήκος των ρεμάτων. Η Πεύκη επίσης υποβαθμισμένη. Η συστάδα είναι πολύ υποβαθμισμένη λόγω των έντονων κλίσεων. Εκτός διαχείρισης	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ «ΠΥΡΓΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ» ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2016-2025)
8α	Μ.Π.	0.6-0.75 Κατά θέσεις	40 - 90 κατά θέσεις, Σπορείς Μ.Π. >90	Σπερ., υποκτηπ. & αν	12.869,00	6.619,00	247,48	127,29	51,43	Καλή κατάσταση υγείας κατά θέσεις μέτρια προς κακή. Αρκετές ραγάδες και κεραυνόπληκτα άτομα κυρίως στα μεγαλύτερα υψόμετρα και στα όρια με τις μερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις. Στο ΒΔ τμήμα της συστάδας επικρατούν οι καλύτερες ποιότητες τόπου και καλύτερης ποιότητας κορμοί, με πολλές πυκνοφυτείες. Το Νότιο τμήμα της συστάδας κατώτερης ποιότητας. Στο κεντρικό τμήμα της συστάδας προτείνεται η καλλιέργεια των κορμιδίων και χοντρών κορμιδίων με αραιώση κατά θέσεις εντονότερη. Απαιτείται η απομάκρυνση παλιών παρακρατημάτων (σπορείς) οι οποίοι είναι μεγάλης ηλικίας. Πρέπει να αφεθούν κάποιοι (1 ανά στρέμμα) για λόγους φωλεοποίησης της πανίδας. Στις κατώτερες ποιότητες τόπου προτείνεται η καλλιέργεια (εξευγενιστική αραιώση) με εφαρμογή θετική επιλογής και κατά θέσεις αραιώσεις και προσπάθεια δημιουργίας μικτών ενώσεων. Κατά μήκος της ράχης και του ανατολικού τμήματος της συστάδας δεν θα γίνουν υλοτομίες λόγω ισχυρών κλίσεων. Προτείνεται η διάνοιξη τρακτερόδρομων Υλοτομητέα έκταση 20Ha. Έτος Υλοτομίας: 2020 Απαγόρευση βόσκησης	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ «ΠΥΡΓΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ» ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2016-2025)
8β	Μ.Π.	0.6-0.7	40 - 90	Σπερ., υποκτηπ. & αν	3.232,00	737,00	124,31	28,35	22,80	Σχεδόν αμιγής συστάδα μαύρης Πεύκης (Pinus nigra), διάσπαρτα άτομα ελάτης, οξυάς και γάβρου κυρίως νεαρά άτομα και στην σκιά του ανωρόφου. Η κατάσταση του ξυλώδους κεφαλαίου κρίνεται μέτρια προς καλή και κατά θέσεις καλή. Εντοπίστηκαν αρκετοί σπασμένοι επικόρυφοι κυρίως στα νεαρά άτομα. Υπάρχουν πολλά στρεβλά και κακόμορφα άτομα, με κακή αποκλάδωση και όχι καλή ευθυτένια. Ορισμένα διχαλωτά. Προτείνονται: καλλιέργεια λεπτών κορμιδίων με εφαρμογή αρνητική επιλογής, καθαρισμός στις πυκνές ενώσεις Πεύκης. Αραιώσεις και απομάκρυνση των στρεβλών και κακόμορφων ατόμων στις ενώσεις με μεγάλη πυκνότητα. Διατήρηση σπορέων με πυκνότητα 1 ανά δύο στρέμματα. Επιλογικές υλοτομίες στις ενώσεις Οξυάς, Ελάτης και Φυλ. Πλατυφ. Έτος υλοτομίας: 2020 Απαγόρευση βόσκησης	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ «ΠΥΡΓΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ» ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2016-2025)
9α	Μ.Π.	0.7-0.8	35 – 80 Κατά θέσεις	Σπερ., ανομ. έως υποκτηπ. & ακαν.	10.342,00	2.198,00	198,88	42,27	21,25	Στα ανώτερα υψόμετρα κυριαρχεί η Πεύκη σε μέτρια κατάσταση λόγω των ισχυρών κλίσεων και του βραχώδους εδάφους. Χαμηλά ύψη δέντρων και πολλά στρεβλά και κακόμορφα άτομα. Η συστάδα παραμένει εκτός διαχείρισης λόγω των ισχυρών κλίσεων και της έλλειψης οδικής πρόσβασης. Εκτός διαχείρισης	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ «ΠΥΡΓΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ» ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2016-2025)
	Ο.				2.200,00	0,00	220,00	0,00	0,00		

Συστάδα α	Δασοπονικά είδη	Συγκόμ ωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	Συνολικό ξυλαπόθεμ α συστάδας	Ξυλαπόθεμ α κλάσεων διαμέτρου >34 cm	Συνολικο ξυλαπόθεμ α συστάδας / ha	Ξυλαπόθεμ α κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμ α / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
9β	Μ.Π.	0.6-0.7	40 - 80	Σπερ., ανομ. & αν.	4.396,00	1.848,00	129,29	54,35	42,04	Αμιγής μαύρη Πεύκη με κατά θέσεις μίξη οξυάς και λοιπών πλατύφυλλων (γάβρου και φράξου). Η συστάδα είναι υποβαθμισμένη λόγω των ισχυρών κλίσεων και τους αβαθούς εδάφους. Η Πεύκη ιδιαίτερα στα μεγαλύτερα υψόμετρα εμφανίζεται σε αραιή κατάσταση με άτομα ισχνής ανάπτυξης και καταπιεσμένα λόγω συνθηκών. Καλύτερη κατάσταση στο ρέμα όπου υπάρχουν αμιγείς ενώσεις οξυάς και μίξη με άτομα Μαύρης Πεύκης. Έλλειψη οδικής πρόσβασης. Εκτός διαχείρισης	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ «ΠΥΡΓΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ» ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2016- 2025)
9γ	Μ.Π.	0.6- 0.75	40 – 80 κατά θέσεις	Σπερ., ανομ. & αν.	5.861,00	2.464,00	167,46	70,40	42,04	Σχεδόν αμιγής μαύρη Πεύκη με κατά άτομο μίξη με οξυά και πλατύφυλλα (γάβρος και φράξο). Η συστάδα είναι υποβαθμισμένη λόγω των ισχυρών κλίσεων και του αβαθούς εδάφους. Η Μαύρη πεύκη στο μεγαλύτερο τμήμα της συστάδας είναι υποβαθμισμένη με ισχνή ανάπτυξη (άτομα ώριμα με μικρό ύψος και μέτριες διαμέτρους). Στο ρέμα μόνο υπάρχει καλύτερη ποιότητα όπου υπάρχει έδαφος και περισσότερη υγρασία. Έλλειψη οδικής πρόσβασης. Εκτός διαχείρισης	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ «ΠΥΡΓΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ» ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2016- 2025)
10	Μ.Π.	0.7-1.0	50 – 80 & μεμ. >100	Σπερ., ανομ. & αν.	22.349,00	12.028,00	343,83	185,05	53,82	Σχεδόν αμιγής μαύρη Πεύκη με κατά άτομο μίξη με οξυά κυρίως κοντά στο ρέμα. Διάσπαρτα άτομα από λοιπά πλατύφυλλα (γάβρο και φράξο) και ελάτη. Σύμπυκνες ενώσεις μαύρης Πεύκης και κατά θέσεις αραιότερα στις περιοχές των βραχωδών εξάρσεων. Η συστάδα δεν έχει οδική σύνδεση. Κατά θέσεις πυκνές ενώσεις Πεύκης στο στάδιο χοντρών κορμιδίων. Στο νότιο τμήμα της συστάδας κυριαρχούν οι μερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις με αραιά άτομα πεύκης μεγάλης ηλικίας. Στις μισγάνγειες και στις ρεματιές μίξη κατά άτομο με οξυά και σύμπυκνες ενώσεις Μαύρης Πεύκης. Εκτός διαχείρισης	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ «ΠΥΡΓΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ» ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2016- 2025)
11α	Μ.Π.	0.6-0.7	Μ.Π.: >80	Σπερ,	200,00	0,00	66,67	0,00	0,00	Προτείνονται: αποψιλωτική υλοτομία των αειφύλλων πλατυφύλλων χωρίς παρακρατήματα. Διατήρηση μόνο ανωρίμων ενώσεων ως φυσικό απόθεμα. Όπου υπάρχουν φυλλοβόλα πλατύφυλλα ως ανώροφος στα αείφυλλα, θα παρακρατούνται 5-6 άτομα (φυλλοβόλων πλατυφύλλων) ανά στρέμμα. Στις αμιγείς ενώσεις φυλλοβόλων πλατυφύλλων καλλιεργητικές υλοτομίες αρνητικής κυρίως επιλογής με θετική επιλογή στις καλύτερες από υγεία και φαινότυπο ενώσεις. Η μαύρη πεύκη δεν θα υλοτομηθεί λόγω έλλειψης οδικής πρόσβασης. Υλοτομητέα έκταση 10Ha. Έτος υλοτομίας: 2020. Απαγόρευση βόσκησης	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ «ΠΥΡΓΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ» ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2016- 2025)
	Α.πλ.	0.8-1.2	≈ 20-50	Πρεμν.	917,00	0,00	27,79	0,00	0,00		
	Φ.πλ.	0.8-1.2	≈ 20-50	Πρεμν.	600,00	0,00	18,18	0,00	0,00		
11β	Μ.Π.	0.6-0.8	>80	Αν. Μ.Π.: σπερ. & Α.πλ.: πρεμν.	4.307,00	3.280,00	143,57	109,33	76,16	Αμιγής συστάδα μαύρης Πεύκης με εμφάνιση αείφυλλων πλατύφυλλων στα κατάντη προς το ρέμα Αράπης. Ενώσεις οξυάς και μεμονωμένα άτομα κατά μήκος του ρέματος. Η συστάδα είναι πολύ υποβαθμισμένη λόγω της ολικής καταστροφής από δασική πυρκαγιά το 1997. Το μεγαλύτερο τμήμα της αποτελεί μερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις. Εκτός διαχείρισης	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ «ΠΥΡΓΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ» ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2016- 2025)
12α	Α.πλ.	0.8-1.1	έως 50	Πρεμν & αν.	162,00	0,00	8,53	0,00	0,00	Μαύρη Πεύκη σε έκταση 27Ha και οξυά σε ομάδες σε έκταση 5Ha, αείφυλλα και φυλλοβόλα πλατύφυλλα σε έκταση 19Ha. Η μαύρη Πεύκη περιορίζεται στο ανώτερο τμήμα της συστάδας σε κακή κατάσταση, υποβαθμισμένη. Στα μέσα και κατώτερα υψόμετρα κυριαρχούν τα αείφυλλα πλατύφυλλα. Η συστάδα παρέμεινε εκτός διαχείρισης. Προτείνονται: αποψιλωτική υλοτομία των αειφύλλων πλατυφύλλων χωρίς παρακρατήματα. Διατήρηση μόνο ανωρίμων ενώσεων ως φυσικό απόθεμα. Όπου υπάρχουν φυλλοβόλα πλατύφυλλα ως ανώροφος στα αείφυλλα, θα παρακρατούνται 5-6 άτομα (φυλλοβόλων πλατυφύλλων) ανά στρέμμα. Στις αμιγείς ενώσεις φυλλοβόλων πλατυφύλλων καλλιεργητικές υλοτομίες αρνητικής κυρίως επιλογής με θετική επιλογή στις καλύτερες από υγεία και φαινότυπο ενώσεις. Η μαύρη πεύκη δεν θα υλοτομηθεί λόγω έλλειψης οδικής πρόσβασης. Υλοτομητέα έκταση 19Ha .Έτος υλοτομίας: 2020. Απαγόρευση βόσκησης	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ «ΠΥΡΓΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ» ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2016- 2025)
	Μ.Π.	0.6-0.7	>80	Σπερ. & αν.	3.528,00	3.617,00	130,67	133,96	102,52		
	Ο.	0.6-0.8	30-60		327,00	189,00	65,40	37,80	57,80		
12β	Μ.Π.	0.7-0.9	Μέσες & ανωτ. >60	Σπερ., υποκτηπ. & αν	5.741,00	4.457,00	108,32	84,09	77,63	Οι ενώσεις Μαύρης Πεύκης με άτομα χαμηλού ύψους και μικρής ανάπτυξης λόγω των εδαφικών συνθηκών. Ίχνη παλαιάς πυρκαγιάς σε μεγάλη έκταση. Σημαντικές ζημιές από ανεμοθλασίες και χιονοθλασίες. Η συστάδα παρέμεινε εκτός διαχείρισης για πολλά χρόνια. Προτείνονται: Καλλιεργητικές υλοτομίες και εξευγενιστικές αραιώσεις στις ανώτερες κλάσεις διαμέτρων. Υλοτομητέα έκταση 20Ha Έτος υλοτομίας: 2021 Απαγόρευση βόσκησης	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ «ΠΥΡΓΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ» ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2016- 2025)

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας / ha	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
12γ	Μ.Π.	0.6-0.7	>80	Αν. & υποκτηπ. σπερ.	6.432,00	4.949,00	134,00	103,10	76,94	Μαύρη Πεύκη σε αμιγή κατάσταση κυρίως αλλά και σε μίξη σε έκταση 48Ha και θαμνώνες αείφυλλων πλατύφυλλων σε έκταση 10Ha με άτομα βραχύκορμων. Το κατώτερο τμήμα της συστάδας εμφανίζεται αρκετά υποβαθμισμένο με μεγάλα τμήματα μερικώς δασοσκεπή και γυμνά. Η συστάδα παρέμεινε εκτός διαχείρισης. Προτείνονται: να αποληφθεί ποσότητα 100κ.μ. με επιλογικές υλοτομίες στις ενώσεις μαύρης Πεύκης. Η υλοτομία να γίνει κατά μήκος του δρόμου μόνο(5Ha) στο Νότιο μέρος της συστάδας λόγω αδυναμίας εξωδάσωσης των δασικών προϊόντων στην υπόλοιπη συστάδα. Αποψιλωτική υλοτομία των αιφύλλων πλατυφύλλων χωρίς παρακρατήματα. Διατήρηση μόνο ανώριμων ενώσεων ως φυσικό απόθεμα . Όπου υπάρχουν φυλλοβόλα πλατύφυλλα ως ανώροφος στα αείφυλλα, θα παρακρατούνται 5-6 άτομα (φυλλοβόλων πλατυφύλλων) ανά στρέμμα. Στις αμιγείς ενώσεις φυλλοβόλων πλατυφύλλων καλλιεργητικές υλοτομίες αρνητικής κυρίως επιλογής με θετική επιλογή στις καλύτερες από υγεία και φαινότυπο ενώσεις. Η υλοτομία θα γίνει μόνο στο βόρειο μέρος της συστάδας (10Ha) λόγω αδυναμίας εξωδάσωσης των δασικών προϊόντων στην υπόλοιπη συστάδα. Έτος υλοτομίας: 2021 Απαγόρευση βόσκησης	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ «ΠΥΡΓΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ» ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2016-2025)
	Πλ.	Θ.: 0.8-1.1	Θ.: 4 έως 60	Πρεμν.	1.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
13α	Λ.πλ.	0.9-1.2	Ωρ. & υπερωρ. >120	Ανομ. & αν. σπερ.	190,00	56,00	19,00	5,60	29,47	Αμιγής συστάδα μαύρης Πεύκης με μεμονωμένα και κατά ομάδες άτομα βραχύκορμων, οξυάς στα ρέματα και άτομα λοιπών πλατύφυλλων με κυρίαρχα την κουμαριά, αριά, γαύρο, φράξο και άτομα αρκεύθου. Από το μέσο προς τα ανώτερα υψόμετρα η Πεύκη εμφανίζεται πολύ ικανοποιητική με καλή αναγέννηση και πλήρη δασοκάλυψη. Στα κατώτερα υψόμετρα κυριαρχούν τα αείφυλλα πλατύφυλλα με αραιή την κάλυψη της Πεύκης. Εκτός διαχείρισης. Έλλειψη δασοδρόμων	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ «ΠΥΡΓΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ» ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2016-2025)
	Μ.Π.	0.6-0.8		Πρεμν.	947,00	688,00	59,19	43,00	72,65		
13β	Μ.Π.	Μ.Π.: 0.8-0.9 Β + Λ.πλ.: 0.9-1.1	ακαθορ. με κυριαρχία υπερωρ.	Αν. & υποκτηπ. Μ.Π.: σπερ. Λ.πλ.: πρεμν.	5.274,00	4.516,00	159,82	136,85	85,63	Σχεδόν αμιγής συστάδα μαύρης Πεύκης σε έκταση 30Ha, πλατύφυλλα είδη και βραχύκορμα σε έκταση 3Ha. Στο μέσο και κατώτερο προς το ρέμα τμήμα της συστάδας πολύ καλή κατάσταση για τη μαύρη Πεύκη η οποία εμφανίζεται αμιγής. Καταγράφηκαν μικρής έκτασης ζημιές από ανεμοθλασίες. Η συστάδα παρέμεινε εκτός διαχείρισης. Θα αποληφθεί ποσότητα 100κ.μ. από τις ενώσεις μαύρης Πεύκης με επιλογικές υλοτομίες. Υλοτομητέα έκταση 7Ha Έτος υλοτομίας: 2021 Απαγόρευση βόσκησης	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ «ΠΥΡΓΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ» ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2016-2025)
13γ	Μ.Π.	0.6-1.1		Ακαν., υποκτηπ.	3.633,00	1.884,00	201,83	104,67	51,86	Μαύρη Πεύκη, βραχύκορμα,δρυς κλπ. φυλλοβόλα - αείφυλλα πλατύφυλλα. Άτομα Οξυάς. Καλή κατάσταση ξυλώδους κεφαλαίου Μ. Πεύκης και Οξυάς. Πολύ κακή κατάσταση λοιπών πλατύφυλλων. Υλοτομήθηκε το 1991 και απελήφθησαν 24,20 κ.μ. στρογγύλη ξυλεία Μ. Πεύκης, 89,98 κ.μ. στύλοι ΔΕΗ, 6,51 κ.μ. στύλοι ΟΤΕ και 10 τόνοι καυσόξυλα. Προτείνονται: να αποληφθεί ποσότητα 100κ.μ. από τις ενώσεις μαύρης Πεύκης με επιλογικές υλοτομίες(18Ha). Αποψιλωτική υλοτομία των αιφύλλων πλατυφύλλων χωρίς παρακρατήματα. Διατήρηση μόνο ανωρίμων ενώσεων ως φυσικό απόθεμα. Όπου υπάρχουν φυλλοβόλα πλατύφυλλα και δρυς ως ανώροφος στα αείφυλλα, θα παρακρατούνται 5-6 άτομα (φυλλοβόλων πλατυφύλλων) ή δρυς ανά στρέμμα. Στις αμιγείς ενώσεις φυλλοβόλων πλατυφύλλων και δρυός καλλιεργητικές υλοτομίες αρνητικής κυρίως επιλογής με θετική επιλογή στις καλύτερες από υγεία και φαινότυπο ενώσεις. Υλοτομητέα έκταση Βόρειο μέρος 10Ha Έτος υλοτομίας: 2021 Απαγόρευση βόσκησης	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ «ΠΥΡΓΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ» ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2016-2025)
	Ο.			Ακαν.	316,00	0,00	17,56	0,00	0,00		
	Δ.			Ακαν., πρεμν.	200,00	0,00	20,00	0,00	0,00		
	Φ.πλ.		Ακαθορ., Μ.Π.: >100	Ακαν.	400,00	0,00	40,00	0,00	0,00		
	Α.πλ			Ακαν.	70,00	0,00	7,00	0,00	0,00		

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας / ha	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
13δ*	Β. + Α. + Μ.Π.	0.5-0.8	Μ.Π.: ακαθορ. έως >120 Λ.πλ.: ποικ.	Ακαν. & αν. Μ.Π.: Σπερ. Λ.πλ.: πρεμν.	1.000,00	-	100,00	-	-	Μαύρη Πεύκη και βραχύκορμα άτομα σε έκταση 5Ha και λοιπά πλατύφυλλα(και αείφυλλα) σε έκταση 5Ha αποτελούμενα κυρίως από γάβρο και φράξο. Συστάδα υποβαθμισμένη λόγω του άγονου εδάφους και των ιδιαίτερων συνθηκών που δημιουργούνται. Σημαντικό μέρος της συστάδας έχει απογυμνωθεί και επικρατούν ισχυρές κλίσεις. Σημαντικό τμήμα επίσης της έκτασης είναι μερικώς δασοσκεπές. Αυξάνεται η παρουσία θαμνωδών και λοιπών πλατύφυλλων ειδών που εμφανίζονται πιο ανθεκτικά στις συνθήκες της περιοχής. Η συστάδα παραμένει εκτός διαχείρισης. Προτείνονται: να μην υλοτομηθεί η Πεύκη λόγω έλλειψης δασοδρόμων. Αποψιλωτική υλοτομία των αειφύλλων πλατυφύλλων χωρίς παρακρατήματα. Διατήρηση μόνο ανωρίμων ενώσεων ως φυσικό απόθεμα. Όπου υπάρχουν φυλλοβόλα πλατύφυλλα ως ανώροφος στα αείφυλλα, θα παρακρατούνται 5-6 άτομα (φυλλοβόλων πλατυφύλλων) ανά στρέμμα. Στις αμιγείς ενώσεις φυλλοβόλων πλατυφύλλων καλλιεργητικές υλοτομίες αρνητικής κυρίως επιλογής με θετική επιλογή στις καλύτερες από υγεία και φαινότυπο ενώσεις. Υλοτομητέα έκταση Βόρειο μέρος 5Ha Έτος υλοτομίας: 2022 Απαγόρευση βόσκησης	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ «ΠΥΡΓΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ» ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2016-2025)
14α	Μ.Π.	0.4-0.7	μέσες & ανώτ.	Υποκηπτ. πλήρως ακαν.	321,00	174,00	32,10	17,40	54,21	Μαύρη Πεύκη 10 Ha, αείφυλλα, δρυς και πλατύφυλλα φυλλοβόλα 18 Ha, θαμνότοποι 19 Ha. Κακή κατάσταση ξυλώδους κεφαλαίου Μ. Πεύκης και λοιπών πλατύφυλλων. Υλοτομήθηκε το 1992 και απολήφθησαν 9,97 κ.μ. στρογγύλη ξυλεία Μ. Πεύκης και 454,5 τόννοι καυσόξυλα. Προτείνονται: Επιλογικές υλοτομίες στις ενώσεις μαύρης Πεύκης(20Ha). Αποψιλωτική υλοτομία των αειφύλλων πλατυφύλλων χωρίς παρακρατήματα. Διατήρηση μόνο ανωρίμων ενώσεων ως φυσικό απόθεμα.(19Ha). Όπου υπάρχουν φυλλοβόλα πλατύφυλλα και δρυς ως ανώροφος στα αείφυλλα, θα παρακρατούνται 5-6 άτομα (φυλλοβόλων πλατυφύλλων) ή δρυς ανά στρέμμα. Στις αμιγείς ενώσεις φυλλοβόλων πλατυφύλλων και δρυός καλλιεργητικές υλοτομίες αρνητικής κυρίως επιλογής με θετική επιλογή στις καλύτερες από υγεία και φαινότυπο ενώσεις (26Ha). Έτος υλοτομίας: 2022 Απαγόρευση βόσκησης	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ «ΠΥΡΓΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ» ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2016-2025)
	Α.πλ.				397,00	0,00	20,89	0,00	0,00		
	Δ				222,00	0,00	12,33	0,00	0,00		
	Φ.πλ.	0.8-1.1	60-70		482,00	0,00	26,78	0,00	0,00		
14β	Λ.πλ. + Α.πλ.	Λ.: 0.6-1.1	60-70	Ακαν. υποκηπτ.	390,00	0,00	15,60	0,00	0,00	Σχετικά καλή κατάσταση το ξυλώδες κεφάλαιο της Οξυάς. Αρκετά υπέργηρα άτομα Μ. Πεύκης. Υλοτομήθηκε το 1992 και απελήφθησαν 27,68 κ.μ. στρογγύλη ξυλεία Μ. Πεύκης και 34 τόννοι καυσόξυλα. Προτείνονται: καλλιεργητικές υλοτομίες για τη Μ. Πεύκη σε ποσοστό με απομάκρυνση των υπέργηρων ατόμων. Διατήρηση του ξυλώδους κεφαλαίου της Οξυάς. Επιλογικές υλοτομίες στις ενώσεις μαύρης Πεύκης. Αποψιλωτική υλοτομία των αειφύλλων πλατυφύλλων χωρίς παρακρατήματα. Διατήρηση μόνο ανωρίμων ενώσεων ως φυσικό απόθεμα. Όπου υπάρχουν φυλλοβόλα πλατύφυλλα ως ανώροφος στα αείφυλλα, θα παρακρατούνται 5-6 άτομα (φυλλοβόλων πλατυφύλλων) ανά στρέμμα. Στις αμιγείς ενώσεις φυλλοβόλων πλατυφύλλων καλλιεργητικές υλοτομίες αρνητικής κυρίως επιλογής με θετική επιλογή στις καλύτερες από υγεία και φαινότυπο ενώσεις. Υλοτομητέα έκταση 10 Ha Έτος υλοτομίας: 2019 Απαγόρευση βόσκησης	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ «ΠΥΡΓΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ» ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2016-2025)
	Μ.π.	0.5-0.8	μέσες & ανωτ.		3.407,00	2.818,00	94,64	78,28	82,71		
	Ο.				106,00	32,00	21,20	6,40	30,19		
14γ	Μ.Π.	Μ.Π.: 0.4-0.8 Λ.: 0.7-1.1	Μ.Π.: μέσες & ανωτ. Λ.: 60-70	Ακαν. υποκηπτ.	3.371,00	3.227,00	108,74	104,10	95,73	Μ. Πεύκη 27 Ha, βραχύκορμα 4 Ha. Το ξυλώδες κεφάλαιο της Μ. Πεύκης είναι συσσωρευμένο στην ανώτερη κλάση. Εκτός Διαχείρισης	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ «ΠΥΡΓΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ» ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2016-2025)
14δ	Μ.Π.	0.7-0.9	μέσες & ανωτ.	Ακαν. υποκηπτ.	9.871,00	7.293,00	229,56	169,60	73,88	Μ. Πεύκη αμιγής 43 Ha, βραχύκορμα κ.λ.π. 11 Ha. Αρκετά καλή κατάσταση ξυλώδους κεφαλαίου. Ίχνη παλιάς πυρκαγιάς κυρίως στο ανώτερο τμήμα. Εκτός Διαχείρισης	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ «ΠΥΡΓΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ» ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2016-2025)
	Πλ.	Λ.: 0.8-1.1			1.100,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
15α	Δ.	1		πρεμν., ομηλ.	524,00	0,00	40,31	0,00	0,00	Κακή κατάσταση ξυλώδους κεφαλαίου Μ. Πεύκης, Δρυός και ικανοποιητική της Οξυάς. Υλοτομήθηκε αποψιλωτικά (σαν 15δ) το έτος 1985-86 και απελήφθησαν : 916 τόννοι καυσόξυλα δρυός, 127 τόννοι καυσόξυλα οξυάς, 176,37 κ.μ. ξυλεία Μ. Πεύκης και 10 τόννοι καυσόξυλα Μ. Πεύκης. Προτείνονται: επιλογικές υλοτομίες στις ενώσεις μαύρης Πεύκης με οξυά (6Ha). Αποψιλωτική υλοτομία των αειφύλλων πλατυφύλλων χωρίς παρακρατήματα.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ «ΠΥΡΓΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ» ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2016-2025)
	Μ.Π	0.6-0.8	μέσες & ανωτ.	υποκηπτ. Ακαν.	402,00	315,00	67,00	52,50	78,36		
	Ο.				407,00	254,00	67,83	42,33	62,41		

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm	Συνολικο ξυλαπόθεμα συστάδας / ha	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
	A.πλ		έως 30		400,00	0,00	30,77	0,00	0,00	Διατήρηση μόνο ανωρίμων ενώσεων ως φυσικό απόθεμα.(13Ha)Όπου υπάρχουν φυλλοβόλα πλατύφυλλα και δρυς ως ανώροφος στα αείφυλλα, θα παρακρατούνται 5-6 άτομα (φυλλοβόλων πλατυφύλλων) ή δρυός ανά στρέμμα. Στις αμιγείς ενώσεις φυλλοβόλων πλατυφύλλων και δρυός καλλιεργητικές υλοτομίες αρνητικής κυρίως επιλογής με θετική επιλογή στις καλύτερες από υγεία και φαινότυπο ενώσεις. Έτος υλοτομίας: 2024 Απαγόρευση βόσκησης	
15β*	M.Π. + B.	0.5-0.8	Μέσες & >45	M.Π.: σπρεμν. Λ.πλ.: Πρεμν.	760,00	-	42,22	-	-	Μαύρη Πεύκη σε αμιγή μορφή σε έκταση 12 Ha και διάσπαρτα άτομα Πεύκης με λοιπά πλατύφυλλα (κυρίως γάβρο) σε έκταση 6Ha. Κατά μήκος του ρέματος στο χαμηλό τμήμα της συστάδας άτομα οξυάς. Η συστάδα είναι υποβαθμισμένη με άτομα μέσης και μεγάλης ηλικίας με χαμηλό ύψος και χοντρούς κορμούς. Η ποιότητα του ξυλώδους κεφαλαίου είναι κακή. Εντοπίζονται μικρής έκτασης και κατά θέσεις ζημιές από ανεμοθλασίες και χιονοθλασίες δεν εντοπίστηκαν ασθένειες. Εκτός διαχείρισης Αδύνατη η πρόσβαση. Εκτίμηση του ξυλώδους όγκου με χρήση αεροφωτογραφιών και οπτική εκτίμηση.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ «ΠΥΡΓΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ» ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2016-2025)
15γ*	M.Π. + B.	0.5-0.7	>40 , υπερωρ. >80	Αν.,υποκηπ. Π.: σπερ. Λ.πλ.: πρεμν. Ο.: ακαθορ	1.880,00	-	48,21	-	-	Αμιγής συστάδα μαύρης Πεύκης σε έκταση 34Ha και μεμονωμένων διάσπαρτων βραχύκορμων ατόμων σε έκταση 5Ha. Κατά μήκος του ρέματος υπάρχουν άτομα οξυάς κατά ομάδες και διάσπαρτα. Εντοπίστηκαν διάσπαρτα άτομα λοιπών πλατύφυλλων. Συστάδα υποβαθμισμένη λόγω των κλίσεων του εδάφους και του άγονου πετρώδους εδάφους. Η κατάσταση του ξυλώδους κεφαλαίου είναι μέτρια με άτομα μικρού ύψους και με κακή αποκλάδωση. Μεγάλο τμήμα της συστάδας είναι σε οριακή κατάσταση μερικώς δασοσκεπούς επιφάνειας. Ζημιές εντοπίστηκαν κατά μήκος του μονοπατιού λόγω βοσκής και κλαδονομής. Εκτός διαχείρισης Αδύνατη η πρόσβαση. Εκτίμηση του ξυλώδους όγκου με χρήση αεροφωτογραφιών και οπτική εκτίμηση.. Προτείνεται διάνοιξη δασικής οδού για το κεντρικό τμήμα της συστάδας.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ «ΠΥΡΓΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ» ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2016-2025)
16α	Δ.	0.6-0.9	10-20	Σπερ., υποκηπ. & αν, Πρεμν. ομηλ.	848,00	0,00	28,27	0,00	0,00	Η κατάσταση της υγείας της συστάδας είναι καλή χωρίς προσβολές από ασθένειες, έντομα και μύκητες. Η κατάσταση του ξυλαποθέματος είναι πολύ καλή με χοντρά άτομα στην μαύρη Πεύκη με ικανοποιητική ποιότητα κορμών. Η οξύα εμφανίζεται στο κεντρικό τμήμα της συστάδας. Προτείνονται: στη Μαύρη Πεύκη καλλιεργητικές υλοτομίες με εξυγιαντικό χαρακτήρα. Αραιώσεις και φωτοδοτίδες υλοτομίες ανάλογα με την κατάσταση της συστάδας κατά θέσεις . Θετική επιλογή με σκοπό την ευνόηση των βέλτιστων ατόμων. Στην ελάτη καλλιεργητικές υλοτομίες με εφαρμογή αρνητικής επιλογής στο στάδιο των λεπτών κορμιδίων. Στην Οξύα καλλιεργητικές υλοτομίες με εξυγιαντικό χαρακτήρα. Υλοτομίες με αρνητική επιλογή στις θέσεις όπου επιδιώκουμε ευνόηση της Μαύρης Πεύκης. Στη δρυ καλλιεργητικές υλοτομίες με εφαρμογή αρνητικής επιλογής στο στάδιο των λεπτών κορμιδίων. Έτος υλοτομίας: 2022 Απαγόρευση βόσκησης	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ «ΠΥΡΓΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ» ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2016-2025)
	Ε.		10-40	Σπερ., υποκηπ. & αν	3.752,00	1.468,00	187,60	73,40	39,13		
	M.Π.		40-90	Σπερ., υποκηπ. & αν	3.747,00	1.730,00	138,78	64,07	46,17		
	Ο.		25-50	Σπερ., υποκηπ. & αν	1.129,00	550,00	112,90	55,00	48,72		
16β	M.Π.	0.7-0.8	25 έως 90	Σπερ.,ανομ. έως υποκηπ. & ομ.	8.998,00	5.791,00	224,95	144,78	64,36	Κατά θέσεις υπάρχουν πολλά λεπτόκορμα άτομα Πεύκης με χοντρά άτομα ώριμα ως υπερώριμα. Στο μεγαλύτερο τμήμα της έκτασης τα πεύκα με μορφή χοντρών κορμών. Στα τμήματα πάνω από το δρόμο εντοπίζονται πολλές πυκνοφυτείες Πεύκης. Η υγεία της συστάδας είναι καλή με λίγα κακόμορφα άτομα και ελάχιστες προσβολές από Viscum album. Επίσης, λίγες χιονοθλασίες και γονατοειδή άτομα. Προτείνονται: στη Μαύρη Πεύκη καλλιεργητικές υλοτομίες με εξυγιαντικό χαρακτήρα. Αραιώσεις και φωτοδοτίδες υλοτομίες ανάλογα με την κατάσταση της συστάδας κατά θέσεις. Θετική επιλογή με σκοπό την ευνόηση των βέλτιστων ατόμων. Στην Οξύα καλλιεργητικές υλοτομίες με εξυγιαντικό χαρακτήρα. Στην ελάτη καλλιεργητικές υλοτομίες θετικής επιλογής και στην δρυ αρνητικής. Οι επεμβάσεις κοντά στο καταφύγιο και πέριξ αυτού να είναι το δυνατόν ηπιότερες. Έτος υλοτομίας: 2021 Απαγόρευση βόσκησης	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ «ΠΥΡΓΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ» ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2016-2025)
	Ο.		15-30		958,00	0,00	23,95	0,00	0,00		
	Δ.				400,00	0,00	40,00	0,00	0,00		
	Ε.		15-30		800,00	0,00	80,00	0,00	0,00		

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm	Συνολικο ξυλαπόθεμα συστάδας /ha	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
16γ	Δ.		20-30	πρεμν., ομηλ.	1.236,00	0,00	41,20	0,00	0,00	Οξυά (12 ha), Δρυς αμιγής κατα θέσεις και σε μίξη με τα άλλα είδη και φυλλοβόλα πλατύφυλλα(30 ha), Μαύρη Πεύκη (16 ha) και λίγα άτομα Ελάτης. Πολύ καλή για την οξυά κατά θέσεις, υπέργηρα άτομα πεύκης και κακή για τη δρυ. Υλοτομήθηκε το έτος 1986 και απολήφθηκαν 176,21 κ.μ. ξυλεία Μ. Πεύκης, 127 τόνοι καυσόξυλα Μ. Πεύκης και 167 τόνοι καυσόξυλα δρυός. Προτείνονται: συντηρητικές - καλλιεργητικές υλοτομίες για τη Μ. Πεύκη σε ποσοστό 12% από τον ανώροφο. Εξυγιαντικές υλοτομίες για την Οξυά . Καλλιεργητικές υλοτομίες σε όλη την έκταση της δρυός και των πλατυφύλλων. Έτος υλοτομίας 2025 Απαγόρευση βόσκησης	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ «ΠΥΡΓΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ» ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2016-2025)
	Μ.Π.	0.4-0.8	μέσες & ανώτ.	υποκτηπ	1.978,00	1.946,00	123,63	121,63	98,38		
	Ο.	0.6-0.9	μέσες & ανώτ.	υποκτηπ	1.308,00	368,00	109,00	30,67	28,13		
	Φ.πλ.				750,00	0,00	25,00	0,00	0,00		
17α	Μ.Π.	0.8	>25	Πρεμν. ανομ., ομ.	300,00	0,00	60,00	0,00	0,00	Η υγεία της συστάδας είναι καλή, υπάρχουν συμπτώματα υπερβόσκησης, δεν εντοπίστηκαν συμπτώματα από ασθένειες και ζημιές. Προτείνονται: Επιλογικές υλοτομίες στις ενώσεις μαύρης Πεύκης και οξυάς (10Ha). Αποψιλωτική υλοτομία των αειφύλλων πλατυφύλλων χωρίς παρακρατήματα. Διατήρηση μόνο ανωρίμων ενώσεων ως φυσικό απόθεμα.(48Ha)Όπου υπάρχουν φυλλοβόλα πλατύφυλλα και δρυς ως ανώροφος στα αείφυλλα, θα παρακρατούνται 5-6 άτομα (φυλλοβόλων πλατυφύλλων) ή δρυς ανά στρέμμα. Στις αμιγείς ενώσεις φυλλοβόλων πλατυφύλλων και δρυός καλλιεργητικές υλοτομίες αρνητικής κυρίως επιλογής με θετική επιλογή στις καλύτερες από υγεία και φαινότυπο ενώσεις. Έτος υλοτομίας 2025 Απαγόρευση βόσκησης	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ «ΠΥΡΓΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ» ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2016-2025)
	Ο.				400,00	0,00	80,00	0,00	0,00		
	Δ.				1.568,00	354,00	32,67	7,38	22,58		
	Φ.πλ.				1.253,00	964,00	26,10	20,08	76,94		
	Α.πλ.				336,00	142,00	7,00	2,96	42,26		
17β	Λ.πλ. + Α.	0.8-1.0	55	Πρεμν. ανομ.,αν.	362,00	0,00	12,93	0,00	0,00	Δρυς και λοιπά πλατύφυλλα (κυρίως γάβρος), στον μεσόροφο λοιπά πλατύφυλλα και αείφυλλα πλατύφυλλα. Στο ρέμα υπάρχουν άτομα οξυάς. Συστάδα υποβαθμισμένη από τη βόσκηση. Δεν εντοπίστηκαν άλλες ζημιές. Μέτρια κατάσταση υγείας. Η ποιότητα των κορμών της συστάδας είναι μέτρια. Η συστάδα δεν μπορεί να υλοτομηθεί και να αποδώσει ικανοποιητικό λήμμα, επίσης υπάρχει η αμφισβήτηση της έκτασης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ «ΠΥΡΓΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ» ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2016-2025)
18α	Δ.	0.6-1.1	20-30	Πρεμν. ομηλ. με παρ.	1.023,00	0,00	33,00	0,00	0,00	Δρυς κλπ. φυλλοβόλα και αείφυλλα πλατύφυλλα (31ha), Μ. Πεύκη, Οξυά, άτομα ελάτης κλπ. Πολύ κακή κατάσταση ξυλώδους κεφαλαίου, υποβαθμισμένο με δρυ μικρής ανάπτυξης. Υλοτομήθηκε αποψιλωτικά με παρακρατήματα. Προτείνονται: επιλογικές υλοτομίες στις ενώσεις μαύρης Πεύκης και οξυάς (10Ha). Αποψιλωτική υλοτομία των αειφύλλων πλατύφυλλων χωρίς παρακρατήματα. Διατήρηση μόνο ανωρίμων ενώσεων ως φυσικό απόθεμα.(48Ha)Όπου υπάρχουν φυλλοβόλα πλατύφυλλα και δρυς ως ανώροφος στα αείφυλλα, θα παρακρατούνται 5-6 άτομα (φυλλοβόλων πλατύφυλλων) ή δρυς ανά στρέμμα. Στις αμιγείς ενώσεις φυλλοβόλων πλατύφυλλων και δρυός καλλιεργητικές υλοτομίες αρνητικής κυρίως επιλογής με θετική επιλογή στις καλύτερες από υγεία και φαινότυπο ενώσεις. Έτος υλοτομίας: 2024	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ «ΠΥΡΓΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ» ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2016-2025)
	Ο.		20-30		542,00	0,00	16,42	0,00	0,00		
	Φ.πλ.				402,00	0,00	12,97	0,00	0,00		
	Α.πλ.				124,00	0,00	4,00	0,00	0,00		
18β	Δ.	0.6-1.1	20-30	πρεμν. ομηλ.	2.117,00	0,00	132,31	0,00	0,00	Καλή κατάσταση της δρυός, παρέχει μόνο καυσόξυλα. Κυρίως στην ΙΙΙ+ΙV το ξυλαπόθεμα της Μ. Πεύκης. Η κατάσταση εξελίσσεται κανονικά όσον αφορά την αναγέννηση. Το έτος 1986 - 1989 απολήφθηκαν 19 κ.μ. δρυός και 853 τόνοι καυσόξυλα δρυός. Προτείνονται: καλλιεργητικές υλοτομίες για τη Μ. Πεύκη με απομάκρυνση των υπέργηρων ατόμων. Καλλιεργητικές υλοτομίες αρνητικής επιλογής στη δρυ και στα φυλλοβόλα πλατύφυλλα και θετικής στα υπόλοιπα είδη . Έτος υλοτομίας: 2024 Απαγόρευση βόσκησης	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ «ΠΥΡΓΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ» ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2016-2025)
	Μ.Π.			ακαθορ.	765,00	741,00	153,00	148,20	96,86		
	Ο.				350,00	0,00	43,75	0,00	0,00		
	Ε.				350,00	0,00	43,75	0,00	0,00		
	Φ.πλ.				350,00	0,00	21,88	0,00	0,00		
19α	Α.πλ.	0.8-1.1	25-60	Πρεμν. ομηλ., ακαν.	367,00	0,00	18,35	0,00	0,00	Δρυς, φυλλοβόλα-αείφυλλα πλατύφυλλα 34Ha, αείφυλλα πλατύφυλλα -θάμνοι 20Ha. Συστάδα δρυός, με αείφυλλα-φυλλοβόλα πλατύφυλλα υποβαθμισμένη από τη βοσκή και λαθροϋλοτομίες του παρελθόντος με αυξημένο ποσοστό παραμιγμάτων. Υγεία, ποιότητα ξυλώδους κεφαλαίου μέτρια. Στα κατώτερα αείφυλλα και φυλλοβόλα πλατύφυλλα μικρής ξυλαποδοτικότητας με ζημιές από λαθροϋλοτομίες και βοσκή. Προτείνονται: Αποψιλωτική υλοτομία των αειφύλλων πλατύφυλλων χωρίς παρακρατήματα. Διατήρηση μόνο ανωρίμων ενώσεων ως φυσικό απόθεμα (20Ha)Όπου υπάρχουν φυλλοβόλα πλατύφυλλα και δρυς ως ανώροφος στα αείφυλλα, θα παρακρατούνται 5-6 άτομα (φυλλοβόλων πλατύφυλλων) ή δρυός ανά στρέμμα. Στις	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ «ΠΥΡΓΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ» ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2016-2025)
	Δ.				1.816,00	0,00	53,41	0,00	0,00		
	Φ.πλ,				798,00	0,00	39,90	0,00	0,00		

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας /ha	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
										αμιγείς ενώσεις φυλλοβόλων πλατύφυλλων και δρυός(34Ha)καλλιεργητικές υλοτομίες αρνητικής κυρίως επιλογής με θετική επιλογή στις καλύτερες από υγεία και φαινότυπο ενώσεις. Έτος υλοτομίας: 2023 Απαγόρευση βόσκησης	
19β	Δ.	0.6-1.1	20-30	Πρεμν. ομηλ. με παρ.	4.311,00	0,00	123,17	0,00	0,00	Δρυς και λοιπά πλατύφυλλα (35Ha) , διάσπαρτα άτομα Μ. Πεύκης. Η κατάσταση εξελίσσεται κανονικά όσον αφορά την αναγέννηση. Υλοτομήθηκε αποψιλωτικά με παρακρατήματα τα έτη 85-86 και απολήφθησαν 2189 τόννοι καυσόξυλα Δρυός και λοιπών πλατύφυλλων. Προτείνονται: αποψιλωτική υλοτομία των αείφυλλων πλατύφυλλων χωρίς παρακρατήματα. Διατήρηση μόνο ανωρίμων ενώσεων ως φυσικό απόθεμα. Όπου υπάρχουν φυλλοβόλα πλατύφυλλα και δρυς ως ανώροφος στα αείφυλλα, θα παρακρατούνται 5-6 άτομα (φυλλοβόλων πλατύφυλλων) ή δρυός ανά στρέμμα. Στις αμιγείς ενώσεις φυλλοβόλων πλατύφυλλων και δρυός καλλιεργητικές υλοτομίες αρνητικής κυρίως επιλογής με θετική επιλογή στις καλύτερες από υγεία και φαινότυπο ενώσεις. Έτος υλοτομίας: 2023. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ «ΠΥΡΓΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ» ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2016-2025)
	Φ.πλ.				762,00	0,00	21,77	0,00	0,00		
	Α.πλ.		έως 60		222,00	0,00	6,00	0,00	0,00		
20α	Α.πλ.	0.9-1.0	25-30	Πρεμν. ομήλ. και ομ.	320,00	0,00	13,33	0,00	0,00	Δρυς και αείφυλλα πλατύφυλλα σε μίξη με φυλλοβόλα πλατύφυλλα. Μέτρια κατάσταση ξυλαποθέματος, λόγω βόσκησης και κλαδονομής. Προτείνονται: Αποψιλωτική υλοτομία των αείφυλλων πλατύφυλλων χωρίς παρακρατήματα. Διατήρηση μόνο ανωρίμων ενώσεων ως φυσικό απόθεμα. Όπου υπάρχουν φυλλοβόλα πλατύφυλλα και δρυς ως ανώροφος στα αείφυλλα, θα παρακρατούνται 5-6 άτομα (φυλλοβόλων πλατύφυλλων) ή δρυός ανά στρέμμα. Στις αμιγείς ενώσεις φυλλοβόλων πλατύφυλλων και δρυός καλλιεργητικές υλοτομίες αρνητικής κυρίως επιλογής με θετική επιλογή στις καλύτερες από υγεία και φαινότυπο ενώσεις. Έτος υλοτομίας: 2018. Απαγόρευση βόσκησης	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ «ΠΥΡΓΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ» ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2016-2025)
	Δ.				1.680,00	0,00	70,00	0,00	0,00		
	Φ.πλ.				2.800,00	0,00	116,67	0,00	0,00		
1		Οριζ. - Κλιμ.	60-120 Ανομηλ.	Ε.: Ακαν. Υποκηπ.	-	-	-	-	-	Θαμνώνες πρίνου και λοιπών αειφύλλων πλατυφύλλων. Ελάτη διάσπαρτη κατά λόχμες, ομάδες και άτομα. Το τμήμα καλύπτεται κυρίως από θαμνώνες πρίνου και χορτολίβαδα με διάσπαρτες λόχμες και ομάδες ελάτης στο ανώτερο μέρος το πλείστον στα ρέματα και κοιλώματα. Χαρακτηρίζεται ως δασοβοσκοτόπος. Την ανώμαλη περίοδο 1945 - 50 προσεβλήθη από πυρκαγιά. Εκτός διαχείρισης. Δασοβοσκοτόπος.	ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΔΑΣΟΣ «ΚΑΡΥΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ (2006-2015)
2		Οριζ. - Κλιμ.	60-120 Ανομηλ.	Ε.: Ακαν. Υποκηπ.	-	-	-	-	-	Θαμνώνες πρίνου κυρίως και λοιπών αειφύλλων πλατυφύλλων. Διάσπαρτη ελάτη κατά λόχμες, ομάδες και άτομα πεύκης.Το τμήμα καλύπτεται κυρίως από θαμνώνες πρίνου και χορτολίβαδα με διάσπαρτες λόχμες και ομάδες ελάτης στο ανώτερο μέρος το πλείστον στα ρέματα και κοιλώματα. Χαρακτηρίζεται ως δασοβοσκοτόπος. Την ανώμαλη περίοδο 1945 - 50 προσεβλήθη από πυρκαγιά.Εκτός διαχείρισης. Δασοβοσκοτόπος	ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΔΑΣΟΣ «ΚΑΡΥΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ (2006-2015)
3		Οριζ. - Κλιμ.	60-120 Ανομηλ.	Μ.Π.: Ακαν. Υποκηπ.	-	-	-	-	-	Θαμνώνες πρίνου κυρίως και λοιπών πλατυφύλλων. Μαύρη πεύκη και δρυς διάσπαρτη κατά λόχμες, ομάδες και άτομα. Άτομα ελάτης. Το τμήμα καλύπτεται κυρίως από θαμνώνες πρίνου και χορτολίβαδα με διάσπαρτα άτομα -συνδενδρίες μαύρης πεύκης, ελάτης, δρυός. Στα χαμηλότερα επικρατεί η μαύρη πεύκη κατά διάσπαρτες λόχμες και ομάδες μέτριας μορφής.Εκτός διαχείρισης. Δασοβοσκοτόπος.	ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΔΑΣΟΣ «ΚΑΡΥΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ (2006-2015)
4	Δ.	Οριζ.	>100	Σπερ., ακαν. υποκηπ.	307,00	860,00	52,93	148,28	280,13	Μαύρη πεύκη κυρίως σε μίξη ακανόνιστη με δρυ. Άτομα ελάτης. Θαμνώνες πρίνου και λοιπών	ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΔΑΣΟΣ «ΚΑΡΥΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ (2006-2015)
	Μ.Π.				964,00	204,00	105,93	22,42	21,16	αειφύλλων πλατυφύλλων.Συστάδα μαύρης πεύκης το πλείστον σε μίξη με τη δρυ με την μαύρη πεύκη να επικρατεί στις ανατολικές εκθέσεις και τη δρυ στις νότιες. Η συστάδα διασπάζεται από θαμνώνες και μερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις. Η μαύρη πεύκη με ξυλαπόθεμα καλής μορφής, μέτριων και χονδρών το πλείστον κορμών, ευθυτενών, κατάλληλο για τεχνική ξυλεία, σε ικανοποιητικό ποσοστό καλής ποιότητας. Απαντώνται εκτεταμένες πυκνοφυτείες ελάτης έως και 2 m ύψος στον υπόροφο της πεύκης. Η δρυς διασπασμένη από μικροδιάκενα, μέτριας μορφής, μέτριων και χονδρών κορμών, με πολλά άτομα ηλικιωμένα, πολύκλαδα, διχαλωμένα. Με τη μείωση της κτηνοτροφίας παρατηρούμε ικανοποιητική εμφάνιση αναγέννησης δρυός κατά θέσεις. Έγινε γλοτομία το έτος 1990. Προτείνονται:	

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας /ha	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
										Αναγεννητική υλοτομία (προπαρασκευαστική - σπερμοδότιδα - φωτοδότιδα), με διάσπαρτα αναγεννητικά κέντρα των 2,0 στρ. που να καλύπτουν το 1/4 της συνολικής δασοσκεπούς έκτασης (14,9/4 = 3,72 εκταρίων δηλ. 37,2/2 = 19 αναγεννητικά κέντρα). Έτσι, σε ορισμένα αναγεννητικά κέντρα θα εκτελείται προπαρασκευαστική υλοτομία (με αυτήν θα απομακρύνονται τα ευρύκορμα, κακόμορφα, βαρέα και ζημιωθέντα δένδρα), σε άλλα θα διενεργείται υλοτομία σποράς (θα απομακρύνονται και με αυτήν τα βαρύτερα, χαμηλόκορμα, κακόμορφα δένδρα και θα διατηρούνται τα καλύτερα ως σπορείς, μέχρι βαθμού συγκόμωσης 0,5 - 0,6) και σε άλλα – όπου έχει εγκατασταθεί νεοφυτεία – φωτοδότιδα υλοτομία (με απομάκρυνση της μητρικής συστάδας). Στην υπόλοιπη έκταση υπεραραιώσεις στους λεπτούς, μέτριους και χονδρούς κορμούς με σκοπό την καλλιέργεια των εκλεκτών ατόμων του μέλλοντος, εξευγενιστική αραιώση στα λεπτά και χονδρά κορμίδα με ευνόηση των εκάστοτε εκλεκτών ατόμων διά της υλοτομίας των οξυτέρων ανταγωνιστών και κακών τύπων. Επίσης καλλιέργεια - εξυγίανση της νεοφυτείας και πυκνοφυτείας της συστάδας. Σημείωση: Να εξαιρεθούν από τις υλοτομίες ορισμένα γηραιά, κουφαλερά κ.λ.π. αλλά υγιή άτομα (1 - 2 άτομα στο εκτάριο) ώστε να υπάρχουν ενδιαιήματα και μετά το πέρας των υλοτομιών για ορισμένα είδη πανίδας. Υλοτομητέος ξυλώδης όγκος (m3) : Από αναγεννητική υλοτομία (το 1/4 του 25% του ξυλαποθέματος της ΙΙΙ και ΙV κλάσης) 65 m3. Από ενδιάμεση κάρπωση (τα 3/4 του 14% του συνολικού ξυλαποθέματος) 135 m3. Απαγόρευση βόσκησης	
5	Δ.	Οριζ. - Κλιμ.	Ανομηλ.	Σπερ., ακαν. υποκτηπ.	431,00	0,00	75,61	0,00	0,00	Μαύρη πεύκη κυρίως. Δρυς. Άτομα ελάτης. Πλάτανος στο ρέμα Ζηλιάνα. Θαμνώνες πρίνου και λοιπών αειφύλλων πλατυφύλλων. Συστάδα μαύρης πεύκης το πλείστον σε μίξη με τη δρυ κατά θέσεις και άτομα ελάτης καταλαμβάνει το χαμηλότερο μισό της έκτασης, διασπασμένη από μερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις και αγρούς. Το ανώτερο μισό καλύπτεται από θαμνώνες πρίνου κυρίως και λοιπών αειφύλλων πλατυφύλλων και διάσπαρτα άτομα δρυός και πεύκης. Η μαύρη πεύκη έχει πολύ καλή μορφή, αυξητικότητα και εξέλιξη, μέτριων και χονδρών κορμών, ευθυτενών το πλείστον, πληρόμορφων με ικανοποιητικό ποσοστό τεχνικής ξυλείας καλής ποιότητας. Εκτεταμένη αναγέννηση ελάτης κυρίως και πεύκης στα αρκετά αραιώματα. Η δρυς εμφανίζεται σε μίξη με άτομα πρίνου, φράξου, γαύρου, οστράς, πεύκης και ελάτης με αρκετά στρεβλά, πολύκλαδα άτομα κυρίως λεπτών κορμών. Έγινε υλοτομία το έτος 1997. Προτείνονται: Αναγεννητική υλοτομία (προπαρασκευαστική - σπερμοδότιδα - φωτοδότιδα), με διάσπαρτα αναγεννητικά κέντρα των 2,0 στρ. που να καλύπτουν το 1/4 της συνολικής δασοσκεπούς έκτασης της μαύρης πεύκης (45/4 = 11,25 εκταρίων δηλ. 112,5/2 = 56 αναγεννητικά κέντρα). Έτσι, σε ορισμένα αναγεννητικά κέντρα θα εκτελείται προπαρασκευαστική υλοτομία (με αυτήν θα απομακρύνονται τα ευρύκορμα, κακόμορφα, βαρέα και ζημιωθέντα δένδρα), σε άλλα θα διενεργείται υλοτομία σποράς (θα απομακρύνονται και με αυτήν τα βαρύτερα, χαμηλόκορμα, κακόμορφα δένδρα και θα διατηρούνται τα καλύτερα ως σπορείς, μέχρι βαθμού συγκόμωσης 0,5 - 0,6) και σε άλλα – όπου έχει εγκατασταθεί νεοφυτεία – φωτοδότιδα υλοτομία (με απομάκρυνση της μητρικής συστάδας). Στην υπόλοιπη έκταση υπεραραιώσεις στους λεπτούς, μέτριους και χονδρούς κορμούς με σκοπό την καλλιέργεια των εκλεκτών ατόμων του μέλλοντος, εξευγενιστική αραιώση στα λεπτά και χονδρά κορμίδα με ευνόηση των εκάστοτε εκλεκτών ατόμων διά της υλοτομίας των οξυτέρων ανταγωνιστών και κακών τύπων. Επίσης καλλιέργεια - εξυγίανση της νεοφυτείας και πυκνοφυτείας της συστάδας. Σημείωση: Να εξαιρεθούν από τις υλοτομίες ορισμένα γηραιά, κουφαλερά κ.λ.π. αλλά υγιή άτομα (1 - 2 άτομα στο εκτάριο) ώστε να υπάρχουν ενδιαιήματα και μετά το πέρας των υλοτομιών για ορισμένα είδη πανίδας. Υλοτομητέος ξυλώδης όγκος (m3) : Από αναγεννητική υλοτομία μαύρης πεύκης (το 1/4 του 25% του ξυλαποθέματος της ΙΙΙ και ΙV κλάσης) 330 m3 και από ενδιάμεση κάρπωση (τα 3/4 του 15% του συνολικού ξυλαποθέματος) 810 m3 . Απαγόρευση βόσκησης	ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΔΑΣΟΣ «ΚΑΡΥΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ (2006-2015)
	Μ.Π.		Μ.Π. >100		6.753,00	5.260,00	150,07	116,89	77,89		

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας /ha	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
6	Ε.	Οριζ. - Κλιμ.	Ανομηλ. , 1-120 και άνω	Σπερ., ακαν. υποκτηπ.	7.053,00	3.174,00	173,29	77,99	45,00	Ελάτη, άτομα μαύρης πεύκης. Θαμνώνες πρίνου και λοιπών αειφύλλων πλατυφύλλων. Συστάδα ελάτης κυρίως, διασπασμένη από μερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις, θαμνώνες πρίνου το πλείστον και χορτολίβαδα στα υψηλότερα. Ικανοποιητικής μορφής, αυξητικότητας και εξέλιξης με πολλά όμως γηρασμένα, διχαλωμένα και αποκορυφωμένα άτομα. Κατά θέσεις αναγεννητικά κέντρα με ικανοποιητική ανάπτυξη. Ξυλαπόθεμα όλων των κλάσεων διαμέτρου το πλείστον λεπτών και μέτριων κορμών, κατάλληλο για τεχνική ξυλεία σε ικανοποιητικό ποσοστό. Έγινε υλοτομία το έτος 1995. Προτείνονται: Αναγεννητική υλοτομία (προπαρασκευαστική - σπερμοδότιδα - φωτοδότιδα), με διάσπαρτα αναγεννητικά κέντρα των 2,0 στρ. που να καλύπτουν το 1/4 της συνολικής δασοσκεπούς έκτασης (40,7/4 = 10,17 εκταρίων δηλ. 101,7/2 = 51 αναγεννητικά κέντρα). Έτσι, σε ορισμένα αναγεννητικά κέντρα θα εκτελείται προπαρασκευαστική υλοτομία (με αυτήν θα απομακρύνονται τα ευρύκορμα, κακόμορφα, βαρέα και ζημιωθέντα δένδρα), σε άλλα θα διενεργείται υλοτομία σποράς (θα απομακρύνονται και με αυτήν τα βαρύτερα, χαμηλόκορμα, κακόμορφα δένδρα και θα διατηρούνται τα καλύτερα ως σπορείς, μέχρι βαθμού συγκόμωσης 0,5 - 0,6) και σε άλλα – όπου έχει εγκατασταθεί νεοφυτεία – φωτοδότιδα υλοτομία (με απομάκρυνση της μητρικής συστάδας). Στην υπόλοιπη έκταση υπεραραιώσεις στους λεπτούς, μέτριους και χονδρούς κορμούς με σκοπό την καλλιέργεια των εκλεκτών ατόμων του μέλλοντος, εξευγενιστική αραιώση στα λεπτά και χονδρά κορμίδα με ευνόηση των εκάστοτε εκλεκτών ατόμων διά της υλοτομίας των οξυτέρων ανταγωνιστών και κακών τύπων. Επίσης καλλιέργεια - εξυγίανση της νεοφυτείας και πυκνοφυτείας της συστάδας. Σημείωση: Να εξαιρεθούν από τις υλοτομίες ορισμένα γηραιά, κουφαλερά κ.λ.π. αλλά υγιή άτομα (1 - 2 άτομα στο εκτάριο) ώστε να υπάρχουν ενδιαιτήματα και μετά το πέρας των υλοτομιών για ορισμένα είδη πανίδας. Υλοτομητέος ξυλώδης όγκος (m3) : Από αναγεννητική υλοτομία (το 1/4 του 25% του ξυλαποθέματος της ΙΙΙ και ΙV κλάσης) 200 m3. Από ενδιάμεση κάρπωση (τα 3/4 του 15% του συνολικού ξυλαποθέματος) 800 m3. Απαιγόμευση βόσκησης	
7	Μ.Π.	Οριζ.	Αναδάσωση Μ.Π. 48-49 & Ένωση	Σπερ., ομηλ.	3.396,00	0,00	300,53	0,00	0,00	Μαύρη πεύκη (αναδάσωση 1957 - 58). Άτομα - ομάδες ελάτης, δρυός, αγριολεύκης. Θαμνώνες πρίνου και λοιπών αειφύλλων πλατυφύλλων. Άτομα πολύ καλής ανάπτυξης. Χρειάζονται αραιώση με αρνητική επιλογή για επίταση της κατά πάχος αύξησης. Φυσική αποκλάδωση ικανοποιητική. Λίγες ανεμοθλασίες. Προτείνονται: Αραιώση στις αναδασώσεις μαύρης πεύκης κλπ. με αρνητική επιλογή με ευνόηση των εκάστοτε εκλεκτών ατόμων δια της υλοτομίας των οξυτέρων ανταγωνιστών και κακών τύπων. Αναγεννητική υλοτομία στην ένωση της ελάτης. Υλοτομητέος ξυλώδης όγκος (m3) : Από αραιώση αναδάσωσης μαύρης πεύκης το 15% του συνολικού ξυλαποθέματος 510 m3. Από αναγεννητική υλοτομία στην ένωση της ελάτης (το 1/4 του 30% του ξυλαποθέματος της ΙΙΙ και ΙV κλάσης) 20 m3	ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΔΑΣΟΣ «ΚΑΡΥΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ (2006-2015)
	Ε.		80-100		255,00	254,00	159,38	158,75	99,61		
8	Γαυρός (οξύα κλπ)	Οριζ. - Κλιμ.	Ανορθωμένο δάσος 30-50	Ανορθωμένο δάσος: Διφ. ακαν. υποκτηπ.	4.102,00	215,00	254,78	13,35	5,24	Γαύρος κυρίως. Άτομα - ομάδες οξύας, οστρυάς, δρυός κ.ά.. Θαμνώνες πρίνου και λοιπών αειφύλλων πλατυφύλλων. Το πλείστον θαμνώνες πρίνου και λοιπών αειφύλλων πλατυφύλλων και χορτολίβαδα συνέπεια της υπερβόσκησης, ξυλεύσεων κλπ.. Πάνω από τον οικισμό η πλαγιά με ανατολική έκθεση μέχρι το ύψωμα Παλαιόκαστρο παρατηρούμε ανόρθωση του ανυλοτόμητου δάσους στα ψηλότερα κυρίως κατά μήκος των ρεμάτων όπου σε μίξη με το γαύρο απαντώνται άτομα οξύας, οστρυάς, δρυός, αρκεύθου κ.ά. σε συνολική έκταση 16 περίπου εκταρίων. Χαμηλότερα το δάσος παραμένει υποβαθμισμένο, κακής μορφής παρέχοντας αντιπλημμυρική - υδρονομική προστασία στον οικισμό Καρυών. Το ξυλαπόθεμα κατάλληλο μόνο για καυσόξυλα κατά θέσεις. Προτείνονται: Να γίνει μια πρώτη καλλιεργητική υλοτομία όπου το υπό ανόρθωση δάσος δυτικά και άνωθεν του οικισμού προσφέρεται, με προτεραιότητα στο ανώτερο μέρος κατά μήκος του υπάρχοντος μονοπατιού που οδηγεί στο ύψωμα Παλαιόκαστρο (θέση θέας), ώστε σταδιακά και μακροχρόνια να δημιουργηθεί μια συστάδα σε όλη την με ΒΑ έκθεση πλαγιά πάνω από τον οικισμό Καρυάς ώστε να παρέχει εκτός από αντιπλημμυρική και υδρονομική προστασία και δυνατότητα δασικής αναψυχής αφού θα λειτουργεί και ως δάσος - πάρκο. Συμβολικό ποσό ξυλείας από την πρώτη καλλιεργητική υλοτομία: 1 m³.	ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΔΑΣΟΣ «ΚΑΡΥΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ (2006-2015)
	Γαύρος κλπ				746,00	0,00	15,01	0,00	0,00		
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Θαμνώνες κυρίως πρίνου και λοιπών αειφύλλων πλατυφύλλων. Μακροχρόνια υπερβόσκηση, άτακτες ξυλεύσεις κλπ. επέφεραν τη θαμνοποίηση της δασικής έκτασης. Σε συνδυασμό με τα υπάρχοντα χορτολίβαδα και αγροτικές εκτάσεις χρησιμοποιείται σήμερα ως δασοβοσκότοπος. Εκτός διαχείρισης. Δασοβοσκότοπος.	ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΔΑΣΟΣ «ΚΑΡΥΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ (2006-2015)
12α	Μ.Π.		60-120		7.370,00	1.917,00	223,33	58,09	26,01		

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας / ha	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
	Ε.	Οριζ.-Κλιμ.		Σπερ. , ακαν., υποκηπ.	760,00	103,00	23,03	3,12	13,55	Μαύρη πεύκη. Διάσπαρτα άτομα - συνδενδρίες ελάτης σε ποσοστό μικρότερο του 9% της δασοσκεπούς έκτασης. Επίσης άτομα οξυάς, δρυός, αγριολεύκης. Στον υπόροφο αρκουδοπούρναρο, πρίνος, κράταιγος, σορβιά. Συστάδα μαύρης πεύκης στα δυτικά αραιωμένη από αναγεννητικές υλοτομίες ενώ στα ανατολικά και νότια περισσότερο συμπαγής και κατά θέσεις σύμπυκνης κατάστασης, συνεχόμενη. Ξυλαπόθεμα κυρίως χονδρών κορμιδίων και λεπτών κορμών, συσσωρεύεται κυρίως στις Ι και ΙΙ κλάσεις διαμέτρων πολύ καλής μορφής και αυξητικότητας και συντίθεται από άτομα ευθυτενή, πληρόμορφα ως επί το πλείστον, με μεγάλο μήκος χρήσιμου τεχνικού ξύλου. Παρουσία της ελάτης έντονη σε όλη την έκταση της συστάδας, με μορφή νεαρών ως επί το πλείστον αθροισμάτων, πολύ καλής μορφής και ανάπτυξης η οποία σε πολλές περιπτώσεις εκτοπίζει την αναγέννηση της πεύκης. Στα ρέματα κυρίως απαντάται και η οξυά με άτομα πολύ καλής μορφής και εξέλιξης. Έχουν διενεργηθεί αναγεννητικές υλοτομίες στο δυτικό κυρίως μέρος της συστάδας. Προτείνονται: Αναγεννητική υλοτομία (προπαρασκευαστική - σπερμοδότιδα - φωτοδότιδα), με διάσπαρτα αναγεννητικά κέντρα των 2,0 στρ. που να καλύπτουν το 1/4 της συνολικής δασοσκεπούς έκτασης (33/4 = 8,25 εκταρίων δηλ. 82,5/2 = 41 αναγεννητικά κέντρα). Έτσι, σε ορισμένα αναγεννητικά κέντρα θα εκτελείται προπαρασκευαστική υλοτομία (με αυτήν θα απομακρύνονται τα ευρύκορμα, κακόμορφα, βαρέα και ζημιωθέντα δένδρα), σε άλλα θα διενεργείται υλοτομία σποράς (θα απομακρύνονται και με αυτήν τα βαρύτερα, χαμηλόκορμα, κακόμορφα δένδρα και θα διατηρούνται τα καλύτερα ως σπορείς, μέχρι βαθμού συγκόμωσης 0,5 - 0,6) και σε άλλα – όπου έχει εγκατασταθεί νεοφυτεία – φωτοδότιδα υλοτομία (με απομάκρυνση της μητρικής συστάδας). Στην υπόλοιπη έκταση υπεραραιώσεις στους λεπτούς, μέτριους και χονδρούς κορμούς με σκοπό την καλλιέργεια των εκλεκτών ατόμων του μέλλοντος, εξευγενιστική αρραίωση στα λεπτά και χονδρά κορμίδια με ευνόηση των εκάστοτε εκλεκτών ατόμων διά της υλοτομίας των οξυτέρων ανταγωνιστών και κακών τύπων. Επίσης καλλιέργεια - εξυγίανση της νεοφυτείας και πυκνοφυτείας της συστάδας. Σημείωση: Να εξαιρεθούν από τις υλοτομίες ορισμένα γηραιά, κουφαλερά κ.λ.π. αλλά υγιή άτομα (1 - 2 άτομα στο εκτάριο) ώστε να υπάρχουν ενδιαιτήματα και μετά το πέρας των υλοτομιών για ορισμένα είδη πανίδας. Υλοτομητέος ξυλώδης όγκος (m³) : Από αναγεννητική υλοτομία (το 1/4 του 30% του ξυλαποθέματος της ΙΙΙ και ΙV κλάσης) ΜΔ=144 m³, Ε=8 m³ και Δ=3 m³. Από ενδιάμεση κάρπωση (τα 3/4 του 16% του συνολικού ξυλαποθέματος): Μ.Π.=884 m³, Ε=91 m³ και Δ= 70 m³. Απαγόρευση βόσκησης	ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΔΑΣΟΣ «ΚΑΡΥΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ (2006-2015)
	Δ.				580,00	58,00	17,58	1,76	10,00		
13α	Μ.Π.	Οριζ.-Κλιμ.	30-100	Σπερ. , ακαν., υποκηπ.	4.323,00	3.875,00	134,25	120,34	89,64	Μαύρη πεύκη 63%. Άτομα - ομάδες οξυάς 20%, ελάτης 15%, Δρυός 2%. Στον υπόροφο άτομα κράταιγου, αρκουδοπούρναρου κ.ά.. Συστάδα μαύρης πεύκης σε μίξη με οξυά, ελάτη και λίγη δρυ κατά θέσεις, συμπαγής, ικανοποιητικής έως αρίστης κατά θέσεις μορφής, αυξητικότητας και εξέλιξης στο στάδιο της αναγέννησης. Η οξυά απαντάται το πλείστον στα ρέματα. Διάσπαρτες πυκνοφυτείες ελάτης. Ξυλαπόθεμα το πλείστον μέσων και χονδρών κορμών, υγιές, με ευθυτενή άτομα μαύρης πεύκης - ελάτης, ενώ της οξυάς αρκετά διχαλωμένα και στρεβλά. Η δρυς μέτριας ποιότητας λεπτών διαστάσεων. Έχουν διενεργηθεί αναγεννητικές υλοτομίες το έτος 1991. Προτείνονται: Αναγεννητική υλοτομία (προπαρασκευαστική - σπερμοδότιδα - φωτοδότιδα), με διάσπαρτα αναγεννητικά κέντρα των 2,0 στρ. που να καλύπτουν το 1/4 της συνολικής δασοσκεπούς έκτασης (32,2/4 = 8,05 εκταρίων δηλ. 80,5/2 = 40 αναγεννητικά κέντρα). Έτσι, σε ορισμένα αναγεννητικά κέντρα θα εκτελείται προπαρασκευαστική υλοτομία (με αυτήν θα απομακρύνονται τα ευρύκορμα, κακόμορφα, βαρέα και ζημιωθέντα δένδρα), σε άλλα θα διενεργείται υλοτομία σποράς (θα απομακρύνονται και με αυτήν τα βαρύτερα, χαμηλόκορμα, κακόμορφα δένδρα και θα διατηρούνται τα καλύτερα ως σπορείς, μέχρι βαθμού συγκόμωσης 0,5 - 0,6) και σε άλλα – όπου έχει εγκατασταθεί νεοφυτεία – φωτοδότιδα υλοτομία (με απομάκρυνση της μητρικής συστάδας). Στην υπόλοιπη έκταση υπεραραιώσεις στους λεπτούς, μέτριους και χονδρούς κορμούς με σκοπό την καλλιέργεια των εκλεκτών ατόμων του μέλλοντος, εξευγενιστική αρραίωση στα λεπτά και χονδρά κορμίδια με ευνόηση των εκάστοτε εκλεκτών ατόμων διά της υλοτομίας των οξυτέρων ανταγωνιστών και κακών τύπων. Επίσης καλλιέργεια - εξυγίανση της νεοφυτείας και πυκνοφυτείας της συστάδας. Σημείωση: Να εξαιρεθούν από τις υλοτομίες ορισμένα γηραιά, κουφαλερά κ.λ.π. αλλά υγιή άτομα (1 - 2 άτομα στο εκτάριο) ώστε να υπάρχουν ενδιαιτήματα και μετά το πέρας των υλοτομιών για ορισμένα είδη πανίδας. Υλοτομητέος ξυλώδης όγκος (m³): Από	ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΔΑΣΟΣ «ΚΑΡΥΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ (2006-2015)
	Ε.				1.051,00	355,00	32,64	11,02	33,78		
	Ο.				1.279,00	269,00	39,72	8,35	21,03		
	Δ.				159,00	0,00	4,94	0,00	0,00		

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm	Συνολικο ξυλαπόθεμα συστάδας /ha	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
										αναγεννητική υλοτομία (το 1/4 του 25% του ξυλαποθέματος της ΙΙΙ και ΙV κλάσης) Μ.Π.= 242m³, Ε=22 m³, Ο.=16 m³.Από ενδιάμεση κάρπωση (τα 3/4 του 15% του συνολικού ξυλαποθέματος) Μ.Π.= 481m³, Ε=118 m³, Ο.=161 m³. Απαγόρευση βόσκησης.	
14α	Μ.Π.	Οριζ.-Κλιμ.	1-120	Σπερ. , ακαν., υποκηπ.	1.265,00	886,00	50,80	35,58	70,04	Ελάτη 30%. Οξυά 30%. Μαύρη πεύκη 30%. Δρυς και άτομα οστράδας, φράξου, αγριολεύκης, αγριοπλάτανου 10%. Συστάδα μικτή ελάτης, μαύρης πεύκης, οξυάς και λιγότερο δρυός με τα κωνοφόρα να υπερτερούν στο ανώτερο μέρος και την οξυά στο κατώτερο. Τα κωνοφόρα το πλείστον πολύ καλής μορφής, αυξητικότητας και εξέλιξης, η οξυά μέτριας σε μίξη κυρίως με ελάτη αρκετά καλής μορφής. Ξυλαπόθεμα όλων των κλάσεων διαμέτρων με ευθυτενή, πληρόμορφα το πλείστον υγιή άτομα μαύρης πεύκης - ελάτης ενώ της οξυάς με αρκετά στρεβλά άτομα μέτριας ποιότητας. Παρατηρήθηκαν κατά θέσεις αρκετές ανεμοθλασίες κυρίως στην πεύκη. Νεαρά αθροίσματα ελάτης κατά θέσεις στον υπόροφο χρήζουν καλλιέργειας. Προτείνονται: Αναγεννητική υλοτομία (προπαρασκευαστική - σπερμοδότιδα - φωτοδότιδα), με διάσπαρτα αναγεννητικά κέντρα των 2,0 στρ. που να καλύπτουν το 1/4 της συνολικής δασοσκεπούς έκτασης (24,9/4 = 6,22 εκταρίων δηλ. 62,2/2 = 31 αναγεννητικά κέντρα). Έτσι, σε ορισμένα αναγεννητικά κέντρα θα εκτελείται προπαρασκευαστική υλοτομία (με αυτήν θα απομακρύνονται τα ευρύκορμα, κακόμορφα, βαρέα και ζημιωθέντα δένδρα), σε άλλα θα διενεργείται υλοτομία σποράς (θα απομακρύνονται και με αυτήν τα βαρύτερα, χαμηλόκορμα, κακόμορφα δένδρα και θα διατηρούνται τα καλύτερα ως σπορείς, μέχρι βαθμού συγκόμωσης 0,5 - 0,6) και σε άλλα – όπου έχει εγκατασταθεί νεοφυτεία – φωτοδότιδα υλοτομία (με απομάκρυνση της μητρικής συστάδας). Στην υπόλοιπη έκταση υπεραραιώσεις στους λεπτούς, μέτριους και χονδρούς κορμούς με σκοπό την καλλιέργεια των εκλεκτών ατόμων του μέλλοντος, εξευγενιστική αραίωση στα λεπτά και χονδρά κορμίδια με ευνόηση των εκάστοτε εκλεκτών ατόμων διά της υλοτομίας των οξυτέρων ανταγωνιστών και κακών τύπων. Επίσης καλλιέργεια – εξυγίανση της νεοφυτείας και πυκνοφυτείας της συστάδας. Σημείωση: Να εξαιρεθούν από τις υλοτομίες ορισμένα γηραιά, κουφαλερά κ.λ.π. αλλά υγιή άτομα (1 - 2 άτομα στο εκτάριο) ώστε να υπάρχουν ενδαιτήματα και μετά το πέρας των υλοτομιών για ορισμένα είδη πανίδας. Υλοτομητέος όγκος (m³): Από αναγεννητική υλοτομία (το 1/4 του 30% του ξυλαποθέματος της ΙΙΙ και ΙV κλάσης) Μ.Π.= 66m³, Ε=31 m³, Ο.=28 m³.Από ενδιάμεση κάρπωση (τα 3/4 του 16% του συνολικού ξυλαποθέματος) Μ.Π.=152m³, Ε=180 m³, Ο.=178 m³, Δ.=70 m³. Απαγόρευση βόσκησης.	ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΔΑΣΟΣ «ΚΑΡΥΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ (2006-2015)
	Ε.				1.496,00	410,00	60,08	16,47	27,41		
	Δ.				575,00	0,00	23,09	0,00	0,00		
	Ο.				1.483,00	380,00	59,56	15,26	25,62		
14β	Μ.Π.	Οριζ.	1-120	Σπερ. , ακαν., υποκηπ.	1.874,00	828,00	54,16	23,93	44,18	Οξυά 50%. Μαύρη πεύκη 30%. Ελάτη 10%. Δρυς, άτομα καστανιάς, οστράδας, αγριολεύκης, αγριοπλάτανου κλπ. 10%.Συστάδα μικτή οξυάς, μαύρης πεύκης, ελάτης και λιγότερο δρυός, καστανιάς κλπ. μέτριας έως πολύ καλής μορφής, αυξητικότητας και εξέλιξης. Στις αραιωμένες θέσεις έντονη αναγέννηση αρτιφύτων ελάτης - πεύκης. Σύμπυκνες πυκνοφυτείες χρήζουν καλλιέργειας. Ξυλαπόθεμα το πλείστον λεπτών και μέσων κορμών οξυάς κακής έως μέτριας μορφής με πολλά στρεβλά, διχαλωμένα άτομα αλλά και θέσεις οξυάς κατά φωλιές με ευθυτενή, πληρόμορφα άτομα πολύ καλής ποιότητας. Μαύρης πεύκης - ελάτης μέτριας έως αρκετά καλής μορφής και ποιότητας. Δρυός το πλείστον κορμιδίων και λεπτών κορμών όχι καλής μορφής. Παρατηρήθηκαν λίγες ανεμοθλασίες. Προτείνονται: Αναγεννητική υλοτομία (προπαρασκευαστική - σπερμοδότιδα - φωτοδότιδα), με διάσπαρτα αναγεννητικά κέντρα των 2,0 στρ. που να καλύπτουν το 1/4 της συνολικής δασοσκεπούς έκτασης (34,6/4 = 8,65 εκταρίων δηλ. 86,5/2 = 43 αναγεννητικά κέντρα). Έτσι, σε ορισμένα αναγεννητικά κέντρα θα εκτελείται προπαρασκευαστική υλοτομία (με αυτήν θα απομακρύνονται τα ευρύκορμα, κακόμορφα, βαρέα και ζημιωθέντα δένδρα), σε άλλα θα διενεργείται υλοτομία σποράς (θα απομακρύνονται και με αυτήν τα βαρύτερα, χαμηλόκορμα, κακόμορφα δένδρα και θα διατηρούνται τα καλύτερα ως σπορείς, μέχρι βαθμού συγκόμωσης 0,5 - 0,6) και σε άλλα – όπου έχει εγκατασταθεί νεοφυτεία – φωτοδότιδα υλοτομία (με απομάκρυνση της μητρικής συστάδας). Στην υπόλοιπη έκταση υπεραραιώσεις στους λεπτούς, μέτριους και χονδρούς κορμούς με σκοπό την καλλιέργεια των εκλεκτών ατόμων του μέλλοντος, εξευγενιστική αραίωση στα λεπτά και χονδρά κορμίδια με ευνόηση των εκάστοτε εκλεκτών ατόμων διά της υλοτομίας των οξυτέρων ανταγωνιστών και κακών τύπων. Επίσης καλλιέργεια – εξυγίανση της νεοφυτείας και πυκνοφυτείας της συστάδας. Σημείωση: Να εξαιρεθούν από τις υλοτομίες ορισμένα γηραιά, κουφαλερά κ.λ.π. αλλά υγιή άτομα (1 - 2 άτομα στο εκτάριο) ώστε να υπάρχουν ενδαιτήματα και μετά το πέρας των υλοτομιών για ορισμένα	ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΔΑΣΟΣ «ΚΑΡΥΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ (2006-2015)
	Ο.				3.285,00	456,00	94,94	13,18	13,88		
	Ε.				837,00	359,00	24,19	10,38	42,89		
	Δ.				731,00	287,00	21,13	8,29	39,26		

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm	Συνολικο ξυλαπόθεμα συστάδας /ha	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
										είδη πανίδας. Υλοτομητέος όγκος (m³): Από αναγεννητική υλοτομία (το 1/4 του 30% του ξυλαποθέματος της III και IV κλάσης) Μ.Π.= 62m³, Ο.=34 m³, Ε.=27 m³, Δ.=22m³ .Από ενδιάμεση κάρπωση (τα 3/4 του 16% του συνολικού ξυλαποθέματος) Μ.Π.=224m³, Ο.=394 m³, Ε.=100m³, Δ.=87 m³. Απαγόρευση βόσκησης.	
16α	Μ.Π.	Οριζ.	1-120	Σπερ. , ακαν., υποκτηπ.	754,00	0,00	23,56	0,00	0,00	Οξύα 55%. Ελάτη 30%. Μαύρη πεύκη 10%. Άτομα καστανιάς, αγριολεύκης κλπ. 5%.Συστάδα μικτή οξύας, ελάτης, μαύρης πεύκης και σε πολύ μικρό ποσοστό καστανιά, αγριολεύκη κλπ. μέτριας έως ικανοποιητικής και πολύ καλής κατά θέσεις μορφής, αυξητικότητας και εξέλιξης. Σύμπικνα κατά θέσεις αθροίσματα λεπτών κορμιδίων ελάτης χρίζουν άμεσα καλλιέργειας. Ξυλαπόθεμα κορμιδίων λεπτών και μέσων κορμών το πλείστον, ελάτης πολύ καλής μορφής στο μεγαλύτερο μέρος, ενώ της οξύας μέτριας μορφής με πολλά διχαλωμένα, πολύκλαδα άτομα στο ανώτερο μέρος της συστάδας ενώ στο κατώτερο απαντάται οξύα πολύ καλής μορφής σε μίξη με άτομα καστανιάς. Η πεύκη καλής ποιότητας. Παρατηρήθηκαν αρκετές ανεμοθλασίες. Έγινε υλοτομία τελευταία το έτος 1993. Προτείνονται: Αναγεννητική υλοτομία (προπαρασκευαστική - σπερμοδότιδα - φωτοδότιδα) , με διάσπαρτα αναγεννητικά κέντρα των 2,0 στρ. που να καλύπτουν το 1/4 της συνολικής δασοσκεπούς έκτασης (32/4 = 8 εκταρίων δηλ. 80/2 = 40 αναγεννητικά κέντρα). Έτσι, σε ορισμένα αναγεννητικά κέντρα θα εκτελείται προπαρασκευαστική υλοτομία (με αυτήν θα απομακρύνονται τα ευρύκορμα, κακόμορφα, βαρέα και ζημιωθέντα δένδρα), σε άλλα θα διενεργείται υλοτομία σποράς (θα απομακρύνονται και με αυτήν τα βαρύτερα, χαμηλόκορμα, κακόμορφα δένδρα και θα διατηρούνται τα καλύτερα ως σπορείς, μέχρι βαθμού συγκόμωσης 0,5 - 0,6) και σε άλλα – όπου έχει εγκατασταθεί νεοφυτεία – φωτοδότιδα υλοτομία (με απομάκρυνση της μητρικής συστάδας). Στην υπόλοιπη έκταση υπεραραιώσεις στους λεπτούς, μέτριους και χονδρούς κορμούς με σκοπό την καλλιέργεια των εκλεκτών ατόμων του μέλλοντος, εξευγενιστική αρραίωση στα λεπτά και χονδρά κορμίδια με ευνόηση των εκάστοτε εκλεκτών ατόμων διά της υλοτομίας των οξυτέρων ανταγωνιστών και κακών τύπων. Επίσης καλλιέργεια - εξυγίανση της νεοφυτείας και πυκνοφυτείας της συστάδας. Σημείωση: Να εξαιρεθούν από τις υλοτομίες ορισμένα γηραιά, κουφαλερά κ.λ.π. αλλά υγιή άτομα (1 - 2 άτομα στο εκτάριο) ώστε να υπάρχουν ενδιαιήματα και μετά το πέρας των υλοτομιών για ορισμένα είδη πανίδας. Υλοτομητέος όγκος (m³): Από αναγεννητική υλοτομία (το 1/4 του 30% του ξυλαποθέματος της III και IV κλάσης) Ε.= 60m³, Ο.=50 m³ .Από ενδιάμεση κάρπωση (τα 3/4 του 16% του συνολικού ξυλαποθέματος) Ε.=250m³, Μ.Π.=90 m³, Ο.=550m³. Απαγόρευση βόσκησης.	ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΔΑΣΟΣ «ΚΑΡΥΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ (2006-2015)
	Ο.				4.568,00	652,00	142,75	20,38	14,27		
	Ε.				2.100,00	793,00	65,63	24,78	37,76		
18α	Ε.	Οριζ.	1-120	Σπερ. , ακαν., υποκτηπ.	1.684,00	1.002,00	81,35	48,41	59,50	Οξύα 50%. Ελάτη 40%. Καστανιά, άτομα δρυός, οστρυάς, φλαμουριάς, αγριολεύκης κλπ. 10%.Συστάδα μικτή οξύας, ελάτης κυρίως και λιγότερο καστανιάς, δρυός, φλαμουριάς, οστρυάς κλπ., συνεχόμενη, με αθροίσματα πυκνοφυτειών οξύας και ελάτης. Ξυλαπόθεμα υγιές όλων των κλάσεων διαμέτρων, ελάτης ικανοποιητικής έως πολύ καλής μορφής, οξύας μέτριας μορφής με πολλά πολύκλαδα άτομα. Κατά θέσεις αρκετές ανεμοθλασίες. Η συστάδα υλοτομήθηκε τελευταία το έτος 1991. Προτείνονται: Αναγεννητική υλοτομία (προπαρασκευαστική - σπερμοδότιδα - φωτοδότιδα), με διάσπαρτα αναγεννητικά κέντρα των 2,0 στρ. που να καλύπτουν το 1/4 της συνολικής δασοσκεπούς έκτασης (20,7/4 = 5,17 εκταρίων δηλ. 51,7/2 = 26 αναγεννητικά κέντρα). Έτσι, σε ορισμένα αναγεννητικά κέντρα θα εκτελείται προπαρασκευαστική υλοτομία (με αυτήν θα απομακρύνονται τα ευρύκορμα, κακόμορφα, βαρέα και ζημιωθέντα δένδρα), σε άλλα θα διενεργείται υλοτομία σποράς (θα απομακρύνονται και με αυτήν τα βαρύτερα, χαμηλόκορμα, κακόμορφα δένδρα και θα διατηρούνται τα καλύτερα ως σπορείς, μέχρι βαθμού συγκόμωσης 0,5 - 0,6) και σε άλλα – όπου έχει εγκατασταθεί νεοφυτεία – φωτοδότιδα υλοτομία (με απομάκρυνση της μητρικής συστάδας). Στην υπόλοιπη έκταση υπεραραιώσεις στους λεπτούς, μέτριους και χονδρούς κορμούς με σκοπό την καλλιέργεια των εκλεκτών ατόμων του μέλλοντος, εξευγενιστική αρραίωση στα λεπτά και χονδρά κορμίδια με ευνόηση των εκάστοτε εκλεκτών ατόμων διά της υλοτομίας των οξυτέρων ανταγωνιστών και κακών τύπων. Επίσης καλλιέργεια – εξυγίανση της νεοφυτείας και πυκνοφυτείας της συστάδας. Σημείωση: Να εξαιρεθούν από τις υλοτομίες ορισμένα γηραιά, κουφαλερά κ.λ.π. αλλά υγιή άτομα (1 - 2 άτομα στο εκτάριο) ώστε να υπάρχουν ενδιαιήματα και μετά το πέρας των υλοτομιών για ορισμένα είδη πανίδας. Υλοτομητέος όγκος (m³): Από αναγεννητική υλοτομία (το 1/4 του 30% του ξυλαποθέματος της III και IV κλάσης) Ε.=75m³, Ο.=35 m³ .Από ενδιάμεση κάρπωση (τα	ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΔΑΣΟΣ «ΚΑΡΥΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ (2006-2015)
	Ο.				1.944,00	442,00	93,91	21,35	22,74		

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm	Συνολικο ξυλαπόθεμα συστάδας / ha	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
										3/4 του 16% του συνολικού ξυλαποθέματος) E.=200m³, O.=235m³. Απαγόρευση βόσκησης.	
18β	E.	Οριζ.	1-120	Σπερ. , ακαν., υποκηπ.	1.220,00	505,00	48,61	20,12	41,39	Οξυά 45%. Ελάτη 20%. Δρυς 15%. Καστανιά 10%. Φλαμουριά, οστρυά, φράξος, γαύρος, σφενδάμι, αριά, αγριοπλάτανος, αρκουδοπούρναρο, άρκευθος κλπ. 10%.Συστάδα μικτή οξυάς, ελάτης, δρυός, καστανιάς και λοιπών πλατυφύλλων, το πλείστον πολύ καλής μορφής όπου επικρατεί οξυά - ελάτη. Στο ανατολικό μέρος της συστάδας όπου επικρατεί η δρυς με άτομα γαύρου, φράξου, οστρυάς κλπ. η μορφή είναι μέτρια έως και κακή. Ξυλαπόθεμα υγιές όλων των κλάσεων διαμέτρων. Σύμπυκνες θέσεις χρήζουν καλλιέργειας. Κατά θέσεις κουτσουμπάνες καστανιάς. Παρατηρήθηκαν λίγες ανεμοθλασίες. Προτείνονται: Αναγεννητική υλοτομία (προπαρασκευαστική - σπερμοδότιδα - φωτοδότιδα), με διάσπαρτα αναγεννητικά κέντρα των 2,0 στρ. που να καλύπτουν το 1/4 της συνολικής δασοσκεπούς έκτασης (31,1/4 = 7,77 εκταρίων δηλ. 77,7/2 = 39 αναγεννητικά κέντρα). Έτσι, σε ορισμένα αναγεννητικά κέντρα θα εκτελείται προπαρασκευαστική υλοτομία (με αυτήν θα απομακρύνονται τα ευρύκορμα, κακόμορφα, βαρέα και ζημιωθέντα δένδρα), σε άλλα θα διενεργείται υλοτομία σποράς (θα απομακρύνονται και με αυτήν τα βαρύτερα, χαμηλόκορμα, κακόμορφα δένδρα και θα διατηρούνται τα καλύτερα ως σπορείς, μέχρι βαθμού συγκόμωσης 0,5 - 0,6) και σε άλλα – όπου έχει εγκατασταθεί νεοφυτεία – φωτοδότιδα υλοτομία (με απομάκρυνση της μητρικής συστάδας). Στην υπόλοιπη έκταση υπεραραιώσεις στους λεπτούς, μέτριους και χονδρούς κορμούς με σκοπό την καλλιέργεια των εκλεκτών ατόμων του μέλλοντος, εξευγενιστική αραιώση στα λεπτά και χονδρά κορμίδια με ευνόηση των εκάστοτε εκλεκτών ατόμων διά της υλοτομίας των οξυτέρων ανταγωνιστών και κακών τύπων. Επίσης καλλιέργεια – εξυγίανση της νεοφυτείας και πυκνοφυτείας της συστάδας. Σημείωση: Να εξαιρεθούν από τις υλοτομίες ορισμένα γηραιά, κουφαλερά κ.λ.π. αλλά υγιή άτομα (1 - 2 άτομα στο εκτάριο) ώστε να υπάρχουν ενδιαιτήματα και μετά το πέρας των υλοτομιών για ορισμένα είδη πανίδας. Υλοτομητέος όγκος (m³): Από αναγεννητική υλοτομία (το 1/4 του 30% του ξυλαποθέματος της ΙΙΙ και ΙV κλάσης) E.= 38m³, O.=164 m³ Δ.=13 .Από ενδιάμεση κάρπωση (τα 3/4 του 16% του συνολικού ξυλαποθέματος) E.=147m³, O.=472 m³, Δ.=96m³. Απαγόρευση βόσκησης.	ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΔΑΣΟΣ «ΚΑΡΥΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ (2006-2015)
	O.				3.929,00	2.190,00	156,53	87,25	55,74		
	Δ.				797,00	179,00	132,83	29,83	22,46		
1	Λ.Π.	0,75-1,15	120	Λ.Π.: Σπερ. , ακαν., υποκηπ.	-	-	-	-	-	Λευκόδερμη Πεύκη στα κατάντη του τμήματος στα δασοόρια. Θαμνώδης βλάστηση από πυξάρι στα μέσα και νότια. Το τμήμα λόγω του υψομέτρου αποδίδεται αποκλειστικά στην κτηνοτροφική εκμετάλλευση-υπαλπικός βοσκότοπος. Το ρόμπολο στα κατάντη μπορεί να δώσει μελλοντικά λίγο λήμμα από διενέργια κλαδεύσεων-αραιώσεων, την παρούσα πενταετία επιλέχθηκε να μην γίνει καμία επέμβαση για λόγους αύξησης της δασοσκεπούς έκτασης από την εισδοχή περισσότερων ατόμων Λευκόδερμου Πεύκης μιας και η αναγέννηση της είναι ικανοποιητική. Στα μέσα και βόρεια του τμήματος αναπτύσσεται η προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου ενταγμένη στο δίκτυο NATURA 2000 με κωδικό GR1250001. Εκτός καλλιέργειας την παρούσα 5ετία	ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΑΣΟΣ «ΣΠΑΡΜΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ» ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ (2019-2023)
2	E.	0,75-1,15	150	Σπερ. Ακαν.	3.103,00	899,00	104,76	30,35	28,97	Ελάτη σε μίξη με άτομα ή ομάδες Οστρυάς, Γαύρου, Αγριολεύκης, Σφένδαμου, Δρυός, Ίταμου. Υπόροφος από κέδρο, πουρνάρι και πυξάρι. Βόρεια του τμήματος θαμνώδης έκταση από πυξάρι. Γενική κατάσταση: Τμήμα γενικά μέτριας έως καλής(κατά θέσεις) υγείας και κατάστασης με αρκετά γηραιά κλωνοβριθή, στρεβλά, σηπτόμενα, καχεκτικά άτομα Ελάτης. Στα κατάντη μικτό δάσος με φυλλοβόλα πλατύφυλλα. Γενικά ευθυτενή άτομα. Διάσπαρτες σύμπυκνες ενώσεις λεπτών κορμών-κορμιδίων που χρήζουν καλλιέργειας. Το 2004 εγκρίθηκε λήμμα 296 κ.μ. το οποίο δεν υλοτομήθηκε λόγω ανύπαρκτου οδικού δικτύου. Παχυμετρηθείσα επιφάνεια : 2 επιφάνειες του 1 και 1,5 στρέμματος αντίστοιχα και οπτική εκτίμηση. Προτείνονται: αναγεννητικές υλοτομίες (προπαρασκευαστικές, σποράς, φωτοδότιδες), σε μικρά διάσπαρτα κέντρα έκτασης μέχρι δύο στρεμμάτων στη δασοσκεπή έκταση Ελάτης. Προπαρασκευαστικές υλοτομίες μέσω αρνητικής επιλογής (με απομάκρυνση κακόμορφων, καχεκτικών, ασθενών ατόμων). Στο τέλος των φωτοδότιδων υλοτομιών απομάκρυνση της μητρικής συστάδας. Σε άλλα στάδια εξέλιξης καλλιεργητικές υλοτομίες με αρνητική επιλογή στο στάδιο της νεοφυτείας και αρχικά στο στάδιο της πυκνοφυτείας, ευνόηση των καλύτερων ατόμων στο στάδιο της πυκνοφυτείας χωρίς μεγάλη χαλάρωση της κομοστέγης. Στο στάδιο των λεπτών κορμών εγκατάσταση εξευγενιστικών αραιώσεων που θα συνεχιστούν και στο στάδιο των μέτριων κορμών, ενώ υπεραραιώσεις θα διεξαχθούν στο στάδιο των μεγάλων κορμών με μεγάλη χαλάρωση της κομοστέγης. Απομάκρυνση των υπέργηρων,	ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΑΣΟΣ «ΣΠΑΡΜΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ» ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ (2019-2023)
	Οσ.				669,00	0,00	22,59	0,00	0,00		
	Δ.				32,00	0,00	1,08	0,00	0,00		

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας /ha	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
										κουφαλερών με παρακράτηση ενός υπέργηρου ατόμου στο εκτάριο για ενίσχυση της βιοποικιλότητας. Το λήμμα θα ανέλθει σε ποσοστό 9% του συνολικού ξυλαποθέματος. Απαγόρευση βόσκησης	
3	Ε.	0,7 - 1,35	180	Σπερ. Ακαν. Υποκτηπ.	8.390,00	5.753,00	185,87	127,45	68,57	Ελάτη σχεδόν το πλείστον σε μίξη με άτομα φυλλοβόλων πλατύφυλλων όπως Οστρυά και Σφένδαμος κυρίως στα κατάντη, διάσπαρτα άτομα Ίταμου και Λευκόδερμη Πεύκη στα δασοόρια και στα όρια με το τμήμα. Τμήμα Ελάτης κατά κύριο λόγο, ανυλοτόμητο, με ξυλώδες κεφάλαιο υπέργηρο σε αρκετές θέσεις με μεγάλη κλωνοβρίθεια. Σύμπυκνες ενώσεις που χρήζουν καλλιέργειας-αραίωσης, διάσπαρτες ενώσεις λεπτών κορμών κορμιδίων. Σε σημεία του, λόγω ανυλοτόμησης, έχει επέλθει στάδιο διάσπασης κορμοστέγης με ταυτόχρονη έντονη αναγέννηση. Λίγα στρεβλά, ζημίες παρατηρήθηκαν από χινοθλασίες και προσβολές από ιξό. Δεν υλοτομήθηκε λόγω ανύπαρκτου οδικού δικτύου. Παχυμετρηθείσα επιφάνεια : 2 επιφάνειες του 1,5 στρέμματος η καθεμία και οπτική εκτίμηση. Προτείνονται: Υπόσκιες αναγεννητικές υλοτομίες (προπαρασκευαστικές, σποράς, φωτοδότιδες), σε μικρά διάσπαρτα κέντρα έκτασης μέχρι δύο στρεμμάτων στη δασοσκεπή έκταση Ελάτης. Προπαρασκευαστικές υλοτομίες μέσω αρνητικής επιλογής (με απομάκρυνση κακόμορφων, καχεκτικών, ασθενών ατόμων). Στο τέλος των φωτοδοτίδων υλοτομιών απομάκρυνση της μητρικής συστάδας. Σε άλλα στάδια εξέλιξης καλλιεργητικές υλοτομίες με αρνητική επιλογή στο στάδιο της νεοφυτείας και αρχικά στο στάδιο της πυκνοφυτείας, ευνόηση των καλύτερων ατόμων στο στάδιο της πυκνοφυτείας χωρίς μεγάλη χαλάρωση της κομοστέγης. Στο στάδιο των λεπτών κορμών εγκατάσταση εξευγενιστικών αραιώσεων που θα συνεχιστούν και στο στάδιο των μέτριων κορμών, ενώ υπεραραιώσεις θα διεξαχθούν στο στάδιο των μεγάλων κορμών με μεγάλη χαλάρωση της κομοστέγης. Απομάκρυνση των υπέργηρων, κουφαλερών με παρακράτηση ενός υπέργηρου ατόμου στο εκτάριο για ενίσχυση της βιοποικιλότητας. Το λήμμα θα ανέλθει σε ποσοστό 9% του συνολικού ξυλαποθέματος. Αν κριθεί σκόπιμο από άποψη καλλιεργητικών χειρισμών, λήμμα Λευκόδεσμης Πεύκης μπορεί να παρθεί από αυτό της Ελάτης. Απαγόρευση βόσκησης	ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΑΣΟΣ «ΣΠΑΡΜΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ» ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ (2019-2023)
	Οσ.				237,00	0,00	5,25	0,00	0,00		
4	Δ.	0,7 - 1,2	150	Ακαν. Σπερ.	89,31	0,00	1,56	0,00	0,00	Στα ανάντη ελάτη σε μίξη με φυλλοβόλα πλατύφυλλα όπως γαύρος, δρυς, σφένδαμος, σκλήθρο και οστρυά. Στα μέσα και κατάντη δρυς σε μίξη με φυλλοβόλα είδη και αείφυλλα πλατύφυλλα. Τμήμα ανομήλικο με μέτρια ποιότητα ξυλώδους κεφαλαίου και μέτριας προς καλής κατάστασης και υγιεινής. Διάσπαρτες σύμπυκνες ενώσεις λεπτών κορμών-κορμιδίων γαύρου-πουρναριού και γενικά γαύρου-οστρυάς που χρήζουν αραιώσης. Το πουρνάρι αποψιλωτικά σε όλη την έκταση για υποβοήθηση της αναγέννησης-επέκτασης δρυός-φυλλοβόλων. Διάσπαρτα γηραιά ώριμα προς υλοτομία άτομα δρυός-γαύρου με ορισμένα εξ αυτών προσβεβλημένα από ξυλοφάγους μύκητες που πρέπει να απομακρυνθούν. Το ξυλαπόθεμα είναι πιο συγκροτημένο και η συγκόμωση παρουσιάζει μεγαλύτερη συνοχή στα διάσπαρτα ρέματα κι όχι τόσο στις προσήλιες με μεγάλες κλίσεις θέσεις. Το τμήμα υλοτομήθηκε με υλοτομίες αναγωγής το 2004 και απολήφθησαν 543,82 κ.μ. καυσόξυλων δρυός-φυλλοβόλων. Παχυμετρηθείσα επιφάνεια : 2 επιφάνειες του 1 και μία του 1,5 στρέμματος αντίστοιχα και οπτική εκτίμηση. Προτείνονται: Στα διφυή δάση Δρυός και Φυλλοβόλων Πλατύφυλλων, καλλιεργητικές αναγωγικές υλοτομίες (αραιώσεις) για αλλαγή της διαχειριστικής μορφής. Στις καλύτερες ποιότητες τόπου, σε πυκνοφυτείες (τουλάχιστον 150 άτομα στο εκτάριο), αναγωγή με καλλιέργεια με παράταση του περιόρου χρόνου. Εξευγενιστικές αραιώσεις μέτριας έντασης αρχικά στον ανώροφο (υψηλή αραιώση) με θετική επιλογή. Σε συστάδες 50 ετών, ισχυρότερες αραιώσεις. Διαμόρφωση της κόμης των καλύτερων ατόμων και διατήρηση τυχόν υπάρχοντος υπορόφου. Σε υποβαθμισμένα εδάφη (IV, V, ποιότητα τόπου) ενρητίνωση με εισαγωγή μαύρης Πεύκης. Διατήρηση της Δρυός/Φυλλοβόλων τουλάχιστον 30-40% κατ' επιφάνεια. Εξυγιαντικές υλοτομίες με απομάκρυνση των υπέργηρων-κουφαλερών-προσβεβλημένων από ξυλοφάγους μύκητες με παρακράτηση ενός υπέργηρου ατόμου στο εκτάριο για ενίσχυση της βιοποικιλότητας. Το λήμμα θα ανέλθει σε ποσοστό 9% του συνολικού ξυλαποθέματος. Αποψιλωτικές υλοτομίες στα αείφυλλα πλατύφυλλα με παρακρατήματα 12% επί του συνόλου της δασοσκεπούς έκτασης. Απαγόρευση βόσκησης	ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΑΣΟΣ «ΣΠΑΡΜΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ» ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ (2019-2023)
	Γ. + Οστρ.			Ακαν.	73,76	0,00	1,29	0,00	0,00		
	Ε.			Ακαν.	5,93	0,00	0,10	0,00	0,00		
	Α.πλ.			Ακαν.	40,08	0,00	0,70	0,00	0,00		
5	Δ.	0,7 - 1,3	150	Ακαν.	60,00	0,00	0,78	0,00	0,00	Άτομα ή ομάδες Ελάτης σε μίξη με γαύρο, δρυ, σφενδάμι, σκλήθρο και οστρυά στα ανάντη. Στα κατάντη άτομα ή ομάδες δρυός σε μίξη με φυλλοβόλα πλατύφυλλα, κυρίως γαύρο. Διάσπαρτα άτομα Ιτάμου. Υπόροφος και σε άγονες θέσεις πυξάρι. Γενικά μέτριας υγείας και κατάστασης και μέτριας ποιότητας ξυλώδους κεφαλαίου με αρκετά άτομα	ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΑΣΟΣ «ΣΠΑΡΜΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ» ΔΗΜΟΥ
	Γ. + Οστρ.				5.854,00	1.283,00	75,78	16,61	21,92		
	Ε				1.916,00	146,00	40,00	3,05	7,62		

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας /ha	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
	I.				72,00	0,00	0,93	0,00	0,00	υπέργηρα και κακής πιότητας χρήσιμης ξυλείας. Καλής συνοχής σε αρκετά σημεία, διασπόμενη σε άλλα από βραχώσεις εξάρσεις. Μεγάλη κλωνοβρίθεια και αρκετά διάσπαρτα ώριμα προς υλοτομία άτομα. Προσβολές από κισσό και λίγες από ιξό. Το τμήμα υλοτομήθηκε το 2007 και απολήφθησαν 1.129,56 κ.μ. καυσόξυλων δρυός-φυλλοβόλων πλατυφύλλων. Παχυμετρηθείσα επιφάνεια : 3 επιφάνειες του 1 στρέμματος η καθεμία και οπτική εκτίμηση. Προτείνονται: Για την Ελάτη: Υπόσκιες αναγεννητικές υλοτομίες (προπαρασκευαστικές, σποράς, φωτοδότιδες), σε μικρά διάσπαρτα κέντρα έκτασης μέχρι δύο στρεμμάτων στη δασοσκεπή έκταση Ελάτης. Προπαρασκευαστικές υλοτομίες μέσω αρνητικής επιλογής (με απομάκρυνση κακόμορφων, καχεκτικών, ασθενών ατόμων). Στο τέλος των φωτοδοτίδων υλοτομιών απομάκρυνση της μητρικής συστάδας. Σε άλλα στάδια εξέλιξης καλλιεργητικές υλοτομίες με αρνητική επιλογή στο στάδιο της νεοφυτείας και αρχικά στο στάδιο της πυκνοφυτείας, ευνόηση των καλύτερων ατόμων στο στάδιο της πυκνοφυτείας χωρίς μεγάλη χαλάρωση της κομοστέγης. Στο στάδιο των λεπτών κορμών εγκατάσταση εξευγενιστικών αραιώσεων που θα συνεχιστούν και στο στάδιο των μέτριων κορμών, ενώ υπεραραιώσεις θα διεξαχθούν στο στάδιο των μεγάλων κορμών με μεγάλη χαλάρωση της κομοστέγης. Απομάκρυνση των υπέργηρων, κουφαλερών με παρακράτηση ενός υπέργηρου ατόμου στο εκτάριο για ενίσχυση της βιοποικιλότητας. Το λήμμα θα ανέλθει σε ποσοστό 9% του συνολικού ξυλαποθέματος. Στα διφυή δάση Δρυός και Φυλλοβόλων Πλατύφυλλων, καλλιεργητικές αναγωγικές υλοτομίες (αραιώσεις) για αλλαγή της διαχειριστικής μορφής. Στις καλύτερες ποιότητες τόπου, σε πυκνοφυτείες (τουλάχιστον 150 άτομα στο εκτάριο), αναγωγή με καλλιέργεια με παράταση του περίτροπου χρόνου. Εξευγενιστικές αραιώσεις μέτριας έντασης αρχικά στον ανώροφο (υψηλή αραιώση) με θετική επιλογή. Σε συστάδες 50 ετών, ισχυρότερες αραιώσεις. Διαμόρφωση της κόμης των καλύτερων ατόμων και διατήρηση τυχόν υπάρχοντος υπορόφου. Σε υποβαθμισμένα εδάφη (IV, V, ποιότητα τόπου) ενρητίνωση με εισαγωγή μαύρης Πεύκης. Διατήρηση της Δρυός/Φυλλοβόλων τουλάχιστον 30-40% κατ' επιφάνεια. Εξυγιαντικές υλοτομίες με απομάκρυνση των υπέργηρων-κουφαλερών-προσβεβλημένων από ξυλοφάγους μύκητες με παρακράτηση ενός υπέργηρου ατόμου στο εκτάριο για ενίσχυση της βιοποικιλότητας. Το λήμμα θα ανέλθει σε ποσοστό 9% του συνολικού ξυλαποθέματος. Απαγόρευση βόσκησης	ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ (2019-2023)
6	Δ.	0,6-1,3	100 & 30-60 η μέση	Ακαν., διφ. με επικρατέστερη σπερ.	3.681,00	2.951,00	49,30	39,53	80,17	Δρυς και πουρνάρι σε μίξη με γαύρο, λίγη οστράα, σφένδαμο, φράξο και γκορτσιά. Γενική κατάσταση: Τμήμα μικτό δρυός-φυλλοβόλων πλατυφύλλων-πουρναριού, γενικά μέτριας έως καλής υγείας. Σύμπυκνες ενώσεις λεπτών κορμών-κορμιδίων που χρήζουν αραιώσης-καλλιέργειας. Διάσπαρτα γηραιά δρυός(κυρίως) και γαύρου(λιγότερο). Στα άναντη, κυρίως, προοπτική ανάπτυξης ευθυενών πληρόμορφων κορμών σε θέσεις που ευνοεί το έδαφος και η έκθεση. Στα κατάντη πιο υποβαθμισμένη, με εντονότερη εμφάνιση του πουρναριού πιθανότατα λόγω έντονης βόσκησης. Διακοπτόμενης συνοχής σε λίγα διάσπαρτα σημεία. Αρκετά γηραιά άτομα δρυός κουφαλερά-ξηρά ή με ξηράνσεις κορυφών από ξυλοφάγους μύκητες ή προσβολές από ιξό, που ολοκλήρωσαν το ρόλο τους ως σπορείς στο παρελθόν, των οποίων η απομάκρυνση είναι επιβεβλημένη και θα γίνει επιπλέον του προτεινόμενου λήματος για λόγους αναβάθμισης της υγιεινής της συστάδας. Τα αείφυλλα αποφιλωτικά μιας και η δυναμική του τμήματος είναι αυτή της δρυός.Το τμήμα υλοτομήθηκε το 2007 και απολήφθησαν 39,66 κ.μ. δρυός και 49,84 κ.μ. πουρναριού. Παχυμετρηθείσα επιφάνεια : 2 επιφάνειες του 1 και μία του 1,5 στρέμματος αντίστοιχα και οπτική εκτίμηση. Προτείνονται: Στα διφυή δάση Δρυός και Φυλλοβόλων Πλατύφυλλων, καλλιεργητικές αναγωγικές υλοτομίες (αραιώσεις) για αλλαγή της διαχειριστικής μορφής. Στις καλύτερες ποιότητες τόπου, σε πυκνοφυτείες (τουλάχιστον 150 άτομα στο εκτάριο), αναγωγή με καλλιέργεια με παράταση του περίτροπου χρόνου. Εξευγενιστικές αραιώσεις μέτριας έντασης αρχικά στον ανώροφο (υψηλή αραιώση) με θετική επιλογή. Σε συστάδες 50 ετών, ισχυρότερες αραιώσεις. Διαμόρφωση της κόμης των καλύτερων ατόμων και διατήρηση τυχόν υπάρχοντος υπορόφου. Σε υποβαθμισμένα εδάφη (IV, V, ποιότητα τόπου) ενρητίνωση με εισαγωγή μαύρης Πεύκης. Διατήρηση της Δρυός/Φυλλοβόλων τουλάχιστον 30-40% κατ' επιφάνεια. Εξυγιαντικές υλοτομίες με απομάκρυνση των υπέργηρων-κουφαλερών-προσβεβλημένων από ξυλοφάγους μύκητες με παρακράτηση ενός υπέργηρου ατόμου στο εκτάριο για ενίσχυση της βιοποικιλότητας. Το λήμμα θα ανέλθει σε ποσοστό 9% του συνολικού ξυλαποθέματος. Αποφιλωτικές υλοτομίες στα αείφυλλα πλατύφυλλα με παρακρατήματα 12% επί του συνόλου της δασοσκεπούς έκτασης. Απαγόρευση βόσκησης	ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΑΣΟΣ «ΣΠΑΡΜΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ» ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ (2019-2023)
	Γ.				2.094,00	1.017,00	28,05	13,62	48,57		
	Α.πλ,				522,00	0,00	6,99	0,00	0,00		

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας /ha	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
7	Δ.	0,65-1,2	70 με διασπαρτα νεαρά αθροίσματα	Ακαν., διφ. με επικρατέστερη σπερ.	1.440,00	475,00	29,10	9,60	32,99	Δρυς σε μίξη κατά θέσεις με γαύρο, λίγη οστρυά-φράξο-σφένδαμο και κέδρο. Υπόροφος από πουρνάρι. Τμήμα μέτριας υγείας και ανάπτυξης γενικά, κατάλληλο προς το παρών για παραγωγή καυσόξυλου. Η δυναμική της είναι αυτή δρυός, λόγω δυσμενών επιδράσεων από βοσκή και την πυρκαγιά του 1994, έχει υποβαθμιστεί σημαντικά με αποτέλεσμα την έντονη εισδοχή του πουρναριού σε όλη την έκταση της, το οποίο με απομάκρυνση του με αποψιλωτική υλοτομία μπορεί να επιταχύνει-υποβοηθήσει την αναγέννηση-επέκταση της δρυός. Αρκετά διάσπαρτα γηραιά άτομα δρυός-γαύρου στα ρέματα και σε ύφυγρες θέσεις γενικά. Στα ρέματα το ξυλαπόθεμα είναι πιο συγκροτειμένο. Διάσπαρτα γηραιά άτομα πρίνου μεγάλων διαμέτρων(>30cm). Μερικά ξηρά ιστάμενα που θα απομακρυνθούν πλέον του προτεινόμενου λήμματος για λόγους αναβάθμισης της υγιεινής του τμήματος.Το τήμα υλοτομήθηκε το 2004 και απολήφθησαν 38,39 κ.μ. καυσόξυλων δρυός. Η μεγαλύτερη έκταση του τμήματος, 700 στρ., κήκε από πυρκαγιά το 1994. Έντονα σημάδια κακομεταχείρισης από μεγάλη πίεση της βοσκής κατά το παρελθόν. Η δρυς, σταδιακά με την εφαρμογή των κατάλληλων δασοκομικών χειρισμών, θα εκτοπίσει τα αείφυλλα όταν περιοριστούν οι παράγοντες καταστολής της. Η επικράτηση της δρυός στις καλύτερες ποιότητες τόπου θεωρείται δεδομένη. Γενικά παρά τη συνεχιζόμενη βόσκηση, ελάχιστα μειωμένη σε σχέση με το παρελθόν, η δασοσκεπής έκταση βρίσκεται υπό ανόρθωση. Παχυμετρηθείσα επιφάνεια : 3 επιφάνειες του 1 στρέμματος η καθεμία και οπτική εκτίμηση. Προτείνονται: Στα διφυή δάση Δρυός και Φυλλοβόλων Πλατύφυλλων, καλλιεργητικές αναγωγικές υλοτομίες (αραιώσεις) για αλλαγή της διαχειριστικής μορφής. Στις καλύτερες ποιότητες τόπου, σε πυκνοφυτείες (τουλάχιστον 150 άτομα στο εκτάριο), αναγωγή με καλλιέργεια με παράταση του περιότρου χρόνου. Εξευγενιστικές αραιώσεις μέτριας έντασης αρχικά στον ανώροφο (υψηλή αραιώση) με θετική επιλογή. Σε συστάδες 50 ετών, ισχυρότερες αραιώσεις. Διαμόρφωση της κόμης των καλύτερων ατόμων και διατήρηση τυχόν υπάρχοντος υπορόφου. Σε υποβαθμισμένα εδάφη (IV, V, ποιότητα τόπου) ενρητίνωση με εισαγωγή μαύρης Πεύκης. Διατήρηση της Δρυός/Φυλλοβόλων τουλάχιστον 30-40% κατ' επιφάνεια. Εξυγιαντικές υλοτομίες με απομάκρυνση των υπέργηρων-κουφαλερών-προσβεβλημένων από ξυλοφάγους μύκητες με παρακράτηση ενός υπέργηρου ατόμου στο εκτάριο για ενίσχυση της βιοποικιλότητας. Το λήμμα θα ανέλθει σε ποσοστό 9% του συνολικού ξυλαποθέματος. Αποψιλωτικές υλοτομίες στα αείφυλλα πλατύφυλλα με παρακρατήματα 12% επί του συνόλου της δασοσκεπούς έκτασης. Απαγόρευση βόσκησης	ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΑΣΟΣ «ΣΠΑΡΜΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ» ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ (2019-2023)
	Γ.				84,00	0,00	1,70	0,00	0,00		
	Α.πλ.				346,00	0,00	6,99	0,00	0,00		
8	Δ.	0,6-1,0	40	Πρεμν. Σχεδόν ομήλ.	26,00	0,00	19,70	0,00	0,00	Πουρνάρι κατά θέσεις σε μίξη με γαύρο, δρυ, φράξο και σφενδάμι. Η δρυς εμφανίζεται σε ομάδες και λόγχμες. Γενικά τμήμα μέτριας υγείας και ανάπτυξης κατάλληλη για παραγωγή καυσόξυλων. Συστάδα γενικά μέτριας συνοχής με εμφανή τα σημεία υπερβόσκησης για μεγάλο χρονικό διάστημα, με άτομα δρυός που προέρχονται από παλαιότερη κλαδονομή, πολύκλαδα, στρεβλά, καταπιεσμένα και πρεμνοφυή αναγέννηση κατά θέσεις, με νανώδη μορφή. Ζημίες αρκετές από βοσκή και λαθροϋλοτομίες, αποξηραμένες κορυφές κ.λ.π.. Το τμήμα είναι κακής κατάστασης με αποκάλυψη κατά θέσεις του μητρικού πετρώματος και έκπλυση του εδάφους. Έντονα σημάδια κακομεταχείρισης κατά το παρελθόν. Η δρυς εμφανίζεται κατ' άτομο κυρίως σε μίξη με αείφυλλα πλατύφυλλα, κύρια φυλλίκι και πρίνο, με άτομα μικρής ηλικίας και αυξητικής τάσης τα οποία εκτοπίζει συνεχώς. Η επικράτηση στις καλύτερες ποιότητες τόπου θεωρείται δεδομένη. Το τμήμα υλοτομήθηκε το 2009 και απολήφθησαν 48,6 κ.μ. καυσόξυλων δρυός. Τα ανάντη του τμήματος κήκαν από την πυρκαγιά του 1994. Εκτός καλλιέργειας την παρούσα 5ετία	ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΑΣΟΣ «ΣΠΑΡΜΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ» ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ (2019-2023)
	Α.πλ.				120,00	0,00	3,99	0,00	0,00		
9	Δ.	0,6-1,1	150	Πρεμν. ομήλ.	1.135,00	0,00	50,20	0,00	0,00	Πουρνάρι κατά θέσεις σε μίξη με γαύρο, δρυ, φράξο και σφενδάμι. Η δρυς εμφανίζεται σε ομάδες και λόγχμες με υπόροφο πλατυφύλλων. Γενικά τμήμα μέτριας υγείας και ανάπτυξης κατάλληλη για παραγωγή καυσόξυλων. Συστάδα γενικά μέτριας συνοχής με εμφανή τα σημεία υπερβόσκησης για μεγάλο χρονικό διάστημα, με άτομα δρυός που προέρχονται από παλαιότερη κλαδονομή, πολύκλαδα, στρεβλά, καταπιεσμένα και πρεμνοφυή αναγέννηση κατά θέσεις, με νανώδη μορφή. Ζημίες αρκετές από βοσκή και λαθροϋλοτομίες, αποξηραμένες κορυφές κ.λ.π..Το τμήμα είναι κακής κατάστασης με αποκάλυψη κατά θέσεις του μητρικού πετρώματος και έκπλυση του εδάφους. Έντονα σημάδια κακομεταχείρισης κατά το παρελθόν. Η δρυς εμφανίζεται κατ' άτομο κυρίως σε μίξη με αείφυλλα πλατύφυλλα, κύρια φυλλίκι και πρίνο, με άτομα μικρής ηλικίας και αυξητικής τάσης τα οποία εκτοπίζει συνεχώς. Η επικράτηση στις καλύτερες ποιότητες τόπου θεωρείται δεδομένη. Το τμήμα υλοτομήθηκε το 2009 και απολήφθησαν 669,03 κ.μ.	ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΑΣΟΣ «ΣΠΑΡΜΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ» ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ (2019-2023)
	Α.πλ.		40		502,00	0,00	9,56	0,00	0,00		

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας /ha	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
										καυσόξυλων δρυός και αιφύλλων πλατυφύλλων. Μικρή έκταση βόρεια του τμήματος κάηκε στην πυρκαγιά του 1994. Εκτός καλλιέργειας την παρούσα 5ετία	
10	Δ.	0,6-1,0	45	Πρεμν. Σχεδόν ομήλ.	865,00	0,00	14,96	0,00	0,00	Πουρνάρι κατά θέσεις σε μίξη με γαύρο, δρυ, φράξο και σφενδάμι. Η δρυς εμφανίζεται σε ομάδες και λόγχμες με υπόροφο πλατυφύλλων. Γενικά τμήμα μέτριας υγείας και ανάπτυξης κατάλληλο για παραγωγή καυσόξυλων. Τμήμα γενικά μέτριας συνοχής με εμφανή τα σημεία υπερβόσκησης για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ζημίες αρκετές από βοσκή και λαθρούλοτομίες, αποξηραμένες κορυφές κ.λ.π. Το τμήμα είναι κακής κατάστασης με αποκάλυψη κατά θέσεις του μητρικού πετρώματος και έκπλυση του εδάφους. Έντονα σημάδια κακομεταχείρισης κατά το παρελθόν. Η δρυς εμφανίζεται κατ' άτομο κυρίως σε μίξη με αείφυλλα πλατύφυλλα, κύρια φυλλίκι και πρίνο. Στο τμήμα εμφανίζονται πολλά διάφορα πλατύφυλλα. Το τμήμα υλοτομήθηκε το 2010 και απολήφθησαν 435,96 κ.μ. καυσόξυλων αιφύλλων πλατυφύλλων. Εκτός καλλιέργειας την παρούσα 5ετία.	ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΑΣΟΣ «ΣΠΑΡΜΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ» ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ (2019-2023)
11	Δ.	0,6-1,0	Αείφυλλα: 12 Δ.:100	Πρεμν. ομήλ.	-	-	-	-	-	Πουρνάρι κατά θέσεις σε μίξη με γαύρο, δρυ, φράξο και σφενδάμι. Η δρυς εμφανίζεται σε μικροεκτάσεις σε ομάδες και λόγχμες με υπόροφο πλατυφύλλων. Το τμήμα εξελίσσεται κανονικά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα στην εξέλιξη του. Το τμήμα υλοτομήθηκε το 2006 και απολήφθησαν 190,01 κ.μ. καυσόξυλων αιφύλλων πλατυφύλλων. Εκτός καλλιέργειας την παρούσα 5ετία.	ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΑΣΟΣ «ΣΠΑΡΜΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ» ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ (2019-2023)
12	Δ.	0,6-1,0	45	Πρεμν. Σχεδόν ομήλ.	887,00	0,00	8,38	0,00	0,00	Πουρνάρι κατά θέσεις σε μίξη με γαύρο, δρυ, φράξο και σφενδάμι. Η δρυς εμφανίζεται σε ομάδες και λόγχμες με υπόροφο πλατυφύλλων. Γενικά τμήμα μέτριας έως καλής υγείας και ανάπτυξης κατάλληλο για παραγωγή καυσόξυλων. Ζημίες από τη βοσκή παντού. Το τμήμα υλοτομήθηκε το 2004 και απολήφθησαν 334,16 κ.μ. καυσόξυλων αιφύλλων πλατυφύλλων. Εκτός καλλιέργειας την παρούσα 5ετία	ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΑΣΟΣ «ΣΠΑΡΜΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ» ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ (2019-2023)
13	Δ.	0,6-1,0	Αείφυλλα: 12 Δ.:100	Πρεμν. ομήλ.	-	-	-	-	-	Πουρνάρι κατά θέσεις σε μίξη με γαύρο, δρυ, φράξο και σφενδάμι. Πλάτανος στα ρέματα. Γενικά καλής υγείας και ανάπτυξης, το τμήμα εξελίσσεται κανονικά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα στην εξέλιξη του. Το τμήμα υλοτομήθηκε το 2006 και απολήφθησαν 257,31 κ.μ. καυσόξυλων αιφύλλων πλατυφύλλων. Έκτος καλλιέργειας την παρούσα 5ετία	ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΑΣΟΣ «ΣΠΑΡΜΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ» ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ (2019-2023)
14	Δ.	0,6-1,1	60	Ακαν. Διφ. με επικρατέστερη την πρεμν.	1.802,00	0,00	27,96	0,00	0,00	Δρυς και πουρνάρι σε μίξη με γαύρο, πεδινό σφένδαμο και φράξο. Διάσπαρτα άτομα Γκορτσιάς. Στα ανάντη αείφυλλα και διάσπαρτα άτομα δρυός. Τμήμα Δρυός σε μίξη με Γαύρο-Σφένδαμο και αρκετό πουρνάρι στον υπόροφο ή μόνο του σε όλη την έκταση. Δασοσκεπή έκταση διακοπτόμενης συνοχής με πολλά μικρά-μεγάλα διάκενα, αποτέλεσμα συνεχής υποβάθμισης του από υπερβόσκηση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Γενικά μέτριας έως κακής κατάστασης και υγείας με πολλά πολύκλαδα, στρεβλά και κουφαλερά άτομα. Σε θέσεις καλύτερης μορφής με αρκετά ευθυτενή-πληρόμορφα άτομα. Η Δρυς σε αρκετά σημεία φαίνεται να εκτοπίζει το πουρνάρι, γεγονός που καταδεικνύει ότι μπορεί να γίνει δυναμική Δρυοσυστάδα μελλοντικά με τους κατάλληλους δασοκομικούς χειρισμούς. Αρκετά γηραιά άτομα Δρυός προσβεβλημένα από ξυλοφάγους μύκητες. Το τμήμα υλοτομήθηκε το 2004 και απολήφθησαν 54,1 κ.μ. καυσόξυλων πουρναριού. Το ξυλαπόθεμα του τμήματος συγκροτείται από υπέργηρα άτομα με μεγάλη εμφάνιση εγκάρδιου ξύλου και φαιά σήψη καθιστώντας επισφαλές το ξυλαπόθεμα στο εγγύς μέλλον γι' αυτό και προτείνεται η επίσπευση αναγεννητικών υλοτομιών και η αποψιλωτική υλοτομία του πουρναριού για υποβοήθηση της αναγέννησης Δρυός και λοιπών φυλλοβόλων πλατυφύλλων. Τα γηραιά κουφαλερά-προσβεβλημένα θα απομακρύνονται όλα, για λόγους αναβάθμισης και θωράκισης της υγιεινής του τμήματος, χωρίς να συμμετέχουν στο λήμμα. Παχυμετρηθείσα επιφάνεια : 3 επιφάνειες του 1 στρέμματος η καθεμία και οπτική εκτίμηση. Προτείνονται: Στα δίφυη δάση Δρυός και Φυλλοβόλων Πλατύφυλλων, καλλιεργητικές αναγωγικές υλοτομίες (αραιώσεις) για αλλαγή της διαχειριστικής μορφής. Στις καλύτερες ποιότητες τόπου, σε πυκνοφυτείες (τουλάχιστον 150 άτομα στο εκτάριο), αναγωγή με καλλιέργεια με παράταση του περιότρου χρόνου. Εξευγενιστικές αραιώσεις μέτριας έντασης αρχικά στον ανώροφο (υψηλή αραιώση) με θετική επιλογή. Σε συστάδες 50 ετών, ισχυρότερες αραιώσεις. Διαμόρφωση της κόμης των καλύτερων ατόμων και διατήρηση τυχόν υπάρχοντος υπορόφου. Σε υποβαθμισμένα εδάφη (IV, V, ποιότητα τόπου) ενρητίνωση με εισαγωγή μαύρης Πεύκης. Διατήρηση της Δρυός/Φυλλοβόλων τουλάχιστον 30-40% κατ' επιφάνεια. Εξυγιαντικές υλοτομίες με απομάκρυνση των υπέργηρων-κουφαλερών-προσβεβλημένων από ξυλοφάγους μύκητες με παρακράτηση ενός υπέργηρου ατόμου	ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΑΣΟΣ «ΣΠΑΡΜΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ» ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ (2019-2023)

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας / ha	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
										στο εκτάριο για ενίσχυση της βιοποικιλότητας. Το λήμμα θα ανέλθει σε ποσοστό 9% του συνολικού ξυλαποθέματος. Αποψιλωτικές υλοτομίες στα αείφυλλα πλατύφυλλα με παρακρατήματα 12% επί του συνόλου της δασοσκεπούς έκτασης. Απαγόρευση βόσκησης.	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Εκτός διαχείρισης την παρούσα 10ετία	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ «ΚΑΡΥΑ» (2014-2023)
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Εκτός διαχείρισης την παρούσα 10ετία	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ «ΚΑΡΥΑ» (2014-2023)
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Εκτός διαχείρισης την παρούσα 10ετία	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ «ΚΑΡΥΑ» (2014-2023)
4α	Μ.Π.	-	-	-	-	-	-	-	-	Εκτός διαχείρισης την παρούσα 10ετία	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ «ΚΑΡΥΑ» (2014-2023)
4β	Ο.	0,9		Σπερ. Κηπ.	2.872,62	1.905,37	94,65	62,78	66,33	Αναγεννητικές- Καλλιεργητικές- Εξυγιαντικές. Λήμμα: Οξυά 143,63 m3 και Ελάτη 94,34 m3 Έτος υλοτομίας 2021	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ «ΚΑΡΥΑ» (2014-2023)
	Ε.				1.572,25	1.004,26	37,84	24,17	63,87		
4γ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Εκτός διαχείρισης την παρούσα 10ετία	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ «ΚΑΡΥΑ» (2014-2023)
5α	Μ.Π.	0,8		Σπερ. Υποκηπ.	811,97	258,43	82,35	26,21	31,83	Αναγεννητικές- Καλλιεργητικές- Εξυγιαντικές. Λήμμα: Πεύκη 56,84 m3 και Οξυά 29,18 m3 Έτος υλοτομίας 2022	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ «ΚΑΡΥΑ» (2014-2023)
	Ο.				291,84	70,14	106,51	25,60	24,03		
5β	Ε.	0,9 - 1,0			1.609,74	997,41	117,93	73,07	61,96	Αναγεννητικές- Καλλιεργητικές- Εξυγιαντικές. Λήμμα: Ελάτη 96,58 m3 και Οξυά 87,90 m3 Έτος υλοτομίας 2021	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ «ΚΑΡΥΑ» (2014-2023)
	Ο.				1.465,05	1.063,74	107,33	77,93	72,61		
6α	Μ.Π.	0,7 - 0,8		Σπερ. Υποκηπ.	6.527,19	4.629,41	118,59	84,11	70,93	Αναγεννητικές- Καλλιεργητικές- Εξυγιαντικές. Λήμμα: Πεύκη 326,36 m3 και Οξυά 31,75 m3 Έτος υλοτομίας 2022	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ «ΚΑΡΥΑ» (2014-2023)
	Ο.				352,73	295,95	175,49	147,24	83,90		
6β	Μ.Π.	0,7 - 0,8		Σπερ. Υποκηπ.	2.553,64	2.014,24	97,43	76,85	78,88	Αναγεννητικές- Καλλιεργητικές- Εξυγιαντικές. Λήμμα: Πεύκη 127,68 m3 και Οξυά 98,34 m3 Έτος υλοτομίας 2023	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ «ΚΑΡΥΑ» (2014-2023)
	Ο.				1.404,88	1.086,89	131,79	101,96	77,37		
7α	Μ.Π.	0,8- 0,9		Σπερ. Υποκηπ.	5.061,70	3.497,28	131,20	90,65	69,09	Αναγεννητικές- Καλλιεργητικές- Εξυγιαντικές. Λήμμα: Πεύκη 253,08 m3 και Ελάτη 155,67 m3 Έτος υλοτομίας 2019	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ «ΚΑΡΥΑ» (2014-2023)
	Ε.				3.113,42	2.481,47	80,70	64,32	79,70		
7β	Μ.Π.	0,8		Σπερ. Υποκηπ.	4.033,81	2.579,13	75,37	48,19	63,94	Αναγεννητικές- Καλλιεργητικές- Εξυγιαντικές. Λήμμα: Πεύκη 201,69 m3 και Ελάτη 140,56 m3 Έτος υλοτομίας 2019	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ «ΚΑΡΥΑ» (2014-2023)
	Ε.				3.514,12	2.613,92	65,66	48,84	74,38		
8α	Μ.Π.	0,8		Σπερ. Υποκηπ.	3.973,89	2.917,50	130,42	95,75	73,42	Αναγεννητικές- Καλλιεργητικές- Εξυγιαντικές. Λήμμα: Πεύκη 357,65 m3. Έτος υλοτομίας 2018.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ «ΚΑΡΥΑ» (2014-2023)
8β	Ε.	0,9		Σπερ. Υποκηπ.	5.547,57	4.367,34	140,73	110,79	78,73	Αναγεννητικές- Καλλιεργητικές- Εξυγιαντικές. Λήμμα: Ελάτη 166,43 m3, Οξυά 292,48 m3, Πεύκη 93,93 m3. Έτος υλοτομίας 2023.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ «ΚΑΡΥΑ» (2014-2023)
	Ο.				7.312,01	6.281,18	185,49	159,34	85,90		
	Μ.Π.				1.341,86	728,48	34,04	18,48	54,29		
8γ	Ε.	0,9-1,0		Σπερ. Υποκηπ. προς κηπ.	4.458,45	1.659,09	124,26	46,24	37,21	Αναγεννητικές- Καλλιεργητικές- Εξυγιαντικές. Λήμμα: Ελάτη 222,92 m3 και Οξυά 460,92 m3 Έτος υλοτομίας 2019	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ «ΚΑΡΥΑ» (2014-2023)
	Ο.				6.584,57	4.212,18	217,96	139,43	63,97		
9α	Μ.Π.	0,9		Σπερ., κηπ., υποκηπ.	4.114,23	3.469,96	381,30	321,59	84,34	Αναγεννητικές- Καλλιεργητικές- Εξυγιαντικές. Λήμμα: Πεύκη 288,00 m3. Έτος υλοτομίας 2015.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ «ΚΑΡΥΑ» (2014-2023)
9β	Μ.Π.	0,9		Σπερ., κηπ., υποκηπ.	1.041,34	117,24	65,37	7,36	11,26	Αναγεννητικές- Καλλιεργητικές- Εξυγιαντικές. Λήμμα: Πεύκη 62,48 m3 και Δρυς 126,46 m3 Έτος υλοτομίας 2015	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ «ΚΑΡΥΑ» (2014-2023)
	Δ.				1.264,62	259,71	122,66	25,19	20,54		
10	Δ.	0,6		Σπερ., πρεμν., ακαν., υποκηπ.	1.390,48	164,56	167,73	19,85	11,83	Εκτός διαχείρισης την παρούσα 10ετία	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ «ΚΑΡΥΑ» (2014-2023)
11α	Μ.Π.	0,7			7.219,96	6.861,24	256,30	243,57	95,03		

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας / ha	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
	Δ.			Ομηλ., διφ., σπερ.	128,11	10,72	44,33	3,71	8,37	Αναγεννητικές- Καλλιεργητικές- Εξυγιαντικές. Λήμμα: Πεύκη 433,20 m3 και Δρυς 12,81 m3 Έτος υλοτομίας 2017	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ «ΚΑΡΥΑ» (2014-2023)
11β	Δ.	0,8		Υποκηπ.	2.973,23	0,00	82,02	0,00	0,00	Αναγεννητικές- Καλλιεργητικές- Εξυγιαντικές. Λήμμα: Δρυς 297,32 m3 και Πεύκη 90,42 m3 Έτος υλοτομίας 2017	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ «ΚΑΡΥΑ» (2014-2023)
	Μ.Π.			Ομηλ.,	1.291,77	1.105,87	107,29	91,85	85,61		
11γ	Δ.	0,8		Σπερ., υποκηπ., κατά θέσεις κηπ., σχεδόν ομήλ.	764,65	172,97	61,27	13,86	22,62	Αναγεννητικές- Καλλιεργητικές- Εξυγιαντικές. Λήμμα: Δρυς 68,82 m3. Έτος υλοτομίας 2017.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ «ΚΑΡΥΑ» (2014-2023)
12α	Δ.	0,9		Σπερ., υποκηπ.	5.846,38	2.326,11	152,21	60,56	39,79	Αναγεννητικές- Καλλιεργητικές- Εξυγιαντικές. Λήμμα: Δρυς 350,78 m3 και Πεύκη 151,24 m3 Έτος υλοτομίας 2015.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ «ΚΑΡΥΑ» (2014-2023)
	Μ.Π.			υποκηπ.	2.520,74	1.745,73	126,10	87,33	69,25		
12β	Δ.	0,9		Σπερ., υποκηπ., διφ.	5.670,52	2.926,64	188,64	97,36	51,61	Αναγεννητικές- Καλλιεργητικές- Εξυγιαντικές. Λήμμα: Δρυς 510,35 m3, Πεύκη 143,13 m3, Οξυά 192,29 m3. Έτος υλοτομίας 2020.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ «ΚΑΡΥΑ» (2014-2023)
	Μ.Π.				2.385,50	1.418,84	112,95	67,18	59,48		
	Ο.				2.136,58	598,69	209,88	58,81	28,02		
13α	Δ.	0,7		Σπερ., υποκηπ.	1.896,23	576,35	77,02	23,41	30,39	Αναγεννητικές- Καλλιεργητικές- Εξυγιαντικές. Λήμμα: Δρυς 132,74 m3, Πεύκη 68,45 m3, Οξυά 7,76 m3. Έτος υλοτομίας 2023.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ «ΚΑΡΥΑ» (2014-2023)
	Μ.Π.				977,91	593,59	39,72	24,11	60,70		
	Ο.				110,79	59,83	4,50	2,43	54,00		
13β	Δ.	0,8		Σπερ., υποκηπ.	7.191,54	4.231,30	133,30	78,43	58,84	Αναγεννητικές- Καλλιεργητικές- Εξυγιαντικές. Λήμμα: Δρυς 401,89 m3 και Πεύκη 25,59 m3 Έτος υλοτομίας 2023.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ «ΚΑΡΥΑ» (2014-2023)
	Ο.				365,59	101,61	126,94	35,28	27,79		
14α	Δ.	0,6-0,7		Σπερ., υποκηπ.	858,58	423,13	138,48	68,25	49,28	Αναγεννητικές- Καλλιεργητικές- Εξυγιαντικές. Λήμμα: Δρυς 54,74 m3. Έτος υλοτομίας 2014.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ «ΚΑΡΥΑ» (2014-2023)
14β	Δ.	0,7		Σπερ., υποκηπ., διφ.	354,88	354,88	40,19	40,19	100,00	Αναγεννητικές- Καλλιεργητικές- Εξυγιαντικές. Λήμμα: Δρυς 35,49 m3. Έτος υλοτομίας 2014.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ «ΚΑΡΥΑ» (2014-2023)
15	Μ.Π.	0,7-0,8		Ανομ. έως 110 ετών	3.885,99	1.466,83	133,31	50,32	37,75	Αναγεννητικές- Καλλιεργητικές- Εξυγιαντικές. Λήμμα: Πεύκη 233,16 m3 και Δρυς 150,71 m3 Έτος υλοτομίας 2023.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ «ΚΑΡΥΑ» (2014-2023)
	Δ.				2.153,02	376,62	73,86	12,92	17,49		
1α	Α.πλ.	Οριζ. έως κατακόρυφη	1-40	Πρεμν. ανομ. Ακαν. Με κατά θέσεις ομήλ.	1.845,00	0,00	12,42	0,00	0,00	Πρίνος, φιλόκι, χρυσόξυλο, αριά, κουμαριά, γλυστροκουμαριά. Δάφνη κυρίως στο ρ. Μανουσάκι. Λίγα διασπαρτα άτομα Μ.Πεύκης στο άνω μέρος της συστάδας. Εκτεταμένη πυρκαγιά το 1949 σε ολόκληρη την έκταση της συστάδας. Σήμερα παρουσιάζει μέτρια έως κακή, κατά θέσεις μορφή, εξαιτίας πρόσφατων δυσμενών ανθρωπογενών επιδράσεων (λαθροϋλοτομίες, υπερβόσκηση, κ.λ.π.) οι οποίες δρουν ανασχετικά στην ανέλιξη του οικοσυστήματος. Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει για τον μεγάλο κίνδυνο πυρκαγιάς που υφίσταται λόγω γεινίασης με το πεδίο βολής αρμάτων Λιτοχώρου, το ξηροθερμικό περιβάλλον και την ευφλεκτικότητα της βλάστησης. Τμήμα έκτασης 20ha της συστάδας υλοτομήθηκε το 1990-92 και απολήφθηκαν 41m3 αείφυλλων πλατύφυλλων. Τμήμα της συστάδας υλοτομήθηκε επίσης το 2001 και απολήφθηκαν 201 τόνοι καυσόξυλα αείφυλλων πλατύφυλλων. Προτείνονται: αποψιλωτικές υλοτομίες κατά πινάκια των 1-2 στρ. με παρακράτηση 10-15 ατόμων ανά στρέμμα, σε συνολική επιφάνεια 30 ha, στις ώριμες και πολυξυλώτερες θέσεις, με σκοπό την δημιουργία αναγεννητικών κέντρων. Τυχόν υπάρχοντα διάσπαρτα άτομα Μ. Πεύκης δεν θα γίνουν, αντίθετα θα ευνοηθούν με την απομάκρυνση των εγγύτερων ανταγωνιστών τους. Απαγόρευση βόσκησης.	ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΑΣΟΣ Ι.Μ. ΔΟΝΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΟΛΥΜΠΩ (2008-2017)
2	Α.πλ.	Φωτ. έως κλ. Κατά θέσεις συμπ.	1-40	Πρεμν. ανομ. Ακαν. Με κατά θέσεις ομήλ.	3.935,00	0,00	104,99	0,00	0,00	Πρίνος, φιλόκι, χρυσόξυλο, αριά, κουμαριά, γλυστροκουμαριά, γαύρος, κέδρα. Λίγα διάσπαρτα άτομα ελάτης. Άτομα, ενώσεις και αθροίσματα μαύρης πεύκης στο άνω μέρος της συστάδας. Πυρκαγιά το 1949, η οποία κατέκαυσε ολόκληρη την έκταση της συστάδας. Μέτρια έως κακή μορφή, εξαιτίας ανθρωπογενών επιδράσεων. Στο ανώτερο τμήμα εμφανίζεται μικρή βελτίωση. Μέτρια έως κακή η ποιότητα ατόμων. Μεγάλος κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω του ξηροθερμικού περιβάλλοντος και της ευφλεκτικότητας της βλάστησης αλλά και της κίνησης στον δρόμο Λιτόχωρο-Πριόνια. Η συστάδα υλοτομήθηκε το 1990-1992 για τεχνική ξυλεία και καυσόξυλα. Προτείνονται: αποψιλωτικές υλοτομίες στην έκταση των αείφυλλων πλατύφυλλων 1-2 στρ. με παρακράτηση 15 ατόμων ανά στρέμμα σε συνολική επιφάνεια 22 Ha, στις ώριμες και πολυξυλώτερες	ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΑΣΟΣ Ι.Μ. ΔΟΝΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΟΛΥΜΠΩ (2008-2017)
	Μ.Π.				67,00	3,00	98,53	4,41	4,48		

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας / ha	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
										θέσεις, με σκοπό την δημιουργία αναγεννητικών κέντρων. Τυχόν υπάρχοντα διάσπαρτα άτομα μαύρης πεύκης και ελάτης δεν θα θιγούν, αντίθετα θα ευνοηθούν με την απομάκρυνση των εγγυτέρων ανταγωνιστών τους. Καλλιεργητική επέμβαση στην έκταση της Μ.Π. με ποσοστό απόληψης 5%. Γηραιά, κουφαλερά κ.λπ. αλλά υγιή άτομα θα εξαιρεθούν από τις υλοτομίες (1-2 άτομα/Ha) ώστε να υπάρχουν ενδισαιήματα και μετά το πέρας των υλοτομιών για ορισμένα είδη πανίδας. Έτος υλοτομίας: 2014 Απαγόρευση βόσκησης	
3α	Α.πλ.	Χαλ. Έως κλ. Κατά θέσεις συμπτ.	1-40	ανομ. ακαν.	1.002,00	0,00	37,84	0,00	0,00	Αείφυλλα πλατύφυλλα 26,48 Ha. Μαύρη πεύκη 19,69 Ha. Οξυά 1,12 Ha. Άτομα και ενώσεις ελάτης στο κέντρο της συστάδας. Τα αείφυλλα πλ. επικρατούν στον κατώτερο και μέσο τμήμα της συστάδας, με μέτρια έως κακή ποιότητα ξυλαποθέματος. Η Μ.Π. παρουσιάζεται σχεδόν αμιγής προς τα ανώτερα και σε κατ' άτομο και ομάδες μίξη με τα αείφυλλα και διάσπαρτα άτομα ελάτης προς το μεσαίο τμήμα με μέτρια (και κατά θέσεις καλή) ποιότητα ξυλαποθέματος. Η οξυά εμφανίζεται στο ανώτερο τμήμα-στο όριο με την 4γ-σχεδόν αμιγής και προς τα χαμηλότερα ως υπόροφος στην έκταση της Μ.Π.. Γενικά στι ΒΑ εκθέσεις η κατάσταση παρουσιάζεται καλύτερη ενώ στις προσονότιες εκθέσεις υπολείπεται. Τμήμα της συστάδας υλοτομήθηκε (ως μέρος του πρώην ενιαίου τμήματος 3) το 1969-1970. Το 1996 προβλεπόταν υλοτομία των αείφυλλων πλ., η οποία δεν πραγματοποιήθηκε. Προτείνονται: καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες σε όλη την έκταση της πεύκης και της οξυάς, με ποσοστό απόληψης αυξομειούμενο κατά χώρο ανάλογα με την δομή των ενώσεων των δασοπονικών ειδών(βαθμό και είδος συγκόμωσης, παραγωγικότητα εδάφους κ.λπ.) και λαμβάνοντας υπ' όψη το εδαφικό ανάγλυφο (χαλαρότερες επεμβάσεις στις θέσεις των ισχυρών κλίσεων), έτσι ώστε να αποληφθεί συνολικά από όλη την συστάδα η προτεινόμενη ποσότητα ξυλείας. Στην πεύκη το βάρος θα δοθεί στις αναγεννητικές υλοτομίες, ενώ στην οξυά στην καλλιέργεια των κορμιδιών. Κλάση 0,09-I: καλλιέργεια της πυκνοφυτείας, αραιώση θετικής επιλογής στα λεπτά και χονδρά κορμίδια, απόληψη 8% στην πεύκη και 15% στην οξυά. Κλάση II: εξευγενιστικές αραιώσεις θετικής επιλογής, με ποσοστό απόληψης 10% στην πεύκη και 8% στην οξυά. Κλάση III-IV: καλλιέργεια, αναγεννητικές υλοτομίες με ποσοστό απόληψης 12-14% στην πεύκη (διεύρυνση υπάρχοντων αναγεννητικών κέντρων) και 8% στην οξυά. Αποφιλωτικές υλοτομίες των 1-2 στρ. με παρακράτηση 10-15 ατόμων ανά στρέμμα, σε συνολική επιφάνεια 9 Ha στην έκταση αείφυλλων πλ., στις ώριμες και πολυξυλώτερες θέσεις, με σκοπό την δημιουργία αναγεννητικών κέντρων. Τυχόν υπάρχοντα διάσπαρτα άτομα μαύρης πεύκης και ελάτης δεν θα θιγούν, αντίθετα θα ευνοηθούν με την απομάκρυνση των εγγυτέρων ανταγωνιστών τους. Γηραιά, κουφαλερά κ.λπ. αλλά υγιή άτομα θα εξαιρεθούν από τις υλοτομίες (1-2 άτομα/Ha) ώστε να υπάρχουν ενδισαιήματα και μετά το πέρας των υλοτομιών για ορισμένα είδη πανίδας. Έτος υλοτομίας: 2008. Απαγόρευση βόσκησης	ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΑΣΟΣ Ι.Μ. ΔΟΝΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΟΛΥΜΠΩ (2008-2017)
	Μ.Π.		50-70	υποκτηπ. Ακαν	4.501,00	3737,00	228,59	189,79	83,03		
	Ο.		30-60		237,00	67,00	211,61	59,82	28,27		
3β	Α.πλ.		10-40	Υποκτηπ. ακαν. με επικρ. Ανώτερες κλασεις Μ.Π. & κατώτερες + μέσες Ο. Α.πλ. Ανομ. Ακαν.	426,00	0,00	37,14	0,00	0,00	Αείφυλλα κ.λπ. πλατύφυλλα (πρίνος φιλόκι, αριά, κουμαριά, γλυτροκουμαριά, γαύρος, οστρυά) με άτομα Μ.Π. 11,47 Ha. Μαύρη πεύκη 20,83 Ha. Οξυά 10,75 Ha. Άτομα και συδενδρίες ελάτης. Μαύρη πεύκη στο ανώτερο και μέσο τμήμα, σύμπυκνη και ακαλλιέργητη, μέτριας έως σχετικά καλής ποιότητας, με διάσπαρτα άτομα οξυάς στον οικότονο με την τελευταία και ελάτης κατά μήκος της ράχης. Η οξυά εμφανίζεται κυρίως στο μέσο της συστάδας κατά μήκος του ρέματος Κακιά Σκάλα έως τη θέση «Σταυρός» με ποιότητα ξυλαποθέματος που βαίνει μειούμενη όσο προχωρά προς την ράχη, με γηραιά και πολύκλαδα άτομα στα ψηλότερα που καταπιέζουν την εμφανιζόμενη αναγέννηση. Ελάτη σε κατ' άτομο μίξη με την πεύκη και οξυά, κυρίως στην ράχη γύρω από τον «Σταυρό». Τα αείφυλλα καταλαμβάνουν το κατώτερο τμήμα και χαρακτηρίζονται από μέτρια ποιότητα με αρκετά διάσπαρτα άτομα Μ.Π. από τον ελιγμό του ασφαλτόδρομου και προς τα ψηλότερα. Κίνδυνος πυρκαγιάς ιδίως για το κατώτερο τμήμα της συστάδας λόγω γειννίας με το πεδίο βολής αρμάτων Λιτοχώρου, σε συνδυασμό με την ευφλεκτικότητα της βλάστησης. Μέτριας έκτασης ζημιές από ανεμοθλασίες και χιονορριπίες στο ανώτερο τμήμα. Υλοτομήθηκε το 1969-1970. Το 1996 προβλεπόταν υλοτομία των αείφυλλων πλ., η οποία δεν πραγματοποιήθηκε. Προτείνονται: καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες σε όλη την έκταση της πεύκης και της οξυάς, με ποσοστό απόληψης αυξομειούμενο κατά χώρο ανάλογα με την δομή των ενώσεων των δασοπονικών ειδών(βαθμό και είδος συγκόμωσης, παραγωγικότητα εδάφους κ.λπ.) και λαμβάνοντας υπ' όψη το εδαφικό ανάγλυφο (χαλαρότερες επεμβάσεις στις θέσεις των ισχυρών κλίσεων), έτσι ώστε να αποληφθεί συνολικά από όλη την συστάδα η	ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΑΣΟΣ Ι.Μ. ΔΟΝΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΟΛΥΜΠΩ (2008-2017)
	Μ.Π.	Κλ. Έως συμπτ	1-120 επικρ. 60-100		5.844,00	4000,00	280,56	192,03	68,45		
	Ο.		1-120 επικρ. 60-100		2.550,00	385,00	237,87	35,91	15,10		

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας /ha	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
										προτεινόμενη ποσότητα ξυλείας. Στην πεύκη το βάρος θα δοθεί στις αναγεννητικές υλοτομίες, ενώ στην οξυά στην καλλιέργεια των κορμιδίων και λεπτών κορών με παράλληλη υποβοήθηση της εγκατεστημένης αναγέννησης. Κλάση 0,09-I: καλλιέργεια της πυκνοφυτείας, αραιώση θετικής επιλογής στα λεπτά και χονδρά κορμίδια, απόληψη 5% στην πεύκη και 11% στην οξυά. Κλάση II: εξευγενιστικές αραιώσεις θετικής επιλογής, με ποσοστό απόληψης 5% στην πεύκη και 11% στην οξυά. Κλάση III-IV: καλλιέργεια, αναγεννητικές υλοτομίες με ποσοστό απόληψης 12-15% στην πεύκη και 5% στην οξυά. Αποψιλωτικές υλοτομίες των 1-2 στρ. με παρακράτηση 10-15 ατόμων ανά στρέμμα, σε συνολική επιφάνεια 6 Ha στην έκταση αείφυλλων πλ., στις ώριμες και πολυξυλώτερες θέσεις, με σκοπό την δημιουργία αναγεννητικών κέντρων. Τυχόν υπάρχοντα διάσπαρτα άτομα μαύρης πεύκης και ελάτης δεν θα θιγούν, αντίθετα θα ευνοηθούν με την απομάκρυνση των εγγυτέρων ανταγωνιστών τους. Γηραιά, κουφαλερά κ.λπ. αλλά υγιή άτομα θα εξαιρεθούν από τις υλοτομίες (1-2 άτομα/Ha) ώστε να υπάρχουν ενδιαίτηματα και μετά το πέρας των υλοτομιών για ορισμένα είδη πανίδας. Έτος υλοτομίας : 2008. Απαγόρευση βόσκησης.	
4α	Μ.Π.	Χαλ. Έως κλ	1-130 επικρατ. 60-100	Υποκηπ. ακαν. με επικρ. Ανωτερες κλασεις Μ.Π. & κατώτερες + μέσες Ο.	5.174,00	3890,00	234,65	176,42	75,18	Η οξυά εμφανίζεται στο βόρειο τμήμα της συστάδας, πάνω από το ρέμα Μάνα, με αρκετά καλής ποιότητας ξυλαπόθεμα και κατά θέσεις μίξη κατ' άτομο με ελάτη και πεύκη, με επικρατούντες τους λεπτούς κορμούς και κατά δεύτερο λόγο τα λεπτά και χονδρά κορμίδια, ενώ όσο κατέρχεται προς το ρέμα εμφανίζονται και μέτριας ποιότητας χονδροί κορμοί. Η πεύκη παρουσιάζεται στην υπόλοιπη έκταση σχεδόν αμιγής, με διάσπαρτα άτομα ελάτης γύρω από την «Καμένη Ράχη» και την θέση «Γκορτσιά», με σχετικά καλή ποιότητα μέσων και χονδρών κορμών στις προσνότητες εκθέσεις και λεπτών κορμιδίων και κορμών στις βόρειες. Τμήμα της συστάδας υλοτομήθηκε το 1960. Ένα τμήμα υλοτομήθηκε το 1985 – 86 λόγω διάνοιξης δασοδρόμου Προτείνονται: καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες σε όλη την έκταση της συστάδας, με ποσοστό απόληψης αυξομειούμενο κατά χώρο ανάλογα με την δομή των ενώσεων των δασοπονικών ειδών(βαθμό και είδος συγκόμωσης, παραγωγικότητα εδάφους κ.λπ.) και λαμβάνοντας υπ' όψη το εδαφικό ανάγλυφο (χαλαρότερες επεμβάσεις στις θέσεις των ισχυρών κλίσεων), έτσι ώστε να αποληφθεί συνολικά από όλη την συστάδα η προτεινόμενη ποσότητα ξυλείας. Στην πεύκη το βάρος θα δοθεί στις αναγεννητικές υλοτομίες, ενώ στην οξυά στην καλλιέργεια των κορμιδίων και λεπτών κορμών με παράλληλη υποβοήθηση της εγκατεστημένης αναγέννησης. Κλάση 0,09-I: καλλιέργεια της πυκνοφυτείας, αραιώση θετικής επιλογής στα λεπτά και χονδρά κορμίδια, απόληψη 8% στην πεύκη και 10% στην οξυά. Κλάση II: εξευγενιστικές αραιώσεις θετικής επιλογής, με ποσοστό απόληψης 10% στην πεύκη και 12% στην οξυά. Κλάση III-IV: καλλιέργεια, αναγεννητικές υλοτομίες με ποσοστό απόληψης 12-14% στην πεύκη (διάνοιξη νέων και διεύρυνση υπαρχόντων αναγεννητικών κέντρων) και 5% στην οξυά (διεύρυνση και καλλιέργεια υπαρχόντων αναγεννητικών κέντρων). Γηραιά, κουφαλερά κλπ αλλά υγιή άτομα θα εξαιρεθούν από τις υλοτομίες (1-2 άτομα/Ha) ώστε να υπάρχουν ενδιαίτηματα και μετά το πέρας των υλοτομιών για ορισμένα είδη πανίδας. Έτος υλοτομίας: 2016. Απαγόρευση βόσκησης.	ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΑΣΟΣ Ι.Μ. ΔΟΝΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΟΛΥΜΠΩ (2008-2017)
	Ο.				6.186,00	2054,00	193,49	64,25	33,20	καρμών στις βόρειες. Τμήμα της συστάδας υλοτομήθηκε το 1960. Ένα τμήμα υλοτομήθηκε το 1985 – 86 λόγω διάνοιξης δασοδρόμου Προτείνονται: καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες σε όλη την έκταση της συστάδας, με ποσοστό απόληψης αυξομειούμενο κατά χώρο ανάλογα με την δομή των ενώσεων των δασοπονικών ειδών(βαθμό και είδος συγκόμωσης, παραγωγικότητα εδάφους κ.λπ.) και λαμβάνοντας υπ' όψη το εδαφικό ανάγλυφο (χαλαρότερες επεμβάσεις στις θέσεις των ισχυρών κλίσεων), έτσι ώστε να αποληφθεί συνολικά από όλη την συστάδα η προτεινόμενη ποσότητα ξυλείας. Στην πεύκη το βάρος θα δοθεί στις αναγεννητικές υλοτομίες, ενώ στην οξυά στην καλλιέργεια των κορμιδίων και λεπτών κορμών με παράλληλη υποβοήθηση της εγκατεστημένης αναγέννησης. Κλάση 0,09-I: καλλιέργεια της πυκνοφυτείας, αραιώση θετικής επιλογής στα λεπτά και χονδρά κορμίδια, απόληψη 8% στην πεύκη και 10% στην οξυά. Κλάση II: εξευγενιστικές αραιώσεις θετικής επιλογής, με ποσοστό απόληψης 10% στην πεύκη και 12% στην οξυά. Κλάση III-IV: καλλιέργεια, αναγεννητικές υλοτομίες με ποσοστό απόληψης 12-14% στην πεύκη (διάνοιξη νέων και διεύρυνση υπαρχόντων αναγεννητικών κέντρων) και 5% στην οξυά (διεύρυνση και καλλιέργεια υπαρχόντων αναγεννητικών κέντρων). Γηραιά, κουφαλερά κλπ αλλά υγιή άτομα θα εξαιρεθούν από τις υλοτομίες (1-2 άτομα/Ha) ώστε να υπάρχουν ενδιαίτηματα και μετά το πέρας των υλοτομιών για ορισμένα είδη πανίδας. Έτος υλοτομίας: 2016. Απαγόρευση βόσκησης.	
4β	Μ.Π.	Χαλ. Έως κλ.	1-130 επικρατ, 60-100	Υποκηπ. Ακαν. Με μέτρια υστέρηση των κατωτερ. Κλασεων στην Μ.Π. & ισχυρη επικράτηση αυτών στην Ο.	3.509,00	2208,00	261,67	164,65	62,92	Μαύρη πεύκη 13,41 Ha, Οξυά 13,82 Ha. Άτομα σε συνεδρίες ελάτης. Συστάδα καλής γενικά κατάστασης, με την πεύκη να υπερέχει ελαφρώς σε ποιότητα. Κατά θέσεις διάσπαρτα άτομα ελάτης τόσο στον ανώροφο, όσο και – ως νεοφυτεία- στον υπόροφο. Έμεινε ακαλλιέργητη λόγω έλλειψης πρόσβασης. Κίνδυνος πυρκαγιάς στο ΒΑ τμήμα λόγω πεδίου βολής . Η συστάδα υλοτομήθηκε στο 1969 και το 1984 για τεχνική ξυλεία και καυσόξυλα πεύκης και οξυάς. Προτείνονται: καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες σε όλη την έκταση της συστάδας, με ποσοστό απόληψης αυξομειούμενο κατά χώρο ανάλογα με την δομή των ενώσεων των δασοπονικών ειδών(βαθμό και είδος συγκόμωσης, παραγωγικότητα εδάφους κ.λπ.) και λαμβάνοντας υπ' όψη το εδαφικό ανάγλυφο (χαλαρότερες επεμβάσεις στις θέσεις των ισχυρών κλίσεων), έτσι ώστε να αποληφθεί συνολικά από όλη την συστάδα η προτεινόμενη ποσότητα ξυλείας. Στην πεύκη το βάρος θα δοθεί στην καλλιέργεια των μέσων κορμών και στις αναγεννητικές υλοτομίες, ενώ στην οξυά στην καλλιέργεια των κορμιδίων με μέτριες επεμβάσεις στους λεπτούς κορμούς υποβοήθηση της λίγης εγκατεστημένης αναγέννησης. Κλάση 0,09-I: καλλιέργεια της πυκνοφυτείας, εξευγενιστική αραιώση θετικής επιλογής στα λεπτά και χονδρά κορμίδια, απόληψη 5% στην πεύκη και 15% στην οξυά. Κλάση II: εξευγενιστικές αραιώσεις θετικής επιλογής, με ποσοστό απόληψης 10% στην πεύκη και 8% στην οξυά. Κλάση III-IV: καλλιέργεια, αναγεννητικές υλοτομίες με ποσοστό απόληψης 12-15% στην	ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΑΣΟΣ Ι.Μ. ΔΟΝΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΟΛΥΜΠΩ (2008-2017)
	Ο.				1.966,00	612,00	142,26	44,28	31,13		

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας /ha	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
										πεύκη(διάνοιξη νέων και διεύρυνση υπαρχόντων αναγεννητικών κέντρων) και 8% στην οξυά(αραιώσεις στους μέσους κορμούς και διεύρυνση των λίγων υπαρχόντων αναγεννητικών κέντρων). Γηραιά, κουφαλερά κλπ αλλά υγιή άτομα θα εξαιρεθούν από τις υλοτομίες (1-2 άτομα/Ha) ώστε να υπάρχουν ενδιαιτήματα και μετά το πέρας των υλοτομιών για ορισμένα είδη πανίδας. Έτος υλοτομίας: 2011. Απαγόρευση βόσκησης.	
4γ	Μ.Π.	Χαλ. έως κλ.	1-130 επικρατ. 60-100	Υποκτηπ. Ακαν. Με σχετική επικράτηση των μέσων κλάσεων στην Μ.Π. & ισχυρη κατωτ. κλασεων στην Ο.	11.277,00	5901,00	322,29	168,65	52,33	Μαύρη πεύκη 34,99 Ha, Οξυά 12,81 Ha. Άτομα σε συδενδρίες ελάτης. Πολύξυλη συστάδα μαύρης πεύκης και οξυάς, με την δεύτερη να εμφανίζεται στο ΒΔ τμήμα, με διάσπαρτα άτομα ελάτης στο μέσο και γύρω από την θέση «Καμένη Ράχη». Ξυλαπόθεμα καλής σχετικά έως πολύ καλής ποιότητας, ιδίως στις ΝΑ εκθέσεις πάνω από τον ασφαλτόδρομο. Λόγω της επι μακρόν απουσίας καλλιέργειας, χρήζει επέμβασης το συντομότερο. Η συστάδα υλοτομήθηκε το 1969 και το 1984 για τεχνική ξυλεία και καυσόξυλα πεύκης και οξυάς. Προτείνονται: καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες σε όλη την έκταση της συστάδας, με ποσοστό απόληψης αυξομειούμενο κατά χώρο ανάλογα με την δομή των ενώσεων των δασοπονικών ειδών(βαθμό και είδος συγκόμωσης, παραγωγικότητα εδάφους κ.λπ.) και λαμβάνοντας υπ' όψη το εδαφικό ανάγλυφο (χαλαρότερες επεμβάσεις στις θέσεις των ισχυρών κλίσεων), έτσι ώστε να αποληφθεί συνολικά από όλη την συστάδα η προτεινόμενη ποσότητα ξυλείας. Στην πεύκη το βάρος θα δοθεί στην καλλιέργεια των μέσων κορμών, ενώ στην οξυά στην καλλιέργεια των κορμιδίων. Κλάση 0,09-I: καλλιέργεια της πυκνοφυτείας, εξευγενιστική αραιώση θετικής επιλογής στα λεπτά και χονδρά κορμίδια, απόληψη 8% στην πεύκη και 15% στην οξυά. Κλάση II: εξευγενιστικές αραιώσεις θετικής επιλογής, με ποσοστό απόληψης 14% στην πεύκη και 5% στην οξυά. Κλάση III-IV: αναγεννητικές υλοτομίες με ποσοστό απόληψης 8% στην πεύκη και 5% στην οξυά (αραιώσεις στους μέσους κορμούς και διεύρυνση των υπαρχόντων αναγεννητικών κέντρων). Γηραιά, κουφαλερά κλπ αλλά υγιή άτομα θα εξαιρεθούν από τις υλοτομίες (1-2 άτομα/Ha) ώστε να υπάρχουν ενδιαιτήματα και μετά το πέρας των υλοτομιών για ορισμένα είδη πανίδας. Έτος υλοτομίας: 2008.	ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΑΣΟΣ Ι.Μ. ΔΟΝΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΟΛΥΜΠΩ (2008-2017)
	Ο.				3.163,00	815,00	246,92	63,62	25,77	Μαύρη πεύκη 33,41 Ha, Οξυά 6,62 Ha. Άτομα ελάτης Προς το ρέμα Μάνα κατά θέσεις υπόροφος από πυξάρι στην οξυά. Συστάδα γενικά καλής κατάστασης και ποιότητας ξυλαποθέματος, με μέση κατανομή ξυλώδους όγκου κατά κλάσεις διαμέτρων πλησιάζουσα την κανονική. Η οξυά απαντάται σε σχεδόν αμιγείς ενώσεις σε ζώνες εκατέρωθεν των δύο ρεμάτων με σχετικά καλής ποιότητας ξυλαπόθεμα. Η πεύκη στο όριο με την 7β και λίγο χαμηλότερα μίγνυται κατά θέσεις με άτομα ελάτης. Η συστάδα υλοτομήθηκε το 1960 για τεχνική ξυλεία πεύκης και οξυάς και καυσόξυλα οξυάς. Το 1989 υλοτομήθηκε λόγω διάνοιξης δρόμου. Το 1990-1991 υλοτομήθηκε για τεχνική ξυλεία και καυσόξυλα πεύκης και οξυάς. Προτείνονται: καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες σε όλη την έκταση της συστάδας, με ποσοστό απόληψης αυξομειούμενο κατά χώρο ανάλογα με την δομή των ενώσεων των δασοπονικών ειδών(βαθμό και είδος συγκόμωσης, παραγωγικότητα εδάφους κ.λπ.) και λαμβάνοντας υπ' όψη το εδαφικό ανάγλυφο (χαλαρότερες επεμβάσεις στις θέσεις των ισχυρών κλίσεων), έτσι ώστε να αποληφθεί συνολικά από όλη την συστάδα η προτεινόμενη ποσότητα ξυλείας. Στην πεύκη το βάρος θα δοθεί στις αναγεννητικές υλοτομίες, ενώ στην οξυά στην καλλιέργεια των κορμιδίων. Κλάση 0,09-I: καλλιέργεια της πυκνοφυτείας, αραιώση θετικής επιλογής στα λεπτά και χονδρά κορμίδια, απόληψη 12% στην πεύκη και 8% στην οξυά. Κλάση II: εξευγενιστικές αραιώσεις θετικής επιλογής, με ποσοστό απόληψης 12% στην πεύκη και 12% στην οξυά. Κλάση III-IV: αναγεννητικές υλοτομίες (προπαρασκευαστικές – σπερμοδότιδες – φωτοδότιδες, με διάνοιξη νέων διεύρυνση των υπαρχόντων αναγεννητικών κέντρων) με ποσοστό απόληψης 8% στην πεύκη και 10% στην οξυά. Γηραιά, κουφαλερά κλπ αλλά υγιή άτομα θα εξαιρεθούν από τις υλοτομίες (1-2 άτομα/Ha) ώστε να υπάρχουν ενδιαιτήματα και μετά το πέρας των υλοτομιών για ορισμένα είδη πανίδας. Σε απόσταση 100 m ανάντη και πλευρικά από την πηγή Μάνα οι επεμβάσεις χαλαρότερες και με μεγάλη προσοχή. Έτος υλοτομίας: 2016. Απαγόρευση βόσκησης	ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΑΣΟΣ Ι.Μ. ΔΟΝΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΟΛΥΜΠΩ (2008-2017)
5β	Μ.Π.	Χαλ. Έως κλ	1-130	Υποκτηπ. ακαν, με επικρατ. ανώτ. Κλάσεις	8.636,00	5993,00	323,20	224,29	69,40	Μαύρη πεύκη 26,72 Ha, Οξυά 4,51 Ha. Άτομα ελάτης, υπόροφος από κέδρα, αρκουδοπούρναρο, πυξάρι, ίταμο. Η οξυά απαντάται στις υγρότερες θέσεις προς το ρέμα Μάνα και στο ρέμα-όριο με την 5α, με μέτριας ποιότητας ξυλαπόθεμα και επικρατούντες τους μέσους και χονδρούς κορμούς, ιδίως στα χαμηλότερα. Η πεύκη εμφανίζεται πολύξυλη, με σχετικά καλής έως πολύς καλής ποιότητας ξυλαπόθεμα,	ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΑΣΟΣ Ι.Μ. ΔΟΝΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΟΛΥΜΠΩ (2008-2017)
	Ο.				696,00	451,00	154,32	100,00	64,80		

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας /ha	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
										αραιωμένη στις εύκολα προσβάσιμες θέσεις από παλαιότερες υλοτομίες. Στο ανώτερο τμήμα της συστάδας διάσπαρτα άτομα ελάτης. Παρατηρήθηκαν λίγες παράνομες υλοτομίες κατά μήκος του μονοπατιού και περιορισμένες ζημιές από ανεμοθλασίες και χιονορριπίες. Υλοτομήθηκε το 1989 λόγω διάνοιξης δασολωρίδας, το 1990-1991 λόγω διάνοιξης δασόδρομου. Προτείνονται: καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες σε όλη την έκταση της συστάδας και σε όλες τις κλάσεις διαμέτρων, με ποσοστό απόληψης αυξομειούμενο κατά χώρο ανάλογα με την δομή των ενώσεων των δασοπονικών ειδών(βαθμό και είδος συγκόμωσης, παραγωγικότητα εδάφους κ.λπ.) και λαμβάνοντας υπ' όψη το εδαφικό ανάγλυφο (χαλαρότερες επεμβάσεις στις θέσεις των ισχυρών κλίσεων), έτσι ώστε να αποληφθεί συνολικά από όλη την συστάδα η προτεινόμενη ποσότητα ξυλείας. Μεγαλύτερο βάρος θα δοθεί στις αναγεννητικές υλοτομίες, τόσο στην πεύκη όσο και στην οξυά, με την διενέργεια προπαρασκευαστικών και σπερμοδότιδων υλοτομιών. Κλάση I: εξευγενιστική αραιώση θετικής επιλογής στα λεπτά και χονδρά κορμίδια, απόληψη 5%. Κλάση II: εξευγενιστικές αραιώσεις θετικής επιλογής, με ποσοστό απόληψης 5%. Κλάση III-IV: αναγεννητικές υλοτομίες με ποσοστό απόληψης 10-12%. Γηραιά, κουφαλερά κλπ αλλά υγιή άτομα θα εξαιρεθούν από τις υλοτομίες (1-2 άτομα/Ha) ώστε να υπάρχουν ενδιαιήματα και μετά το πέρας των υλοτομιών για ορισμένα είδη πανίδας. Έτος υλοτομίας: 2017.Απαγόρευση βόσκησης	
5γ	Μ.Π.	Κλ.	1-130	Υποκηπ. Ακαν. Σχεδόν κανονική κατανομή κλάσεων στην Μ.Π & επικράτηση των μέσων κλάσεων στην Ο.	6.930,00	3880,00	226,40	126,76	55,99	Μαύρη πεύκη 30,61 Ha, Οξυά 7,98 Ha. Άτομα ελάτης. Πρίνος στις προσνότητες εκθέσεις. Η οξυά εμφανίζεται στο μέσο τμήμα της συστάδας, γύρω από το ρέμα που την διχοτομεί, και προς τα χαμηλότερα, με μέτριας ποιότητας ξυλαπόθεμα λεπτών και μέσω κορμών. Οι ενώσεις της πεύκης συγκροτούνται από καλής ποιότητας ξυλαπόθεμα, σχεδόν αμιγείς στο ανώτερο (με λίγα διάσπαρτα άτομα ελάτης στο όριο με 6α) και σε κατ' άτομο και ομάδες μίξη με οξυά που γίνεται εντονότερη όσο κατέρχεται προς το ρέμα Μάνα. Στις εύκολα προσβάσιμες θέσεις, όπου πραγματοποιήθηκαν οι παλαιότερες υλοτομίες, έχει εγκατασταθεί αναγέννηση που χρήζει καλλιέργειας. Υλοτομήθηκε το 1989 λόγω διάνοιξης δασολωρίδας. Το 1990-1991 και το 2004 υλοτομήθηκε για τεχνική ξυλεία. Προτείνονται: καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες σε όλη την έκταση της συστάδας και σε όλες τις κλάσεις διαμέτρων, με ποσοστό απόληψης αυξομειούμενο κατά χώρο ανάλογα με την δομή των ενώσεων των δασοπονικών ειδών(βαθμό και είδος συγκόμωσης, παραγωγικότητα εδάφους κ.λπ.) και λαμβάνοντας υπ' όψη το εδαφικό ανάγλυφο (χαλαρότερες επεμβάσεις στις θέσεις των ισχυρών κλίσεων), έτσι ώστε να αποληφθεί συνολικά από όλη την συστάδα η προτεινόμενη ποσότητα ξυλείας. Στην πεύκη το βάρος θα δοθεί στις αναγεννητικές υλοτομίες με διενέργεια σπερμοδότιδων, φωτοδότιδων υλοτομιών και καλλιέργεια αναγεννητικών κέντρων, ενώ στην οξυά στην καλλιέργεια των λεπτών κορμών. Κλάση I: εξευγενιστική αραιώση θετικής επιλογής στα λεπτά και χονδρά κορμίδια, απόληψη 5%. Κλάση II: εξευγενιστικές αραιώσεις θετικής επιλογής, με ποσοστό απόληψης 10% στην πεύκη και 15% στην οξυά. Κλάση III-IV: αναγεννητικές υλοτομίες με ποσοστό απόληψης 10% στην πεύκη και 8% στην οξυά. Στα σημεία που έχει εγκατασταθεί νεοφυτεία θα απομακρυνθεί η μητρική συστάδα. Γηραιά, κουφαλερά κλπ αλλά υγιή άτομα θα εξαιρεθούν από τις υλοτομίες (1-2 άτομα/Ha) ώστε να υπάρχουν ενδιαιήματα και μετά το πέρας των υλοτομιών για ορισμένα είδη πανίδας. Έτος υλοτομίας: 2017. Απαγόρευση βόσκησης	ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΑΣΟΣ Ι.Μ. ΔΟΝΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΟΛΥΜΠΩ (2008-2017)
	Ο.				2.292,00	1129,00	287,22	141,48	49,26		
5δ	Μ.Π.	Κλ.κατ' α θέσεις χαλ. έως συμπ.	37-107 και άνω	Υποκηπ. ακαν, με επικρατ. κατωτ. και μέσες κλάσεις	6.266,00	2223,00	208,94	74,12	35,48	Μαύρη πεύκη 29,99 Ha, Οξυά 11,09 Ha. Οξυά σχεδόν αμιγής στο μέσο και κατώτερο τμήμα στις συστάδας, κύρια στις Α και ΒΑ εκθέσεις, γύρω από το ρέμα που την διχοτομεί, με καλή γενικά ποιότητα ξυλαποθέματος. Η πεύκη στο ανώτερο εμφανίζεται αραιωμένη, διακοπτόμενη από μερικώς δασοσκεπείς, γυμνές και άγονες εκτάσεις με σχετικά καλή ποιότητα ξυλαποθέματος, η οποία βελτιώνεται αισθητά όσο κατερχόμεθα. Στο όριο με την 5γ πιθανά ίχνη παλαιάς έρπουσας πυρκαγιάς. Υλοτομήθηκε το 1989 λόγω διάνοιξης δασολωρίδας. Έκτοτε καμία υλοτομία δεν πραγματοποιήθηκε. Προτείνονται: καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες σε όλη την έκταση της συστάδας και σε όλες τις κλάσεις διαμέτρων, με ποσοστό απόληψης αυξομειούμενο κατά χώρο ανάλογα με την δομή των ενώσεων των δασοπονικών ειδών(βαθμό και είδος συγκόμωσης, παραγωγικότητα εδάφους κ.λπ.) και λαμβάνοντας υπ' όψη το εδαφικό ανάγλυφο (χαλαρότερες επεμβάσεις στις θέσεις των ισχυρών κλίσεων), έτσι ώστε να αποληφθεί συνολικά από όλη την συστάδα η προτεινόμενη ποσότητα ξυλείας. Μεγαλύτερο βάρος θα δοθεί στην καλλιέργεια των κορμιδίων και λεπτών κορμών, με παράλληλη διεύρυνση των υπάρχοντων αναγεννητικών κέντρων και καλλιέργεια	ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΑΣΟΣ Ι.Μ. ΔΟΝΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΟΛΥΜΠΩ (2008-2017)
	Ο.				1.411,00	697,00	127,23	62,85	49,40		

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm	Συνολικο ξυλαπόθεμα συστάδας / ha	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
										πυκνοφυτείας. Κλάση 0,09-I: εξευγενιστική αραιώση θετικής επιλογής στα λεπτά και χονδρά κορμίδια, απόληψη 15% στην πεύκη και 20% στην οξυά. Κλάση II: εξευγενιστικές αραιώσεις θετικής επιλογής, με ποσοστό απόληψης 15% στην πεύκη και 5% στην οξυά. Κλάση III-IV: αναγεννητικές υλοτομίες με ποσοστό απόληψης 5% στην πεύκη και 8% στην οξυά. Στα σημεία που έχει εγκατασταθεί νεοφυτεία θα απομακρυνθεί η μητρική συστάδα. Γηραιά, κουφαλερά κλπ αλλά υγιή άτομα θα εξαιρεθούν από τις υλοτομίες (1-2 άτομα/Ha) ώστε να υπάρχουν ενδiciaήματα και μετά το πέρας των υλοτομιών για ορισμένα είδη πανίδας. Έτος υλοτομίας: 2017. Απαγόρευση βόσκησης	
6α	Μ.Π.	Χαλ. Έως κλ	1-130	Υποκτηπ.ακαν. με επικρατ.ανωτ. κλάσεις	10.439,00	7425,00	285,77	203,26	71,13	Μαύρη πεύκη 36,53 Ha, Οξυά 20,09 Ha. Άτομα ελάτης, κέδρου, λευκόδερμης πεύκης και σε υγρές θέσεις προς το ρέμα πλατανοειδούς σφενδάμου, ίταμου και αρκουδοπούρναρου. Η οξυά απαντάται κυρίως στα χαμηλότερα της συστάδας, γύρω από το ρέμα Κώνωπες καθώς και σε προσβόρειες εκθέσεις, η πεύκη στις ξηρότερες θέσεις στο μέσο και ανώτερο τμήμα, ενώ στα σημεία επαφής τους μίγνυνται κατ' άτομο και ομάδες. Και τα δύο είδη συγκροτούν πολύξυλες ενώσεις, ενώ όμως ο όγκος του ξυλαποθέματος τους πλησιάζει αυτόν του κανονικού, υπολείπεται στην κατανομή στις κλάσεις διαμέτρων. Αυτό της πεύκης είναι ικανοποιητικής έως αρκετά καλής ποιότητας και εμφανίζεται συγκεντρωμένο στην ανωτέρα κλάση, ενώ της οξυάς συγκεντρώνεται στην κατώτερα κλάση διαμέτρων και είναι μέτριας ποιότητας. Παρατηρήθηκαν περιορισμένες ζημιές από ανεμοθλασίες και χιονορριψίες. Η συστάδα υλοτομήθηκε το 1992 -1993. Προτείνονται: καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες σε όλη την έκταση της συστάδας, με ποσοστό απόληψης αυξομειούμενο κατά χώρο ανάλογα με την δομή των ενώσεων των δασοπονικών ειδών(βαθμό και είδος συγκόμωσης, παραγωγικότητα εδάφους κ.λπ.) και λαμβάνοντας υπ' όψη το εδαφικό ανάγλυφο (χαλαρότερες επεμβάσεις στις θέσεις των ισχυρών κλίσεων), έτσι ώστε να αποληφθεί συνολικά από όλη την συστάδα η προτεινόμενη ποσότητα ξυλείας. Στην πεύκη το βάρος θα δοθεί στις αναγεννητικές υλοτομίες, ενώ στην οξυά στην καλλιέργεια των λεπτών και μέσων κορμών με παράλληλη υποβοήθηση των ελάχιστων υπαρχόντων αναγεννητικών κέντρων. Κλάση 0,09-I: καλλιέργεια της πυκνοφυτείας, αραιώση θετικής επιλογής στα λεπτά και χονδρά κορμίδια, απόληψη 5% στην πεύκη και 15% στην οξυά. Κλάση II: εξευγενιστικές αραιώσεις θετικής επιλογής, με ποσοστό απόληψης 10% στην πεύκη και 12% στην οξυά. Κλάση III-IV: αναγεννητικές υλοτομίες με ποσοστό απόληψης 12% στην πεύκη (διεύρυνση υπαρχόντων και διάνοιξη νέων αναγεννητικών κέντρων) και 5-8% στην οξυά (διεύρυνση λίγων υπαρχόντων αναγεννητικών κέντρων). Στα σημεία που έχει εγκατασταθεί νεοφυτεία θα απομακρυνθεί η μητρική συστάδα. Γηραιά, κουφαλερά κλπ αλλά υγιή άτομα θα εξαιρεθούν από τις υλοτομίες (1-2 άτομα/Ha) ώστε να υπάρχουν ενδiciaήματα και μετά το πέρας των υλοτομιών για ορισμένα είδη πανίδας. Έτος υλοτομίας: 2009. Απαγόρευση βόσκησης	ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΑΣΟΣ Ι.Μ. ΔΟΝΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΟΛΥΜΠΩ (2008-2017)
	Ο.			Υποκτηπ.ακαν. με επικρατ. καττ. κλάσεις	4.542,00	1702,00	226,08	84,72	37,47		
6β	Μ.Π.	Κλ.	1-130	Υποκτηπ.ακαν. σχεδόν κανονική κατανομή κλάσεων στην Μ.Π. & ισχυρή επικράτηση των ανωτ. κλάσεων στην Ο.	3.304,00	1982,00	174,81	104,87	59,99	Μαύρη πεύκη 18,90 Ha, Οξυά 20,17Ha. Άτομα λευκόδερμης πεύκης, ελάτης, υπόροφος από κέδρα, πυξάρι, ίταμο. Η οξυά καταλαμβάνει το κατώτερο τμήμα της συστάδας, συγκροτούσα πολύξυλες ενώσεις καλής ποιότητας ξυλαποθέματος, με επικρατούντες τους μέσους και χονδρούς κορμούς, ενώ η μαύρη πεύκη το ανώτερο με σχετικά καλής ποιότητας ξυλαπόθεμα κατανεμημένο σχεδόν κανονικά στις κλάσεις διαμέτρου. Στο μέσο και λίγο προς το ανώτερο τμήμα της συστάδας η οξυά και η μαύρη πεύκη μίγνυνται κατ' άτομο με ελάτη και λευκόδερμη πεύκη. Η συστάδα υλοτομήθηκε το 1992-1993 για τεχνική ξυλεία και καυσόξυλα πεύκης. Προτείνονται: καλλιεργητικές, εξευγενιστικές και αναγεννητικές υλοτομίες σε όλη την έκταση της συστάδας, με ποσοστό απόληψης αυξομειούμενο κατά χώρο ανάλογα με την δομή των ενώσεων των δασοπονικών ειδών(βαθμό και είδος συγκόμωσης, παραγωγικότητα εδάφους κ.λπ.) και λαμβάνοντας υπ' όψη το εδαφικό ανάγλυφο (χαλαρότερες επεμβάσεις στις θέσεις των ισχυρών κλίσεων), έτσι ώστε να αποληφθεί συνολικά από όλη την συστάδα η προτεινόμενη ποσότητα ξυλείας. Στην πεύκη θα διενεργηθεί επέμβαση σε όλες τις κλάσεις διαμέτρων, ενώ στην οξυά το βάρος θα δοθεί στις εξυγιαντικές και ιδιαίτερα τις προπαρασκευαστικές της αναγέννησης υλοτομίες στις συμπαγείς ενώσεις των μέσων και χονδρών κορμών με παράλληλη διεύρυνση των ελάχιστων υπαρχόντων αναγεννητικών κέντρων. Κλάση I: αραιώση θετικής επιλογής στα λεπτά και χονδρά κορμίδια, απόληψη 8% στην πεύκη. Κλάση II: εξευγενιστικές αραιώσεις θετικής επιλογής, με ποσοστό απόληψης 8% στην πεύκη και 5% στην οξυά. Κλάση III-IV: αναγεννητικές υλοτομίες με ποσοστό απόληψης 12-14% στην πεύκη και 14% στην οξυά. Στα σημεία που έχει εγκατασταθεί νεοφυτεία θα	ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΑΣΟΣ Ι.Μ. ΔΟΝΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΟΛΥΜΠΩ (2008-2017)
	Ο.				6.115,00	5739,00	303,17	284,53	93,85		

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας /ha	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
										απομακρυνθεί η μητρική συστάδα. Γηραιά, κουφαλερά κλπ αλλά υγιή άτομα θα εξαιρεθούν από τις υλοτομίες (1-2 άτομα/Ha) ώστε να υπάρχουν ενδιαιτήματα και μετά το πέρας των υλοτομιών για ορισμένα είδη πανίδας.	
7α	Λ.Π.	Χαλ. Έως κλ	1-130	Υποκηπ.ακαν. με επικρ. κατωτ. κλάσεις	2.432,00	1226,00	136,25	68,68	50,41	Μαύρη πεύκη 1,64 Ha, Οξυά 23,47 Ha. Λευκόδερμη πεύκη 17,85 Ha. Άτομα και συδενδρίες ελάτης. Οι ενώσεις της οξυάς, συγκροτούμενες κυρίως από λεπτούς και μέσους κορμούς, παρουσιάζουν ικανοποιητική ξυλοβριθεία και ποιότητα ξυλαποθέματος στα χαμηλότερα και γύρω από τα ρέματα, υπολειπόμενες όσο ανέρχονται προς την κορυφή Μπάρμπα, όπου και μίγνυνται με άτομα λευκόδεσμης πεύκης. Η μαύρη πεύκη παρουσιάζεται σε μικρή έκταση στο κέντρο της συστάδας, μίγνυόμενη με την οξυά και την λευκόδερμη πεύκη, με καλής σχετικά ποιότητας ξυλαπόθεμα. Στην υπόλοιπη έκταση η λευκόδερμη πεύκη εμφανίζεται με καλή ποιότητα ξυλαποθέματος. Παρατηρήθηκαν περιοσμένης έκτασης ζημιές από ανεμοθλασίες και χιονορριψίες. Προτείνονται: καλλιεργητικές, εξευγενιστικές και αναγεννητικές υλοτομίες σε όλη την έκταση της συστάδας, με ποσοστό απόληψης αυξομειούμενο κατά χώρο ανάλογα με την δομή των ενώσεων των δασοπονικών ειδών(βαθμό και είδος συγκόμωσης, παραγωγικότητα εδάφους κ.λπ.) και λαμβάνοντας υπ' όψη το εδαφικό ανάγλυφο (χαλαρότερες επεμβάσεις στις θέσεις των ισχυρών κλίσεων), έτσι ώστε να αποληφθεί συνολικά από όλη την συστάδα η προτεινόμενη ποσότητα ξυλείας. Το βάρος θα δοθεί στην καλλιέργεια των κατώτερων κλάσεων, με ελαφρές αραιώσεις στις μέσες και ανώτερες κλάσεις και διεύρυνση υπαρχόντων αναγεννητικών κέντρων. Κλάση 0,09-I: καλλιέργεια της πυκνοφυτείας, αραιώση θετικής επιλογής στα λεπτά και χονδρά κορμίδια, απόληψη 12% στην μαύρη και λευκόδερμη πεύκη και 10% στην οξυά. Κλάση II: εξευγενιστικές αραιώσεις θετικής επιλογής, με ποσοστό απόληψης 8% στην λευκόδερμη πεύκη, 5% στην μαύρη και 5% στην οξυά. Κλάση III-IV: αναγεννητικές και εξυγιαντικές υλοτομίες με ποσοστό απόληψης 8% στην λευκόδερμη πεύκη, 5% στην μαύρη πεύκη και 5% στην οξυά. Απαραίτητη κρατική επιδότηση για την πραγματοποίηση καλλιέργειας στις κατώτερες κλάσεις διαμέτρων. Γηραιά, κουφαλερά κλπ αλλά υγιή άτομα θα εξαιρεθούν από τις υλοτομίες (1-2 άτομα/Ha) ώστε να υπάρχουν ενδιαιτήματα και μετά το πέρας των υλοτομιών για ορισμένα είδη πανίδας. Έτος υλοτομίας: 2012. Απαγόρευση βόσκησης	ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΑΣΟΣ Ι.Μ. ΔΟΝΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΟΛΥΜΠΩ (2008-2017)
	Μ.Π.			Υποκηπ.ακαν. με επικρ. κατωτ. κλάσεις	119,00	40,00	72,56	24,39	33,61		
	Ο.			Υποκηπ.ακαν. με επικρ. κατωτ. κλάσεις και μέσες	6.694,00	1162,00	285,22	49,51	17,36		
7β	Λ.Π.	Χαλ. Έως κλ	1-130	Υποκηπ.ακαν. με επικρ. κατωτ. και μέσες κλάσεις	2.329,00	926,00	191,53	76,15	39,76	Μαύρη πεύκη 23,91 Ha, Οξυά 24,74 Ha. Λευκόδερμη πεύκη 12,16 Ha. Άτομα και συδενδρίες ελάτης. Μικτή συστάδα λευκόδεσμης, μαύρης και οξυάς χωρίς σαφή όρια διαχωρισμού της εξάπλωσης των κύριων δασοπονικών ειδών, ενώ κατά θέσεις εμφανίζονται και άτομα ελάτης. Και τα τρία είδη παρουσιάζονται με ικανοποιητικής ποιότητας ξυλαπόθεμα που διαφορίζεται κατά θέσεις, ανάλογα με τα υπάρχοντα μικροπεριβάλλοντα. Παρατηρήθηκαν περιορισμένης έκτασης ζημιές από ανεμοθλασίες και χιονορριψίες. Προτείνονται: καλλιεργητικές, εξευγενιστικές και αναγεννητικές υλοτομίες σε όλη την έκταση της συστάδας, με ποσοστό απόληψης αυξομειούμενο κατά χώρο ανάλογα με την δομή των ενώσεων των δασοπονικών ειδών(βαθμό και είδος συγκόμωσης, παραγωγικότητα εδάφους κ.λπ.) και λαμβάνοντας υπ' όψη το εδαφικό ανάγλυφο (χαλαρότερες επεμβάσεις στις θέσεις των ισχυρών κλίσεων), έτσι ώστε να αποληφθεί συνολικά από όλη την συστάδα η προτεινόμενη ποσότητα ξυλείας. Στην λευκόδερμη πεύκη το βάρος θα δοθεί στην καλλιέργεια των κορμιδίων και λεπτών κορμών, ενώ στην μαύρη πεύκη και την οξυά στις εξυγιαντικές και ιδιαίτερα τις προπαρασκευαστικές της αναγέννησης υλοτομίες στις συμπαγείς ενώσεις των μέσων και χονδρών κορμών με παράλληλη διεύρυνση των υπαρχόντων αναγεννητικών κέντρων. Κλάση 0,09-I: καλλιέργεια της πυκνοφυτείας, αραιώση θετικής επιλογής στα λεπτά και χονδρά κορμίδια, απόληψη 15% στην λευκόδερμη πεύκη, 5% στην μαύρη πεύκη και 8% στην οξυά. Κλάση II: εξευγενιστικές αραιώσεις θετικής επιλογής, με ποσοστό απόληψης 10% στην λευκόδερμη πεύκη, 8% στην μαύρη και 12% στην οξυά. Κλάση III-IV: αναγεννητικές και εξυγιαντικές υλοτομίες με ποσοστό απόληψης 5% στην λευκόδερμη πεύκη, 12% στην μαύρη πεύκη και 10-12% στην οξυα. Απαραίτητη κρατική επιδότηση για την πραγματοποίηση καλλιέργειας στις κατώτερες κλάσεις διαμέτρων. Γηραιά, κουφαλερά κλπ αλλά υγιή άτομα θα εξαιρεθούν από τις υλοτομίες (1-2 άτομα/Ha) ώστε να υπάρχουν ενδιαιτήματα και μετά το πέρας των υλοτομιών για ορισμένα είδη πανίδας. Έτος υλοτομίας: 2010. Απαγόρευση βόσκησης	ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΑΣΟΣ Ι.Μ. ΔΟΝΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΟΛΥΜΠΩ (2008-2017)
	Μ.Π.			Υποκηπ.ακαν. με επικρ. ανωτ. κλάσεις	5.959,00	4468,00	249,23	186,87	74,98		
	Ο.			Υποκηπ.ακαν. με επικρ. μέσες κλάσεις	6.873,00	3577,00	277,81	144,58	52,04		
8α	Λ.Π.	Κλ. Κατά	1-120	Υποκηπ. ακαν. με	757,00	382,00	136,15	68,71	50,46	Μαύρη πεύκη 31,13 Ha, λευκόδερμη πεύκη 5,56 Ha. Άτομα οξυάς και ελάτης. Η λευκόδερμη πεύκη εμφανίζεται στο ανώτερο τμήμα (στα όρια με 7α), ενώ η μαύρη πεύκη από το μέσο της συστάδας μέχρι τον ασφαλτόδρομο Λιτόχωρο – Πριόνια, διακοπτόμενη	ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΑΣΟΣ Ι.Μ.
	Μ.Π.				10.090,00	4544,00	324,12	145,97	45,03		

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας /ha	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
		Θέσεις χαλ.		επικρ. κατωτ. κλάσεις						από άγονες εκτάσεις, συγκροτούμενη κατά κύριο λόγο από κορμίδια έως μέσους κορμούς με σποραδική εμφάνιση γηραιών πολύκλαδων ατόμων μεγαλύτερης διαμέτρου. Προτείνονται: καλλιεργητικές, εξευγενιστικές και αναγεννητικές υλοτομίες σε όλη την έκταση της πεύκης και της οξυάς, με ποσοστό απόληψης αυξομειούμενο κατά χώρο ανάλογα με την δομή των ενώσεων των δασοπονικών ειδών(βαθμό και είδος συγκόμωσης, παραγωγικότητα εδάφους κ.λπ.) και λαμβάνοντας υπ' όψη το εδαφικό ανάγλυφο (χαλαρότερες επεμβάσεις στις θέσεις των ισχυρών κλίσεων), έτσι ώστε να αποληφθεί συνολικά από όλη την συστάδα η προτεινόμενη ποσότητα ξυλείας. Στην λευκόδερμη πεύκη το βάρος θα δοθεί στην καλλιέργεια των κορμιδίων, ενώ στην μαύρη πεύκη στις εξυγιαντικές υλοτομίες και την καλλιέργεια των κορμιδίων και λεπτών κορμών με παράλληλη διεύρυνση των υπαρχόντων αναγεννητικών κέντρων. Κλάση I: αραιώση θετικής επιλογής στα λεπτά και χονδρά κορμίδια, απόληψη 15% στην λευκόδερμη πεύκη και 14% στην μαύρη πεύκη. Κλάση II: εξευγενιστικές αραιώσεις θετικής επιλογής, με ποσοστό απόληψης 8% στην λευκόδερμη πεύκη, 10% στην μαύρη. Κλάση III-IV: αναγεννητικές και εξυγιαντικές υλοτομίες με ποσοστό απόληψης 8% στην λευκόδερμη πεύκη και 8-10% στην μαύρη πεύκη. Απαραίτητη κρατική επιδότηση για την πραγματοποίηση καλλιέργειας στις κατώτερες κλάσεις διαμέτρων. Γηραιά, κουφαλερά κλπ αλλά υγιή άτομα θα εξαιρεθούν από τις υλοτομίες (1-2 άτομα/Ha) ώστε να υπάρχουν ενδιαιτήματα και μετά το πέρας των υλοτομιών για ορισμένα είδη πανίδας. Έτος υλοτομίας 2011. Απαγόρευση βόσκησης	ΔΟΝΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΟΛΥΜΠΩ (2008-2017)
8β	Λ.Π.	Κλ. Κατά θέσεις χαλ.	1-120	Υποκηπ. Ακαν. Με επικρ. Κατω κλασεις	1.272,00	642,00	136,19	68,74	50,47	Μαύρη πεύκη 43,15 Ha, λευκόδερμη πεύκη 9,34 Ha, οξυά 1,56 Ha. Άτομα ελάτης, κέδρα κ.α. Η οξυά εμφανίζεται αμιγής στο κατώτερο τμήμα, στο όριο με 5α και 4α , με καλή ποιότητα ξυλαποθέματος και διάσπαρτη σε κατ' άτομο μίξη με την μαύρη πεύκη στα ρέματα και στο όριο με 7β. Η λευκόδερμη πεύκη παρουσιάζεται κυρίως εκατέρωθεν του ρέματος διαυλακώνει την συστάδα με ΝΑ κατεύθυνση, σε κατ' άτομο μίξη με ελάτη στα ανώτερα. Στην υπόλοιπη έκταση εξαπλώνεται η μαύρη πεύκη με καλής ποιότητας ξυλαπόθεμα λεπτών και μέσων κορμών. Παρατηρήθηκαν περιορισμένης έκτασης ζημιές από ανεμοθλασίες και χιονορριψίες. Υλοτομήθηκε το 1960, το 1987 και το 2003 για τεχνική ξυλεία και καυσόξυλα πεύκης και οξυάς. Προτείνονται: καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες σε όλη την έκταση της συστάδας, με ποσοστό απόληψης αυξομειούμενο κατά χώρο ανάλογα με την δομή των ενώσεων των δασοπονικών ειδών(βαθμό και είδος συγκόμωσης, παραγωγικότητα εδάφους κ.λπ.) και λαμβάνοντας υπ' όψη το εδαφικό ανάγλυφο (χαλαρότερες επεμβάσεις στις θέσεις των ισχυρών κλίσεων), έτσι ώστε να αποληφθεί συνολικά από όλη την συστάδα η προτεινόμενη ποσότητα ξυλείας. Στην λευκόδερμη πεύκη το βάρος θα δοθεί στην καλλιέργεια των κορμιδίων, ενώ στην μαύρη πεύκη και την οξυά στην καλλιέργεια των λεπτών κορμών με παράλληλη διεύρυνση των υπαρχόντων αναγεννητικών κέντρων. Κλάση I: αραιώση θετικής επιλογής στα λεπτά και χονδρά κορμίδια, απόληψη 15% στην λευκόδερμη πεύκη και 8% στην μαύρη πεύκη. Κλάση II: εξευγενιστικές αραιώσεις θετικής επιλογής, με ποσοστό απόληψης 8% στην λευκόδερμη πεύκη, 14% στην μαύρη και 10% στην οξυά. Κλάση III-IV: αναγεννητικές υλοτομίες με ποσοστό απόληψης 5-8% στην λευκόδερμη πεύκη, 8% στην μαύρη πεύκη και 8% στην οξυά. Απαραίτητη κρατική επιδότηση για την πραγματοποίηση καλλιέργειας στις κατώτερες κλάσεις διαμέτρων. Γηραιά, κουφαλερά κλπ αλλά υγιή άτομα θα εξαιρεθούν από τις υλοτομίες (1-2 άτομα/Ha) ώστε να υπάρχουν ενδιαιτήματα και μετά το πέρας των υλοτομιών για ορισμένα είδη πανίδας. Έτος υλοτομίας:2016. Απαγόρευση βόσκησης	ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΑΣΟΣ Ι.Μ. ΔΟΝΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΟΛΥΜΠΩ (2008-2017)
	Μ.Π.			Υποκηπ. Ακαν. Με επικρ. μέσες κλασεις	10.783,00	5477,00	249,90	126,93	50,79		
	Ο.			Υποκηπ. Ακαν. Με επικρ. μέσες κλασεις	284,00	178,00	182,05	114,10	62,68		
9α	Μ.Π.	Χαλ. Εως κλ.	1-110	Υποκηπ. Ακαν. Με μέτρια επικτάτηση κατωτ. κλάσεων	6.792,00	3605,00	234,77	124,61	53,08	Μαύρη πεύκη. Κατά θέσεις άτομα οξυάς, δρυός, καρυδιάς και φουντουκιάς. Αμιγής συστάδα μαύρης πεύκης με λίγα διάσπαρτα άτομα οξυάς, με μέτριας και καλής σχετικά ποιότητας ξυλαπόθεμα και αντιπροσώπευση όλων των κλάσεων διαμέτρων. Οι υλοτομίες του παρελθόντος περιορίστηκαν στις εύκολα προσβάσιμες θέσεις, όπου διεξήχθησαν με μεγαλύτερη ένταση, ενώ οι δυσπρόσιτες περιοχές έμειναν ακαλλιέργητες. Στα χαμηλότερα, προς τον Ενιπέα, εγκαταλειμμένες γεωργικές εκτάσεις. Η συστάδα υλοτομήθηκε το 1985 και το 2000. Προτείνονται: καλλιεργητικές, εξευγενιστικές και αναγεννητικές υλοτομίες σε όλη την έκταση της συστάδας και σε όλες τις κλάσεις διαμέτρων, με ποσοστό απόληψης αυξομειούμενο κατά χώρο ανάλογα με την δομή των ενώσεων των δασοπονικών ειδών(βαθμό και είδος συγκόμωσης, παραγωγικότητα εδάφους κ.λπ.) και λαμβάνοντας υπ' όψη το εδαφικό ανάγλυφο (χαλαρότερες επεμβάσεις στις θέσεις των ισχυρών κλίσεων), έτσι ώστε να αποληφθεί συνολικά από όλη την συστάδα η προτεινόμενη ποσότητα ξυλείας. Κλάση 0,09-I: καλλιέργεια της	ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΑΣΟΣ Ι.Μ. ΔΟΝΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΟΛΥΜΠΩ (2008-2017)

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας / ha	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
										πυκνοφυτείας, εξευγενιστική αραίωση θετικής επιλογής στα λεπτά και χονδρά κορμίδια, απόληψη 12%. Κλάση II: εξευγενιστικές αραιώσεις θετικής επιλογής, με ποσοστό απόληψης 10%. Κλάση III-IV: αναγεννητικές υλοτομίες (προπαρασκευαστικές – σπερμοδότιδες – φωτοδότιδες, με διάνοιξη νέων διεύρυνση των υπαρχόντων αναγεννητικών κέντρων) με ποσοστό απόληψης 8%. Γηραιά, κουφαλερά κλπ αλλά υγιή άτομα θα εξαιρεθούν από τις υλοτομίες (1-2άτομα/Ha) ώστε να υπάρχουν ενδιαίτηματα και μετά το πέρας των υλοτομιών για ορισμένα είδη πανίδας. Έτος υλοτομίας::2013. Απαγόρευση βόσκησης	
9β	Μ.Π.	Χαλ. Έως κλ.	1-110	Υποκτηπ.ακαν. με υστέρηση κατωτ. κλάσεων	9.760,00	5465,00	219,08	122,67	55,99	Μαύρη πεύκη. Κατά θέσεις άτομα οξυάς (ιδίως στο όριο με 9γ), δρυός, καρυδιάς και φουντουκιάς. Αμιγής συστάδα μαύρης πεύκης με λίγα διάσπαρτα άτομα οξυάς, με καλής έως αρκετά καλής ποιότητας ξυλαπόθεμα και αντιπροσώπευση όλων των κλάσεων διαμέτρων με υπεροχή των λεπτών και μέσων κορμών. Από τις υλοτομίες του παρελθόντος αραιώθηκαν περισσότερο οι εύκολα προσβάσιμες θέσεις. Γύρω από την παλαιά Μονή του Αγ. Διονυσίου και προς τον Ενιπέα εγκαταλειμμένες γεωργικές εκτάσεις. Η συστάδα υλοτομήθηκε το 1969, το 1984 και το 2000 για τεχνική ξυλεία και καυσόξυλα. Προτείνονται: καλλιεργητικές, εξευγενιστικές και αναγεννητικές υλοτομίες σε όλη την έκταση συστάδας και σε όλες τις κλάσεις διαμέτρων, με ποσοστό απόληψης αυξομειούμενο κατά χώρο ανάλογα με την δομή των ενώσεων των δασοπονικών ειδών(βαθμό και είδος συγκόμωσης, παραγωγικότητα εδάφους κ.λπ.) και λαμβάνοντας υπ' όψη το εδαφικό ανάγλυφο (χαλαρότερες επεμβάσεις στις θέσεις των ισχυρών κλίσεων), έτσι ώστε να αποληφθεί συνολικά από όλη την συστάδα η προτεινόμενη ποσότητα ξυλείας. Κλάση 0,09-I: καλλιέργεια της πυκνοφυτείας, εξευγενιστική αραίωση θετικής επιλογής στα λεπτά και χονδρά κορμίδια, απόληψη 5%. Κλάση II: εξευγενιστικές αραιώσεις θετικής επιλογής, με ποσοστό απόληψης 12%. Κλάση III-IV: αναγεννητικές υλοτομίες (προπαρασκευαστικές – σπερμοδότιδες – φωτοδότιδες, με διάνοιξη νέων διεύρυνση των υπαρχόντων αναγεννητικών κέντρων) με ποσοστό απόληψης 10%. Γηραιά, κουφαλερά κλπ αλλά υγιή άτομα θα εξαιρεθούν από τις υλοτομίες (1-2 άτομα/Ha) ώστε να υπάρχουν ενδιαίτηματα και μετά το πέρας των υλοτομιών για ορισμένα είδη πανίδας. Έτος υλοτομίας: 2013. Απαγόρευση βόσκησης	ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΑΣΟΣ Ι.Μ. ΔΟΝΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΟΛΥΜΠΩ (2008-2017)
9γ	Μ.Π.	Χαλ. Έως κλ.	1-110	Υποκτηπ.ακαν. με επικρ. ανωτ.κλάσεις	7.942,00	5696,00	268,95	192,89	71,72	Μαύρη πεύκη 29,53 Ha, Οξυά 3,58 Ha. Άτομα καρυδιάς, φουντουκιάς. Ενώσεις οξυάς, ως λωρίδες, στις ΒΑ εκθέσεις κυρίως δίπλα στα ρέματα και διάσπαρτα άτομα στις υγρότερες θέσεις σε μίξη με την μαύρη πεύκη. Η τελευταία κυριαρχεί στην συστάδα, συγκροτώντας κατά το μάλλον ξυλοβριθείς ενώσεις μέτριας έως καλής ποιτικής σύνθεσης ξυλαποθέματος, με κυριαρχία των μέσων κορμών. Υλοτομήθηκε το 1969, το 1984 και το 2001 για τεχνική ξυλεία και καυσόξυλα. Προτείνονται: καλλιεργητικές, εξευγενιστικές και αναγεννητικές υλοτομίες σε όλη την έκταση της συστάδας και σε όλες τις κλάσεις διαμέτρων, με ποσοστό απόληψης αυξομειούμενο κατά χώρο ανάλογα με την δομή των ενώσεων των δασοπονικών ειδών(βαθμό και είδος συγκόμωσης, παραγωγικότητα εδάφους κ.λπ.) και λαμβάνοντας υπ' όψη το εδαφικό ανάγλυφο (χαλαρότερες επεμβάσεις στις θέσεις των ισχυρών κλίσεων), έτσι ώστε να αποληφθεί συνολικά από όλη την συστάδα η προτεινόμενη ποσότητα ξυλείας. Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στις αναγεννητικές υλοτομίες. Κλάση 0,09-I: καλλιέργεια της πυκνοφυτείας, εξευγενιστική αραίωση θετικής επιλογής στα λεπτά και χονδρά κορμίδια, απόληψη 5%. Κλάση II: εξευγενιστικές αραιώσεις θετικής επιλογής, με ποσοστό απόληψης 8% στην μαύρη πεύκη και 12% στην οξυά. Κλάση III-IV: αναγεννητικές υλοτομίες (προπαρασκευαστικές – σπερμοδότιδες – φωτοδότιδες, με διάνοιξη νέων διεύρυνση των υπαρχόντων αναγεννητικών κέντρων) με ποσοστό απόληψης 12% στην μαύρη πεύκη και 11% στην οξυά. Γηραιά, κουφαλερά κλπ αλλά υγιή άτομα θα εξαιρεθούν από τις υλοτομίες (1-2 άτομα/Ha) ώστε να υπάρχουν ενδιαίτηματα και μετά το πέρας των υλοτομιών για ορισμένα είδη πανίδας. Έτος υλοτομίας: 2014. Απαγόρευση βόσκησης	ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΑΣΟΣ Ι.Μ. ΔΟΝΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΟΛΥΜΠΩ (2008-2017)
	Ο.			Υποκτηπ.ακαν. με επικρ. μέσες και ανωτ. κλάσεις	652,00	407,00	182,12	113,69	62,42	Μαύρη πεύκη 25,33 Ha, λευκόδερμη πεύκη 8,37 Ha. Κατά θέσεις άτομα οξυάς, δρυός και ελάτης. Οι δασοσκεπείς εκτάσεις περιορίζονται από το μέσο της συστάδας και προς χαμηλότερα, αποτελούμενες από σύμπυκνες ενώσεις μαύρης πεύκης με κυριαρχούντες τους μέσους κορμούς, μέτριας έως καλής ποιότητας ξυλαποθέματος, διακοπτόμενες προς τα ανώτερα από μερικώς δασοσκεπείς και άγονες εκτάσεις. Η λευκόδερμη πεύκη περιορίζεται στην ράχη στο όριο με την 10β. Το κατώτερο τμήμα, συγκροτούμενο από αξιόλογες ενώσεις μαύρης πεύκης, χρήζει καλλιέργειας με ήπιες επεμβάσεις, με σκοπό την δημιουργία πυρασφαλιστικής δομής, λόγω της γειννίαςσης του με τον ασφαλτόδρομο	
10α	Λ.Π.	Χαλ. Έως κλ.	1-110	Υποκτηπ.ακαν. με επικρ. κατωτ. κλάσεις	1.140,00	574,00	136,20	68,58	50,35		ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΑΣΟΣ Ι.Μ. ΔΟΝΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΟΛΥΜΠΩ (2008-2017)
	Μ.Π.	Κατά θέσεις συμπ.		Υποκτηπ.ακαν. με επικρ. ανωτ. κλάσεις	7.431,00	5035,00	293,37	198,78	67,76		

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας / ha	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
										Λιτόχωρο – Πριόνια. Προτείνονται: καλλιεργητικές, εξευγενιστικές και αναγεννητικές υλοτομίες στο κατώτερο τμήμα της συστάδας, έκτασης 10,00 Ha μαύρης πεύκης, με ποσοστό απόληψης αυξομειούμενο κατά χώρο ανάλογα με την δομή των ενώσεων των δασοπονικών ειδών(βαθμό και είδος συγκόμωσης, παραγωγικότητα εδάφους κ.λπ.) και λαμβάνοντας υπ' όψη το εδαφικό ανάγλυφο (χαλαρότερες επεμβάσεις στις θέσεις των ισχυρών κλίσεων), έτσι ώστε να αποληφθεί συνολικά από όλη την υλοτομούμενη έκταση η προτεινόμενη ποσότητα ξυλείας, χωρίς να διασπασθεί η συνοχή της συστάδας. Κλάση I: εξευγενιστική αραιώση θετικής επιλογής στα λεπτά και χονδρά κορμίδια, απόληψη 8%. Κλάση II: εξευγενιστικές αραιώσεις θετικής επιλογής, με ποσοστό απόληψης 10%. Κλάση III-IV: αναγεννητικές υλοτομίες και εξυγιαντικές με ποσοστό απόληψης 12%. Γηραιά, κουφαλερά κλπ αλλά υγιή άτομα θα εξαιρεθούν από τις υλοτομίες (1-2 άτομα/Ha) ώστε να υπάρχουν ενδιαιτήματα και μετά το πέρας των υλοτομιών για ορισμένα είδη πανίδας. Έτος υλοτομίας: 2012. Απαγόρευση βόσκησης	
10β	Λ.Π.	Φωτ. Έως κλ	1-110	Υποκηπ.ακαν. με επικρ. κατωτ. κλάσεις	2.810,00	1417,00	136,21	68,69	50,43	Οξυά 40,39 Ha, λευκόδερμη πεύκη 20,63 Ha. Κατά θέσεις άτομα ελάτης. Η λευκόδερμη πεύκη παρουσιάζεται προς το ανώτερο τμήμα και την ράχη στο όριο με την 10 ^α σχεδόν αμιγής, με διάσπαρτα άτομα ελάτης και μέτριας ποιότητας ξυλαπόθεμα. Η οξυά καταλαμβάνει το κατώτερο τμήμα της συστάδας και ανέρχεται έως το μέσο γύρω από το ρέμα και στις υγρότερες θέσεις, με ισχυρά διαφοριζόμενη ποιότητα ξυλαποθέματος (από πολύ καλή στο όριο με 7α έως μέτρια όσο ανέρχεται). Στο μέσο της συστάδας διακόπτεται από μερικώς δασοσκεπείς, γυμνές και άγονες εκτάσεις. Προτείνονται: καλλιεργητικές, εξυγιαντικές και αναγεννητικές υλοτομίες (σύμφωνα με την §2, αρθρ.71, Ν.Δ. 86/1969 όπως τροποποιήθηκε με την §7, αρθρ.4, Ν. 3208/2003) στο ΒΑ τμήμα της συστάδας, έκτασης 10,00 Ha οξυάς, με ποσοστό απόληψης αυξομειούμενο κατά χώρο ανάλογα με την δομή των ενώσεων των δασοπονικών ειδών (βαθμό και είδος συγκόμωσης, παραγωγικότητα εδάφους κ.λπ.) και λαμβάνοντας υπ' όψη το εδαφικό ανάγλυφο (χαλαρότερες επεμβάσεις στις θέσεις των ισχυρών κλίσεων), έτσι ώστε να αποληφθεί συνολικά από όλη την υλοτομούμενη έκταση η προτεινόμενη ποσότητα ξυλείας, χωρίς να διασπασθεί η συνοχή της συστάδας. Κλάση 0,09-I: καλλιέργεια της πυκνοφυτείας, εξευγενιστική αραιώση θετικής επιλογής στα λεπτά και χονδρά κορμίδια, απόληψη 14%. Κλάση II: εξευγενιστικές αραιώσεις θετικής επιλογής, με ποσοστό απόληψης 12%. Κλάση III-IV: αναγεννητικές υλοτομίες και εξυγιαντικές με ποσοστό απόληψης 5%.Γηραιά, κουφαλερά κλπ αλλά υγιή άτομα θα εξαιρεθούν από τις υλοτομίες (1-2 άτομα/Ha) ώστε να υπάρχουν ενδιαιτήματα και μετά το πέρας των υλοτομιών για ορισμένα είδη πανίδας. Έτος υλοτομίας: 2012. Απαγόρευση βόσκησης	ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΑΣΟΣ Ι.Μ. ΔΟΝΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΟΛΥΜΠΩ (2008-2017)
	Ο.			Υποκηπ.ακαν. με επικρ. κατωτ. και μέσες κλάσεις	6.247,00	1788,00	154,67	44,27	28,62	Οξυά 40,39 Ha, λευκόδερμη πεύκη 20,63 Ha. Κατά θέσεις άτομα ελάτης. Η λευκόδερμη πεύκη παρουσιάζεται προς το ανώτερο τμήμα και την ράχη στο όριο με την 10 ^α σχεδόν αμιγής, με διάσπαρτα άτομα ελάτης και μέτριας ποιότητας ξυλαπόθεμα. Η οξυά καταλαμβάνει το κατώτερο τμήμα της συστάδας και ανέρχεται έως το μέσο γύρω από το ρέμα και στις υγρότερες θέσεις, με ισχυρά διαφοριζόμενη ποιότητα ξυλαποθέματος (από πολύ καλή στο όριο με 7α έως μέτρια όσο ανέρχεται). Στο μέσο της συστάδας διακόπτεται από μερικώς δασοσκεπείς, γυμνές και άγονες εκτάσεις. Προτείνονται: καλλιεργητικές, εξυγιαντικές και αναγεννητικές υλοτομίες (σύμφωνα με την §2, αρθρ.71, Ν.Δ. 86/1969 όπως τροποποιήθηκε με την §7, αρθρ.4, Ν. 3208/2003) στο ΒΑ τμήμα της συστάδας, έκτασης 10,00 Ha οξυάς, με ποσοστό απόληψης αυξομειούμενο κατά χώρο ανάλογα με την δομή των ενώσεων των δασοπονικών ειδών (βαθμό και είδος συγκόμωσης, παραγωγικότητα εδάφους κ.λπ.) και λαμβάνοντας υπ' όψη το εδαφικό ανάγλυφο (χαλαρότερες επεμβάσεις στις θέσεις των ισχυρών κλίσεων), έτσι ώστε να αποληφθεί συνολικά από όλη την υλοτομούμενη έκταση η προτεινόμενη ποσότητα ξυλείας, χωρίς να διασπασθεί η συνοχή της συστάδας. Κλάση 0,09-I: καλλιέργεια της πυκνοφυτείας, εξευγενιστική αραιώση θετικής επιλογής στα λεπτά και χονδρά κορμίδια, απόληψη 14%. Κλάση II: εξευγενιστικές αραιώσεις θετικής επιλογής, με ποσοστό απόληψης 12%. Κλάση III-IV: αναγεννητικές υλοτομίες και εξυγιαντικές με ποσοστό απόληψης 5%.Γηραιά, κουφαλερά κλπ αλλά υγιή άτομα θα εξαιρεθούν από τις υλοτομίες (1-2 άτομα/Ha) ώστε να υπάρχουν ενδιαιτήματα και μετά το πέρας των υλοτομιών για ορισμένα είδη πανίδας. Έτος υλοτομίας: 2012. Απαγόρευση βόσκησης	ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΑΣΟΣ Ι.Μ. ΔΟΝΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΟΛΥΜΠΩ (2008-2017)
11α	Μ.Π.	Φωτ. Έως συμπ	1-120	Υποκηπ. Ακαν. με ελαφρά επικράτηση ανωτ. κλάσεων & μεγάλα ομηλ. Αθρ.	15.238,00	9002,00	288,87	170,65	59,08	Μαύρη πεύκη 52,75 Ha, λευκόδερμη πεύκη 6,77 Ha. Κατά θέσεις άτομα οξυάς και ελάτης. Η δασοσκεπής έκταση της συστάδας διακόπτεται από μερικώς δασοσκεπείς και άγονες εκτάσεις, συγκροτώντας ένα πολυσχιδές μωσαϊκό ενώσεων μαύρης και λευκόδερμης πεύκης μέτριας γενικά ποιότητας. Η κατάσταση εμφανίζεται βελτιωμένη στη ζώνη μαύρης πεύκης πάνω από τον ασφαλτόδρομο (συμπαγή αθροίσματα άριστης μορφής), όπου οι κλίσεις είναι ηπιότερες και μπορούν να διενεργηθούν καλλιεργητικές επεμβάσεις (σύμφωνα με την §2, αρθρ.71, Ν.Δ. 86/1969 όπως τροποποιήθηκε με την §7, αρθρ.4, Ν. 3208/2003) με σκοπό την δημιουργία πυρασφαλιστικής δομής, λόγω της γειννιάσής της με τον ασφαλτόδρομο Λιτόχωρο – Πριόνια. Προτείνονται: καλλιεργητικές, εξυγιαντικές και αναγεννητικές υλοτομίες στο κατώτερο τμήμα της συστάδας, έκτασης 20,00 Ha μαύρης πεύκης, με ποσοστό απόληψης αυξομειούμενο κατά χώρο ανάλογα με την δομή των ενώσεων των δασοπονικών ειδών(βαθμό και είδος συγκόμωσης, παραγωγικότητα εδάφους κ.λπ.) και λαμβάνοντας υπ' όψη το εδαφικό ανάγλυφο (χαλαρότερες επεμβάσεις στις θέσεις των ισχυρών κλίσεων), έτσι ώστε να αποληφθεί συνολικά από όλη την υλοτομούμενη έκταση η προτεινόμενη ποσότητα ξυλείας, χωρίς να διασπαστεί η συνοχή της συστάδας. Κλάση 0,09-I: καλλιέργεια της πυκνοφυτείας, εξευγενιστική αραιώση θετικής επιλογής στα λεπτά και χονδρά κορμίδια, απόληψη 10%. Κλάση II: εξευγενιστικές αραιώσεις θετικής επιλογής, με ποσοστό απόληψης 10%. Κλάση III-IV: αναγεννητικές υλοτομίες και εξυγιαντικές με ποσοστό απόληψης 12-14%.Γηραιά, κουφαλερά κλπ αλλά υγιή άτομα θα εξαιρεθούν από τις υλοτομίες (1-2 άτομα/Ha) ώστε να υπάρχουν ενδιαιτήματα και μετά το πέρας των υλοτομιών για ορισμένα είδη πανίδας. Έτος υλοτομίας: 2012. Απαγόρευση βόσκησης	ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΑΣΟΣ Ι.Μ. ΔΟΝΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΟΛΥΜΠΩ (2008-2017)

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας / ha	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
11β	Μ.Π. + Λ.Π.	Αραιά έως κλ.	1-120	Υποκηπ. ακαν,	-	-	-	-	-	Μαύρη πεύκη 0,20 Ha, λευκόδερμη πεύκη 47,03 Ha. Κατά θέσεις άτομα ελάτης. Στο μέσο και ανώτερο τμήμα της συστάδας σχεδόν αμιγείς ενώσεις λευκόδερμης πεύκης σε μέτρια κατάσταση, οι οποίες αραιώνουν και μιγνύονται προς το κατώτερο με μαύρη πεύκη και δημιουργούν ένα πολυσχιδές μωσαϊκό με τις μερικώς δασοσκεπείς και άγονες εκτάσεις. Στα ανώτερα διάσπαρτα άτομα ελάτης. Στην παρούσα μορφή δεν προσφέρεται για οικονομικής εκμετάλλευση. Εκτός διαχείρισης	ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΑΣΟΣ Ι.Μ. ΔΟΝΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΟΛΥΜΠΩ (2008-2017)
11γ	Μ.Π. Λ.Π. Ε.	Αραιά έως χαλ. Κατά θέσεις κλ.	1-120	Υποκηπ. Ακαν.	-	-	-	-	-	Διάσπαρτες ενώσεις λευκόδερμης πεύκης με κατά θέσεις κατ' άτομο μίξη ελάτης και μαύρης πεύκης, μέτριας ποιότητας, διακοπτόμενες από μερικώς δασοσκεπείς, άγονες και χορτολιβαδικές εκτάσεις. Δεν προσφέρεται για οικονομική εκμετάλλευση. Εκτός διαχείρισης	ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΑΣΟΣ Ι.Μ. ΔΟΝΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΟΛΥΜΠΩ (2008-2017)
12α	Λ.Π. Μ.Π.	Αραιά έως χαλ. Κατά θέσεις κλ.	1-120	Υποκηπ. Ακαν.	-	-	-	-	-	Ενώσεις λευκόδερμης πεύκης με κατά θέσεις κατ' άτομο μίξη μαύρης πεύκης, μέτριας μορφής. Στο μέσο της συστάδας εκτεταμένες μερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις. Παρατηρούνται ζημιές από ανεμοθλασίες και χιονορριψίες. Δεν προσφέρεται για οικονομική εκμετάλλευση. Εκτός διαχείρισης	ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΑΣΟΣ Ι.Μ. ΔΟΝΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΟΛΥΜΠΩ (2008-2017)
12β	Λ.Π. Μ.Π.	Αραιά έως χαλ. Κατά θέσεις κλ.	1-120	Υποκηπ. Ακαν.	-	-	-	-	-	Ενώσεις λευκόδερμης πεύκης στο κατώτερο κυρίως μέρος της συστάδας, διασπώμενες προς το ανώτερο από μερικώς δασοσκεπείς, άγονες και χορτολιβαδικές εκτάσεις, με κατά θέσεις κατ' άτομο μίξη μαύρης πεύκης, μέτριας μορφής. Δεν προσφέρεται για οικονομική εκμετάλλευση. Εκτός διαχείρισης	ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΑΣΟΣ Ι.Μ. ΔΟΝΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΟΛΥΜΠΩ (2008-2017)
12γ	Λ.Π. Μ.Π.	Αραιά έως χαλ. Κατά θέσεις κλ.	1-120	Υποκηπ. Ακαν.	-	-	-	-	-	Συνεχόμενες ενώσεις λευκόδερμης πεύκης στο κατώτερο και το όριο με 11α , με κατά θέσεις κατ' άτομο μίξη μαύρης πεύκης, μέτριας μορφής, διασπασμένες στο μέσο και ανώτερο από μερικώς δασοσκεπείς και άγονες εκτάσεις. Δεν προσφέρεται για οικονομική εκμετάλλευση. Εκτός διαχείρισης	ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΑΣΟΣ Ι.Μ. ΔΟΝΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΟΛΥΜΠΩ (2008-2017)
13α	Λ.Π.	Αραιά έως χαλ. Κατά θέσεις κλ.	1-120	Υποκηπ. Ακαν.	-	-	-	-	-	Ανήκει στην Διαχειριστική Κλάση VI. Προστατευτικού - Αισθητικού Δάσους, ωστόσο είναι εκτός διαχείρισης διότι αποτελείται κυρίως από Μερικώς Δασοσκεπή έκταση Λευκόδερμης Πεύκης και διάσπαρτα άτομα.	ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΑΣΟΣ Ι.Μ. ΔΟΝΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΟΛΥΜΠΩ (2008-2017)
13β	Λ.Π.	Αραιά έως χαλ. Κατά θέσεις κλ.	1-120	Υποκηπ. Ακαν.	-	-	-	-	-	Μέτριας ποιότητας ενώσεις λευκόδερμης πεύκης στο κατώτερο τμήμα, νότιο του ρέματος Γκάβος. Ζημιές από ανεμοθλασίες, χιονορριψίες και χιονολισθήσεις. Δεν προσφέρεται για οικονομική εκμετάλλευση.	ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΑΣΟΣ Ι.Μ. ΔΟΝΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΟΛΥΜΠΩ (2008-2017)
13γ	Λ.Π.	Αραιά έως χαλ. Κατά θέσεις κλ.	1-120	Υποκηπ. Ακαν.	-	-	-	-	-	Διασπασμένες ενώσεις λευκόδερμης πεύκης στο κατώτερο δυτικό τμήμα, βόρεια του ρέματος Γκάβος. Ζημιές από ανεμοθλασίες, χιονορριψίες και χιονολισθήσεις. Δεν προσφέρεται για οικονομική εκμετάλλευση.	ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΑΣΟΣ Ι.Μ. ΔΟΝΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΟΛΥΜΠΩ (2008-2017)
14	Λ.Π.	-	-	-	-	-	-	-	-	Λίγα διάσπαρτα άτομα λευκόδερμης πεύκης στο όριο 13α και 13β. Το μεγαλύτερο μέρος της συστάδας καταλαμβάνεται από άγονες εκτάσεις. Στο ανώτερο τμήμα, όπου οι κλίσεις είναι ήπιες, εμφανίζεται συνεχόμενη χορτολιβαδική έκταση (αλπικά λιβάδια) με πλούσια ποώδη βλάστηση, κατάλληλη για βόσκηση κτηνοτροφικών ζώων. Γυμνές εκτάσεις κατάλληλες μόνο για βοσκή τους θερινούς μήνες	ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΑΣΟΣ Ι.Μ. ΔΟΝΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΟΛΥΜΠΩ (2008-2017)
8α	Δ. + Λ.Φ.	0,6-1,0	Απροσδιόριστη	Πρεμν. Ακαν.	1.130,00	0,00	53,81	0,00	0,00	Μικτή συστάδα λοιπών φυλλοβόλων (γαύρος, οστρά) και δρυός 0,9, αείφυλλα 0,1. Γηραιά άτομα καστανιάς στα ρέματα και Μ. Πεύκης στις ράχες. Μέτρια έως καλή συστάδα κυρίως Δρυός και Λοιπών Φυλλοβόλων. Κατά θέσεις σημάδια υπερβόσκησης. Στην συστάδα βρίσκεται ο οικισμός Πέτρας και ασκεί προστατευτικό ρόλο. Επίσης η	ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΔΑΣΟΣ ΠΡΩΗΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
	Α.πλ.				406,00	0,00	20,00	0,00	0,00		

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm	Συνολικο ξυλαπόθεμα συστάδας / ha	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
										γεινίαση της με τον οικισμό θα δημιουργούσε προβλήματα με απαγόρευση βόσκησης μετά την υλοτομία. Εκτός διαχείρισης	ΠΕΤΡΑΣ ΟΛΥΜΠΟΥ (2012-2021)
8β	Δ. + Λ.Φ.	0,6	Αππροσιόριστη	Πρεμν. Ακαν.	1.022,43	0,00	53,81	0,00	0,00	Μικτή συστάδα λοιπών φυλλοβόλων και δρυός 0,7, αείφυλλα 0,3. Γηραιά άτομα καστανιάς στα ρέματα και Μ. πεύκης στις ράχες. Μέτρια έως καλή συστάδα κυρίως Δρυός και Λοιπών Φυλλοβόλων. Κατά θέσεις σημάδια υπερβόσκησης. Στην συστάδα βρίσκεται ο οικισμός Πέτρας και ασκεί προστατευτικό ρόλο. Επίσης η γεινίαση της με τον οικισμό και οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις εντός της, θα δημιουργούσε απαγόρευση βόσκησης μετά την υλοτομία. Εκτός διαχείρισης	ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΔΑΣΟΣ ΠΡΩΗΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΤΡΑΣ ΟΛΥΜΠΟΥ (2012-2021)
	Α.πλ.				330,00	0,00	20,00	0,00	0,00		
9α	Δ. + Λ.Φ.	0,7-1,1	.50, στα ΝΑ 25	Πρεμν.ομήλ.	1.170,18	0,00	53,43	0,00	0,00	Μικτή συστάδα λοιπών φυλλοβόλων (γαύρος, οστρυά) και δρυός 0,9, αείφυλλα 0,1. Γηραιά άτομα καστανιάς στα ρέματα. Μέτρια έως καλή η συστάδα κυρίως Δρυός και Λοιπών Φυλλοβόλων. Υλοτομήθηκε το 1987.Προτείνονται: Αποφιλωτικές υλοτομίες με παρακρατήματα 10-12% στις ενώσεις δρυός και λοιπών φυλλοβόλων. Η παρακράτηση κατά ομάδες και λόχμες στις καλύτερες ποιότητες τόπου. Αποφιλωτικές υλοτομίες στα αείφυλλα πλατύφυλλα. Απαγόρευση βόσκησης	ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΔΑΣΟΣ ΠΡΩΗΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΤΡΑΣ ΟΛΥΜΠΟΥ (2012-2021)
	Α.πλ.				210,00	0,00	20,00	0,00	0,00		
9β	Δ. + Λ.Φ.	0,7-1,1	25, ΒΑ > 50	Πρεμν. Ομηλ.	1.366,18	0,00	60,72	0,00	0,00	Μικτή συστάδα λοιπών φυλλοβόλων (γαύρος, οστρυά) και δρυός 0,9, αείφυλλα 0,1. Γηραιά άτομα καστανιάς στα ρέματα. Μέτρια έως καλή η συστάδα κυρίως Δρυός και Λοιπών Φυλλοβόλων. Τμήμα ΝΑ υλοτομήθηκε το 1987. Προτείνονται: Αποφιλωτικές υλοτομίες με παρακρατήματα 10-12% στις ενώσεις δρυός και λοιπών φυλλοβόλων. Η παρακράτηση κατά ομάδες και λόχμες στις καλύτερες ποιότητες τόπου. Αποφιλωτικές υλοτομίες στα αείφυλλα πλατύφυλλα. Απαγόρευση βόσκησης	ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΔΑΣΟΣ ΠΡΩΗΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΤΡΑΣ ΟΛΥΜΠΟΥ (2012-2021)
	Α.πλ,				246,00	0,00	20,00	0,00	0,00		
10α	Δ. + Λ.Φ.	0,5-0,8	24 ετών κθ>50	Διφ. Ομήλ.	459,66	0,00	27,69	0,00	0,00	Μικτή συστάδα λοιπών φυλλοβόλων (γαύρος, οστρυά) και δρυός 0,9, αείφυλλα 0,1. Άτομα Μ. πεύκης στις ράχες και οξυάς στο όριο με την 11. Μέτρια έως καλή συστάδα κυρίως δρυός και λοιπών φυλλοβόλων. Υλοτομήθηκε το 1988, δεν παρατηρήθηκαν ζημιές από τη βοσκή με την υλοτομία. Εκτός διαχείρισης.	ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΔΑΣΟΣ ΠΡΩΗΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΤΡΑΣ ΟΛΥΜΠΟΥ (2012-2021)
	Δρυς σε αναγωγή				174,62	0,00	43,66	0,00	0,00		
	Α.πλ,				104,40	0,00	12,00	0,00	0,00		
10β	Δ. + Λ.Φ.	0,5-0,8	24, κατά θέσεις > 50	Πρεμν. Ομηλ.	656,26	0,00	27,69	0,00	0,00	Μικτή συστάδα λοιπών φυλλοβόλων (γαύρος, οστρυά) και δρυός 0,7, αείφυλλα 0,3. Άτομα οξυάς στο όριο με την 11. Μέτρια έως καλή η συστάδα κυρίως Δρυός και Λοιπών Φυλλοβόλων. Υλοτομήθηκε το 1988, δεν παρατηρήθηκαν ζημιές από την βοσκή μετά την υλοτομία. Εκτός διαχείρισης	ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΔΑΣΟΣ ΠΡΩΗΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΤΡΑΣ ΟΛΥΜΠΟΥ (2012-2021)
	Α.πλ,				99,60	0,00	12,00	0,00	0,00		
11	Δ. + Λ.Φ.	0,6-1,2		Μεσόροφος	1.544,45	0,00	39,40	0,00	0,00	Μικτή συστάδα λοιπών φυλλοβόλων (γαύρος, οστρυά) 0,4, μαύρης πεύκης 0,4, οξυάς 0,1 και δρυός 0,1. Άτομα ελάτης. Μικτή συστάδα καλής κατάστασης. Στο μισό περίπου της συστάδας τον υποόροφο της πεύκης καταλαμβάνουν δρυς και λοιπά φυλλοβόλα, στην υπόλοιπη η μαύρη πεύκη αναγεννάται κανονικά. Η μίξη της πάνω από 5 δασοπονικά είδη της δίνει υψηλή αισθητική αλλά και οικολογική αξία. Εκτός διαχείρισης. Διατήρησή της για την υψηλή βιοποικιλότητα της και την αισθητική της αξία.	ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΔΑΣΟΣ ΠΡΩΗΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΤΡΑΣ ΟΛΥΜΠΟΥ (2012-2021)
	Μ.Π.			Διφ., ανώρωφος	3.444,51	1590,10	98,41	45,43	46,16		
	Ο.			Διφ., ανώρωφος	960,00	0,00	160,00	0,00	0,00		
1	Ε.	0,75-0,85	5-100	Σπερ. Κηπ. ομήλ	1.809,00	516,00	56,09	16,00	28,52	Ελάτη & Οξυά σε ποσοστό μίξης 40-60% αντίστοιχα και κατά θέσεις μεμονωμένα άτομα μαύρης πεύκης κυρίως προς τις ράχες. Τα άτομα της πεύκης δεν θα θιγούν στη παρούσα συστάδα και συνεπώς δεν συμμετέχουν στο λήμμα της. Η υγεία των κορμών είναι γενικά καλή, λίγα άτομα παρουσίασαν κακομορφίες. Επικράτηση των κατώτερων κλάσεων διαμέτρων τόσο για την οξυά όσο και για την ελάτη. Αρκετά μεγάλα διάκενα σε όλη τη συστάδα. Σημάδια υπερβόσκησης. Ύπαρξη μεμονωμένων ατόμων μαύρης πεύκης εντός της μικτής συστάδας, τα οποία δεν θα θιγούν, αλλά θα παραμείνουν για ενίσχυση της μίξης. Όλα τα διαχειριστικά μέτρα που προτείνονται στη συνέχεια έχουν ως κύριο στόχο τη διατήρηση της υπάρχουσας μίξης. Παχυμετρηθείσα επιφάνεια: 1 επιφάνεια του 1.5 στρέμματος για την Ελάτη, 1 επιφάνεια του 1.5 στρέμματος για την οξυά και οπτική εκτίμηση. Προτείνονται: Η επιδιωκτέα δασοπονική μορφή, η οποία θα προκύψει μετά τη λήψη των προτεινόμενων διαχειριστικών επεμβάσεων θα είναι η σπερμοφυής υποκτηπευτή και για τα τρία είδη που αναπτύσσονται στη συστάδα. Η διαχειριστική μορφή της οξυάς είναι υποκτηπευτοειδής και για την αναγωγή της προτείνονται καλλιεργητικές υλοτομίες με τέτοια ένταση ώστε ο βαθμός συγκόμωσης να μην κατέρχεται του υπάρχοντος. Στη συνέχεια διενεργούνται σπερμοδότιδες και φωτοδότιδες υλοτομίες σε θέσεις όπου υπάρχει ιδιαίτερα αναπτυγμένη αναγέννηση του είδους και οπωσδήποτε στις καλύτερες ποιότητες τόπου. Τελική διεύρυνση των αναγεννηθέντων κέντρων αναγέννησης με υπόσκιες υλοτομίες εφόσον δεν έχει αποληφθεί το προβλεπόμενο λήμμα. Το λήμμα για	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2014-2023
	Ο.		10-50		2.787,00	0,00	86,42	0,00	0,00		

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας /ha	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
										την οξυά θα ανέλθει σε ποσοστό 7% του συνολικού ξυλαποθέματος. Διατήρηση και ευνόηση των ευγενών πλατυφύλλων ειδών (σφένδαμος, φράξος, φλαμουριά), με σκοπό τη μελλοντική παραγωγή πολύτιμου ξύλου αλλά και για εδαφοβελτιωτικούς σκοπούς. Η αναγέννηση της ελάτης επιτυγχάνεται καλύτερα σε στενά διακενογενή ή ενδοδασογενή περιβάλλοντα τα οποία σικάζονται επαρκώς. Και στη περίπτωση αυτή διενεργείται η ίδια σειρά υλοτομιών με την οξυά δηλαδή στο στάδιο της νεοφυτείας καμία επέμβαση, σε αυτό της πυκνοφυτείας καλλιεργητικές υλοτομίες με αρνητική επιλογή, στο στάδιο των κορμιδίων καλλιεργητικές υλοτομίες με θετική επιλογή και στη συνέχειαδιενεργούνται αναγεννητικές σπερμοδότδες και φωτοδότιδες υλοτομίες με διεύρυνση ή μη των κέντρων αναγέννησης που δημιουργήθηκαν. Το λήμμα για την ελάτη και την οξυά θα ανέλθει σε ποσοστό 7% του συνολικού ξυλαποθέματος.Απομάκρυνση όλων των στρεβλών, καχεκτικών , κακόμορφων και άρρωστων ατόμων μαύρης πεύκης και γενικότερα ατόμων που εμποδίζουν την ομαλή ανάπτυξη των υγιών και καλλίμορφων ατόμων. Απομάκρυνση των γηραιών δέντρων που τυχόν υπάρχουν γύρω από νεοφυτείες- πυκνοφυτείες και νεαρούς κορμούς προς ευνόηση αυτών. Απαγόρευση βόσκησης.	
2α	Μ.Π.	0,85-0,95	10-105	Σπερ. κηπ. ή υποκηπ., διάφορος κατά θέση, σχεδον ομήλ.	3.383,00	2.660,00	146,45	115,15	78,63	Ελάτη & Μαύρη Πεύκη σε ποσοστό μίξης 50-50%.Η υγεία των κορμών είναι γενικά καλή, λίγα άτομα παρουσίασαν κακομορφίες. Επικράτηση των κατώτερων κλάσεων διαμέτρων τόσο για τη μαύρη πεύκη όσο κυρίως για την ελάτη. Αρκετά μεγάλα διάκενα σε όλη τη συστάδα. Σημάδια υπερβόσκησης. Ύπαρξη αμιγούς κηλίδας αναγέννησης μαύρης πεύκης και ελάτης στο στάδιο των νεαρών κορμιδίων, η οποία καλύπτει επιφάνεια περίπου 4 στρεμμάτων. Παχυμετρηθείσα επιφάνεια: 1 επιφάνεια του 1.5 στρέμματος για την Ελάτη, 1 επιφάνεια του 1.5 στρέμματος για την πεύκη και οπτική εκτίμηση. Προτείνονται: Η επιδιωκτέα δασοπονική μορφή, η οποία θα προκύψει μετά τη λήψη των προτεινόμενων διαχειριστικών επεμβάσεων θα είναι η σπερμοφυής υποκτηπευτή και για τα δύο είδη που αναπτύσσονται στη συστάδα. Αναγεννητικές υλοτομίες με τη δημιουργία υπόσκιων υλοτομιών έκτασης περίπου 1 στρ., στις επιφάνεις της συστάδας που αναπτύσσονται αυξητικά ώριμες ενώσεις και παρατηρείται συσσώρευση ξυλώδους κεφαλαίου στην ανώτερη βαθμίδα διαμέτρου για τη μαύρη πεύκη. Απομάκρυνση των ατόμων μαύρης πεύκης που υπερβαίνουν την ώριμη προς υλοτομία διάμετρο του είδους (>45 εκ.). Αναμόχλευση του εδάφους με μηχανικά μέσα όπου αυτό είναι εφικτό για ευνόηση της αναγέννησης. Διενέργεια καλλιεργητικών υλοτομιών στις παραπάνω θέσεις (γύρω από νεοφυτείες- πυκνοφυτείες και νεαρούς κορμούς), με τέτοια ένταση ώστε ο βαθμός συγκόμωσης να μην κατέρχεται του 0.7-0.8, με σκοπό τη ποιοτική βελτίωση του ξυλαποθέματος. Το ποσοστό του λήμματος για τη μαύρη πεύκη δεν θα υπερβαίνει το 8% του ξυλαποθέματος. Διατήρηση και ευνόηση των ευγενών πλατυφύλλων ειδών (σφένδαμος, φράξος, φλαμουριά), με σκοπό τη μελλοντική παραγωγή πολύτιμου ξύλου αλλά και για εδαφοβελτιωτικούς σκοπούς. Η αναγέννηση της ελάτης επιτυγχάνεται καλύτερα σε στενά διακενογενή ή ενδοδασογενή περιβάλλοντα τα οποία σικάζονται επαρκώς. Και στη περίπτωση αυτή διενεργείται η ίδια σειρά υλοτομιών με την οξυά δηλαδή στο στάδιο της νεοφυτείας καμία επέμβαση, σε αυτό της πυκνοφυτείας καλλιεργητικές υλοτομίες με αρνητική επιλογή, στο στάδιο των κορμιδίων καλλιεργητικές υλοτομίες με θετική επιλογή και στη συνέχεια διενεργούνται αναγεννητικές σπερμοδότδες και φωτοδότιδες υλοτομίες με διεύρυνση ή μη των κέντρων αναγέννησης που δημιουργήθηκαν. Το λήμμα για την ελάτη θα ανέλθει σε ποσοστό 8% του συνολικού ξυλαποθέματος. Απομάκρυνση όλων των στρεβλών, καχεκτικών , κακόμορφων και άρρωστων ατόμων μαύρης πεύκης και γενικότερα ατόμων που εμποδίζουν την ομαλή ανάπτυξη των υγιών και καλλίμορφων ατόμων. Απομάκρυνση των γηραιών δέντρων που τυχόν υπάρχουν γύρω από νεοφυτείες- πυκνοφυτείες και νεαρούς κορμούς προς ευνόηση αυτών. Απομάκρυνση όλων των στρεβλών, καχεκτικών , κακόμορφων και άρρωστων ατόμων μαύρης πεύκης και γενικότερα ατόμων που εμποδίζουν την ομαλή ανάπτυξη των υγιών και καλλίμορφων ατόμων. Απομάκρυνση των γηραιών δέντρων που τυχόν υπάρχουν γύρω από νεοφυτείες- πυκνοφυτείες και νεαρούς κορμούς προς ευνόηση αυτών. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2014-2023
	Ε.		5-105		98,00	0,00	4,41	0,00	0,00		

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας / ha	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
2β	Μ.Π.	0,7	5-75	Σπερ. Υποκηπ. Και κατά θέσεις κηπ., σχεδόν ομήλ.	9.429,00	6.603,00	222,33	155,69	70,03	Μ.Πεύκη και Ελάτη. Η ελάτη παρουσιάζει σποραδική εμφάνιση μέσα στην αμιγή συστάδα της μαύρης πεύκης και αναπτύσσει αμιγείς μικρές συστάδες (λόχμες) στα κράσπεδα της συστάδας προς τα δασοόρια. Λόγω της δύσκολης πρόσβασης στα σημεία που αναπτύσσεται η ελάτη δεν συμμετέχει στο λήμμα της συστάδας αυτής. Η υγεία των κορμών είναι γενικά καλή, λίγα άτομα παρουσίασαν κακομορφίες. Επικράτηση της κατώτερης κυρίως κλάσης διαμέτρων. Αρκετά μεγάλα διάκενα σε όλη τη συστάδα. Σημάδια υπερβόσκησης. Σποραδική εμφάνιση πλατύφυλλων ειδών εντός της συστάδας. Ύπαρξη αμιγούς κηλίδας αναγέννησης μαύρης πεύκης στο στάδιο της νεοφυτείας, η οποία καλύπτει επιφάνεια περίπου 3 στρεμμάτων. Παχυμετρηθείσα επιφάνεια : 1 επιφάνεια των 2 στρεμμάτων και οπτική εκτίμηση. Προτείνονται: Η επιδιωκτέα δασοπονική μορφή, η οποία θα προκύψει μετά τη λήψη των προτεινόμενων διαχειριστικών επεμβάσεων θα είναι η υποκηπευτή, με σκοπό την εξυτηρέτηση των δασοκομικών απαιτήσεων της μαύρης πεύκης, την απαλοιφή της τυχόν ακανονιστίας της συστάδας, την εκμετάλλευση της μέγιστης τεχνικής ικανότητας του είδους για παραγωγή ξυλείας και τη βελτίωση και προστασία του δάσους. Απομάκρυνση όλων των ατόμων πλατυφύλλων ειδών από τη συστάδα. Διατήρηση και ευνόηση των ευγενών πλατυφύλλων ειδών (σφένδαμος, φράξος, φλαμουριά) με σκοπό τη μελλοντική παραγωγή πολύτιμου ξύλου αλλά και για εδαφοβελτιωτικούς σκοπούς. Διατήρηση επίσης των μεμονωμένων ατόμων ελάτης που αναπτύσσονται εντός της αμιγούς συστάδας μαύρης πεύκης. Αναγεννητικές υλοτομίες με τη δημιουργία υπόσκιων υλοτομιών έκτασης περίπου 1 στρ., στις επιφάνειες της συστάδας που αναπτύσσονται αυξητικά ώριμες ενώσεις και παρατηρείται συσσώρευση ξυλώδους κεφαλαίου στην ανώτερη βαθμίδα διαμέτρου . Απομάκρυνση των ατόμων μαύρης πεύκης που υπερβαίνουν την ώριμη προς υλοτομία διάμετρο του είδους (>45 εκ.). Αναμόχλευση του εδάφους με μηχανικά μέσα όπου αυτό είναι εφικτό για ευνόηση της αναγέννησης. Απομάκρυνση όλων των στρεβλών, καχεκτικών, κακόμορφων και άρρωστων ατόμων μαύρης πεύκης και γενικότερα ατόμων που εμποδίζουν την ομαλή ανάπτυξη των υγιών και καλλιμορφων ατόμων. Απομάκρυνση των γηραιών δέντρων που τυχόν υπάρχουν γύρω από νεοφυτείες- πυκνοφυτείες και νεαρούς κορμούς προς ευνόηση αυτών. Διενέργεια καλλιεργητικών υλοτομιών στις παραπάνω θέσεις (γύρω από νεοφυτείες- πυκνοφυτείες και νεαρούς κορμούς), με τέτοια ένταση ώστε ο βαθμός συγκόμωσης να μην κατέρχεται του 0,6-0,7, με σκοπό την ποιοτική βελτίωση του ξυλαποθέματος. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2014-2023
2γ	Μ.Π.	0,9	10-100	Σπερ. Υποκηπ. Και κατά θέσεις κηπ., σχεδόν ομήλ.	3.162,00	1.261,00	210,38	83,90	39,88	Μ.Πεύκη και Ελάτη. Η ελάτη παρουσιάζει σποραδική εμφάνιση μέσα στην αμιγή συστάδα της μαύρης πεύκης. Για δασοβιολογικούς σκοπούς (δημιουργία μικτού δάσους, ευνόηση της ανάπτυξής της) η ελάτη δεν συμμετέχει στο λήμμα της συστάδας αυτής. Η υγεία των κορμών είναι γενικά καλή, λίγα άτομα παρουσίασαν κακομορφίες. Επικράτηση της κατώτερης κυρίως κλάσης διαμέτρων. Αρκετά μεγάλα διάκενα σε όλη τη συστάδα. Σημάδια υπερβόσκησης. Διατήρηση και ευνόηση των ευγενών πλατυφύλλων ειδών (σφένδαμος, φράξος, φλαμουριά) με σκοπό τη μελλοντική παραγωγή πολύτιμου ξύλου αλλά και για εδαφοβελτιωτικούς σκοπούς. Διατήρηση επίσης των μεμονωμένων ατόμων ελάτης που αναπτύσσονται εντός της αμιγούς συστάδας μαύρης πεύκης .Αναγεννητικές υλοτομίες με τη δημιουργία υπόσκιων υλοτομιών έκτασης περίπου 1 στρ., στις επιφάνειες της συστάδας που αναπτύσσονται αυξητικά ώριμες ενώσεις και παρατηρείται συσσώρευση ξυλώδους κεφαλαίου στην ανώτερη βαθμίδα διαμέτρου . Απομάκρυνση των ατόμων μαύρης πεύκης που υπερβαίνουν την ώριμη προς υλοτομία διάμετρο του είδους (>45 εκ.). Αναμόχλευση του εδάφους με μηχανικά μέσα όπου αυτό είναι εφικτό για ευνόηση της αναγέννησης. Απομάκρυνση όλων των στρεβλών, καχεκτικών , κακόμορφων και άρρωστων ατόμων μαύρης πεύκης και γενικότερα ατόμων που εμποδίζουν την ομαλή ανάπτυξη των υγιών και καλλιμορφων ατόμων. Απομάκρυνση των γηραιών δέντρων που τυχόν υπάρχουν γύρω από νεοφυτείες- πυκνοφυτείες και νεαρούς κορμούς προς ευνόηση αυτών. Διενέργεια καλλιεργητικών υλοτομιών στις παραπάνω θέσεις (γύρω από νεοφυτείες- πυκνοφυτείες και νεαρούς κορμούς), με τέτοια ένταση ώστε ο βαθμός συγκόμωσης να μην κατέρχεται του 0.7-0.8, με σκοπό τη ποιοτική βελτίωση του ξυλαποθέματος. Το λήμμα θα ανέλθει σε ποσοστό 8% επί του συνολικού ξυλαποθέματος. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2014-2023

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm	Συνολικο ξυλαπόθεμα συστάδας / ha	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
3α	Μ.Π.	0,8	5-95	Σπερ. Υποκτηπ. Και κατά θέσεις κηπ., σχεδόν ομήλ.	11.451,00	9.216,00	221,06	177,92	80,48	Μ.Πεύκη και κατά θέσεις σποραδική εμφάνιση ατόμων νεαρής Ελάτης. Η υγεία των κορμών είναι γενικά καλή, λίγα άτομα παρουσίασαν κακομορφίες. Επικράτηση της κατώτερης κυρίως κλάσης διαμέτρων. Αρκετά μεγάλα διάκενα σε όλη τη συστάδα. Σημάδια υπερβόσκησης. Σποραδική εμφάνιση διάσπαρτων ατόμων ελάτης (κυρίως νεαρής ηλικίας) εντός της συστάδας. Παχυμετρηθείσα επιφάνεια: 1 επιφάνεια του 1.5 στρέμματος & 1 επιφάνεια του 1 στρέμματος και οπτική εκτίμηση. Προτείνονται: Η επιδιωκτέα δασοπονική μορφή, η οποία θα προκύψει μετά τη λήψη των προτεινόμενων διαχειριστικών επεμβάσεων θα είναι η υποκτητευτή, με σκοπό την εξυπηρέτηση των δασοκομικών απαιτήσεων της μαύρης πεύκης, την απαλοιφή της τυχόν ακανονιστίας της συστάδας, την εκμετάλλευση της μέγιστης τεχνικής ικανότητας του είδους για παραγωγή ξυλείας και τη βελτίωση και προστασία του δάσους. Καλλιεργητικές υλοτομίες γύρω από νεοφυτείες- πυκνοφυτείες και νεαρούς κορμούς, με τέτοια ένταση ώστε ο βαθμός συγκόμωσης να μην κατέρχεται του υπάρχοντος, με σκοπό τη ποιοτική βελτίωση του ξυλαποθέματος. Οι επεμβάσεις στην Πεύκη θα γίνουν κατά κύριο λόγο στην Ι και ΙΙ και ΙΙΙ κλάση διαμέτρων. Εξυγιαντικές υλοτομίες με απομάκρυνση (αρνητική επιλογή) όλων των στρεβλών, καχεκτικών , κακόμορφων και άρρωστων ατόμων μαύρης πεύκης και γενικότερα ατόμων που εμποδίζουν την ομαλή ανάπτυξη των υγιών και καλλίμορφων ατόμων. Απομάκρυνση των γηραιών δέντρων που τυχόν υπάρχουν γύρω από νεοφυτείες- πυκνοφυτείες και νεαρούς κορμούς προς ευνόηση αυτών. Το λήμμα για τη πεύκη θα ανέλθει σε ποσοστό 8% του ξυλαποθέματος. Διατήρηση και ευνόηση των ευγενών πλατυφύλλων ειδών (σφένδαμος, φράξος, φλαμουριά) με σκοπό τη μελλοντική παραγωγή πολύτιμου ξύλου αλλά και για εδαφοβελτιωτικούς σκοπούς. Διατήρηση επίσης των μεμονομένων ατόμων ελάτης που αναπτύσσονται εντός της αμιγούς συστάδας μαύρης πεύκης. Αναγεννητικές υλοτομίες με τη δημιουργία υπόσκιων υλοτομιών έκτασης περίπου 1 στρ., στις επιφάνειες της συστάδας που αναπτύσσονται αυξητικά ώριμες ενώσεις και παρατηρείται συσσώρευση ξυλώδους κεφαλαίου στην ανώτερη βαθμίδα διαμέτρου. Απομάκρυνση των ατόμων μαύρης πεύκης που υπερβαίνουν την ώριμη προς υλοτομία διάμετρο του είδους (>45 εκ.). Αναμόχλευση του εδάφους με μηχανικά μέσα όπου αυτό είναι εφικτό για ευνόηση της αναγέννησης. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2014-2023
3β	Μ.Π.	0,7-1,1	>70	Σπερ. Υποκτηπ. Και κατά μεγάλες θέσεις κηπ.	18.071,00	5.776,00	406,09	129,80	31,96	Μαύρη Πεύκη αμιγής(44,5Ha).Ποιοτική και υγιεινή κατάσταση σπερμοβλαστημάτων καλή με καλή ανάπτυξη. Ζημιές δεν παρατηρήθηκαν. Η τελευταία επέμβαση στη συστάδα έγινε το 2010 και παραλήφθηκαν 1021,49 κ.μ. καυσόξυλων Μ. Πεύκης. Εκτός καλλιέργειας την παρούσα 10ετία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2014-2023
3γ	Μ.Π.	0,8	5-75	Σπερ. Υποκτηπ. Και κατά θέσεις κηπ., σχεδόν ομήλ.	17.306,00	7.632,00	296,08	130,57	44,10	Η υγεία των κορμών είναι γενικά καλή, λίγα άτομα παρουσίασαν κακομορφίες. Επικράτηση της κατώτερης κυρίως κλάσης διαμέτρων. Αρκετά μεγάλα διάκενα σε όλη τη συστάδα. Σημάδια υπερβόσκησης. Ύπαρξη αμιγούς κηλίδας αναγέννησης μαύρης πεύκης στο στάδιο της νεοφυτείας, η οποία καλύπτει επιφάνεια περίπου 2 στρεμμάτων.Παχυμετρηθείσα επιφάνεια : 2 επιφάνειες των 1.5 στρεμμάτων και οπτική εκτίμηση. Προτείνονται: Η επιδιωκτέα δασοπονική μορφή, η οποία θα προκύψει μετά τη λήψη των προτεινόμενων διαχειριστικών επεμβάσεων θα είναι η υποκτητευτή, με σκοπό την εξυπηρέτηση των δασοκομικών απαιτήσεων της μαύρης πεύκης, την απαλοιφή της τυχόν ακανονιστίας της συστάδας, την εκμετάλλευση της μέγιστης τεχνικής ικανότητας του είδους για παραγωγή ξυλείας και τη βελτίωση και προστασία του δάσους. Διατήρηση και ευνόηση των ευγενών πλατυφύλλων ειδών (σφένδαμος, φράξος, φλαμουριά) με σκοπό τη μελλοντική παραγωγή πολύτιμου ξύλου αλλά και για εδαφοβελτιωτικούς σκοπούς. Διατήρηση επίσης των μεμονομένων ατόμων ελάτης που τυχόν αναπτύσσονται εντός της αμιγούς συστάδας μαύρης πεύκης. Αναγεννητικές υλοτομίες με τη δημιουργία υπόσκιων υλοτομιών έκτασης περίπου 1 στρ., στις επιφάνειες της συστάδας που αναπτύσσονται αυξητικά ώριμες ενώσεις και παρατηρείται συσσώρευση ξυλώδους κεφαλαίου στην ανώτερη βαθμίδα διαμέτρου . Απομάκρυνση των ατόμων μαύρης πεύκης που υπερβαίνουν την ώριμη προς υλοτομία διάμετρο του είδους (>45 εκ.). Αναμόχλευση του εδάφους με μηχανικά μέσα όπου αυτό είναι εφικτό για ευνόηση της αναγέννησης. Το λήμμα θα ανέλθει σε ποσοστό 8% του συνολικού ξυλαποθέματος. Απομάκρυνση όλων των στρεβλών, καχεκτικών , κακόμορφων και άρρωστων ατόμων μαύρης πεύκης και γενικότερα ατόμων που εμποδίζουν την ομαλή ανάπτυξη των υγιών και καλλίμορφων ατόμων. Απομάκρυνση των γηραιών δέντρων που τυχόν υπάρχουν γύρω από νεοφυτείες- πυκνοφυτείες και νεαρούς κορμούς προς ευνόηση αυτών.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2014-2023

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας / ha	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
										Διενέργεια καλλιεργητικών υλοτομιών στις παραπάνω θέσεις (γύρω από νεοφυτείες-πυκνοφυτείες και νεαρούς κορμούς), με τέτοια ένταση ώστε ο βαθμός συγκόμωσης να μην κατέρχεται του 0.6-0.7, με σκοπό τη ποιοτική βελτίωση του ξυλαποθέματος. Απαγόρευση βόσκησης.	
36	Μ.Π.	0,7	10-100	Σπερ. Υποκτηπ. Και κατά θέσεις κηπ., σχεδόν ομήλ.	7.384,00	3.815,00	262,78	135,77	51,67	Μ.Πεύκη και λίγη νεαρή οξυά κυρίως πλησίον των ρεμάτων. Η υγεία των κορμών είναι γενικά καλή, λίγα άτομα παρουσίασαν κακομορφίες. Επικράτηση της κατώτερης κυρίως κλάσης διαμέτρων. Αρκετά μεγάλα διάκενα σε όλη τη συστάδα. Σημάδια υπερβόσκησης. Σποραδική εμφάνιση πλατύφυλλων ειδών εντός της συστάδας. Ύπαρξη αμιγούς κηλίδας αναγέννησης μαύρης πεύκης στο στάδιο της νεοφυτείας, η οποία καλύπτει επιφάνεια περίπου 1 στρέμματος. Παχυμετρηθείσα επιφάνεια : 1 επιφάνεια του 1.5 στρέμματος και οπτική εκτίμηση. Προτείνονται: Η επιδιωκτέα δασοπονική μορφή, η οποία θα προκύψει μετά τη λήψη των προτεινόμενων διαχειριστικών επεμβάσεων θα είναι η υποκτηπευτή, με σκοπό την εξυπηρέτηση των δασοκομικών απαιτήσεων της μαύρης πεύκης, την απαλοιφή της τυχόν ακανονιστίας της συστάδας, την εκμετάλλευση της μέγιστης τεχνικής ικανότητας του είδους για παραγωγή ξυλείας και τη βελτίωση και προστασία του δάσους. Διατήρηση και ευνόηση των ευγενών πλατυφύλλων ειδών (σφένδαμος, φράξος, φλαμουριά) με σκοπό τη μελλοντική παραγωγή πολύτιμου ξύλου αλλά και για εδαφοβελτιωτικούς σκοπούς. Διατήρηση επίσης των μεμονομένων ατόμων ελάτης που τυχόν αναπτύσσονται εντός της αμιγούς συστάδας μαύρης πεύκης. Απομάκρυνση των ατόμων μαύρης πεύκης που υπερβαίνουν την ώριμη προς υλοτομία διάμετρο του είδους (>45 εκ.). Το λήμμα θα ανέλθει σε ποσοστό 8% του ξυλαποθέματος. Αναμόχλευση του εδάφους με μηχανικά μέσα όπου αυτό είναι εφικτό, για ευνόηση της αναγέννησης. Απομάκρυνση όλων των στρεβλών, καχεκτικών , κακόμορφων και άρρωστων ατόμων μαύρης πεύκης και γενικότερα ατόμων που εμποδίζουν την ομαλή ανάπτυξη των υγιών και καλλιμορφων ατόμων. Απομάκρυνση των γηραιών δέντρων που τυχόν υπάρχουν γύρω από νεοφυτείες- πυκνοφυτείες και νεαρούς κορμούς προς ευνόηση αυτών. Διενέργεια καλλιεργητικών υλοτομιών στις παραπάνω θέσεις (γύρω από νεοφυτείες-πυκνοφυτείες και νεαρούς κορμούς), με τέτοια ένταση ώστε ο βαθμός συγκόμωσης να μην κατέρχεται του 0,6-0,7, με σκοπό τη ποιοτική βελτίωση του ξυλαποθέματος. Απαγόρευση βόσκησης	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2014-2023
4α	Μ.Π.	0,7	10-90	Σπερ. Υποκτηπ. Και κατά θέσεις κηπ., σχεδόν ομήλ.	29.435,00	1.186,00	305,53	12,31	4,03	Μ. Πεύκη και Οξυά, η οποία κυρίως αποτελείται από νεαρά άτομα κατά μήκος των πρानών και περιξ του ρέματος "Ξηρολάκκι". Η οξυά δεν συμμετέχει στο λήμμα της συστάδας αυτής.Η υγεία των κορμών είναι γενικά καλή, λίγα άτομα παρουσίασαν κακομορφίες. Επικράτηση της κατώτερης κυρίως κλάσης διαμέτρων. Αρκετά μεγάλα διάκενα σε όλη τη συστάδα. Σημάδια υπερβόσκησης. Σποραδική εμφάνιση πλατύφυλλων ειδών εντός της συστάδας. Ύπαρξη αμιγούς κηλίδας αναγέννησης μαύρης πεύκης στο στάδιο της νεοφυτείας, η οποία καλύπτει επιφάνεια περίπου 1 στρέμματος. Παχυμετρηθείσα επιφάνεια : 2 επιφάνειες των 1.5 στρεμμάτων & 1 επιφάνεια των 2 στρέμμάτων και οπτική εκτίμηση. Προτείνονται: Η επιδιωκτέα δασοπονική μορφή, η οποία θα προκύψει μετά τη λήψη των προτεινόμενων διαχειριστικών επεμβάσεων θα είναι η υποκτηπευτή, με σκοπό την εξυπηρέτηση των δασοκομικών απαιτήσεων της μαύρης πεύκης, την απαλοιφή της τυχόν ακανονιστίας της συστάδας, την εκμετάλλευση της μέγιστης τεχνικής ικανότητας του είδους για παραγωγή ξυλείας και τη βελτίωση και προστασία του δάσους. Διατήρηση και ευνόηση των ευγενών πλατυφύλλων ειδών (σφένδαμος, φράξος, φλαμουριά) με σκοπό τη μελλοντική παραγωγή πολύτιμου ξύλου αλλά και για εδαφοβελτιωτικούς σκοπούς. Διατήρηση επίσης των μεμονωμένων ατόμων ελάτης που αναπτύσσονται εντός της αμιγούς συστάδας μαύρης πεύκης. Απομάκρυνση των ατόμων μαύρης πεύκης που υπερβαίνουν την ώριμη προς υλοτομία διάμετρο του είδους (>45 εκ.). Αναμόχλευση του εδάφους με μηχανικά μέσα όπου αυτό είναι εφικτό για ευνόηση της αναγέννησης. Απομάκρυνση όλων των στρεβλών, καχεκτικών , κακόμορφων και άρρωστων ατόμων μαύρης πεύκης και γενικότερα ατόμων που εμποδίζουν την ομαλή ανάπτυξη των υγιών και καλλιμορφων ατόμων. Απομάκρυνση των γηραιών δέντρων που τυχόν υπάρχουν γύρω από νεοφυτείες- πυκνοφυτείες και νεαρούς κορμούς και γενικότερα από τις διάσπαρτες ομάδες ή λόχμες αναγέννησης που αναπτύσσονται στο εσωτερικό της συστάδας προς ευνόηση αυτών. Διενέργεια καλλιεργητικών υλοτομιών στις παραπάνω θέσεις (γύρω από νεοφυτείες- πυκνοφυτείες και νεαρούς κορμούς), με τέτοια ένταση ώστε ο βαθμός συγκόμωσης να μην κατέρχεται του 0.6-0.7, με σκοπό τη ποιοτική βελτίωση του ξυλαποθέματος. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2014-2023

Συστάδα α	Δασοπονικά είδη	Συγκόμ ωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	Συνολικό ξυλαπόθεμ α συστάδας	Ξυλαπόθεμ α κλάσεων διαμέτρου >34 cm	Συνολικο ξυλαπόθεμ α συστάδας / ha	Ξυλαπόθεμ α κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμ α / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
4β	Μ.Π.	2,12	1-120	Σπερ. Υποκηπ. Και κατά θέσεις κηπ.	11.245,00	5.141,00	253,32	115,81	45,72	Μαύρη Πεύκη με διάσπαρτη Δρύς κλπ. Ποιότητα κορμών άριστη, υγεία σταθερή, , μεγάλη αναγέννηση Juniperus, μικρή αναγέννηση Πεύκης. Το ξυλώδες κεφάλαιο παρουσιάζεται πιο συγκροτημένο στα άναντη της συστάδας. Παχυμετρηθείσα επιφάνεια : 1 επιφάνεια του 1 στρέμματος και οπτική εκτίμηση. Προτείνονται: Καλλιεργητικές υλοτομίες γύρω από νεοφυτείες- πυκνοφυτείες και νεαρούς κορμούς, με τέτοια ένταση ώστε ο βαθμός συγκόμωσης να μην κατέρχεται του υπάρχοντος, με σκοπό τη ποιοτική βελτίωση του ξυλαποθέματος. Οι επεμβάσεις στην Πεύκη θα γίνουν κατά κύριο λόγο στην ΙΙ κλάση διαμέτρων. Εξυγιαντικές υλοτομίες με απομάκρυνση(αρνητική επιλογή) όλων των στρεβλών, καχεκτικών , κακόμορφων και άρρωστων ατόμων μαύρης πεύκης και γενικότερα ατόμων που εμποδίζουν την ομαλή ανάπτυξη των υγιών και καλλίμορφων ατόμων. Απομάκρυνση των γηραιών δέντρων που τυχόν υπάρχουν γύρω από νεοφυτείες- πυκνοφυτείες και νεαρούς κορμούς προς ευνόηση αυτών. Αναγωγή της Δρυός με διενέργεια καλλιεργητικών υλοτομιών, διατήρηση της μείξης με την Πεύκη. Αφαίρεση 8% του ξυλαποθέματος στην Πεύκη .Αναγεννητικές υλοτομίες με τη δημιουργία υπόσκιων υλοτομιών έκτασης περίπου 1 στρ., στις επιφάνειες της συστάδας που αναπτύσσονται αυξητικά ώριμες ενώσεις και παρατηρείται συσσώρευση ξυλώδους κεφαλαίου στην ανώτερη βαθμίδα διαμέτρου . Απομάκρυνση των ατόμων μαύρης πεύκης που υπερβαίνουν την ώριμη προς υλοτομία διάμετρο του είδους (>45 εκ.). Αναμόχλευση του εδάφους με μηχανικά μέσα όπου αυτό είναι εφικτό για ευνόηση της αναγέννησης. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2014-2023
4γ	Μ.Π.	0,7-0,9	90	Σπερ. Υποκηπ. Και κατά μεγάλες θέσεις κηπ.	21.998,00	7.615,00	327,30	113,30	34,62	Μαύρη Πεύκη αμιγής(67,21Ha).Ποιοτική και υγιεινή κατάσταση σπερμοβλαστημάτων καλή με καλή ανάπτυξη. Ζημιές δεν παρατηρήθηκαν. Η τελευταία επέμβαση στη συστάδα έγινε το 2010 και παραλήφθηκαν 1021,49 κ.μ. καυσόξυλων Μ. Πεύκης. Εκτός καλλιέργειας την παρούσα 10ετία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2014-2023
5α	Μ.Π.	1,11	1-135	Σπερ. Υποκηπ. Και κατά θέσεις κηπ.	1.038,00	836,00	29,66	23,89	80,54	Μαύρη Πεύκη και Ελάτη, Δρύς κλπ, Οξυά. Ποιότητα κορμών καλή, υγεία σταθερή, αναγέννηση ικανοποιητική. Το ξυλώδες κεφάλαιο παρουσιάζεται πιο συγκροτημένο στα άναντη της συστάδας. Παχυμετρηθείσα επιφάνεια : 1 επιφάνεια του 1 στρέμματος και οπτική εκτίμηση. Προτείνονται: Καλλιεργητικές υλοτομίες γύρω από νεοφυτείες- πυκνοφυτείες και νεαρούς κορμούς, με τέτοια ένταση ώστε ο βαθμός συγκόμωσης να μην κατέρχεται του υπάρχοντος, με σκοπό τη ποιοτική βελτίωση του ξυλαποθέματος. Οι επεμβάσεις στην Πεύκη θα γίνουν κατά κύριο λόγο στην ΙΙ και ΙV κλάση διαμέτρων, στην Ελάτη στη ΙΙ και στην Οξυά στην Ι και ΙΙ. Εξυγιαντικές υλοτομίες με απομάκρυνση(αρνητική επιλογή) όλων των στρεβλών, καχεκτικών , κακόμορφων και άρρωστων ατόμων μαύρης πεύκης και γενικότερα ατόμων που εμποδίζουν την ομαλή ανάπτυξη των υγιών και καλλίμορφων ατόμων. Προτείνεται η καλλιέργεια λεπτών κορμών Οξυάς σε όλη την περιοχή εξάπλωσής της για λόγους μελλοντικής της ανάδειξης και ενίσχυσης της ποιότητας του ξυλαποθέματος και η απομάκρυνση των ατόμων του ανωρόφου επιλογικά σε θέσεις για τη δημιουργία επαρκούς αυξητικού χώρου για την αποτελεσματικότερη κατά πάχος αύξηση των ατόμων Οξυάς. Αφαίρεση 10% του ξυλαποθέματος στην Πεύκη, Ελάτη, Δρυ και Οξυά. Αναγεννητικές υλοτομίες με τη δημιουργία υπόσκιων υλοτομιών έκτασης περίπου 1 στρ., στις επιφάνειες της συστάδας που αναπτύσσονται αυξητικά ώριμες ενώσεις και παρατηρείται συσσώρευση ξυλώδους κεφαλαίου στην ανώτερη βαθμίδα διαμέτρου . Απομάκρυνση των ατόμων μαύρης πεύκης που υπερβαίνουν την ώριμη προς υλοτομία διάμετρο του είδους (>45 εκ.). Αναμόχλευση του εδάφους με μηχανικά μέσα όπου αυτό είναι εφικτό για ευνόηση της αναγέννησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2014-2023
	Ο.	2,27	1-130		161,00	0,00	10,73	0,00	0,00		
	Ε.				5,00	0,00	2,50	0,00	0,00		
	Δ.				48,00	0,00	19,67	0,00	0,00		
5β	Μ.Π.	1,43	1-117	Σπερ. Υποκηπ. Και κατά θέσεις κηπ.	858,00	0,00	13,30	0,00	0,00	Μαύρη πεύκη με διάσπαρτα άτομα Δρυός και πλούσιο υπόροφο απο νεαρή Δρύ-Γαύρο και δενδρύλλια Μ. Πεύκης. Ποιότητα κορμών καλή, υγεία σταθερή. Καλή ποιότητα, για αραιώσεις κατά θέσεις. Παχυμετρηθείσα επιφάνεια: 1 επιφάνειες του 1 στρέμματος και οπτική εκτίμηση. Προτείνονται: Καλλιεργητικές υλοτομίες γύρω από νεοφυτείες- πυκνοφυτείες και νεαρούς κορμούς, με τέτοια ένταση ώστε ο βαθμός συγκόμωσης να μην κατέρχεται του υπάρχοντος, με σκοπό τη ποιοτική βελτίωση του ξυλαποθέματος. Οι επεμβάσεις στην Πεύκη θα γίνουν κατά κύριο λόγο στην ΙΙ κλάση διαμέτρων και στην Οξυά στην Ι. Εξυγιαντικές υλοτομίες με απομάκρυνση(αρνητική επιλογή) όλων των στρεβλών, καχεκτικών, κακόμορφων και άρρωστων ατόμων μαύρης πεύκης και γενικότερα ατόμων που εμποδίζουν την ομαλή ανάπτυξη των υγιών και καλλίμορφων ατόμων. Απομάκρυνση των γηραιών δέντρων που τυχόν υπάρχουν γύρω από νεοφυτείες- πυκνοφυτείες και νεαρούς κορμούς προς ευνόηση αυτών. Αναγωγή της	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2014-2023
	Ο.				11,00	0,00	11,00	0,00	0,00		
	Δ.				18,00	0,00	18,00	0,00	0,00		

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας /ha	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
										Δρυός με διενέργεια καλλιεργητικών υλοτομιών, διατήρηση της μείξης με την Πεύκη. Αφαίρεση 10% του ξυλαποθέματος στην Πεύκη, Οξυά και στη Δρυ. Αναγεννητικές υλοτομίες με τη δημιουργία υπόσκιων υλοτομιών έκτασης περίπου 1 στρ., στις επιφάνειες της συστάδας που αναπτύσσονται αυξητικά ώριμες ενώσεις και παρατηρείται συσσώρευση ξυλώδους κεφαλαίου στην ανώτερη βαθμίδα διαμέτρου . Απομάκρυνση των ατόμων μαύρης πεύκης που υπερβαίνουν την ώριμη προς υλοτομία διάμετρο του είδους (>45 εκ.). Αναμόχλευση του εδάφους με μηχανικά μέσα όπου αυτό είναι εφικτό για ευνόηση της αναγέννησης. Απαγόρευση βόσκησης.	
5γ	Μ.Π.	1,5	1-105	Σπερ. Υποκηπ. Και κατά θέσεις κηπ.	2.599,00	955,00	129,95	47,75	36,74	Μαύρη Πεύκη, Δρύς, Ελάτη κ.α. Ποιότητα κορμών καλή έως πολύ καλή, υγεία σταθερή. Το ξυλώδες κεφάλαιο παρουσιάζεται πιο συγκροτημένο στα άναντη της συστάδας. Παχυμετρηθείσα επιφάνεια : 1 επιφάνεια του 1 στρέμματος και οπτική εκτίμηση. Προτείνονται: Καλλιεργητικές υλοτομίες γύρω από νεοφυτείες- πυκνοφυτείες και νεαρούς κορμούς, με τέτοια ένταση ώστε ο βαθμός συγκόμωσης να μην κατέρχεται του υπάρχοντος, με σκοπό τη ποιοτική βελτίωση του ξυλαποθέματος. Οι επεμβάσεις στην Πεύκη θα γίνουν κατά κύριο λόγο στην ΙΙ και ΙΙΙ κλάση διαμέτρων. Εξυγιαντικές υλοτομίες με απομάκρυνση(αρνητική επιλογή) όλων των στρεβλών, καχεκτικών , κακόμορφων και άρρωστων ατόμων μαύρης πεύκης και γενικότερα ατόμων που εμποδίζουν την ομαλή ανάπτυξη των υγιών και καλλίμορφων ατόμων. Απομάκρυνση των γηραιών δέντρων που τυχόν υπάρχουν γύρω από νεοφυτείες- πυκνοφυτείες και νεαρούς κορμούς προς ευνόηση αυτών. Αναγωγή της Δρυός με διενέργεια καλλιεργητικών υλοτομιών, διατήρηση της μείξης με την Πεύκη. Αφαίρεση 18% του ξυλαποθέματος στην Πεύκη και στη Δρυ.Αναγεννητικές υλοτομίες με τη δημιουργία υπόσκιων υλοτομιών έκτασης περίπου 1 στρ., στις επιφάνειες της συστάδας που αναπτύσσονται αυξητικά ώριμες ενώσεις και παρατηρείται συσσώρευση ξυλώδους κεφαλαίου στην ανώτερη βαθμίδα διαμέτρου . Απομάκρυνση των ατόμων μαύρης πεύκης που υπερβαίνουν την ώριμη προς υλοτομία διάμετρο του είδους (>45 εκ.). Αναμόχλευση του εδάφους με μηχανικά μέσα όπου αυτό είναι εφικτό για ευνόηση της αναγέννησης. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2014-2023
	Δ.				320,00	0,00	32,69	0,00	0,00		
5δ	Μ.Π.	0,9	5-95	Σπερ. Υποκηπ. Και κατά θέσεις κηπ.	9.420,00	5.069,00	152,75	82,20	53,81	Μ.Πεύκη & Δρυς και κατά θέσεις διαμορφωμένος υπόροφος από Γαύρο, Οστρυά και Φράξο. Τα δευτερεύοντα αυτά είδη δεν συμμετέχουν στο λήμμα της συστάδας. Η υγεία των κορμών είναι γενικά καλή, λίγα άτομα παρουσίασαν κακομορφίες. Επικράτηση της κατώτερης κυρίως κλάσης διαμέτρων. Αρκετά μεγάλα διάκενα σε όλη τη συστάδα. Σημάδια υπερβόσκησης. Εμφάνιση κατά θέσεις πλατύφυλλων ειδών (οστρυά, γαύρος, λεπτοκαρυά κ.α.) εντός της συστάδας. Παχυμετρηθείσα επιφάνεια : 2 επιφάνειες των 1.5 & 1 στρεμμάτων και 1 επιφάνεια του 0.5 στρέμματος και οπτική εκτίμηση. Προτείνονται: Η επιδιωκτέα δασοπονική μορφή, η οποία θα προκύψει μετά τη λήψη των προτεινόμενων διαχειριστικών επεμβάσεων θα είναι η σπερμοφυής υποκηπευτή, με σκοπό την εξυπηρέτηση των δασοκομικών απαιτήσεων της μαύρης πεύκης και της δρυός, την απαλοιφή της τυχόν ακανονιστίας της συστάδας, την εκμετάλλευση της μέγιστης τεχνικής ικανότητας του είδους για παραγωγή ξυλείας και τη βελτίωση και προστασία του δάσους. Απομάκρυνση όλων των ατόμων πλατυφύλλων ειδών από τη συστάδα (οστρυά, γαύρος, κουμαριά, πουρνάρι κ.α.). Διατήρηση και ευνόηση των ευγενών πλατυφύλλων ειδών (σφένδαμος, φράξος, φλαμουριά) με σκοπό τη μελλοντική παραγωγή πολύτιμου ξύλου αλλά και για εδαφοβελτιωτικούς σκοπούς. Διατήρηση επίσης των μεμονωμένων ατόμων ελάτης και οξυάς που αναπτύσσονται εντός της αμιγούς συστάδας μαύρης πεύκης και της δρυός. Αναγεννητικές υλοτομίες με τη δημιουργία υπόσκιων υλοτομιών έκτασης περίπου 1 στρ., στις επιφάνειες της συστάδας που αναπτύσσονται αυξητικά ώριμες ενώσεις και παρατηρείται συσσώρευση ξυλώδους κεφαλαίου στην ανώτερη βαθμίδα διαμέτρου . Απομάκρυνση των ατόμων μαύρης πεύκης που υπερβαίνουν την ώριμη προς υλοτομία διάμετρο του είδους (>45 εκ.). Αναμόχλευση του εδάφους με μηχανικά μέσα όπου αυτό είναι εφικτό για ευνόηση της αναγέννησης. Απομάκρυνση όλων των στρεβλών, καχεκτικών , κακόμορφων και άρρωστων ατόμων μαύρης πεύκης και γενικότερα ατόμων που εμποδίζουν την ομαλή ανάπτυξη των υγιών και καλλίμορφων ατόμων. Απομάκρυνση των γηραιών δέντρων που τυχόν υπάρχουν γύρω από νεοφυτείες- πυκνοφυτείες και νεαρούς κορμούς προς ευνόηση αυτών. Διενέργεια καλλιεργητικών υλοτομιών στις παραπάνω θέσεις (γύρω από νεοφυτείες- πυκνοφυτείες και νεαρούς κορμούς), με τέτοια ένταση ώστε ο βαθμός συγκόμωσης να μην κατέρχεται του 0,6-0,7, με σκοπό τη ποιοτική βελτίωση του ξυλαποθέματος. Το ποσοστό του λήμματος για τη μαύρη πεύκη δεν θα υπερβαίνει το 8% του ξυλαποθέματος. Οι	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2014-2023
	Δ.		10-30		165,00	0,00	2,68	0,00	0,00		

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm	Συνολικο ξυλαπόθεμα συστάδας / ha	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
										καλλιεργητικές υλοτομίες της δρυός περιλαμβάνουν εξυγιαντικές υλοτομίες με απομάκρυνση όλων των γηραιών, άρρωστων, κακόμορφων, στρεβλών κ.λ.π. ατόμων, καθαρισμούς στις νεοφυτείες και στις πυκνοφυτείες και εξευγενιστικές αραιώσεις στα κορμπόδια και αργότερα στους κορμούς. Το ποσοστό του λήμματος για τη δρυ δεν θα υπερβαίνει το 8% του ξυλαποθέματος. Απαγόρευση βόσκησης.	
6α	Μ.Π.	1,07	1-115	Σπερ. Υποκτηπ. Και κατά θέσεις κηπ.	1.633,00	0,00	19,01	0,00	0,00	Μαύρη πεύκη και Γαύρος. Γενική κατάσταση: Μέτρια. Άτομα μικρών διαστάσεων, για επιλογικές υλοτομίες – καθαρισμούς. Παχυμετρηθείσα επιφάνεια : 1 επιφάνειες του 1 στρέμματος και οπτική εκτίμηση. Προτείνονται: Καλλιεργητικές υλοτομίες γύρω από νεοφυτείες- πυκνοφυτείες και νεαρούς κορμούς, με τέτοια ένταση ώστε ο βαθμός συγκόμωσης να μην κατέρχεται του υπάρχοντος, με σκοπό τη ποιοτική βελτίωση του ξυλαποθέματος. Οι επεμβάσεις στην Πεύκη θα γίνουν κατά κύριο λόγο στην Ι και ΙΙ κλάση διαμέτρων. Εξυγιαντικές υλοτομίες με απομάκρυνση(αρνητική επιλογή) όλων των στρεβλών, καχεκτικών , κακόμορφων και άρρωστων ατόμων μαύρης πεύκης και γενικότερα ατόμων που εμποδίζουν την ομαλή ανάπτυξη των υγιών και καλλίμορφων ατόμων. Απομάκρυνση των γηραιών δέντρων που τυχόν υπάρχουν γύρω από νεοφυτείες- πυκνοφυτείες και νεαρούς κορμούς προς ευνόηση αυτών. Αναγωγή της Δρυός με διενέργεια καλλιεργητικών υλοτομιών, διατήρηση της μείξης με την Πεύκη. Αφαίρεση 8% του ξυλαποθέματος στην Πεύκη και 10% στη Δρυ. Αναγεννητικές υλοτομίες με τη δημιουργία υπόσκιων υλοτομιών έκτασης περίπου 1 στρ., στις επιφάνειες της συστάδας που αναπτύσσονται αυξητικά ώριμες ενώσεις και παρατηρείται συσσώρευση ξυλώδους κεφαλαίου στην ανώτερη βαθμίδα διαμέτρου . Απομάκρυνση των ατόμων μαύρης πεύκης που υπερβαίνουν την ώριμη προς υλοτομία διάμετρο του είδους (>45 εκ.). Αναμόχλευση του εδάφους με μηχανικά μέσα όπου αυτό είναι εφικτό για ευνόηση της αναγέννησης. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2014-2023
	Δ.				414,00	0,00	16,97	0,00	0,00		
6β	Μ.Π.	1,02	1-120	Σπερ. Υποκτηπ. Και κατά θέσεις κηπ.	7.794,00	7.794,00	106,48	106,48	100,00	Δρύς (20%), Οστράα (60%), Μαύρη Πεύκη (20%).Γενική κατάσταση: Μέτρια έως καλή. Μικρών έως μέτριων διαστάσεων. Παχυμετρηθείσα επιφάνεια : 2 επιφάνειες του 1 στρέμματος και οπτική εκτίμηση. Προτείνονται: Η επιδιωκτέα δασοπονική μορφή, η οποία θα προκύψει μετά τη λήψη των προτεινόμενων διαχειριστικών επεμβάσεων θα είναι η σπερμοφυής υποκτηπευτή και για τα δύο είδη που αναπτύσσονται στη συστάδα. Αναγεννητικές υλοτομίες με τη δημιουργία υπόσκιων υλοτομιών έκτασης περίπου 1 στρ., στις επιφάνειες της συστάδας που αναπτύσσονται αυξητικά ώριμες ενώσεις και παρατηρείται συσσώρευση ξυλώδους κεφαλαίου στην ανώτερη βαθμίδα διαμέτρου για τη μαύρη πεύκη. Απομάκρυνση των ατόμων μαύρης πεύκης που υπερβαίνουν την ώριμη προς υλοτομία διάμετρο του είδους (>45 εκ.). Αναμόχλευση του εδάφους με μηχανικά μέσα όπου αυτό είναι εφικτό για ευνόηση της αναγέννησης. Διενέργεια καλλιεργητικών υλοτομιών στις παραπάνω θέσεις (γύρω από νεοφυτείες- πυκνοφυτείες και νεαρούς κορμούς), με τέτοια ένταση ώστε ο βαθμός συγκόμωσης να μην κατέρχεται του υπάρχοντος, με σκοπό τη ποιοτική βελτίωση του ξυλαποθέματος. Το ποσοστό του λήμματος για τη μαύρη πεύκη δεν θα υπερβαίνει το 8% του ξυλαποθέματος. Απομάκρυνση όλων των ατόμων αιφυλλων πλατυφύλλων ειδών από τη συστάδα (κουμαριά, πουρνάρι, άρκευθος κ.α.). Διατήρηση και ευνόηση των ευγενών πλατυφύλλων ειδών (σφένδαμος, φράξος, φλαμουριά) με σκοπό τη μελλοντική παραγωγή πολύτιμου ξύλου αλλά και για εδαφοβελτιωτικούς σκοπούς. Διατήρηση επίσης των μεμονωμένων ατόμων ελάτης και οξυάς που τυχόν αναπτύσσονται εντός της αμιγούς συστάδας μαύρης πεύκης και της δρυός. Απομάκρυνση όλων των στρεβλών, καχεκτικών , κακόμορφων και άρρωστων ατόμων μαύρης πεύκης και γενικότερα ατόμων που εμποδίζουν την ομαλή ανάπτυξη των υγιών και καλλίμορφων ατόμων. Απομάκρυνση των γηραιών δέντρων που τυχόν υπάρχουν γύρω από νεοφυτείες- πυκνοφυτείες και νεαρούς κορμούς προς ευνόηση αυτών. Στο πρεμνοφυές ομήλικο δάσος δρυός θα γίνει αναγωγή του σε σπερμοφυές με καλλιεργητικές υλοτομίες σε τόση έκταση ώστε η συγκόμωση να μη κατέρχεται του 0.45-0.6 και αποψιλωτικές υλοτομίες με παρακράτηση 2-4 ατόμων/στρέμμα στις επιφάνειες της δρυός που έχουν θιγεί από παράνομες υλοτομίες και υπερβοσκήσεις με σκοπό την ανόρθωση του ξυλαποθέματος και στη συνέχεια την αναγωγή του. Το λήμμα για τη δρυ θα ανέλθει σε ποσοστό 8% του ξυλαποθέματος. Οι καλλιεργητικές υλοτομίες της δρυός περιλαμβάνουν εξυγιαντικές υλοτομίες με απομάκρυνση όλων των γηραιών, άρρωστων, κακόμορφων, στρεβλών κ.λ.π. ατόμων, καθαρισμούς στις νεοφυτείες και στις πυκνοφυτείες και εξευγενιστικές αραιώσεις στα κορμύδια και αργότερα στους κορμούς. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2014-2023
	Δ.				9.844,00	0,00	61,30	0,00	0,00		

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας /ha	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
7α	Μ.Π. + Ε.	0,7-0,9	90	Σπερ. Υποκ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Μαύρη Πεύκη σε μείξη με Ελάτη(8,89Ha).Ποιοτική και υγιεινή κατάσταση σπερμοβλαστημάτων καλή με καλή ανάπτυξη. Ζημιές δεν παρατηρήθηκαν. Λόγω των ισχυρότατων κλίσεων είναι αδύνατη η υλοτομία και ως εκ τούτου τίθεται εκτός καλλιέργειας. Εκτός καλλιέργειας την παρούσα 10ετία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2014-2023
7β	Ε.+ Ο.	0,7-0,9	90	Σπερ. Κηπ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ελάτη και σε θέση με υψόμετρο 1700μ. παρατηρήθηκε και ομάδα Οξυάς(17,83Ha). Ποιοτική και υγιεινή κατάσταση σπερμοβλαστημάτων καλή με καλή ανάπτυξη. Ζημιές δεν παρατηρήθηκαν. Λόγω των ισχυρότατων κλίσεων είναι αδύνατη η υλοτομία και ως εκ τούτου τίθεται εκτός καλλιέργειας. Εκτός καλλιέργειας την παρούσα 10ετία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2014-2023
7γ	Μ.Π. + Ε.	0,7-0,9	90	Σπερ. Υποκηπ. Και κατά θέσεις κηπ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Μαύρη Πεύκη σε μείξη με Ελάτη(22,82Ha).Ποιοτική και υγιεινή κατάσταση σπερμοβλαστημάτων καλή με καλή ανάπτυξη. Ζημιές δεν παρατηρήθηκαν. Λόγω των ισχυρότατων κλίσεων είναι αδύνατη η υλοτομία και ως εκ τούτου τίθεται εκτός καλλιέργειας. Εκτός καλλιέργειας την παρούσα 10ετία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2014-2023
8α	Μ.Π. + Ε.	0,7-0,9	90	Σπερ. Υποκηπ. Και κατά θέσεις κηπ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Μαύρη Πεύκη σε μείξη με Ελάτη(8,89Ha) με υπόροφο από Γαύρο και Πυξάρι. Ποιοτική και υγιεινή κατάσταση σπερμοβλαστημάτων καλή με καλή ανάπτυξη. Ζημιές δεν παρατηρήθηκαν. Λόγω των ισχυρότατων κλίσεων είναι αδύνατη η υλοτομία και ως εκ τούτου τίθεται εκτός καλλιέργειας. Εκτός καλλιέργειας την παρούσα 10ετία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2014-2023
8β	Μ.Π.	0,7-1,1	90	Σπερ. Υποκηπ. Και κατά θέσεις κηπ.	1.796,00	1.316,00	309,12	226,51	73,27	Μαύρη Πεύκη(5,81Ha).Ποιοτική και υγιεινή κατάσταση σπερμοβλαστημάτων καλή με καλή ανάπτυξη. Ζημιές δεν παρατηρήθηκαν. Εκτός καλλιέργειας την παρούσα 10ετία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2014-2023
9	Μ.Π.	0,7-1,1	100	Σπερ. Υποκηπ. Και κατά θέσεις κηπ.	6.581,00	4.307,00	322,12	210,82	65,45	Μαύρη Πεύκη αμιγής(20,43Ha) με αραιή παρουσία από πυξάρι και κέδρο. Ποιοτική και υγιεινή κατάσταση σπερμοβλαστημάτων καλή με καλή ανάπτυξη. Ζημιές δεν παρατηρήθηκαν. Εκτός καλλιέργειας την παρούσα 10ετία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2014-2023
10α	Μ.Π.	0,5	5-75	Σπερ. Υποκηπ. Και κατά θέσεις κηπ. Σχεδόν ομήλ.	1.436,00	289,00	132,59	26,69	20,13	Μαύρη Πεύκη αμιγής. Η υγεία των κορμών είναι γενικά καλή, λίγα άτομα παρουσίασαν κακομορφίες. Επικράτηση της κατώτερης κυρίως κλάσης διαμέτρων. Αρκετά μεγάλα διάκενα σε όλη τη συστάδα. Σημάδια υπερβόσκησης. Παχυμετρηθείσα επιφάνεια : I επιφάνεια του I στρέμματος και οπτική εκτίμηση. Προτείνονται: Καλλιεργητικές υλοτομίες γύρω από νεοφυτείες- πυκνοφυτείες και νεαρούς κορμούς, με τέτοια ένταση ώστε ο βαθμός συγκόμωσης να μην κατέρχεται του υπάρχοντος, με σκοπό τη ποιοτική βελτίωση του ξυλαποθέματος. Οι επεμβάσεις στην Πεύκη θα γίνουν κατά κύριο λόγο στην I και II κλάση διαμέτρων. Εξυγιαντικές υλοτομίες με απομάκρυνση(αρνητική επιλογή) όλων των στρεβλών, καχεκτικών , κακόμορφων και άρρωστων ατόμων μαύρης πεύκης και γενικότερα ατόμων που εμποδίζουν την ομαλή ανάπτυξη των υγιών και καλλίμορφων ατόμων. Απομάκρυνση των γηραιών δέντρων που τυχόν υπάρχουν γύρω από νεοφυτείες- πυκνοφυτείες και νεαρούς κορμούς προς ευνόηση αυτών. Αφαίρεση 8% του ξυλαποθέματος. Αναγεννητικές υλοτομίες με τη δημιουργία υπόσκικων υλοτομιών έκτασης περίπου 1 στρ., στις επιφάνειες της συστάδας που αναπτύσσονται αυξητικά ώριμες ενώσεις και παρατηρείται συσσώρευση ξυλώδους κεφαλαίου στην ανώτερη βαθμίδα διαμέτρου . Απομάκρυνση των ατόμων μαύρης πεύκης που υπερβαίνουν την ώριμη προς υλοτομία διάμετρο του είδους (>45 εκ.). Αναμόχλευση του εδάφους με μηχανικά μέσα όπου αυτό είναι εφικτό για ευνόηση της αναγέννησης. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2014-2023
10β	Μ.Π.	0,4	5-80	Σπερ. Υποκηπ. Και κατά θέσεις κηπ. Σχεδόν ομήλ.	8.509,00	4.577,00	189,51	101,94	53,79	Μ.Πεύκη με αρκετά διάσπαρτα άτομα Δρυός.Η συστάδα είναι σε ικανοποιητική κατάσταση με παρουσία όλων των κλάσεων και ηλικιών και αρκετά καλή από άποψη υγιεινής του ξυλώδους κεφαλαίου. Σε καλή κατάσταση από άποψη αναγέννησης. Παρουσιάστηκαν μερικές κακομορφίες(διχαλώσεις) κυρίως σε άτομα μέσης ηλικίας.Υπαρξη αμιγούς κηλίδας αναγέννησης μαύρης πεύκης στο στάδιο της νεοφυτείας, η οποία καλύπτει επιφάνεια περίπου 2,5 στρεμμάτων. Παχυμετρηθείσα επιφάνεια : 1 επιφάνεια των 2 στρεμμάτων και οπτική εκτίμηση. Προτείνονται: Καλλιεργητικές υλοτομίες γύρω από νεοφυτείες- πυκνοφυτείες και νεαρούς κορμούς, με τέτοια ένταση ώστε ο βαθμός συγκόμωσης να μην κατέρχεται του υπάρχοντος, με σκοπό τη ποιοτική βελτίωση του ξυλαποθέματος. Οι επεμβάσεις στην Πεύκη θα γίνουν σε όλες τις κλάσεις διαμέτρων. Εξυγιαντικές υλοτομίες με απομάκρυνση(αρνητική επιλογή) όλων των στρεβλών, καχεκτικών , κακόμορφων και άρρωστων ατόμων μαύρης πεύκης και γενικότερα ατόμων που εμποδίζουν την ομαλή ανάπτυξη των υγιών και καλλίμορφων ατόμων. Απομάκρυνση των γηραιών δέντρων που τυχόν υπάρχουν γύρω από νεοφυτείες- πυκνοφυτείες και νεαρούς κορμούς προς ευνόηση αυτών. Αφαίρεση 8% του ξυλαποθέματος. Αναγεννητικές υλοτομίες με τη δημιουργία υπόσκικων υλοτομιών έκτασης	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2014-2023

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας /ha	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
										περίπου 1 στρ., στις επιφάνειες της συστάδας που αναπτύσσονται αυξητικά ώριμες ενώσεις και παρατηρείται συσσώρευση ξυλώδους κεφαλαίου στην ανώτερη βαθμίδα διαμέτρου . Απομάκρυνση των ατόμων μαύρης πεύκης που υπερβαίνουν την ώριμη προς υλοτομία διάμετρο του είδους (>45 εκ.). Αναμόχλευση του εδάφους με μηχανικά μέσα όπου αυτό είναι εφικτό για ευνόηση της αναγέννησης. Απαγόρευση βόσκησης.	
10γ	Δ.	0,5-1	1-35	Σπερ. Υποκηπ. Και κατά θέσεις κηπ., στα ανάντη σχεδόν ομήλ.	375,00	0,00	10,33	0,00	0,00	Μ.Πεύκη σε μείξη με Δρυ Κακή στο μεγαλύτερο μέρος της έκτασης. Παρατηρήθηκαν αρκετά κακόμορφα άτομα κυρίως διχαλωτά και στρεβλά. Η Δρυς έχει έντονη παρουσία προς το ανατολικά τμήμα της συστάδας όπου παρουσιάζεται κατ' άτομο, σε συδενδρίες ή ακόμα και σε ομάδες ενώ προς τα ανάντη η επικράτηση της Πεύκης είναι φανερή. Σημάδια έντονης βόσκησης παρατηρήθηκαν στα χαμηλότερα υψόμετρα της συστάδας. Προς τα ανάντη της συστάδας το ξυλαπόθεμα παρουσιάζεται πιο συγκροτημένο. Ύπαρξη αμιγούς κηλίδας αναγέννησης μαύρης πεύκης στο στάδιο της νεοφυτείας, η οποία καλύπτει επιφάνεια περίπου 4 στρεμμάτων. Παχυμετρηθείσα επιφάνεια : 1 επιφάνεια των 1,5 στρεμμάτων και οπτική εκτίμηση. Προτείνονται: Καλλιεργητικές υλοτομίες γύρω από νεοφυτείες- πυκνοφυτείες και νεαρούς κορμούς, με τέτοια ένταση ώστε ο βαθμός συγκόμωσης να μην κατέρχεται του υπάρχοντος, με σκοπό τη ποιοτική βελτίωση του ξυλαποθέματος. Οι επεμβάσεις στην Πεύκη θα γίνουν κατά κύριο λόγο στην II και III κλάση διαμέτρων. Εξυγιαντικές υλοτομίες με απομάκρυνση(αρνητική επιλογή) όλων των στρεβλών, καχεκτικών , κακόμορφων και άρρωστων ατόμων μαύρης πεύκης και γενικότερα ατόμων που εμποδίζουν την ομαλή ανάπτυξη των υγιών και καλλίμορφων ατόμων. Απομάκρυνση των γηραιών δέντρων που τυχόν υπάρχουν γύρω από νεοφυτείες- πυκνοφυτείες και νεαρούς κορμούς προς ευνόηση αυτών. Αναγωγή της Δρυός με διενέργεια καλλιεργητικών υλοτομιών, διατήρηση της μείξης με την Πεύκη. Αφαίρεση 8% του ξυλαποθέματος στην Πεύκη και 8% στη Δρυ. Αναγεννητικές υλοτομίες με τη δημιουργία υπόσκιων υλοτομιών έκτασης περίπου 1 στρ., στις επιφάνειες της συστάδας που αναπτύσσονται αυξητικά ώριμες ενώσεις και παρατηρείται συσσώρευση ξυλώδους κεφαλαίου στην ανώτερη βαθμίδα διαμέτρου . Απομάκρυνση των ατόμων μαύρης πεύκης που υπερβαίνουν την ώριμη προς υλοτομία διάμετρο του είδους (>45 εκ.). Αναμόχλευση του εδάφους με μηχανικά μέσα όπου αυτό είναι εφικτό για ευνόηση της αναγέννησης. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2014-2023
	Μ.Π.		1-120		2.696,00	1.714,00	74,25	47,20	63,58		
11α	Μ.Π.	0,65	10-100	Σπερ. Υποκηπ. Και κατά θέσεις κηπ., σχεδόν ομήλ.	3.126,00	1.369,00	195,38	85,56	43,79	Μ.Πεύκη. Η Δρυς παρουσιάζει σποραδική εμφάνιση με τη μορφή διάσπαρτων ατόμων μέσα στην αμιγή συστάδα της μαύρης πεύκης. Η υγεία των κορμών είναι γενικά καλή, λίγα άτομα παρουσίασαν κακομορφίες. Επικράτηση της κατώτερης κυρίως κλάσης διαμέτρων. Αρκετά μεγάλα διάκενα σε όλη τη συστάδα. Σημάδια υπερβόσκησης. Σποραδική εμφάνιση της δρυός εντός της συστάδας. Ύπαρξη αμιγούς κηλίδας αναγέννησης μαύρης πεύκης στο στάδιο των νεαρών κορμών, η οποία καλύπτει επιφάνεια περίπου 3-4 στρεμμάτων. Παχυμετρηθείσα επιφάνεια : 1 επιφάνεια του 1 στρεμμάτος και οπτική εκτίμηση. Προτείνονται: Η επιδιωκτέα δασοπονική μορφή, η οποία θα προκύψει μετά τη λήψη των προτεινόμενων διαχειριστικών επεμβάσεων θα είναι η υποκηπευτή, με σκοπό την εξυπηρέτηση των δασοκομικών απαιτήσεων της μαύρης πεύκης, την απαλοιφή της τυχόν ακανονιστίας της συστάδας, την εκμετάλλευση της μέγιστης τεχνικής ικανότητας του είδους για παραγωγή ξυλείας και τη βελτίωση και προστασία του δάσους. Διατήρηση των ατόμων της δρυός εντός της συστάδας για εξυπηρέτηση δασοκομικών σκοπών. Διατήρηση και ευνόηση των ευγενών πλατυφύλλων ειδών (σφένδαμος, φράξος, φλαμουριά) με σκοπό τη μελλοντική παραγωγή πολύτιμου ξύλου αλλά και για εδαφοβελτιωτικούς σκοπούς. Διατήρηση επίσης των μεμονωμένων ατόμων ελάτης που τυχόν αναπτύσσονται εντός της αμιγούς συστάδας μαύρης πεύκης. Αναγεννητικές υλοτομίες με τη δημιουργία υπόσκιων υλοτομιών έκτασης περίπου 1 στρ., στις επιφάνειες της συστάδας που αναπτύσσονται αυξητικά ώριμες ενώσεις και παρατηρείται συσσώρευση ξυλώδους κεφαλαίου στην ανώτερη βαθμίδα διαμέτρου . Απομάκρυνση των ατόμων μαύρης πεύκης που υπερβαίνουν την ώριμη προς υλοτομία διάμετρο του είδους (>45 εκ.). Αναμόχλευση του εδάφους με μηχανικά μέσα όπου αυτό είναι εφικτό για ευνόηση της αναγέννησης. Απομάκρυνση όλων των στρεβλών, καχεκτικών , κακόμορφων και άρρωστων ατόμων μαύρης πεύκης και γενικότερα ατόμων που εμποδίζουν την ομαλή ανάπτυξη των υγιών και καλλίμορφων ατόμων. Απομάκρυνση των γηραιών δέντρων που τυχόν υπάρχουν γύρω από νεοφυτείες- πυκνοφυτείες και νεαρούς κορμούς προς ευνόηση αυτών. Διενέργεια καλλιεργητικών υλοτομιών στις παραπάνω θέσεις (γύρω από νεοφυτείες- πυκνοφυτείες και νεαρούς	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2014-2023

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm	Συνολικο ξυλαπόθεμα συστάδας / ha	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
										κορμούς), με τέτοια ένταση ώστε ο βαθμός συγκόμωσης να μην κατέρχεται του 0.6-0.7, με σκοπό τη ποιοτική βελτίωση του ξυλαποθέματος. Το λήμμα για τη μούρη πεύκη θα ανέλθει σε ποσοστό 8% του συνολικού ξυλαποθέματος. Απαγόρευση βόσκησης.	
11β	Μ.Π.	1,44	1-117	Σπερ. Υποκηπ. Και κατά θέσεις κηπ.	3.558,00	1.071,00	82,08	24,71	30,10	Μαύρη Πεύκη (80%), Οστρυά (15%), Δρύς (5%). Γενική κατάσταση: Μέτρια έως κακή, χρήζουν επιλογικής υλοτομίας τα πεύκα μικρών διαμέτρων. Παχυμετρηθείσα επιφάνεια : 1 επιφάνεια 1 στρέμματος και οπτική εκτίμηση. Προτείνονται: Καλλιεργητικές υλοτομίες γύρω από νεοφυτείες- πυκνοφυτείες και νεαρούς κορμούς, με τέτοια ένταση ώστε ο βαθμός συγκόμωσης να μην κατέρχεται του υπάρχοντος, με σκοπό τη ποιοτική βελτίωση του ξυλαποθέματος. Οι επεμβάσεις στην Πεύκη θα γίνουν κατά κύριο λόγο στην ΙΙ κλάση διαμέτρων. Εξυγιαντικές υλοτομίες με απομάκρυνση(αρνητική επιλογή) όλων των στρεβλών, καχεκτικών , κακόμορφων και άρρωστων ατόμων μούρης πεύκης και γενικότερα ατόμων που εμποδίζουν την ομαλή ανάπτυξη των υγιών και καλλίμορφων ατόμων. Απομάκρυνση των γηραιών δέντρων που τυχόν υπάρχουν γύρω από νεοφυτείες- πυκνοφυτείες και νεαρούς κορμούς προς ευνόηση αυτών. Αναγωγή της Δρυός με διενέργεια καλλιεργητικών υλοτομιών, διατήρηση της μείξης με την Πεύκη. Αφαίρεση 8% του ξυλαποθέματος στην Πεύκη και στη Δρυ. Αναγεννητικές υλοτομίες με τη δημιουργία υπόσκιων υλοτομιών έκτασης περίπου 1 στρ., στις επιφάνειες της συστάδας που αναπτύσσονται αυξητικά ώριμες ενώσεις και παρατηρείται συσσώρευση ξυλώδους κεφαλαίου στην ανώτερη βαθμίδα διαμέτρου . Απομάκρυνση των ατόμων μούρης πεύκης που υπερβαίνουν την ώριμη προς υλοτομία διάμετρο του είδους (>45 εκ.). Αναμόχλευση του εδάφους με μηχανικά μέσα όπου αυτό είναι εφικτό για ευνόηση της αναγέννησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2014-2023
	Δ.	2,27			36,00	0,00	3,46	0,00	0,00		
11γ	Μ.Π.	1,1	1-115	Σπερ. Υποκηπ. Έως κηπ. Κατά θέσεις	1.113,00	384,00	69,00	23,81	34,50	Μ. Πεύκη και ελάχιστη Δρύ , Ελάτη και Οξυά . Η υγεία των κορμών είναι γενικά καλή, λίγα άτομα παρουσίασαν κακομορφίες. Επικράτηση της κατώτερης και μέσης κυρίως κλάσης διαμέτρων. Αρκετά μικροδιάκενα σε όλη τη συστάδα. Σημάδια υπερβόσκησης. Παχυμετρηθείσα επιφάνεια : 1 επιφάνεια του ενός στρέμματος. Εκτός καλλιέργειας την παρούσα 10ετία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2014-2023
12α	Μ.Π.	0,4-0,8	5-85	Σπερ. Υποκηπ. Και κατά θέσεις κηπ, σχεδόν ομήλ.	220,00	0,00	3,79	0,00	0,00	Μ.Πεύκη αμιγής. Η υγεία των κορμών είναι γενικά μέτρια, αρκετά άτομα στρεβλά και διχαλωτά. Επικράτηση της κατώτερης και μέσης κυρίως κλάσης διαμέτρων. Σημάδια υπερβόσκησης. Παχυμετρηθείσα επιφάνεια : 2 επιφάνειες του 1,5 στρέμματος η καθεμία και οπτική εκτίμηση. Προτείνονται: Καλλιεργητικές υλοτομίες γύρω από νεοφυτείες- πυκνοφυτείες και νεαρούς κορμούς, με τέτοια ένταση ώστε ο βαθμός συγκόμωσης να μην κατέρχεται του υπάρχοντος, με σκοπό τη ποιοτική βελτίωση του ξυλαποθέματος. Οι επεμβάσεις στην Πεύκη θα γίνουν κατά κύριο λόγο στην ΙΙ κλάση διαμέτρων. Εξυγιαντικές υλοτομίες με απομάκρυνση(αρνητική επιλογή) όλων των στρεβλών, καχεκτικών , κακόμορφων και άρρωστων ατόμων μούρης πεύκης και γενικότερα ατόμων που εμποδίζουν την ομαλή ανάπτυξη των υγιών και καλλίμορφων ατόμων. Απομάκρυνση των γηραιών δέντρων που τυχόν υπάρχουν γύρω από νεοφυτείες- πυκνοφυτείες και νεαρούς κορμούς προς ευνόηση αυτών. Αφαίρεση 8% του ξυλαποθέματος. Αναγεννητικές υλοτομίες με τη δημιουργία υπόσκιων υλοτομιών έκτασης περίπου 1 στρ., στις επιφάνειες της συστάδας που αναπτύσσονται αυξητικά ώριμες ενώσεις και παρατηρείται συσσώρευση ξυλώδους κεφαλαίου στην ανώτερη βαθμίδα διαμέτρου . Απομάκρυνση των ατόμων μούρης πεύκης που υπερβαίνουν την ώριμη προς υλοτομία διάμετρο του είδους (>45 εκ.). Αναμόχλευση του εδάφους με μηχανικά μέσα όπου αυτό είναι εφικτό για ευνόηση της αναγέννησης. Απαγόρευση της βοσκής σύμφωνα με τις διατάξεις.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2014-2023
12β	90	1,23	1-120	Σπερ. Υποκηπ. Και κατά θέσεις κηπ.	4.390,00	3.822,00	121,10	105,43	87,06	Μαύρη Πεύκη, Δρυς και Οξυά, διάσπαρτη Οστρυά.Καλή ποιότητα, μετρίων και μεγάλων διαστάσεων άτομα, υγεία σταθερή.Παχυμετρηθείσα επιφάνεια: 1 επιφάνεια του 1 στρέμματος και οπτική εκτίμηση. Προτείνονται: Η επιδιωκτέα δασοπονική μορφή, η οποία θα προκύψει μετά τη λήψη των προτεινόμενων διαχειριστικών επεμβάσεων θα είναι η σπερμοφυής υποκηπευτή και για τα τρία είδη που αναπτύσσονται στη συστάδα. Η διαχειριστική μορφή της οξυάς είναι υποκηπευτοειδής και για την αναγωγή της προτείνονται καλλιεργητικές υλοτομίες με τέτοια ένταση ώστε ο βαθμός συγκόμωσης να μην κατέρχεται του υπάρχοντος. Στη συνέχεια διενεργούνται σπερμοδότιδες και φωτοδότιδες υλοτομίες σε θέσεις όπου υπάρχει ιδιαίτερα αναπτυγμένη αναγέννηση του είδους και οπωσδήποτε στις καλύτερες ποιότητες τύπου. Τελική διεύρυνση των αναγεννηθέντων κέντρων αναγέννησης με υπόσκιες υλοτομίες εφόσον δεν έχει	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2014-2023
	Ο.	1,4	1-115		115,00	0,00	6,96	0,00	0,00		
	Δ.				216,00	0,00	13,08	0,00	0,00		

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm	Συνολικο ξυλαπόθεμα συστάδας / ha	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
										αποληφθεί το προβλεπόμενο λήμμα. Το λήμμα για την οξυά θα ανέλθει σε ποσοστό 10% του συνολικού ξυλαποθέματος. Αναγεννητικές υλοτομίες με τη δημιουργία υπόσκιων υλοτομιών έκτασης περίπου 1 στρ., στις επιφάνεις της συστάδας που αναπτύσσονται αυξητικά ώριμες ενώσεις και παρατηρείται συσσώρευση ξυλώδους κεφαλαίου στην ανώτερη βαθμίδα διαμέτρου για τη μαύρη πεύκη. Απομάκρυνση των ατόμων μαύρης πεύκης που υπερβαίνουν την ώριμη προς υλοτομία διάμετρο του είδους (>45 εκ.). Αναμόχλευση του εδάφους με μηχανικά μέσα όπου αυτό είναι εφικτό για ευνόηση της αναγέννησης. Διενέργεια καλλιεργητικών υλοτομιών στις παραπάνω θέσεις (γύρω από νεοφυτείες- πυκνοφυτείες και νεαρούς κορμούς), με τέτοια ένταση ώστε ο βαθμός συγκόμωσης να μην κατέρχεται του 0.6-0.7, με σκοπό τη ποιοτική βελτίωση του ξυλαποθέματος. Το ποσοστό του λήμματος για τη μαύρη πεύκη δεν θα υπερβαίνει το 8% του ξυλαποθέματος. Απαγόρευση βόσκησης.	
13α	Μ.Π.	0,55-0,95	90	Σπερ. Υποκτητ. Και κατά θέσεις κητ.	3.582,00	1.134,00	85,67	27,12	31,66	Μ. Πεύκη (19,65 Ha), Μ.Πεύκη σε μίξη με Δρυ (22,16 Ha) και Οξυά σε μίξη με την Μ. Πεύκη (3,68Ha) προς το ρέμα στα καλύτερα περιβάλλοντα. Κατά θέσεις άτομα Οστρυάς. Γενική κατάσταση: Μέτρια αλλά και καλή σε αρκετές θέσεις. Παχυμετρηθείσα επιφάνεια : 4 επιφάνειες του 1 και 1,5 στρέμματος και οπτική εκτίμηση. Προτείνονται: Καλλιεργητικές υλοτομίες γύρω από νεοφυτείες- πυκνοφυτείες και νεαρούς κορμούς, με τέτοια ένταση ώστε ο βαθμός συγκόμωσης να μην κατέρχεται του υπάρχοντος, με σκοπό τη ποιοτική βελτίωση του ξυλαποθέματος. Εξυγιαντικές υλοτομίες με απομάκρυνση(αρνητική επιλογή) όλων των στρεβλών, καχεκτικών , κακόμορφων και άρρωστων ατόμων μαύρης πεύκης και γενικότερα ατόμων που εμποδίζουν την ομαλή ανάπτυξη των υγιών και καλλίμορφων ατόμων. Απομάκρυνση των γηραιών δέντρων που τυχόν υπάρχουν γύρω από νεοφυτείες- πυκνοφυτείες και νεαρούς κορμούς προς ευνόηση αυτών. Αφαίρεση 6% του ξυλαποθέματος στην Πεύκη & 10% του ξυλαποθέματος σε Δρυ και Οξυά. Αναγεννητικές υλοτομίες με τη δημιουργία υπόσκιων υλοτομιών έκτασης περίπου 1 στρ., στις επιφάνειες της συστάδας που αναπτύσσονται αυξητικά ώριμες ενώσεις και παρατηρείται συσσώρευση ξυλώδους κεφαλαίου στην ανώτερη βαθμίδα διαμέτρου . Απομάκρυνση των ατόμων μαύρης πεύκης που υπερβαίνουν την ώριμη προς υλοτομία διάμετρο του είδους (>45 εκ.). Αναμόχλευση του εδάφους με μηχανικά μέσα όπου αυτό είναι εφικτό για ευνόηση της αναγέννησης. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2014-2023
	Δ.		30		283,00	0,00	12,77	0,00	0,00		
	Ο.		40		116,00	15,00	31,52	4,08	12,93		
13β	Μ.Π.	0,6-0,9	5-140	Σπερ. Υποκτητ. Και κατά θέσεις κητ., ανομηλ.	14.629,00	12.639,00	333,77	288,36	86,40	Μ.Πεύκη σε όλη την έκταση και λίγα άτομα Ελάτης στα ανώτερα τμήματα της συστάδας. Κάποια άτομα Δρυός και Οστρυάς σε μίξη με την Πεύκη.Η υγεία των κορμών είναι γενικά μέτρια και προς τα ανώτερα τμήματα της συστάδας καλή, μερικά άτομα στρεβλά και διχαλωτά. Επικράτηση της μέσης κυρίως κλάσης διαμέτρων. Σημάδια έντονης βόσκησης σε αρκετά σημεία. Συστάδα με ικανοποιητικό ύψος ξυλαποθέματος. Ύπαρξη αμιγούς κηλίδας αναγέννησης μαύρης πεύκης στο στάδιο της νεοφυτείας, η οποία καλύπτει επιφάνεια περίπου 2 στρεμμάτων.Παχυμετρηθείσα επιφάνεια : 1 επιφάνεια των 2 στρεμμάτων και οπτική εκτίμηση. Προτείνονται: Καλλιεργητικές υλοτομίες γύρω από νεοφυτείες- πυκνοφυτείες και νεαρούς κορμούς, με τέτοια ένταση ώστε ο βαθμός συγκόμωσης να μην κατέρχεται του υπάρχοντος, με σκοπό τη ποιοτική βελτίωση του ξυλαποθέματος. Οι επεμβάσεις στην Πεύκη θα γίνουν σε όλες τις κλάσεις διαμέτρων. Εξυγιαντικές υλοτομίες με απομάκρυνση(αρνητική επιλογή) όλων των στρεβλών, καχεκτικών , κακόμορφων και άρρωστων ατόμων μαύρης πεύκης και γενικότερα ατόμων που εμποδίζουν την ομαλή ανάπτυξη των υγιών και καλλίμορφων ατόμων. Απομάκρυνση των γηραιών δέντρων που τυχόν υπάρχουν γύρω από νεοφυτείες- πυκνοφυτείες και νεαρούς κορμούς προς ευνόηση αυτών. Αφαίρεση 6% του ξυλαποθέματος. Αναγεννητικές υλοτομίες με τη δημιουργία υπόσκιων υλοτομιών έκτασης περίπου 1 στρ., στις επιφάνειες της συστάδας που αναπτύσσονται αυξητικά ώριμες ενώσεις και παρατηρείται συσσώρευση ξυλώδους κεφαλαίου στην ανώτερη βαθμίδα διαμέτρου . Απομάκρυνση των ατόμων μαύρης πεύκης που υπερβαίνουν την ώριμη προς υλοτομία διάμετρο του είδους (>45 εκ.). Αναμόχλευση του εδάφους με μηχανικά μέσα όπου αυτό είναι εφικτό για ευνόηση της αναγέννησης. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2014-2023
13γ	Μ.Π.	0,6-0,9	100	Σπερ. Υποκτητ. Και κατά θέσεις κητ.	10.851,00	6.041,00	265,31	147,70	55,67	Μαύρη Πεύκη αμιγής(40,9Ha) με διάσπαρτα άτομα Ελάτης και παρουσία κέδρου. Ποιοτική και υγιεινή κατάσταση σπερμοβλαστημάτων καλή με καλή ανάπτυξη. Ζημιές δεν παρατηρήθηκαν. Εκτός καλλιέργειας την παρούσα 10ετία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2014-2023

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας /ha	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
136	Μ.Π.	0,2-0,6	5-110	Σπερ. Υποκτηπ. Και κατά θέσεις κηπ., σχεδόν ομήλ.	9.648,00	6.068,00	201,59	126,79	62,89	Μ.Πεύκη σε όλη την έκταση, σε ένα ρέμα παρατηρήθηκε και συδενδρία Οξυάς και έντονη παρουσία Λεύκης σε ομάδες ή λόγχμες στα ρέματα. Η υγεία των κορμών είναι γενικά μέτρια και προς τα ανώτερα τμήματα της συστάδας καλή, μερικά άτομα στρεβλά και διχαλωτά. Επικράτηση της μέσης και κατώτερης κλάσης διαμέτρων. Μερικά διάκενα σε όλη τη συστάδα και γενικά μικρή συγκόμωση. Παχυμετρηθείσα επιφάνεια : 2 επιφάνειες του 1 και 1,5 στρέμματος η καθεμιά και οπτική εκτίμηση. Προτείνονται: Καλλιεργητικές υλοτομίες γύρω από νεοφυτείες- πυκνοφυτείες και νεαρούς κορμούς, με τέτοια ένταση ώστε ο βαθμός συγκόμωσης να μην κατέρχεται του υπάρχοντος, με σκοπό τη ποιοτική βελτίωση του ξυλαποθέματος. Οι επεμβάσεις στην Πεύκη θα γίνουν κατά κύριο λόγο στην ΙΙ και ΙΙΙ κλάση διαμέτρων. Εξυγιαντικές υλοτομίες με απομάκρυνση(αρνητική επιλογή) όλων των στρεβλών, καχεκτικών , κακόμορφων και άρρωστων ατόμων μαύρης πεύκης και γενικότερα ατόμων που εμποδίζουν την ομαλή ανάπτυξη των υγιών και καλλίμορφων ατόμων. Απομάκρυνση των γηραιών δέντρων που τυχόν υπάρχουν γύρω από νεοφυτείες- πυκνοφυτείες και νεαρούς κορμούς προς ευνόηση αυτών. Αφαίρεση 10% του ξυλαποθέματος. Αναγεννητικές υλοτομίες με τη δημιουργία υπόσκιων υλοτομιών έκτασης περίπου 1 στρ., στις επιφάνειες της συστάδας που αναπτύσσονται αυξητικά ώριμες ενώσεις και παρατηρείται συσσώρευση ξυλώδους κεφαλαίου στην ανώτερη βαθμίδα διαμέτρου . Απομάκρυνση των ατόμων μαύρης πεύκης που υπερβαίνουν την ώριμη προς υλοτομία διάμετρο του είδους (>45 εκ.). Αναμόχλευση του εδάφους με μηχανικά μέσα όπου αυτό είναι εφικτό για ευνόηση της αναγέννησης. Απαγόρευση της βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2014-2023
14α	Ε.	0,45-0,85	1-110	Σπερ. Υποκτηπ. Και κατά θέσεις κηπ.	2.233,00	0,00	64,93	0,00	0,00	Μ.πεύκη και Ελάτη σε μίξη. Γενική κατάσταση: Γενικά καλή. Η Ελάτη ευνοείται και η επικράτηση της στις καλύτερες ποιότητες τόπου θεωρείται δεδομένη. Η μίξη των δύο ειδών είναι ικανοποιητική. Σε αρκετά άτομα Πεύκης παρατηρήθηκαν κακομορφίες όπως στρεβλώσεις και διχαλώματα. Προς τα ανάντη η συστάδα παρουσιάζει μεγαλύτερη συνοχή και καλύτερη ανάπτυξη. Παχυμετρηθείσα επιφάνεια : 1 επιφάνεια του 1,5 στρέμματος και οπτική εκτίμηση. Προτείνονται: Καλλιεργητικές υλοτομίες γύρω από νεοφυτείες- πυκνοφυτείες και νεαρούς κορμούς, με τέτοια ένταση ώστε ο βαθμός συγκόμωσης να μην κατέρχεται του υπάρχοντος, με σκοπό τη ποιοτική βελτίωση του ξυλαποθέματος. Οι επεμβάσεις στην Πεύκη θα γίνουν κατά κύριο λόγο στην ΙΙΙ κλάση διαμέτρων και στην Ελάτη στην Ι και ΙΙ. Εξυγιαντικές υλοτομίες με απομάκρυνση(αρνητική επιλογή) όλων των στρεβλών, καχεκτικών , κακόμορφων και άρρωστων ατόμων μαύρης πεύκης και γενικότερα ατόμων που εμποδίζουν την ομαλή ανάπτυξη των υγιών και καλλίμορφων ατόμων, ειδικά σε θέσεις ανταγωνισμού με την Ελάτη. Απομάκρυνση των γηραιών δέντρων που τυχόν υπάρχουν γύρω από νεοφυτείες- πυκνοφυτείες και νεαρούς κορμούς προς ευνόηση αυτών. Αφαίρεση έως 6% του ξυλαποθέματος στην Πεύκη και Ελάτη. Αναγεννητικές υλοτομίες με τη δημιουργία υπόσκιων υλοτομιών έκτασης περίπου 1 στρ., στις επιφάνειες της συστάδας που αναπτύσσονται αυξητικά ώριμες ενώσεις και παρατηρείται συσσώρευση ξυλώδους κεφαλαίου στην ανώτερη βαθμίδα διαμέτρου . Απομάκρυνση των ατόμων μαύρης πεύκης που υπερβαίνουν την ώριμη προς υλοτομία διάμετρο του είδους (>45 εκ.). Αναμόχλευση του εδάφους με μηχανικά μέσα όπου αυτό είναι εφικτό για ευνόηση της αναγέννησης. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2014-2023
	Μ.Π.				7.258,00	6.318,00	211,05	183,72	87,05		
14β	Μ.Π.	0,25-0,6	5-130	Σπερ. Υποκτηπ. Και κατά θέσεις κηπ., ανομηλ.	12.418,00	8.862,00	149,61	106,77	71,36	Μ.Πεύκη με πλούσιο υπόροφο κατά θέσεις από αναγέννηση Ελάτης και μερικά αείφυλλα πλατύφυλλα όπως Αρκουδοπούρναρο. Η συστάδα βρίσκεται σε σχετικά καλή κατάσταση, απαντώνται όλες οι κλάσεις διαμέτρων. Παρατηρήθηκαν ορισμένα κακόμορφα και με κακή ανάπτυξη δένδρα Μ. πεύκης. Η Ελάτη έχει έντονη παρουσία σε όλη τη συστάδα με εμφάνιση ατόμων στο στάδιο των νεαρών κορμιδίων και γενικότερα της κατώτερης κλάσης διαμέτρων. Άλλες λεπτομέρειες: Το ξυλώδες κεφάλαιο παρουσιάζει μεγαλύτερη συνοχή προς τα ανάντη της συστάδας. Υπάρχει έντονη παρουσία Ελάτης, η οποία δεν υπολογίσθηκε στο λήμμα για λόγους ευνόησής της, για λόγους ενίσχυσης της ποιότητας του ξυλαποθέματος μελλοντικά και για ενίσχυση της μίξης των δύο ειδών. Παχυμετρηθείσα επιφάνεια : 2 επιφάνειες των 2 στρεμμ. η κάθεμια και οπτική εκτίμηση. Προτείνονται: Καλλιεργητικές υλοτομίες γύρω από νεοφυτείες- πυκνοφυτείες και νεαρούς κορμούς, με τέτοια ένταση ώστε ο βαθμός συγκόμωσης να μην κατέρχεται του υπάρχοντος, με σκοπό τη ποιοτική βελτίωση του ξυλαποθέματος. Οι επεμβάσεις στην Πεύκη θα γίνουν σε όλες τις κλάσεις διαμέτρων. Εξυγιαντικές υλοτομίες με απομάκρυνση(αρνητική επιλογή) όλων των στρεβλών, καχεκτικών , κακόμορφων και άρρωστων ατόμων μαύρης πεύκης και γενικότερα ατόμων που εμποδίζουν την ομαλή	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2014-2023

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας /ha	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
										ανάπτυξη των υγιών και καλλίμορφων ατόμων. Απομάκρυνση των γηραιών δέντρων που τυχόν υπάρχουν γύρω από νεοφυτείες- πυκνοφυτείες και νεαρούς κορμούς προς ευνόηση αυτών, ειδικά σε θέσεις ανταγωνισμού με την Ελάτη. Καλλιέργεια στην Ελάτη λεπτών κορμών και κορμιδίων σε έκταση 10 περίπου στρεμμάτων. Αφαίρεση 8% του ξυλαποθέματος. Αναγεννητικές υλοτομίες με τη δημιουργία υπόσκιων υλοτομιών έκτασης περίπου 1 στρ., στις επιφάνειες της συστάδας που αναπτύσσονται αυξητικά ώριμες ενώσεις και παρατηρείται συσσώρευση ξυλώδους κεφαλαίου στην ανώτερη βαθμίδα διαμέτρου . Απομάκρυνση των ατόμων μαύρης πεύκης που υπερβαίνουν την ώριμη προς υλοτομία διάμετρο του είδους (>45 εκ.). Αναμόχλευση του εδάφους με μηχανικά μέσα όπου αυτό είναι εφικτό για ευνόηση της αναγέννησης. Απαγόρευση βόσκησης.	
15	Ε.	0,9	1-130	Σπερ. Υποκηπ. Και κατά θέσεις κηπ.	10.796,00	3.119,00	210,65	60,86	28,89	Ελάτη, Μ.πεύκη σε μείξη. Γενική κατάσταση: Γενικά καλή. Το ξυλώδες κεφάλαιο βρίσκεται υπό ανόρθωση, η επικράτηση της Ελάτης στις καλύτερες ποιότητες τόπου είναι φανερή. Αρκετά γηραιά άτομα Μαύρης Πεύκης στο μέσο και στα ανώτερα υψόμετρα της συστάδας. Η Ελάτη έχει έντονη παρουσία άνα θέσεις, όπου παρουσιάζεται σε ομάδες στο στάδιο των νεαρών κορμιδίων, λεπτών κορμών ή και γηραιότερων ατόμων.Προς τα ανάντη η συστάδα παρουσιάζει μεγαλύτερη συνοχή και καλύτερη ανάπτυξη. Αρκετά διάκενα σε όλη τη συστάδα. Παχυμετρηθείσα επιφάνεια : 1 επιφάνεια των 2,5 στρεμμ. και οπτική εκτίμηση. Προτείνονται: Καλλιεργητικές υλοτομίες γύρω από νεοφυτείες- πυκνοφυτείες και νεαρούς κορμούς, με τέτοια ένταση ώστε ο βαθμός συγκόμωσης να μην κατέρχεται του υπάρχοντος, με σκοπό τη ποιοτική βελτίωση του ξυλαποθέματος. Οι επεμβάσεις στην Πεύκη και Ελάτη θα γίνουν κατά κύριο λόγω στη ΙΙ και ΙΙΙ κλάση διαμέτρων. Εξυγιαντικές υλοτομίες με απομάκρυνση(αρνητική επιλογή) όλων των στρεβλών, καχεκτικών , κακόμορφων και άρρωστων ατόμων μαύρης πεύκης και γενικότερα ατόμων που εμποδίζουν την ομαλή ανάπτυξη των υγιών και καλλίμορφων ατόμων, ειδικά σε θέσεις ανταγωνισμού με την Ελάτη. Απομάκρυνση των γηραιών δέντρων που τυχόν υπάρχουν γύρω από νεοφυτείες- πυκνοφυτείες και νεαρούς κορμούς προς ευνόηση αυτών. Αφαίρεση έως 5% του ξυλαποθέματος στην Πεύκη και Ελάτη.Αναγεννητικές υλοτομίες με τη δημιουργία υπόσκιων υλοτομιών έκτασης περίπου 1 στρ., στις επιφάνειες της συστάδας που αναπτύσσονται αυξητικά ώριμες ενώσεις και παρατηρείται συσσώρευση ξυλώδους κεφαλαίου στην ανώτερη βαθμίδα διαμέτρου . Απομάκρυνση των ατόμων μαύρης πεύκης που υπερβαίνουν την ώριμη προς υλοτομία διάμετρο του είδους (>45 εκ.). Αναμόχλευση του εδάφους με μηχανικά μέσα όπου αυτό είναι εφικτό για ευνόηση της αναγέννησης. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2014-2023
	Μ.Π.				7.936,00	7.175,00	154,85	140,00	90,41		
16α	Μ.Π.	0,5-0,9	130	Σπερ. - Υποκηπ. Έως κηπ. Κατά θέσεις	2.330,00	811,00	63,84	22,22	34,81	Μ. Πεύκη και ελάχιστη Δρύ , Ελάτη και Οξυά . Η υγεία των κορμών είναι γενικά καλή, λίγα άτομα παρουσίασαν κακομορφίες. Επικράτηση της κατώτερης και μέσης κυρίως κλάσης διαμέτρων. Αρκετά μικροδιάκενα σε όλη τη συστάδα. Σημάδια υπερβόσκησης. Παχυμετρηθείσα επιφάνεια : 1 επιφάνεια των 2,5 στρεμμάτων. Προτείνονται: Καλλιεργητικές υλοτομίες γύρω από νεοφυτείες- πυκνοφυτείες και νεαρούς κορμούς, με τέτοια ένταση ώστε ο βαθμός συγκόμωσης να μην κατέρχεται του υπάρχοντος, με σκοπό τη ποιοτική βελτίωση του ξυλαποθέματος. Οι επεμβάσεις στην Πεύκη θα γίνουν κατά κύριο λόγο στην ΙΙ κλάση διαμέτρων. Εξυγιαντικές υλοτομίες με απομάκρυνση(αρνητική επιλογή) όλων των στρεβλών, καχεκτικών , κακόμορφων και άρρωστων ατόμων μαύρης πεύκης και γενικότερα ατόμων που εμποδίζουν την ομαλή ανάπτυξη των υγιών και καλλίμορφων ατόμων. Απομάκρυνση των γηραιών δέντρων που τυχόν υπάρχουν γύρω από νεοφυτείες- πυκνοφυτείες και νεαρούς κορμούς προς ευνόηση αυτών. Αφαίρεση 10% του ξυλαποθέματος. Αναγεννητικές υλοτομίες με τη δημιουργία υπόσκιων υλοτομιών έκτασης περίπου 1 στρ., στις επιφάνειες της συστάδας που αναπτύσσονται αυξητικά ώριμες ενώσεις και παρατηρείται συσσώρευση ξυλώδους κεφαλαίου στην ανώτερη βαθμίδα διαμέτρου . Απομάκρυνση των ατόμων μαύρης πεύκης που υπερβαίνουν την ώριμη προς υλοτομία διάμετρο του είδους (>45 εκ.). Αναμόχλευση του εδάφους με μηχανικά μέσα όπου αυτό είναι εφικτό για ευνόηση της αναγέννησης. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2014-2023

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας /ha	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
16β	Μ.Π.	0,5-0,6	130	Σπερ. - Υποκτηπ. Έως κηπ. Κατά θέσεις	2.624,00	984,00	42,34	15,88	37,50	Μ. Πεύκη και ελάχιστη Δρύ, Ελάτη και Οξυά . Η υγεία των κορμών είναι γενικά καλή, λίγα άτομα παρουσίασαν κακομορφίες. Επικράτηση της κατώτερης και μέσης κυρίως κλάσης διαμέτρων. Αρκετά μικροδιάκενα σε όλη τη συστάδα. Σημάδια υπερβόσκησης.Παχυμετρηθείσα επιφάνεια : 1 επιφάνεια του ενός στρέμματος. Προτείνονται: Καλλιεργητικές υλοτομίες γύρω από νεοφυτείες- πυκνοφυτείες και νεαρούς κορμούς, με τέτοια ένταση ώστε ο βαθμός συγκόμωσης να μην κατέρχεται του υπάρχοντος, με σκοπό τη ποιοτική βελτίωση του ξυλαποθέματος. Οι επεμβάσεις στην Πεύκη θα γίνουν κατά κύριο λόγο στην ΙΙ κλάση διαμέτρων. Εξυγιαντικές υλοτομίες με απομάκρυνση(αρνητική επιλογή) όλων των στρεβλών, καχεκτικών , κακόμορφων και άρρωστων ατόμων μαύρης πεύκης και γενικότερα ατόμων που εμποδίζουν την ομαλή ανάπτυξη των υγιών και καλλίμορφων ατόμων. Απομάκρυνση των γηραιών δέντρων που τυχόν υπάρχουν γύρω από νεοφυτείες- πυκνοφυτείες και νεαρούς κορμούς προς ευνόηση αυτών. Αφαίρεση 10% του ξυλαποθέματος. Αναγεννητικές υλοτομίες με τη δημιουργία υπόσκιων υλοτομιών έκτασης περίπου 1 στρ., στις επιφάνειες της συστάδας που αναπτύσσονται αυξητικά ώριμες ενώσεις και παρατηρείται συσσώρευση ξυλώδους κεφαλαίου στην ανώτερη βαθμίδα διαμέτρου . Απομάκρυνση των ατόμων μαύρης πεύκης που υπερβαίνουν την ώριμη προς υλοτομία διάμετρο του είδους (>45 εκ.). Αναμόχλευση του εδάφους με μηχανικά μέσα όπου αυτό είναι εφικτό για ευνόηση της αναγέννησης. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2014-2024
17α	Μ.Π.	0,6-0,9	1-90	Σπερ. - Υποκτηπ. Έως κηπ. Κατά θέσεις	1.625,00	402,00	28,62	7,08	24,74	Μ. Πεύκη, Πεύκη σε μίξη με Δρύ και σε μίξη με Οξυά και Ελάτη. Δρύς με Οστρυσά και Γαύρο. Γενική κατάσταση: Μέτρια αλλά και καλή σε αρκετές θέσεις. Η Οξυά έχει έντονη παρουσία σε ορισμένες θέσεις αλλά η ύπαρξή της δεν υπολογίσθηκε στο λήμμα γιατί κρίνεται σκόπιμη η παρουσία της για λόγους διατήρησης της μίξης των ειδών και αύξησης της ποιότητας του εδάφους. Παχυμετρηθείσα επιφάνεια : 1 επιφάνεια του ενός στρέμματος. Προτείνονται: Καλλιεργητικές υλοτομίες γύρω από νεοφυτείες- πυκνοφυτείες και νεαρούς κορμούς, με τέτοια ένταση ώστε ο βαθμός συγκόμωσης να μην κατέρχεται του υπάρχοντος, με σκοπό τη ποιοτική βελτίωση του ξυλαποθέματος. Οι επεμβάσεις στην Πεύκη θα γίνουν κατά κύριο λόγο στην ΙΙ κλάση διαμέτρων. Εξυγιαντικές υλοτομίες με απομάκρυνση(αρνητική επιλογή) όλων των στρεβλών, καχεκτικών , κακόμορφων και άρρωστων ατόμων μαύρης πεύκης και γενικότερα ατόμων που εμποδίζουν την ομαλή ανάπτυξη των υγιών και καλλίμορφων ατόμων. Απομάκρυνση των γηραιών δέντρων που τυχόν υπάρχουν γύρω από νεοφυτείες- πυκνοφυτείες και νεαρούς κορμούς προς ευνόηση αυτών. Αφαίρεση 8% του ξυλαποθέματος. Αναγεννητικές υλοτομίες με τη δημιουργία υπόσκιων υλοτομιών έκτασης περίπου 1 στρ., στις επιφάνειες της συστάδας που αναπτύσσονται αυξητικά ώριμες ενώσεις και παρατηρείται συσσώρευση ξυλώδους κεφαλαίου στην ανώτερη βαθμίδα διαμέτρου . Απομάκρυνση των ατόμων μαύρης πεύκης που υπερβαίνουν την ώριμη προς υλοτομία διάμετρο του είδους (>45 εκ.). Αναμόχλευση του εδάφους με μηχανικά μέσα όπου αυτό είναι εφικτό για ευνόηση της αναγέννησης. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2014-2023
	Δ. + Λ.πλ.		5-20		0,00	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/Ο!		
17β	Μ.Π.	0,2-0,6	1-100	Σπερ. - Υποκτηπ. Έως κηπ. Κατά θέσεις	1.814,00	742,00	38,81	15,88	40,90	Μ. Πεύκη , Ελατη και Οξυά κυρίως στα ρέματα. Γενική κατάσταση: Γενικά καλή. Η Ελάτη ευνοείται και η επικράτηση της στις καλύτερες ποιότητες τόπου θεωρείται δεδομένη. Η μίξη των δύο ειδών είναι ικανοποιητική. Σε αρκετά άτομα Πεύκης παρατηρήθηκαν κακομορφίες όπως στρεβλώσεις και διχαλώματα. Παχυμετρηθείσα επιφάνεια : 1 επιφάνεια του ενός στρέμματος. Προτείνονται: Καλλιεργητικές υλοτομίες γύρω από νεοφυτείες- πυκνοφυτείες και νεαρούς κορμούς, με τέτοια ένταση ώστε ο βαθμός συγκόμωσης να μην κατέρχεται του υπάρχοντος, με σκοπό τη ποιοτική βελτίωση του ξυλαποθέματος. Οι επεμβάσεις στην Πεύκη θα γίνουν κατά κύριο λόγο στην ΙΙ κλάση διαμέτρων. Εξυγιαντικές υλοτομίες με απομάκρυνση(αρνητική επιλογή) όλων των στρεβλών, καχεκτικών , κακόμορφων και άρρωστων ατόμων μαύρης πεύκης και γενικότερα ατόμων που εμποδίζουν την ομαλή ανάπτυξη των υγιών και καλλίμορφων ατόμων. Απομάκρυνση των γηραιών δέντρων που τυχόν υπάρχουν γύρω από νεοφυτείες- πυκνοφυτείες και νεαρούς κορμούς προς ευνόηση αυτών. Αφαίρεση 10% του ξυλαποθέματος. Αναγεννητικές υλοτομίες με τη δημιουργία υπόσκιων υλοτομιών έκτασης περίπου 1 στρ., στις επιφάνειες της συστάδας που αναπτύσσονται αυξητικά ώριμες ενώσεις και παρατηρείται συσσώρευση ξυλώδους κεφαλαίου στην ανώτερη βαθμίδα διαμέτρου . Απομάκρυνση των ατόμων μαύρης πεύκης που υπερβαίνουν την ώριμη προς υλοτομία διάμετρο του είδους (>45 εκ.). Αναμόχλευση του εδάφους με	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2014-2023

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας /ha	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
										μηχανικά μέσα όπου αυτό είναι εφικτό για ευνόηση της αναγέννησης. Απαγόρευση βόσκησης.	
18α	Μ.Π.	0,3-0,6	1-90	Σπερ. - Υποκηπ. Έως κηπ. Κατά θέσεις	1.906,00	968,00	31,26	15,88	50,79	Μ. Πεύκη και Δρύς σε μίξη με τη Πεύκη και αρκετά άτομα Οξυάς. Γενική κατάσταση: Μέτρια αλλά και καλή σε αρκετές θέσεις. Η Οξυά έχει έντονη παρουσία σε ορισμένες θέσεις αλλά η ύπαρξή της δεν υπολογίσθηκε στο λήμμα γιατί κρίνεται σκόπιμη η παρουσία της για λόγους διατήρησης της μίξης των ειδών και αύξησης της ποιότητας του εδάφους. Παχυμετρηθείσα επιφάνεια : 1 επιφάνεια του ενός στρέμματος. Προτείνονται: Καλλιεργητικές υλοτομίες γύρω από νεοφυτείες- πυκνοφυτείες και νεαρούς κορμούς, με τέτοια ένταση ώστε ο βαθμός συγκόμωσης να μην κατέρχεται του υπάρχοντος, με σκοπό τη ποιοτική βελτίωση του ξυλαποθέματος. Οι επεμβάσεις στην Πεύκη θα γίνουν κατά κύριο λόγο στην ΙΙ κλάση διαμέτρων. Εξυγιαντικές υλοτομίες με απομάκρυνση(αρνητική επιλογή) όλων των στρεβλών, καχεκτικών , κακόμορφων και άρρωστων ατόμων μαύρης πεύκης και γενικότερα ατόμων που εμποδίζουν την ομαλή ανάπτυξη των υγιών και καλλίμορφων ατόμων. Απομάκρυνση των γηραιών δέντρων που τυχόν υπάρχουν γύρω από νεοφυτείες- πυκνοφυτείες και νεαρούς κορμούς προς ευνόηση αυτών. Αφαίρεση 10% του ξυλαποθέματος. Αναγεννητικές υλοτομίες με τη δημιουργία υπόσκιων υλοτομιών έκτασης περίπου 1 στρ., στις επιφάνειες της συστάδας που αναπτύσσονται αυξητικά ώριμες ενώσεις και παρατηρείται συσσώρευση ξυλώδους κεφαλαίου στην ανώτερη βαθμίδα διαμέτρου. Απομάκρυνση των ατόμων μαύρης πεύκης που υπερβαίνουν την ώριμη προς υλοτομία διάμετρο του είδους (>45 εκ.). Αναμόχλευση του εδάφους με μηχανικά μέσα όπου αυτό είναι εφικτό για ευνόηση της αναγέννησης. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2014-2023
18β	Μ.Π.	1,28	1-120	Σπερ. - Υποκηπ. Έως κηπ. Κατά θέσεις	5.369,00	3.465,00	58,33	37,65	64,54	Μ. Πεύκη και Δρύς σε μίξη με τη Πεύκη και αρκετά άτομα Οξυάς. Γενική κατάσταση: Κατά τόπους πολύ καλή. Γενικά καλή, για επιλογικές στα πυκνά. Παχυμετρηθείσα επιφάνεια : 1 επιφάνεια του ενός στρέμματος. Προτείνονται: Καλλιεργητικές υλοτομίες γύρω από νεοφυτείες- πυκνοφυτείες και νεαρούς κορμούς, με τέτοια ένταση ώστε ο βαθμός συγκόμωσης να μην κατέρχεται του υπάρχοντος, με σκοπό τη ποιοτική βελτίωση του ξυλαποθέματος. Οι επεμβάσεις στην Πεύκη θα γίνουν κατά κύριο λόγο στην ΙΙ κλάση διαμέτρων. Εξυγιαντικές υλοτομίες με απομάκρυνση(αρνητική επιλογή) όλων των στρεβλών, καχεκτικών , κακόμορφων και άρρωστων ατόμων μαύρης πεύκης και γενικότερα ατόμων που εμποδίζουν την ομαλή ανάπτυξη των υγιών και καλλίμορφων ατόμων. Απομάκρυνση των γηραιών δέντρων που τυχόν υπάρχουν γύρω από νεοφυτείες- πυκνοφυτείες και νεαρούς κορμούς προς ευνόηση αυτών. Αφαίρεση 10% του ξυλαποθέματος. Αναγεννητικές υλοτομίες με τη δημιουργία υπόσκιων υλοτομιών έκτασης περίπου 1 στρ., στις επιφάνειες της συστάδας που αναπτύσσονται αυξητικά ώριμες ενώσεις και παρατηρείται συσσώρευση ξυλώδους κεφαλαίου στην ανώτερη βαθμίδα διαμέτρου . Απομάκρυνση των ατόμων μαύρης πεύκης που υπερβαίνουν την ώριμη προς υλοτομία διάμετρο του είδους (>45 εκ.). Αναμόχλευση του εδάφους με μηχανικά μέσα όπου αυτό είναι εφικτό για ευνόηση της αναγέννησης. Απαγόρευση βόσκησης	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2014-2023
19α	Μ.Π.	1,28	1-120	Σπερ. - Υποκηπ. Έως κηπ. Κατά θέσεις	19.827,00	7.989,00	210,66	84,88	40,29	Πεύκη με διασπαρτη Δρυ και Γαύρο, Οξυά, Λεύκη. Γενική κατάσταση: Κατά τόπους πολύ καλή. Γενικά καλή, για επιλογικές στα πυκνά. Παχυμετρηθείσα επιφάνεια : 1 επιφάνειες του 1 στρέμματος και οπτική εκτίμηση. Προτείνονται: Καλλιεργητικές υλοτομίες γύρω από νεοφυτείες- πυκνοφυτείες και νεαρούς κορμούς, με τέτοια ένταση ώστε ο βαθμός συγκόμωσης να μην κατέρχεται του υπάρχοντος, με σκοπό τη ποιοτική βελτίωση του ξυλαποθέματος. Οι επεμβάσεις στην Πεύκη θα γίνουν κατά κύριο λόγο στην ΙΙ κλάση διαμέτρων. Εξυγιαντικές υλοτομίες με απομάκρυνση(αρνητική επιλογή) όλων των στρεβλών, καχεκτικών , κακόμορφων και άρρωστων ατόμων μαύρης πεύκης και γενικότερα ατόμων που εμποδίζουν την ομαλή ανάπτυξη των υγιών και καλλίμορφων ατόμων. Απομάκρυνση των γηραιών δέντρων που τυχόν υπάρχουν γύρω από νεοφυτείες- πυκνοφυτείες και νεαρούς κορμούς προς ευνόηση αυτών. Αναγωγή της Δρυός με διενέργεια καλλιεργητικών υλοτομιών, διατήρηση της μείξης με την Πεύκη. Αφαίρεση έως 8% του ξυλαποθέματος στην Πεύκη και 10% στην Λεύκη. Αναγεννητικές υλοτομίες με τη δημιουργία υπόσκιων υλοτομιών έκτασης περίπου 1 στρ., στις επιφάνειες της συστάδας που αναπτύσσονται αυξητικά ώριμες ενώσεις και παρατηρείται συσσώρευση ξυλώδους κεφαλαίου στην ανώτερη βαθμίδα διαμέτρου . Απομάκρυνση των ατόμων μαύρης πεύκης που υπερβαίνουν την ώριμη προς υλοτομία διάμετρο του	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2014-2023
	Λ.				268,00	0,00	27,60	0,00	0,00		
	Ο.	1,48	1-117		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας / ha	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
										είδους (>45 εκ.). Αναμόχλευση του εδάφους με μηχανικά μέσα όπου αυτό είναι εφικτό για ευνόηση της αναγέννησης. Απαγόρευση βόσκησης.	
19β	Μ.Π.	0,55	1-112	Σπερ. - Υποκηπ. Έως κηπ. Κατά θέσεις	1.623,00	1.582,00	94,64	92,24	97,47	Πεύκη, Δρυ και στα κατάντη προς το ρέμα Ίταμος στις δυσπρόσιτες θέσεις Οξυά. Γενική κατάσταση: Κατά τόπους αρκετά καλή. Γενικά καλή, για επιλογικές στα πυκνά.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2014-2023
	Δ.		1-35		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Επικράτηση όλων των κλάσεων διαμέτρου στην Πεύκη και της κατώτερης στη Δρυ.	
	Ο.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Αρκετά στρεβλά άτομα και στα δύο δασοπονικά είδη.Μέτριας ποιότητας ξυλαποθέματος συστάδα. Παχυμετρηθείσα επιφάνεια : 1 επιφάνεια του 1 στρέμματος και οπτική εκτίμηση. Προτείνονται: Καλλιεργητικές υλοτομίες γύρω από νεοφυτείες- πυκνοφυτείες και νεαρούς κορμούς, με τέτοια ένταση ώστε ο βαθμός συγκόμωσης να μην κατέρχεται του υπάρχοντος, με σκοπό τη ποιοτική βελτίωση του ξυλαποθέματος. Οι επεμβάσεις στην Πεύκη θα γίνουν σε όλες τις κλάσεις διαμέτρων και στη Δρυ στην κατώτερη. Εξυγιαντικές υλοτομίες με απομάκρυνση(αρνητική επιλογή) όλων των στρεβλών, καχεκτικών , κακόμορφων και άρρωστων ατόμων μαύρης πεύκης και γενικότερα ατόμων που εμποδίζουν την ομαλή ανάπτυξη των υγιών και καλλίμορφων ατόμων. Απομάκρυνση των γηραιών δέντρων που τυχόν υπάρχουν γύρω από νεοφυτείες- πυκνοφυτείες και νεαρούς κορμούς προς ευνόηση αυτών. Αφαίρεση 8% του ξυλαποθέματος στην Πεύκη. Αναγεννητικές υλοτομίες με τη δημιουργία υπόσκιων υλοτομιών έκτασης περίπου 1 στρ., στις επιφάνειες της συστάδας που αναπτύσσονται αυξητικά ώριμες ενώσεις και παρατηρείται συσσώρευση ξυλώδους κεφαλαίου στην ανώτερη βαθμίδα διαμέτρου . Απομάκρυνση των ατόμων μαύρης πεύκης που υπερβαίνουν την ώριμη προς υλοτομία διάμετρο του είδους (>45 εκ.). Αναμόχλευση του εδάφους με μηχανικά μέσα όπου αυτό είναι εφικτό για ευνόηση της αναγέννησης. Στη Δρυ δεν θα γίνει καμία επέμβαση λόγω του ότι από παλαιότερη καλλιέργεια έχει επιτευχθεί κανονική αραιώση και δεν κρίνεται σκόπιμη στο στάδιο αυτό η διάσπαση της κορμοστέγης δεδομένου και του επιδιωκόμενου σκοπού της αύξησης του ποιοτικού ξυλαποθέματος. Απαγόρευση βόσκησης.	
20α	Μ.Π.	1,1	1-115	Σπερ. - Υποκηπ. Έως κηπ. Κατά θέσεις	12.300,00	2.473,00	213,06	42,84	20,11	Μαύρη πεύκη, Οξυά σε ρέματα. Καλή ποιότητα, αρκετά πυκνή χρειάζονται αραιώσεις. Το ξυλώδες κεφάλαιο παρουσιάζεται πιο συγκροτημένο στα ανάντη της συστάδας. Παχυμετρηθείσα επιφάνεια : 1 επιφάνεια του 1 στρέμματος και οπτική εκτίμηση. Προτείνονται: Καλλιεργητικές υλοτομίες γύρω από νεοφυτείες- πυκνοφυτείες και νεαρούς κορμούς, με τέτοια ένταση ώστε ο βαθμός συγκόμωσης να μην κατέρχεται του υπάρχοντος, με σκοπό τη ποιοτική βελτίωση του ξυλαποθέματος. Οι επεμβάσεις στην Πεύκη θα γίνουν κατά κύριο λόγο στην ΙΙ και ΙΙΙ κλάση διαμέτρων. Εξυγιαντικές υλοτομίες με απομάκρυνση(αρνητική επιλογή) όλων των στρεβλών, καχεκτικών , κακόμορφων και άρρωστων ατόμων μαύρης πεύκης και γενικότερα ατόμων που εμποδίζουν την ομαλή ανάπτυξη των υγιών και καλλίμορφων ατόμων. Απομάκρυνση των γηραιών δέντρων που τυχόν υπάρχουν γύρω από νεοφυτείες- πυκνοφυτείες και νεαρούς κορμούς προς ευνόηση αυτών. Αφαίρεση 7% του ξυλαποθέματος. Αναγεννητικές υλοτομίες με τη δημιουργία υπόσκιων υλοτομιών έκτασης περίπου 1 στρ., στις επιφάνειες της συστάδας που αναπτύσσονται αυξητικά ώριμες ενώσεις και παρατηρείται συσσώρευση ξυλώδους κεφαλαίου στην ανώτερη βαθμίδα διαμέτρου . Απομάκρυνση των ατόμων μαύρης πεύκης που υπερβαίνουν την ώριμη προς υλοτομία διάμετρο του είδους (>45 εκ.). Αναμόχλευση του εδάφους με μηχανικά μέσα όπου αυτό είναι εφικτό για ευνόηση της αναγέννησης. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2014-2023
20β	Μ.Π.	1,12	1-115	Σπερ. - Υποκηπ. Έως κηπ. Κατά θέσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Μ. Πεύκη με διάσπαρτα άτομα Δρυός.Καλή ποιότητα, αρκετά πυκνή χρειάζονται αραιώσεις. Προτείνονται: Από τον ανώροφο θα υλοτομηθούν τα κακόμορφα και τα υπερβαίνοντα την ώριμο προς υλοτομία διάμετρο των 45 εκατοστών. Από το μεσόροφο θα υλοτομούνται τα ξερά, τα κατώτερης ποιότητας άτομα και αυτά που ζημιώνουν την κόμη των άριστων ατόμων. Όπου υπάρχει νεοφυτεία - πυκνοφυτεία και λεπτοί κορμοί σε καλή εξέλιξη θα απομακρύνονται τα υπάρχοντα γηραιά δένδρα για την απελευθέρωση των νεαρότερων ατόμων. Τα διάκενα που θα δημιουργούνται από την αφαίρεση των δέντρων δεν πρέπει να υπερβαίνουν το μέγεθος της συνδενδρίας. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2014-2023
20γ	Μ.Π.	0,6-0,95	105	Σπερ. - Υποκηπ. Έως κηπ. Κατά θέσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Μ. Πεύκη και διάσπαρτα δένδρα Δρυός και Οξυάς. Γενική κατάσταση: Κατά τόπους αρκετά καλή. Γενικά καλή, για επιλογικές στα πυκνά. Επικράτηση όλων των κλάσεων διαμέτρου στην Πεύκη και της κατώτερης στη Δρυ. Αρκετά στρεβλά άτομα και στα δύο δασοπονικά είδη. Προτείνονται: Από τον ανώροφο θα υλοτομηθούν τα κακόμορφα και τα υπερβαίνοντα την ώριμο προς υλοτομία διάμετρο των 45 εκατοστών. Από το	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2014-2023

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας / ha	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
										μεσόροφο θα υλοτομούνται τα ξερά, τα κατώτερης ποιότητας άτομα και αυτά που ζημιώνουν την κόμη των άριστων ατόμων. Όπου υπάρχει νεοφυτεία - πυκνοφυτεία και λεπτοί κορμοί σε καλή εξέλιξη θα απομακρύνονται τα υπάρχοντα γηραιά δένδρα για την απελευθέρωση των νεαρότερων ατόμων. Τα διάκενα που θα δημιουργούνται από την αφαίρεση των δέντρων δεν πρέπει να υπερβαίνουν το μέγεθος της συνδενδρίας. Απαγόρευση βόσκησης.	
21	Δ. + Λ.πλ. + Μ.Π.	0,6-0,9	5-45	Σπερ. Ακαν.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Δρυς σε μείξη με το Γαύρο, Σφένδαμος και λοιπά πλατύφυλλα, και πουρνάρι στις χαμηλότερες ποιότητες τόπου. Μαύρη Πεύκη. Ποιοτική και υγιεινή κατάσταση σπερμοβλαστημάτων καλή με καλή ανάπτυξη. Ζημιές δεν παρατηρήθηκαν.Εκτός διαχείρισης την παρούσα 10ετία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2014-2023
22	Δ.	0,6-0,95	105	Σπερ. - Υποκηπ. Έως κηπ. Κατά θέσεις	2.096,00	268,00	67,53	8,63	12,79	Δρυς και διασπαρτα δένδρα από γαύρο, φράξο και σφενδάμι. Παχυμετρηθείσα επιφάνεια : 1 επιφάνεια του ενός στρέμματος. Εκτός καλλιέργειας την παρούσα 10ετία	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2014-2023
23α	Μ.Π.	0,6-0,95	120	Σπερ. - Υποκηπ. Έως κηπ. Κατά θέσεις	454,00	186,00	32,54	13,33	40,97	Μ. Πεύκη (13,95 Ha), Δρύ με Γαύρο και λοιπά πλατύφυλλα(55,43 Ha) και Οξυά(6,05 Ha) . Γενική κατάσταση: Κατά τόπους αρκετά καλή. Γενικά καλή, για επιλογικές στα πυκνά. Επικράτηση όλων των κλάσεων διαμέτρου στην Πεύκη και της κατώτερης στη Δρυ. Αρκετά στρεβλά άτομα και στα δύο δασοπονικά είδη. Παχυμετρηθείσα επιφάνεια : 1 επιφάνεια του ενός στρέμματος. Για την Δρυ χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία των δοκιμαστικών 60,61 & 62. Προτείνονται: Καλλιεργητικές υλοτομίες γύρω από νεοφυτείες- πυκνοφυτείες και νεαρούς κορμούς, με τέτοια ένταση ώστε ο βαθμός συγκόμωσης να μην κατέρχεται του υπάρχοντος, με σκοπό τη ποιοτική βελτίωση του ξυλαποθέματος. Οι επεμβάσεις στην Πεύκη θα γίνουν σε όλες τις κλάσεις διαμέτρων. Εξυγιαντικές υλοτομίες με απομάκρυνση(αρνητική επιλογή) όλων των στρεβλών, καχεκτικών , κακόμορφων και άρρωστων ατόμων μαύρης πεύκης και γενικότερα ατόμων που εμποδίζουν την ομαλή ανάπτυξη των υγιών και καλλιμορφων ατόμων και ειδικά στη Δρυ παράλληλη ευνόηση των ατόμων του μέλλοντος που θα αποτελέσουν τους σπορείς. Απομάκρυνση των γηραιών δέντρων που τυχόν υπάρχουν γύρω από νεοφυτείες- πυκνοφυτείες και νεαρούς κορμούς προς ευνόηση αυτών. Αφαίρεση 10% του ξυλαποθέματος στην Πεύκη και Δρυ. Αναγεννητικές υλοτομίες με τη δημιουργία υπόσκιων υλοτομιών έκτασης περίπου 1 στρ., στις επιφάνειες της συστάδας που αναπτύσσονται αυξητικά ώριμες ενώσεις και παρατηρείται συσσώρευση ξυλώδους κεφαλαίου στην ανώτερη βαθμίδα διαμέτρου . Απομάκρυνση των ατόμων μαύρης πεύκης που υπερβαίνουν την ώριμη προς υλοτομία διάμετρο του είδους (>45 εκ.). Αναμόχλευση του εδάφους με μηχανικά μέσα όπου αυτό είναι εφικτό για ευνόηση της αναγέννησης. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2014-2023
	Δ		1-40		1.706,00	0,00	30,78	0,00	0,00		
23β	Ο.	0,8-0,95	5-95	Σπερ. - Υποκηπ. Έως κηπ. Κατά θέσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Μ. Πεύκη, Δρύ, Γαύρος, λοιπα πλατύφυλλα και Οξυά. Προτείνονται: Από τον ανώροφο θα υλοτομηθούν τα κακόμορφα και τα υπερβαίνοντα την ώριμο προς υλοτομία διάμετρο των 45 εκατοστών. Από το μεσόροφο θα υλοτομούνται τα ξερά, τα κατώτερης ποιότητας άτομα και αυτά που ζημιώνουν την κόμη των άριστων ατόμων. Όπου υπάρχει νεοφυτεία - πυκνοφυτεία και λεπτοί κορμοί σε καλή εξέλιξη θα απομακρύνονται τα υπάρχοντα γηραιά δένδρα για την απελευθέρωση των νεαρότερων ατόμων. Τα διάκενα που θα δημιουργούνται από την αφαίρεση των δέντρων δεν πρέπει να υπερβαίνουν το μέγεθος της συνδενδρίας. Απαγόρευση της βοσκής παντός ζώου για 10 χρόνια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2014-2023
	Δ. + Λ.πλ.		10-50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Μ.Π.		115		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24α	Μ.Π.	0,95	5-110	Σπερ. Υποκηπ. Και κατά θέσεις κηπ. Σχεδόν ομήλ.	3.081,00	3.081,00	150,59	150,59	100,00	Σπερμοφυής υποκηπευτή και κατά θέσεις κηπευτή, σχεδόν ομήλικος. Η υγεία των κορμών είναι γενικά καλή, λίγα άτομα παρουσίασαν κακομορφίες. Επικράτηση των κατώτερων κλάσεων διαμέτρων για τη δρυ και της ανώτερης κλάσης για τη πεύκη. Αρκετά μεγάλα διάκενα σε όλη τη συστάδα. Σημάδια υπερβόσκησης. Ισχυρή παρουσία πλατύφυλλων ειδών (οστρυά, γαύρος, λεπτοκαρυά κ.α.) εντός της συστάδας. Παχυμετρηθείσα επιφάνεια : 1 επιφάνεια του 1 στρέμματος για τη Μαύρη Πεύκη και 2 επιφάνειες των 1.5 & 1 στρεμμάτων για τη Δρυ και οπτική εκτίμηση. Προτείνονται: Η επιδιωκτέα δασοπονική μορφή, η οποία θα προκύψει μετά τη λήψη των προτεινόμενων διαχειριστικών επεμβάσεων θα είναι η σπερμοφυής υποκηπευτή, με σκοπό την εξυπηρέτηση των δασοκομικών απαιτήσεων της μαύρης πεύκης και της δρυός, την απαλοιφή της τυχόν ακανονιστίας της συστάδας, την εκμετάλλευση της μέγιστης τεχνικής ικανότητας του είδους για παραγωγή ξυλείας και τη βελτίωση και προστασία του δάσους. Διατήρηση και ευνόηση των ευγενών πλατυφύλλων ειδών (σφένδαμος, φράξος, φλαμουριά) με σκοπό τη μελλοντική παραγωγή πολύτιμου ξύλου αλλά και για εδαφοβελτιωτικούς σκοπούς. Διατήρηση επίσης των μεμονομένων ατόμων ελάτης και οξυάς που αναπτύσσονται	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2014-2023
	Δ.		10-40		802,00	0,00	18,01	0,00	0,00		

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας / ha	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
										εντός της αμιγούς συστάδας μαύρης πεύκης και της δρυός. Αναγεννητικές υλοτομίες με τη δημιουργία υπόσκιων υλοτομιών έκτασης περίπου 1 στρ., στις επιφάνειες της συστάδας που αναπτύσσονται αυξητικά ώριμες ενώσεις και παρατηρείται συσσώρευση ξυλώδους κεφαλαίου στην ανώτερη βαθμίδα διαμέτρου για τη μαύρη πεύκη. Απομάκρυνση των ατόμων μαύρης πεύκης που υπερβαίνουν την ώριμη προς υλοτομία διάμετρο του είδους (>45 εκ.). Αναμόχλευση του εδάφους με μηχανικά μέσα όπου αυτό είναι εφικτό για ευνόηση της αναγέννησης. Διενέργεια καλλιεργητικών υλοτομιών στις παραπάνω θέσεις (γύρω από νεοφυτείες- πυκνοφυτείες και νεαρούς κορμούς), με τέτοια ένταση ώστε ο βαθμός συγκόμωσης να μην κατέρχεται του 0.7, με σκοπό τη ποιοτική βελτίωση του ξυλαποθέματος. Το ποσοστό του λήμματος για τη μαύρη πεύκη δεν θα υπερβαίνει το 8% του ξυλαποθέματος. Απομάκρυνση όλων των στρεβλών, καχεκτικών , κακόμορφων και άρρωστων ατόμων μαύρης πεύκης και γενικότερα ατόμων που εμποδίζουν την ομαλή ανάπτυξη των υγιών και καλλίμορφων ατόμων. Απομάκρυνση των γηραιών δέντρων που τυχόν υπάρχουν γύρω από νεοφυτείες- πυκνοφυτείες και νεαρούς κορμούς προς ευνόηση αυτών. Οι καλλιεργητικές υλοτομίες της δρυός περιλαμβάνουν εξυγιαντικές υλοτομίες με απομάκρυνση όλων των γηραιών, άρρωστων, κακόμορφων, στρεβλών κ.λ.π. ατόμων, καθαρισμούς στις νεοφυτείες και στις πυκνοφυτείες και εξευγενιστικές αραιώσεις στα κορμίδια και αργότερα στους κορμούς. Το λήμμα για τη δρυ θα ανέλθει σε ποσοστό 10% του ξυλαποθέματος. Απαγόρευση βόσκησης	
24β	Μ.Π.	0,95	0,82	Σπερ. Υποκτηπ. Και κατά θέσεις κηπ. Σχεδόν ομήλ.	8.506,00	6.515,00	186,05	142,50	76,59	Μ. Πεύκη, Δρυς κατά θέσεις διαμορφωμένος υπόροφος από άρκευθο, πουρνάρι και λοιπά αείφυλλα πλατύφυλλα είδη. Οξυά στα ρέματα. Τα δευτερεύοντα αυτά είδη δεν συμμετέχουν στο λήμμα της συστάδας.Η υγεία των κορμών είναι γενικά καλή, λίγα άτομα παρουσίασαν κακομορφίες. Επικράτηση των κατώτερων κλάσεων διαμέτρων για τη δρυ και της μεσαίας κλάσης για τη πεύκη. Αρκετά μεγάλα διάκενα σε όλη τη συστάδα. Σημάδια υπερβόσκησης. Ισχυρή παρουσία αιφύλλων πλατύφυλλων ειδών (άρκευθος, πουρνάρι κ.α.) εντός της συστάδας. Παχυμετρηθείσα επιφάνεια: 2 επιφάνεια του 1 & 1.5 στρέμματος για τη Μαύρη Πεύκη, 1 επιφάνεια του 0.5 στρέμματος για τη Δρυ και οπτική εκτίμηση. Προτείνονται: Η επιδιωκτέα δασοπονική μορφή, η οποία θα προκύψει μετά τη λήψη των προτεινόμενων διαχειριστικών επεμβάσεων θα είναι η σπερμοφυής υποκτηπευτή και για τα δύο είδη που αναπτύσσονται στη συστάδα. Αναγεννητικές υλοτομίες με τη δημιουργία υπόσκιων υλοτομιών έκτασης περίπου 1 στρ., στις επιφάνεις της συστάδας που αναπτύσσονται αυξητικά ώριμες ενώσεις και παρατηρείται συσσώρευση ξυλώδους κεφαλαίου στην ανώτερη βαθμίδα διαμέτρου για τη μαύρη πεύκη. Απομάκρυνση των ατόμων μαύρης πεύκης που υπερβαίνουν την ώριμη προς υλοτομία διάμετρο του είδους (>45 εκ.). Αναμόχλευση του εδάφους με μηχανικά μέσα όπου αυτό είναι εφικτό για ευνόηση της αναγέννησης. Διενέργεια καλλιεργητικών υλοτομιών στις παραπάνω θέσεις (γύρω από νεοφυτείες- πυκνοφυτείες και νεαρούς κορμούς), με τέτοια ένταση ώστε ο βαθμός συγκόμωσης να μην κατέρχεται του υπάρχοντος, με σκοπό τη ποιοτική βελτίωση του ξυλαποθέματος. Το ποσοστό του λήμματος για τη μαύρη πεύκη δεν θα υπερβαίνει το 8% του ξυλαποθέματος. Διατήρηση και ευνόηση των ευγενών πλατυφύλλων ειδών (σφένδαμος, φράξος, φλαμουριά) με σκοπό τη μελλοντική παραγωγή πολυτίμου ξύλου αλλά και για εδαφοβελτιωτικούς σκοπούς. Διατήρηση επίσης των μεμονωμένων ατόμων ελάτης και οξυάς.Απομάκρυνση όλων των στρεβλών, καχεκτικών , κακόμορφων και άρρωστων ατόμων μαύρης πεύκης και γενικότερα ατόμων που εμποδίζουν την ομαλή ανάπτυξη των υγιών και καλλίμορφων ατόμων. Απομάκρυνση των γηραιών δέντρων που τυχόν υπάρχουν γύρω από νεοφυτείες- πυκνοφυτείες και νεαρούς κορμούς προς ευνόηση αυτών. Οι καλλιεργητικές υλοτομίες της δρυός περιλαμβάνουν εξυγιαντικές υλοτομίες με απομάκρυνση όλων των γηραιών, άρρωστων, κακόμορφων, στρεβλών κ.λ.π. ατόμων, καθαρισμούς στις νεοφυτείες και στις πυκνοφυτείες και εξευγενιστικές αραιώσεις στα κορμίδια και αργότερα στους κορμούς. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2014-2023
	Δ.		0,89		35,00	0,00	4,62	0,00	0,00		
	Ο.		0,38		0,00	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/Ο!		
24γ	Δ.	0,8-0,95	10-50	Διφ.	2.276,00	0,00	53,45	0,00	0,00	Δρυς, Οξυά και Καστανιά κατά θέσεις διαμορφωμένος υπόροφος από Γαύρο, Οστρυά και Φράξο και λοιπά πλατύφυλλα είδη. Τα δευτερεύοντα αυτά είδη δεν συμμετέχουν στο λήμμα της συστάδας. Παρουσία αραιών παραμιγμάτων μαύρης πεύκης τα οποία δεν συμμετέχουν στο λήμμα αυτής.Η υγεία των κορμών είναι γενικά καλή, λίγα άτομα παρουσίασαν κακομορφίες. Επικράτηση των κατώτερων κλάσεων διαμέτρων και για τα τρία δασοπονικά είδη που αναμινγνύονται στη συστάδα. Ισχυρή παρουσία πλατύφυλλων ειδών (οστρυά, γαύρος, λεπτοκαρυά κ.α.) εντός της συστάδας. Παχυμετρηθείσα	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2014-2023
	Ο.		5-95		1.835,00	0,00	43,90	0,00	0,00		

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας /ha	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
										επιφάνεια: 2 επιφάνειες του 1 & 1.5 στρέμματος για τη Δρυ, 1 επιφάνεια του 1 στρέμματος για την Οξυά και οπτική εκτίμηση. Προτείνονται: Η επιδιωκτέα δασοπονική μορφή, η οποία θα προκύψει μετά τη λήψη των προτεινόμενων διαχειριστικών επεμβάσεων θα είναι η σπερμοφυής υποκτηπευτή και για τη δρυ και την οξυά. Η διαχειριστική μορφή της οξυάς είναι υποκτηπευτοειδής και για την αναγωγή της προτείνονται καλλιεργητικές υλοτομίες με τέτοια ένταση ώστε ο βαθμός συγκόμμωσης να μην κατέρχεται του υπάρχοντος. Στη συνέχεια διενεργούνται σπερμοδότιδες και φωτοδότιδες υλοτομίες σε θέσεις όπου υπάρχει ιδιαίτερα αναπτυγμένη αναγέννηση του είδους και οπωσδήποτε στις καλύτερες ποιότητες τόπου. Τελική διεύρυνση των αναγεννηθέντων κέντρων αναγέννησης με υπόσκιες υλοτομίες εφόσον δεν έχει αποληφθεί το προβλεπόμενο λήμμα. Το λήμμα για την οξυά θα ανέλθει σε ποσοστό 10% του συνολικού ξυλαποθέματος. Διατήρηση και ευνόηση των ευγενών πλατυφύλλων ειδών (σφένδαμος, φράξος, φλαμουριά) με σκοπό τη μελλοντική παραγωγή πολύτιμου ξύλου αλλά και για εδαφοβελτιωτικούς σκοπούς. Διατήρηση επίσης των μεμονομένων ατόμων ελάτης που αναπτύσσονται εντός της συστάδας.Απομάκρυνση όλων των στρεβλών, καχεκτικών , κακόμορφων και άρρωστων ατόμων δρυός, οξυάς και γενικότερα ατόμων που εμποδίζουν την ομαλή ανάπτυξη των υγιών και καλλίμορφων ατόμων. Απομάκρυνση των γηραιών δέντρων που τυχόν υπάρχουν γύρω από νεοφυτείες- πυκνοφυτείες και νεαρούς κορμούς προς ευνόηση αυτών.Οι καλλιεργητικές υλοτομίες της δρυός περιλαμβάνουν εξυγιαντικές υλοτομίες με απομάκρυνση όλων των γηραιών, άρρωστων, κακόμορφων, στρεβλών κ.λ.π. ατόμων, καθαρισμούς στις νεοφυτείες και στις πυκνοφυτείες και εξευγενιστικές αραιώσεις στα κορμίδια και αργότερα στους κορμούς. Το λήμμα για τη δρυ θα ανέλθει σε ποσοστό 10% του ξυλαποθέματος Απαγόρευση βόσκησης.	
25α	Μ.Π.	0,65-0,90	5-100	Σπερ. Υποκτηπ. Και κατά θέσεις κηπ. Σχεδόν ομήλ.	8.464,00	8.464,00	148,73	148,73	100,00	Μ.Πεύκη, Δρυς & Οξυά και κατά θέσεις διαμορφωμένος υπόροφος από Γαύρο, Οστρουά και Φράξο και λοιπά πλατύφυλλα είδη. Τα δευτερεύοντα αυτά είδη δεν συμμετέχουν στο λήμμα της συστάδας. Γενική κατάσταση: Η υγεία των κορμών είναι γενικά καλή, λίγα άτομα παρουσίασαν κακομορφίες. Επικράτηση των κατώτερων κλάσεων διαμέτρων για την οξυά και τη δρυ και της ανώτερης κλάσης για τη πεύκη. Αρκετά μεγάλα διάκενα σε όλη τη συστάδα. Σημάδια υπερβόσκησης. Ύπαρξη μεμονωμένων ατόμων ελάτης εντός της μικτής συστάδας, τα οποία δεν θα θιγούν, αλλά θα παραμείνουν για ενίσχυση της μίξης. Όλα τα διαχειριστικά μέτρα που προτείνονται στη συνέχεια έχουν ως κύριο στόχο τη διατήρηση της υπάρχουσας μίξης. Παχυμετρηθείσα επιφάνεια : 2 επιφάνειες των 1.5 στρέμματος για τη Μαύρη Πεύκη, 1 επιφάνεια των 2 στρεμμάτων για τη Δρυ, 1 επιφάνεια του 1.5 στρέμματος για την οξυά και οπτική εκτίμηση. Προτείνονται: Η επιδιωκτέα δασοπονική μορφή, η οποία θα προκύψει μετά τη λήψη των προτεινόμενων διαχειριστικών επεμβάσεων θα είναι η σπερμοφυής υποκτηπευτή και για τα τρία είδη που αναπτύσσονται στη συστάδα. Η διαχειριστική μορφή της οξυάς και δρυός προτείνονται καλλιεργητικές υλοτομίες με τέτοια ένταση ώστε ο βαθμός συγκόμμωσης να μην κατέρχεται του υπάρχοντος. Στη συνέχεια διενεργούνται σπερμοδότιδες και φωτοδότιδες υλοτομίες σε θέσεις όπου υπάρχει ιδιαίτερα αναπτυγμένη αναγέννηση του είδους και οπωσδήποτε στις καλύτερες ποιότητες τόπου. Τελική διεύρυνση των αναγεννηθέντων κέντρων αναγέννησης με υπόσκιες υλοτομίες εφόσον δεν έχει αποληφθεί το προβλεπόμενο λήμμα. Το λήμμα για την οξυά και δρυς θα ανέλθει σε ποσοστό 10% του συνολικού ξυλαποθέματος. Διατήρηση και ευνόηση των ευγενών πλατυφύλλων ειδών (σφένδαμος, φράξος, φλαμουριά), με σκοπό τη μελλοντική παραγωγή πολύτιμου ξύλου αλλά και για εδαφοβελτιωτικούς σκοπούς. Αναγεννητικές υλοτομίες με τη δημιουργία υπόσκιων υλοτομιών έκτασης περίπου 1 στρ., στις επιφάνειες της συστάδας που αναπτύσσονται αυξητικά ώριμες ενώσεις και παρατηρείται συσσώρευση ξυλώδους κεφαλαίου στην ανώτερη βαθμίδα διαμέτρου για τη μαύρη πεύκη. Απομάκρυνση των ατόμων μαύρης πεύκης που υπερβαίνουν την ώριμη προς υλοτομία διάμετρο του είδους (>45 εκ.). Αναμόχλευση του εδάφους με μηχανικά μέσα όπου αυτό είναι εφικτό για ευνόηση της αναγέννησης. Διενέργεια καλλιεργητικών υλοτομιών στις παραπάνω θέσεις (γύρω από νεοφυτείες- πυκνοφυτείες και νεαρούς κορμούς), με τέτοια ένταση ώστε ο βαθμός συγκόμμωσης να μην κατέρχεται του 0.7, με σκοπό τη ποιοτική βελτίωση του ξυλαποθέματος. Το ποσοστό του λήμματος για τη μαύρη πεύκη δεν θα υπερβαίνει το 8% του ξυλαποθέματος. Απομάκρυνση όλων των στρεβλών, καχεκτικών , κακόμορφων και άρρωστων ατόμων μαύρης πεύκης και γενικότερα ατόμων που εμποδίζουν την ομαλή ανάπτυξη των υγιών και καλλίμορφων ατόμων. Απομάκρυνση των γηραιών δέντρων	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2014-2023
	Δ.		10-40		372,00	299,00	10,80	8,68	80,38		
	Ο.		10-35		997,00	0,00	41,84	0,00	0,00		

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας / ha	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
										που τυχόν υπάρχουν γύρω από νεοφυτείες- πυκνοφυτείες και νεαρούς κορμούς προς ευνόηση αυτών. Οι καλλιεργητικές υλοτομίες της δρυός περιλαμβάνουν εξυγιαντικές υλοτομίες με απομάκρυνση όλων των γηραιών, άρρωστων, κακόμορφων, στρεβλών κ.λ.π. ατόμων, καθαρισμούς στις νεοφυτείες και στις πυκνοφυτείες και εξευγενιστικές αραιώσεις στα κορμίδα και αργότερα στους κορμούς. Απαγόρευση βόσκησης.	
25β	Ο.	0,8-1,25	10-35	Σπερ. Υποκηπ. Και κατά θέσεις κηπ.	3.237,00	1.037,00	56,49	18,10	32,04	Οξυά και Μαύρη Πεύκη. Δρυς και κατά θέσεις διαμορφωμένος υπόροφος από Γαύρο, Οστρυσά και Φράξο και λοιπά πλατύφυλλα είδη που δεν συμμετέχουν στο λήμμα της συστάδας. Διάσπαρτα άτομα Ελάτης. Η υγεία των κορμών είναι γενικά καλή, λίγα άτομα παρουσίασαν κακομορφίες. Επικράτηση των κατώτερων κλάσεων διαμέτρων για την οξυά και τη δρυ και της ανώτερης κλάσης για τη πεύκη. Αρκετά μεγάλα διάκενα σε όλη τη συστάδα. Σημάδια υπερβόσκησης.Παχυμετρηθείσα επιφάνεια : 2 επιφάνειες του ενός στρέμματος. Προτείνονται: Καλλιεργητικές υλοτομίες γύρω από νεοφυτείες- πυκνοφυτείες και νεαρούς κορμούς, με τέτοια ένταση ώστε ο βαθμός συγκόμωσης να μην κατέρχεται του υπάρχοντος, με σκοπό τη ποιοτική βελτίωση του ξυλαποθέματος. Οι επεμβάσεις στην Οξυά και την Πεύκη θα γίνουν σε όλες τις κλάσεις διαμέτρων. Εξυγιαντικές υλοτομίες με απομάκρυνση(αρνητική επιλογή) όλων των στρεβλών, καχεκτικών , κακόμορφων και άρρωστων ατόμων μαύρης Οξυάς και γενικότερα ατόμων που εμποδίζουν την ομαλή ανάπτυξη των υγιών και καλλίμορφων ατόμων. Απομάκρυνση των γηραιών δέντρων που τυχόν υπάρχουν γύρω από νεοφυτείες- πυκνοφυτείες και νεαρούς κορμούς προς ευνόηση αυτών. Αφαίρεση 10% του ξυλαποθέματος στην Οξυά και Πεύκη. Αναγεννητικές υλοτομίες με τη δημιουργία υπόσκιων υλοτομιών έκτασης περίπου 1 στρ., στις επιφάνειες της συστάδας που αναπτύσσονται αυξητικά ώριμες ενώσεις και παρατηρείται συσσώρευση ξυλώδους κεφαλαίου στην ανώτερη βαθμίδα διαμέτρου . Απομάκρυνση των ατόμων Οξυάς και Πεύκης που υπερβαίνουν την ώριμη προς υλοτομία διάμετρο του είδους (>45 εκ.). Αναμόχλευση του εδάφους με μηχανικά μέσα όπου αυτό είναι εφικτό για ευνόηση της αναγέννησης. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2014-2023
	Μ.Π.				2.072,00	524,00	52,71	13,33	25,29		
26α	Μ.Π.	0,45-0,7	15-145	Σπερ. Υποκηπ. Και κατά θέσεις κηπ. Σχεδόν ομήλ.	9.317,00	4.930,00	198,61	105,09	52,91	Μ.Πεύκη σε όλη την έκταση και σποραδική κατ' άτομο εμφάνιση Ελάτης και Οξυάς .Η υγεία των κορμών είναι γενικά καλή, μερικά άτομα παρουσίασαν κακομορφίες. Επικράτηση της μέσης κυρίως κλάσης διαμέτρων. Αρκετά διάκενα σε όλη τη συστάδα. Σημάδια έντονης βόσκησης. Ο κέδρος κατά θέσεις παρουσιάζει μεγάλη εξάπλωση. Ικανοποιητικού ύψους ξυλαποθέματος συστάδα. Παχυμετρηθείσα επιφάνεια : 2 επιφάνειες του 1 και 1,5 στρέμματος και οπτική εκτίμηση. Προτείνονται: Καλλιεργητικές υλοτομίες γύρω από νεοφυτείες- πυκνοφυτείες και νεαρούς κορμούς, με τέτοια ένταση ώστε ο βαθμός συγκόμωσης να μην κατέρχεται του υπάρχοντος, με σκοπό τη ποιοτική βελτίωση του ξυλαποθέματος. Οι επεμβάσεις στην Πεύκη θα γίνουν κατά κύριο λόγο στην ΙΙ κλάση διαμέτρων. Εξυγιαντικές υλοτομίες με απομάκρυνση(αρνητική επιλογή) όλων των στρεβλών, καχεκτικών , κακόμορφων και άρρωστων ατόμων μαύρης πεύκης και γενικότερα ατόμων που εμποδίζουν την ομαλή ανάπτυξη των υγιών και καλλίμορφων ατόμων. Απομάκρυνση των γηραιών δέντρων που τυχόν υπάρχουν γύρω από νεοφυτείες- πυκνοφυτείες και νεαρούς κορμούς προς ευνόηση αυτών. Αφαίρεση 8% του ξυλαποθέματος. Αναγεννητικές υλοτομίες με τη δημιουργία υπόσκιων υλοτομιών έκτασης περίπου 1 στρ., στις επιφάνειες της συστάδας που αναπτύσσονται αυξητικά ώριμες ενώσεις και παρατηρείται συσσώρευση ξυλώδους κεφαλαίου στην ανώτερη βαθμίδα διαμέτρου . Απομάκρυνση των ατόμων μαύρης πεύκης που υπερβαίνουν την ώριμη προς υλοτομία διάμετρο του είδους (>45 εκ.). Αναμόχλευση του εδάφους με μηχανικά μέσα όπου αυτό είναι εφικτό για ευνόηση της αναγέννησης. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2014-2023
26β	Μ.Π.	0,3-0,7	5-135	Σπερ. Υποκηπ. Και κατά θέσεις κηπ. Σχεδόν ομήλ.	5.304,00	1.330,00	239,46	60,05	25,08	Μ. Πεύκη αμιγής. Η υγεία των κορμών είναι γενικά καλή, λίγα άτομα παρουσίασαν κακομορφίες. Επικράτηση της κατώτερης και μέσης κυρίως κλάσης διαμέτρων. Αρκετά μικροδιάκενα σε όλη τη συστάδα. Σημάδια υπερβόσκησης. Παχυμετρηθείσα επιφάνεια : 1 επιφάνεια του 1 στρέμματος και οπτική εκτίμηση. Προτείνονται: Καλλιεργητικές υλοτομίες γύρω από νεοφυτείες- πυκνοφυτείες και νεαρούς κορμούς, με τέτοια ένταση ώστε ο βαθμός συγκόμωσης να μην κατέρχεται του υπάρχοντος, με σκοπό τη ποιοτική βελτίωση του ξυλαποθέματος. Οι επεμβάσεις στην Πεύκη θα γίνουν κατά κύριο λόγο στην ΙΙ κλάση διαμέτρων. Εξυγιαντικές υλοτομίες με απομάκρυνση(αρνητική επιλογή) όλων των στρεβλών, καχεκτικών , κακόμορφων και άρρωστων ατόμων μαύρης πεύκης και γενικότερα ατόμων που εμποδίζουν την ομαλή ανάπτυξη των υγιών και καλλίμορφων ατόμων. Απομάκρυνση των γηραιών δέντρων που τυχόν υπάρχουν γύρω από νεοφυτείες- πυκνοφυτείες και νεαρούς κορμούς προς ευνόηση αυτών. Αφαίρεση 10%	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2014-2023

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας /ha	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
										του ξυλαποθέματος. Αναγεννητικές υλοτομίες με τη δημιουργία υπόσκιων υλοτομιών έκτασης περίπου 1 στρ., στις επιφάνειες της συστάδας που αναπτύσσονται αυξητικά ώριμες ενώσεις και παρατηρείται συσσώρευση ξυλώδους κεφαλαίου στην ανώτερη βαθμίδα διαμέτρου . Απομάκρυνση των ατόμων μαύρης πεύκης που υπερβαίνουν την ώριμη προς υλοτομία διάμετρο του είδους (>45 εκ.). Αναμόχλευση του εδάφους με μηχανικά μέσα όπου αυτό είναι εφικτό για ευνόηση της αναγέννησης. Απαγόρευση βόσκησης.	
26γ	Δ.	0,5-0,65	5-25	Σπερ. Υποκτητ., ανομηλ.	2.198,00	0,00	39,11	0,00	0,00	Μ. Πεύκη και Δρυς με αρκετά άτομα Γαύρου, λίγα Σφενδάμου σε μίξη. Ελάτη κατά θέσεις και ελάχιστα μεμονωμένα άτομα σε σύμμιξη με Πεύκη και Δρυ. Γενική κατάσταση: Μέτρια σε όλη τη συστάδα. Στα ανάντη της συστάδας η Πεύκη κυριαρχεί, σε περιοχές σε μείξη με την Ελάτη, στο μέσο υπάρχει σύμμιξη όλων σχεδόν των δασοπονικών ειδών, στα κατώτερα και ειδικά προς το ρέμα επικρατεί η Δρυς με λοιπά πλατύφυλλα όπως Γαύρος και Σφένδαμος. Υπάρχουν σημάδια έντονης βόσκησης σχεδόν σε όλη την έκταση της συστάδας. Αρκετές κακομορφίες παρατηρήθηκαν τόσο στην Πεύκη όσο και στα πλατύφυλλα. Η Ελάτη δεν υπολογίσθηκε στο λήμμα για λόγους βελτίωσης μελλοντικά της ποιότητας του ξυλώδους κεφαλαίου. Παχυμετρηθείσα επιφάνεια : 2 επιφάνειες του 1,5 στρέμματος η κάθε μια και οπτική εκτίμηση. Προτείνονται: Καλλιεργητικές υλοτομίες γύρω από νεοφυτείες- πυκνοφυτείες και νεαρούς κορμούς, με τέτοια ένταση ώστε ο βαθμός συγκόμωσης να μην κατέρχεται του υπάρχοντος, με σκοπό τη ποιοτική βελτίωση του ξυλαποθέματος. Οι επεμβάσεις στην Πεύκη θα γίνουν κατά κύριο λόγο στην ΙΙ και ΙΙΙ κλάση διαμέτρων. Εξυγιαντικές υλοτομίες με απομάκρυνση(αρνητική επιλογή) όλων των στρεβλών, καχεκτικών , κακόμορφων και άρρωστων ατόμων μαύρης πεύκης και γενικότερα ατόμων που εμποδίζουν την ομαλή ανάπτυξη των υγιών και καλλίμορφων ατόμων. Απομάκρυνση των γηραιών δέντρων που τυχόν υπάρχουν γύρω από νεοφυτείες- πυκνοφυτείες και νεαρούς κορμούς προς ευνόηση αυτών. Αναγωγή της Δρυός με διενέργεια καλλιεργητικών υλοτομιών. Διατήρηση και ευνόηση των ευγενών πλατυφύλλων ειδών (σφένδαμος, φράξος) με σκοπό τη μελλοντική παραγωγή πολύτιμου ξύλου αλλά και για εδαφοβελτιωτικούς σκοπούς. Διατήρηση επίσης των μεμονωμένων ατόμων ελάτης. Αφαίρεση 8% του ξυλαποθέματος στην Πεύκη και 12% στη Δρυ. Αναγεννητικές υλοτομίες με τη δημιουργία υπόσκιων υλοτομιών έκτασης περίπου 1 στρ., στις επιφάνειες της συστάδας που αναπτύσσονται αυξητικά ώριμες ενώσεις και παρατηρείται συσσώρευση ξυλώδους κεφαλαίου στην ανώτερη βαθμίδα διαμέτρου . Απομάκρυνση των ατόμων μαύρης πεύκης που υπερβαίνουν την ώριμη προς υλοτομία διάμετρο του είδους (>45 εκ.). Αναμόχλευση του εδάφους με μηχανικά μέσα όπου αυτό είναι εφικτό για ευνόηση της αναγέννησης. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2014-2023
	Μ.Π.		1-140		9.987,00	6.608,00	182,64	120,85	66,17		
26δ		0,6-0,9	5-55	Σπερ. Ακαν.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Μαύρη Πεύκη σε μείξη με Δρυ και Γαύρο(103,94Ha), λίγη Οξυά στα ρέματα. Ποιοτική και υγιεινή κατάσταση σπερμοβλαστημάτων καλή με καλή ανάπτυξη. Ζημιές δεν παρατηρήθηκαν.Εκτός καλλιέργειας την παρούσα 10ετία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2014-2023
27α	Μ.Π.	0,6-0,9	25-105	Σπερ. Υποκτητ. Και κατά θέσεις κητ.	43.088,00	18.834,00	473,81	207,10	43,71	Μαύρη Πεύκη(90,94Ha) και κατά θέσεις υπόροφος από Ελάτη και Πυξάρι. Ποιοτική και υγιεινή κατάσταση σπερμοβλαστημάτων καλή με καλή ανάπτυξη. Ζημιές δεν παρατηρήθηκαν. Εκτός καλλιέργειας την παρούσα 10ετία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2014-2023
27β	Μ.Π.	0,5-0,8	130	Σπερ. - Υποκτητ. Έως κητ. Κατά θέσεις	3.046,00	755,00	28,55	7,08	24,79	Μ. Πεύκη και ελάχιστη Δρύ , Ελάτη και Οξυά . Γενική κατάσταση: Γενικά καλή. Η υγεία των κορμών είναι γενικά καλή, λίγα άτομα παρουσίασαν κακομορφίες. Επικράτηση της κατώτερης και μέσης κυρίως κλάσης διαμέτρων. Αρκετά μικροδιάκενα σε όλη τη συστάδα. Σημάδια υπερβόσκησης. Παχυμετρηθείσα επιφάνεια : 1 επιφάνεια του ενός στρέμματος. Προτείνονται: Καλλιεργητικές υλοτομίες γύρω από νεοφυτείες- πυκνοφυτείες και νεαρούς κορμούς, με τέτοια ένταση ώστε ο βαθμός συγκόμωσης να μην κατέρχεται του υπάρχοντος, με σκοπό τη ποιοτική βελτίωση του ξυλαποθέματος. Οι επεμβάσεις στην Πεύκη θα γίνουν κατά κύριο λόγο στην Ι και ΙΙ κλάση διαμέτρων. Εξυγιαντικές υλοτομίες με απομάκρυνση(αρνητική επιλογή) όλων των στρεβλών, καχεκτικών , κακόμορφων και άρρωστων ατόμων μαύρης πεύκης και γενικότερα ατόμων που εμποδίζουν την ομαλή ανάπτυξη των υγιών και καλλίμορφων ατόμων. Απομάκρυνση των γηραιών δέντρων που τυχόν υπάρχουν γύρω από νεοφυτείες- πυκνοφυτείες και νεαρούς κορμούς προς ευνόηση αυτών. Αφαίρεση 10% του ξυλαποθέματος. Αναγεννητικές υλοτομίες με τη δημιουργία υπόσκιων υλοτομιών έκτασης περίπου 1 στρ., στις επιφάνειες της συστάδας που αναπτύσσονται αυξητικά ώριμες ενώσεις και παρατηρείται συσσώρευση ξυλώδους	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2014-2023

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας /ha	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
										κεφαλαίου στην ανώτερη βαθμίδα διαμέτρου . Απομάκρυνση των ατόμων μαύρης πεύκης που υπερβαίνουν την ώριμη προς υλοτομία διάμετρο του είδους (>45 εκ.). Αναμόχλευση του εδάφους με μηχανικά μέσα όπου αυτό είναι εφικτό για ευνόηση της αναγέννησης. Απαγόρευση βόσκησης.	
28α		0,6-0,9	25-105	Σπερ. Υποκηπ.	0,00	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/Ο!	Μαύρη Πεύκη(47,36Ha) μέρος της οποίας προέκυψε από παλαιότερες αναδασώσεις(κυρίως στην περιοχή πάνω από το χωριό). Ποιοτική και υγιεινή κατάσταση σπερμοβλαστημάτων καλή με καλή ανάπτυξη. Ζημιές δεν παρατηρήθηκαν. Για προστατευτικούς λόγους για τον οικισμό Κοκκινοπηλού δεν πραγματοποιούνται υλοτομίες. Εκτός καλλιέργειας την παρούσα 10ετία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2014-2023
28β		0,6-0,9	25-105	Σπερ. Υποκηπ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Μαύρη Πεύκη(54,77Ha) και στα ψηλότερα Ελάτη. Ποιοτική και υγιεινή κατάσταση σπερμοβλαστημάτων καλή με καλή ανάπτυξη. Ζημιές δεν παρατηρήθηκαν. Για προστατευτικούς λόγους για τον οικισμό Κοκκινοπηλού δεν πραγματοποιούνται υλοτομίες. Εκτός καλλιέργειας την παρούσα 10ετία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2014-2023
29		0,6-0,9	5-105	Σπερ. Υποκηπ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Μαύρη Πεύκη(21,09Ha) και Ελάτη στα ψηλότερα. Ποιοτική και υγιεινή κατάσταση σπερμοβλαστημάτων καλή με καλή ανάπτυξη. Ζημιές δεν παρατηρήθηκαν. Εκτός διαχείρισης την παρούσα 10ετία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2014-2023
30		0,6-0,9	5-110	Σπερ. Υποκηπ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Μαύρη Πεύκη(50,28Ha). Ποιοτική και υγιεινή κατάσταση σπερμοβλαστημάτων καλή με καλή ανάπτυξη. Ζημιές δεν παρατηρήθηκαν.Εκτός καλλιέργειας την παρούσα 10ετία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2014-2023
31β	Μ.Π.	0,5-0,85	5-75	Σπερ. Υποκηπ. Και κατά θέσεις κηπ. Σχεδόν ομήλ.	16.737,00	7.395,00	304,14	134,38	44,18	Γενική κατάσταση: Μέτρια. Αρκετά άτομα με κακή ανάπτυξη, νεαρά και διχαλωτά. Πάρα πολλά άτομα στο στάδιο των νεαρών κορμιδίων υπολειπόμενα σε ανάπτυξη σε μεγάλο μέρος της έκτασης. Σημάδια έντονης βόσκησης σε όλη τη συστάδα. Το ξυλώδες κεφάλαιο εμφανίζεται πιο συγκροτημένο στα ανάντη της συστάδος. Παχυμετρηθείσα επιφάνεια : 2 επιφάνειες του 1,5 στρέμματος η κάθεμια και οπτική εκτίμηση. Προτείνονται: Καλλιεργητικές υλοτομίες γύρω από νεοφυτείες- πυκνοφυτείες και νεαρούς κορμούς, με τέτοια ένταση ώστε ο βαθμός συγκόμωσης να μην κατέρχεται του υπάρχοντος, με σκοπό τη ποιοτική βελτίωση του ξυλαποθέματος. Οι επεμβάσεις στην Πεύκη θα γίνουν κατά κύριο λόγο στην ΙΙ κλάση διαμέτρων. Εξυγιαντικές υλοτομίες με απομάκρυνση(αρνητική επιλογή) όλων των στρεβλών, καχεκτικών , κακόμορφων και άρρωστων ατόμων μαύρης πεύκης και γενικότερα ατόμων που εμποδίζουν την ομαλή ανάπτυξη των υγιών και καλλίμορφων ατόμων. Απομάκρυνση των γηραιών δέντρων που τυχόν υπάρχουν γύρω από νεοφυτείες- πυκνοφυτείες και νεαρούς κορμούς προς ευνόηση αυτών. Αφαίρεση 8% του ξυλαποθέματος. Αναγεννητικές υλοτομίες με τη δημιουργία υπόσκιων υλοτομιών έκτασης περίπου 1 στρ., στις επιφάνειες της συστάδας που αναπτύσσονται αυξητικά ώριμες ενώσεις και παρατηρείται συσσώρευση ξυλώδους κεφαλαίου στην ανώτερη βαθμίδα διαμέτρου . Απομάκρυνση των ατόμων μαύρης πεύκης που υπερβαίνουν την ώριμη προς υλοτομία διάμετρο του είδους (>45 εκ.). Αναμόχλευση του εδάφους με μηχανικά μέσα όπου αυτό είναι εφικτό για ευνόηση της αναγέννησης. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2014-2023
32		0,6-0,9	5-110	Ακαν.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Μαύρη Πεύκη(5,66Ha) και πουρνάρι και κέδρα(10Ha). Εκτός καλλιέργειας την παρούσα 10ετία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2014-2023
33		0,6-0,9	5-90	Ακαν.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ελάχιστα άτομα Πεύκης και Ελάτης(5,4Ha), πουρνάρι και κέδρο(15Ha).Η συστάδα βόσκειται σε όλο της την έκταση με αποτέλεσμα να είναι στο μεγαλύτερο μέρος της γυμνή.Εκτός καλλιέργειας την παρούσα 10ετία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2014-2023
12	Α.πλ.	0,8-1	5-35	Πρεμν. Ανομηλ.	2.924,00	0,00	20,00	0,00	0,00	Αείφυλλα πλατύφυλλα και Καστανιά. Η συστάδα έχει τη μορφή θαμνολίβαδου, χαρακτηριστικό παράδειγμα οπισθοδρομικής διαδοχής της βλάστησης. Προτείνονται: αποψιλωτικές υλοτομίες κατά πινάκια των 1-2 στρ. με παρακράτηση 10 -15 ατόμων ανά στρέμμα, στο 1/3 της συνολικής επιφάνειας, στις ώριμες	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΣΚΟΤΙΝΑΣ - ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ «ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ» 2013-2022

ΠΙΕΡΙΑ ΟΡΗ: ΕΖΔ GR1250002

ΥΠΟΜΝΗΜΑ:

Δασοπονικά Είδη: Δ/Δρ.= Δρυς, Δ.π.= Δρυς Πρεμνοφυής Μ.π.= Μαύρη Πεύκη, Πευκ.= Πεύκη Ο/Οξ.=Οξυά, Ελ.=Ελάτη, Γ.= Γαύρος, Λ.= Λεύκη Κασ.= Καστανιά, Φυλ.πλ./Φυλ.πλατ.= Φυλλοβόλα πλατύφυλλα, Αειφ.πλ.= Αείφυλλα πλατύφυλλα, Αναδ.= Αναδασώσεις, Ατ./α.= Άτομα

Διαχειριστική μορφή: Πρ./Πρεμν.= Πρεμνοφυής, Σπ.= Σπερμοφυής, Διφ.=Διφυής

Δασοπονική μορφή: Αν./Ανομ.= Αναμοιόμορφη, Ομ.= Ομοιόμορφη, Ακ.= Ακανόνιστη, Υποκ./Υπ.= Υποκτηπευτή, Παρακρατ.= Παρακρατήματα

Ηλικία: Γηραιοτ.= Γηραιότερα, Νεότ.= Νεότερα

Συγκόμωση: Συμπ./Συμ.= Σύμπυκτη, Αρ.= Αραιή, Χαλ.= Χαλαρή

Πίνακας 2.2.5 -3 Συγκρότηση δασικής βλάστησης στη περιοχή Πιερίων

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	ΣΥ συστάδας	Υ κλάσεων διαμέτρου >34 cm	ΣΥ συστάδας / ha	Υ κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
I ΛΜ	Μ. π - Άτ Δρ.									Εκτός διαχείρισης.Η έκταση της I Λιβαδικής Μονάδας αποτελείται κυρίως από ποολίβαδα και θαμνολίβαδα αείφυλλων - πλατύφυλλων με ξυλώδες κεφάλαιο χωρίς οικονομική σημασία αλλά μεγάλης προστατευτικής αξίας. ΘΑΜΝΟΛΙΒΑΔΑ: Quercus coccifera, Pyrus amygdaliformis, Ulmus campestre, Juniperus communis, Juniperus oxycedrus. ΠΟΟΛΙΒΑΔΑ: Festuca, Origanum, Cistus, Mentha arvensis, Geranium, Hordeum κ.λ.π..Έχει αναγνωρισθεί υπέρ ιδιώτη 1 δασοτεμάχιο έκτασης 7,87 στρ.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ
II ΛΜ	Μ.π-Δ.π				Μ.π.:6.690 Δ.π.:2.997	Μ.π.:3.233 Δ.π.:234	Μ.π.:334,50 Δ.π.:249,74	Μ.π.:161,65 Δ.π.:19,47	Μ.π.:48,33 Δ.π.:7,81	Εκτός διαχείρισης.Στην έκταση της II Λιβαδικής Μονάδας συμπριλαμβάνεται ο οικισμός του Καταφυγίου. Εκμεταλλεύεται κτηνοτροφικά και μερικώς γεωργικά από τους κατοίκους της περιοχής. Έχουν αναγνωρισθεί υπέρ ιδιωτών 4 δασοτεμάχια συνολικής έκτασης 13,09 στρ. Αρχή νέκρωσης της Δ. Πεύκης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ
III ΛΜ	Δ.π	0,6-0,7	50-100	Σπ.ακ.υποκ	8.035	3.512	116,45	50,9	43,71	Εκτός διαχείρισης. Το 1966 συντάχθηκε οριστική μελέτη βελτιώσεως βοσκοτόπων αλλά δεν ολοκληρώθηκε λόγω της συνεχούς μείωσης του κτηνοτροφικού κεφαλαίου. Επικρατέστερα είδη: Festuca hallii, Festuca ovina, Trifolium repens, Bromus, Poa alpina, Dactylis glomerata, Briza media, Fragaria vesca, Viola κ.λ.π. Έχουν αναγνωρισθεί υπέρ ιδιωτών 13 δασοτεμάχια. συνολικής έκτασης 77,49 στρ. Νέκρωση της Δ. Πεύκης	ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Iα	Μ.π-Δ.π	0,7-0,9	Μ.π.:20-120 Δ.π: 40-100	Σπ.ακ.υποκ	Μ.π.:9.145 Δ.π.:5.387	Μ.π.:3.383 Δ.π.:896	Μ.π.:285,17 Δ.π.:237,30	Μ.π.:105,72 Δ.π.:52,71	Μ.π.:36,99 Δ.π.:16,63	Εκτός διαχείρισης για υδρονομικούς και προστατευτικούς λόγους. Στη συστάδα βρίσκεται το αριστερό πρანές του μεγαλύτερου χειμάρου του Θολόλακκα του συμπλέγματος. Παρατηρούνται συνεχείς κατολισθήσεις εδώ και δεκαετίες και έχουν κατασκευαστεί πολλά τεχνικά (φράγματα κ.λ.π.) για τη συγκράτηση των εδαφών. Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες η συστάδα ήταν εκτός διαχείρισης με αποτέλεσμα να είναι εξ' ολοκλήρου δασοσκεπής.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Iβ	Μ.π	0,7-0,9	20-110	Σπ.ακ.υποκ	9.985	4.577	312,03	143,03	45,84	Καλλιεργητικές υλοτομίες σε όλες τις κλάσεις διαμέτρου με σκοπό την εξυγίανση και την ποιοτική αύξηση του ξυλώδους κεφαλαίου. Αναγεννητικές υλοτομίες στην ανώτερη κλάση διαμέτρων. Διεύρυνση των υπαρχόντων κέντρων φυσικής αναγέννησης της Μ. Πεύκης. Απαγόρευση βοσκής 5 χρόνια για τα πρόβατα, 7 χρόνια για τα μεγάλα ζώα και 10 χρόνια για τα γίδια. Ύπαρξη αναγνωρισμένων δασοτεμαχίων.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Iγ	Μ.π Δρ.+Φυλ. πλατ (11,6Ha)	0,8-1,0	20-120	Σπ.ακ.υποκ	Μ.π.:6.943 Φυλ.π.:116	Μ.π.:2.778 Φυλ.π.:0	Μ.π.:244,47 Φυλ.π.:10	Μ.π.:97,82 Φυλ.π.:0	Μ.π.:40,01 Φυλ.π.:0	Καλλιεργητικές υλοτομίες σε όλες τις κλάσεις διαμέτρου με σκοπό την εξυγίανση και την ποιοτική αύξηση του ξυλώδους κεφαλαίου. Αναγεννητικές υλοτομίες στην ανώτερη κλάση διαμέτρων. Διεύρυνση των υπαρχόντων κέντρων φυσικής αναγέννησης της Μ. Πεύκης. Απαγόρευση βοσκής 5 χρόνια για τα πρόβατα, 7 χρόνια για τα μεγάλα ζώα και 10 χρόνια για τα γίδια. Ύπαρξη αναγνωρισμένων δασοτεμαχίων.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	ΣΥ συστάδας	Υ κλάσεων διαμέτρου >34 cm	ΣΥ συστάδας / ha	Υ κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
1δ	Μ.π Δρ.+Φυλ. πλατ (4,8Ha)	0,7-0,9	20-120	Σπ.ακ.υποκ	Μ.π:14.547 Φυλ.π.:48	Μ.π:3.959 Φυλ.π.:0	Μ.π:438,16 Φυλ.π.:10	Μ.π:119,25 Φυλ.π.:0	Μ.π:27,22 Φυλ.π.:0	Καλλιεργητικές υλοτομίες σε όλες τις κλάσεις διαμέτρου με σκοπό την εξυγίανση και την ποιοτική αύξηση του ξυλώδους κεφαλαίου. Αναγεννητικές υλοτομίες στην ανώτερη κλάση διαμέτρων. Διεύρυνση των υπαρχόντων κέντρων φυσικής αναγέννησης της Μ. Πεύκης. Απαγόρευση βοσκής 5 χρόνια για τα πρόβατα, 7 χρόνια για τα μεγάλα ζώα και 10 χρόνια για τα γίδια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ
1ε	Μ.π,Ελ. Δ.π.,Πα- ραπο-ταμια	0,9	30-100	Σπ.ακ.υποκ	Μ.π:19.062 Δ.π:2.320 Ελ.201	Μ.π:8.501 Δ.π:1.229 Ελ.59	Μ.π:405,57 Δ.π:49,36 Ελ.18,35	Μ.π:180,87 Δ.π:26,15 Ελ.5,40	Μ.π:44,60 Δ.π:52,97 Ελ.29,35	Καλλιεργητικές υλοτομίες σε όλες τις κλάσεις διαμέτρου με σκοπό την εξυγίανση και την ποιοτική αύξηση του ξυλώδους κεφαλαίου. Αναγεννητικές υλοτομίες στην ανώτερη κλάση διαμέτρων. Διεύρυνση των υπαρχόντων κέντρων φυσικής αναγέννησης της Μ. Πεύκης. Απαγόρευση βοσκής 5 χρόνια για τα πρόβατα, 7 χρόνια για τα μεγάλα ζώα και 10 χρόνια για τα γίδια. Η συστάδα έχει καεί το 1945 και έχει αναδασωθεί πλήρως.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ
1στ	Μ.π,Ελ. Δ.π.	0,8-1,0	Μ.π:30-120 Δ.π:40-80 Ελ.20-60	Μ.π,Δ.π: Σπ.ακ.υποκ Ελ.Σπ.ομ.	Μ.π:8.214 Δ.π:6.844 Ελ.483	Μ.π:6.664 Δ.π:1.138 Ελ.0	Μ.π:503,93 Δ.π:316,85 Ελ.12,74	Μ.π:408,83 Δ.π:52,69 Ελ.0	Μ.π:81,13 Δ.π:1,66	Εκτός διαχείρισης το βόρειο τμήμα της συστάδας για προστατευτικούς λόγους εξαίτιας της κατολίσθησης που έλαβε μέρος στο δρόμο Βελβεντού - Καταφυγίου. Καλλιεργητικές υλοτομίες σε όλες τις κλάσεις διαμέτρου με σκοπό την εξυγίανση και την ποιοτική αύξηση του ξυλώδους κεφαλαίου, στο μεσαίο τμήμα της συστάδας και σε έκταση 16,2 Ha. Αναγεννητικές υλοτομίες στην ανώτερη κλάση διαμέτρων. Διεύρυνση των υπαρχόντων κέντρων φυσικής αναγέννησης της Μ. Πεύκης. Απαγόρευση βοσκής 5 χρόνια για τα πρόβατα, 7 χρόνια για τα μεγάλα ζώα και 10 χρόνια για τα γίδια σε όλη της συστάδας.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ
1ζ	Μ.π,Ελ. Δ.π.	0,8-1,0	Μ.π:30-120 Δ.π:40-100 Ελ.20-120	Σπ.ακ.υποκ	Μ.π:12.548 Δ.π:2.219 Ελ.9.289	Μ.π:10.491 Δ.π:2.219 Ελ.5.429	Μ.π:545,55 Δ.π:92,45 Ελ.249,70 (383,50+4,15)	Μ.π:456,13 Δ.π:92,46 Ελ.226,21	Μ.π:83,61 Δ.π:100 Ελ.58,45	Λόγω της πυρκαγιάς του έτους 2007 έχει κηρυχθεί αναδασωτέα έκταση 9,80 Ha -Εκτός διαχείρισης. Καλλιεργητικές υλοτομίες σε όλες τις κλάσεις διαμέτρου με σκοπό την εξυγίανση και την ποιοτική αύξηση του ξυλώδους κεφαλαίου. Αναγεννητικές υλοτομίες στην ανώτερη κλάση διαμέτρων. Υποβοήθηση της εγκατάστασης της Ελάτης. Απαγόρευση βοσκής 5 χρόνια για τα πρόβατα, 7 χρόνια για τα μεγάλα ζώα και 10 χρόνια για τα γίδια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ
1η	Ελ. Δ.π.	0,7-1,0	Δ.π:40-100 Ελ.20-120	Σπ.ακ.υποκ	Δ.π:3.368 Ελ.10.320	Δ.π:3.368 Ελ.5.982	Δ.π:116,13 Ελ.355,87	Δ.π:116,13 Ελ.206,28	Δ.π:100 Ελ.57,97	Εκτός διαχείρισης. Λόγω της πυρκαγιάς του έτους 2007 έχει κηρυχθεί αναδασωτέα έκταση 26 από τα 29 Ha. Δεν υπήρξαν εκτεταμένες νεκρώσεις λόγω της πυρκαγιάς και δεν χρειάστηκε να πραγματοποιηθούν αποψιλωτικές υλοτομίες.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ
2α										Εκτός Διαχείρισης. Λόγω της πυρκαγιάς του έτους 2007 έχει κηρυχθεί αναδασωτέα όλη η έκταση της συστάδας.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ
2β	Μ.π, παρουσία Ελ. Δ.π.									Εκτός Διαχείρισης. Λόγω της πυρκαγιάς του έτους 2007 έχει κηρυχθεί αναδασωτέα όλη η έκταση της συστάδας.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ
2γ	Μ.π, Δ.π.									Εκτός Διαχείρισης. Λόγω της πυρκαγιάς του έτους 2007 έχει κηρυχθεί αναδασωτέα όλη η έκταση της συστάδας.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ
2δ	Δ.π, .Ελ.									Εκτός Διαχείρισης. Λόγω της πυρκαγιάς του έτους 2007 έχει κηρυχθεί αναδασωτέα όλη η έκταση της συστάδας.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ
2ε	Μ.π, Δ.π.									Εκτός Διαχείρισης. Λόγω της πυρκαγιάς του έτους 2007 έχει κηρυχθεί αναδασωτέα όλη η έκταση της συστάδας.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ
2στ	Μ.π, άτομα Δ.π.									Εκτός Διαχείρισης. Λόγω της πυρκαγιάς του έτους 2007 έχει κηρυχθεί αναδασωτέα όλη η έκταση της συστάδας.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	ΣΥ συστάδας	Υ κλάσεων διαμέτρου >34 cm	ΣΥ συστάδας / ha	Υ κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
2ζ	Μ.π, συδενδρ. Φυλ. πλατ., Δρ.	0,60-0,7	40-60	Σπ.ομ.	8.742	5.432	412,74	256,47	62,14	Εκτός διαχείρισης. Πολλές βραχώδης εξάρσεις. Μεγάλες κλίσεις. Κατάντι στο ρέμα Καθαρόλακα υφίστανται ενώσεις πλατυφύλλων. Παλιός βοσκότοπος στον οποίο αναπτύχθηκε το δάσος μετά την εγκατάλειψη του Καταφυγίου από τους κατοίκους του.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ
2η	Μ.π, άτομα Δ.π.	0,60-0,7	40-60	Σπ.ομ.	14.469	4.950	380,76	130,26	34,21	Το δάσος έχει αναπτυχθεί σε εγκαταλειμμένους αγρούς. Έχουν αναγνωρισθεί υπέρ ιδιωτών 15 δασοτεμάχια, συνολικής έκτασης 66,33 στρ. Εκτός διαχείρισης έκταση των 25,0 Ηα. Στην έκταση των 13,0 Ηα καλλιεργητικές υλοτομίες σε Ι έως ΙΙΙ κλάσεις διαμέτρου με σκοπό την εξυγίανση και την ποιοτική αύξηση του ξυλώδους κεφαλαίου. Αναγεννητικές υλοτομίες στην ανώτερη κλάση διαμέτρων. Απαγόρευση βοσκής 5 χρόνια για τα πρόβατα, 7 χρόνια για τα μεγάλα ζώα και 10 χρόνια για τα γίδια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ
3α	Μ.π, Δ.π.									Εκτός Διαχείρισης. Λόγω της πυρκαγιάς του έτους 2007 έχει κηρυχθεί αναδασωτέα όλη η έκταση της συστάδας.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ
3β	Δ.π.									Εκτός Διαχείρισης. Νέκρωση Δ. Πεύκης. Λόγω της πυρκαγιάς του έτους 2007 έχει κηρυχθεί αναδασωτέα όλη η έκταση της συστάδας.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ
3γ	Δ.π, άτομα Ελ.									Εκτός Διαχείρισης. Νέκρωση Δ. Πεύκης. Λόγω της πυρκαγιάς του έτους 2007 έχει κηρυχθεί αναδασωτέα όλη η έκταση της συστάδας.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ
3δ	Δ.π, άτομα Ελ.									Εκτός Διαχείρισης. Νέκρωση Δ. Πεύκης. Λόγω της πυρκαγιάς του έτους 2007 έχει κηρυχθεί αναδασωτέα όλη η έκταση της συστάδας.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ
3ε	Δ.π, Ελ.									Εκτός Διαχείρισης. Νέκρωση Δ. Πεύκης. Λόγω της πυρκαγιάς του έτους 2007 έχει κηρυχθεί αναδασωτέα όλη η έκταση της συστάδας.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ
3στ	Δ.π, Ελ.	0,7-0,8	Δ.π:50-90 Ελ.10-50	Δ.π:Σπ.,ακ. Ελ.:Σπ., ομ.	Δ.π:10.855	Δ.π:9.069	Δ.π:471,95	Δ.π:394,30	Δ.π:83,55	Νέκρωση Δ. Πεύκης. Λόγω της πυρκαγιάς του έτους 2007 έχει κηρυχθεί αναδασωτέα έκταση της Ελάτης σε 10,0 Ηα. Εκτός διαχείρισης συνολικά έκταση των 22,0 Ηα. Στην έκταση των 11,0 Ηα καλλιεργητικές υλοτομίες σε Ι έως ΙΙΙ κλάσεις διαμέτρου με σκοπό την εξυγίανση και την ποιοτική αύξηση του ξυλώδους κεφαλαίου. Αναγεννητικές υλοτομίες στην ανώτερη κλάση διαμέτρων. Απαγόρευση βοσκής 5 χρόνια για τα πρόβατα, 7 χρόνια για τα μεγάλα ζώα και 10 χρόνια για τα γίδια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ
4α	Δ.π.	0,7-0,9	50-60	Σπ., ομ.	12.456	4.426	311,4	110,65	35,53	Νέκρωση Δ. Πεύκης. Εκτός διαχείρισης έκταση 20,0 Ηα. Στην έκταση των 20,0 Ηα καλλιεργητικές υλοτομίες σε Ι έως ΙΙΙ κλάσεις διαμέτρου με σκοπό την εξυγίανση και την ποιοτική αύξηση του ξυλώδους κεφαλαίου. Αναγεννητικές υλοτομίες στην ανώτερη κλάση διαμέτρων. Απαγόρευση βοσκής 5 χρόνια για τα πρόβατα, 7 χρόνια για τα μεγάλα ζώα και 10 χρόνια για τα γίδια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ
4β	Δ.π, άτομα Μ.π.	0,7-0,9	50-60	Σπ., ομ.	10.025	2.851	371,33	105,6	28,44	Νέκρωση Δ. Πεύκης. Εκτός διαχείρισης έκταση 43,0 Ηα. Στην έκταση των 10,0 Ηα καλλιεργητικές υλοτομίες σε Ι έως ΙΙΙ κλάσεις διαμέτρου με σκοπό την εξυγίανση και την ποιοτική αύξηση του ξυλώδους κεφαλαίου. Αναγεννητικές υλοτομίες στην ανώτερη κλάση διαμέτρων. Απαγόρευση βοσκής 5 χρόνια για τα πρόβατα, 7 χρόνια για τα μεγάλα ζώα και 10 χρόνια για τα γίδια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ
4γ	Δ.π.	0,7-0,9	50-60	Σπ., ομ.	8.716	1.353	242,11	37,58	15,52	Νέκρωση Δ. Πεύκης. Εκτός διαχείρισης έκταση 16,0 Ηα. Στην έκταση των 20,0 Ηα καλλιεργητικές υλοτομίες σε Ι έως ΙΙΙ κλάσεις διαμέτρου με σκοπό την εξυγίανση και την ποιοτική αύξηση του ξυλώδους κεφαλαίου. Αναγεννητικές υλοτομίες στην ανώτερη κλάση διαμέτρων. Απαγόρευση βοσκής 5 χρόνια για τα πρόβατα, 7 χρόνια για τα μεγάλα ζώα και 10 χρόνια για τα γίδια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	ΣΥ συστάδας	Υ κλάσεων διαμέτρου >34 cm	ΣΥ συστάδας / ha	Υ κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
46	Δ.π.	0,9-1,0	50-60	Σπ., ομ.	27.991	19.312	411,63	284	68,99	Νέκρωση Δ. Πεύκης. Εκτός διαχείρισης έκταση 34,0 Ha. Στην έκταση των 34,0 Ha καλλιεργητικές υλοτομίες σε Ι έως ΙΙΙ κλάσεις διαμέτρου με σκοπό την εξυγίανση και την ποιοτική αύξηση του ξυλώδους κεφαλαίου. Αναγεννητικές υλοτομίες στην ανώτερη κλάση διαμέτρων. Απαγόρευση βοσκής 5 χρόνια για τα πρόβατα, 7 χρόνια για τα μεγάλα ζώα και 10 χρόνια για τα γίδια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ
4ε	Δ.π.	0,9-1,0	50-60	Σπ., ομ.	17.335	11.628	403,14	270,42	67,08	Νέκρωση Δ. Πεύκης. Εκτός διαχείρισης έκταση 31,0 Ha. Στην έκταση των 12,0 Ha καλλιεργητικές υλοτομίες σε Ι έως ΙΙΙ κλάσεις διαμέτρου με σκοπό την εξυγίανση και την ποιοτική αύξηση του ξυλώδους κεφαλαίου. Αναγεννητικές υλοτομίες στην ανώτερη κλάση διαμέτρων. Απαγόρευση βοσκής 5 χρόνια για τα πρόβατα, 7 χρόνια για τα μεγάλα ζώα και 10 χρόνια για τα γίδια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ
4στ	Δ.π.	0,8-1,0	50-80	Σπ., ομ.	16.481	5.932	343,35	123,58	35,99	Νέκρωση Δ. Πεύκης. Εκτός διαχείρισης	ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ
4ζ	Δ.π.	0,7-0,8	50-70	Σπ.ακ.υποκ	23.672	17.371	483,1	354,51	73,38	Νέκρωση Δ. Πεύκης. Εκτός διαχείρισης έκταση 40,0 Ha. Στην έκταση των 9,0 Ha καλλιεργητικές υλοτομίες σε Ι έως ΙΙΙ κλάσεις διαμέτρου με σκοπό την εξυγίανση και την ποιοτική αύξηση του ξυλώδους κεφαλαίου. Αναγεννητικές υλοτομίες στην ανώτερη κλάση διαμέτρων. Απαγόρευση βοσκής 5 χρόνια για τα πρόβατα, 7 χρόνια για τα μεγάλα ζώα και 10 χρόνια για τα γίδια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ
5α	Μ.π, Δ.π.	0,7-0,8	Μ.π:50-70 Δ.π:50-80	Σπ.ακ.υποκ	Μ.π:8.449 Δ.π:15.725	Μ.π:2.232 Δ.π:9.867	Μ.π:444,67 Δ.π:413,82	Μ.π:117,47 Δ.π:259,65	Μ.π:26,42 Δ.π:40,77	Νέκρωση Δ. Πεύκης. Εκτός διαχείρισης έκταση 40,0 Ha. Στην έκταση των 17,0 Ha καλλιεργητικές υλοτομίες σε Ι έως ΙΙΙ κλάσεις διαμέτρου με σκοπό την εξυγίανση και την ποιοτική αύξηση του ξυλώδους κεφαλαίου. Αναγεννητικές υλοτομίες στην ανώτερη κλάση διαμέτρων. Απαγόρευση βοσκής 5 χρόνια για τα πρόβατα, 7 χρόνια για τα μεγάλα ζώα και 10 χρόνια για τα γίδια.Υπάρχουν εγκαταλειμμένοι αγροί που έχουν δασωθεί.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ
5β	Μ.π, Δ.π.	0,7-0,9	Μ.π:50-70 Δ.π:50-80	Σπ.ακ.υποκ	Μ.π:13.049 Δ.π:12.137	Μ.π:5.821 Δ.π:8.435	Μ.π:621,35 Δ.π:577,94	Μ.π:277,19 Δ.π:401,67	Μ.π:44,61 Δ.π:69,50	Νέκρωση Δ. Πεύκης. Εκτός διαχείρισης έκταση 26,0 Ha. Στην έκταση των 16,0 Ha καλλιεργητικές υλοτομίες σε Ι έως ΙΙΙ κλάσεις διαμέτρου με σκοπό την εξυγίανση και την ποιοτική αύξηση του ξυλώδους κεφαλαίου. Αναγεννητικές υλοτομίες στην ανώτερη κλάση διαμέτρων. Απαγόρευση βοσκής 5 χρόνια για τα πρόβατα, 7 χρόνια για τα μεγάλα ζώα και 10 χρόνια για τα γίδια. Υπάρχουν εγκαταλειμμένοι αγροί που έχουν δασωθεί.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ
5γ	Δ.π.	0,7-0,9	50-90	Σπ.ακ.υποκ	17.460	10.307	311,79	184,05	59,03	Νέκρωση Δ. Πεύκης. Εκτός διαχείρισης έκταση 38,0 Ha. Στην έκταση των 18,0 Ha καλλιεργητικές υλοτομίες σε Ι έως ΙΙΙ κλάσεις διαμέτρου με σκοπό την εξυγίανση και την ποιοτική αύξηση του ξυλώδους κεφαλαίου. Αναγεννητικές υλοτομίες στην ανώτερη κλάση διαμέτρων. Απαγόρευση βοσκής 5 χρόνια για τα πρόβατα, 7 χρόνια για τα μεγάλα ζώα και 10 χρόνια για τα γίδια.Υπάρχουν εγκαταλειμμένοι αγροί που έχουν δασωθεί.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ
5δ	Δ.π.	0,7-0,9	50-90	Σπ.ακ.υποκ	15.005	5.654	214,36	80,77	37,68	Νέκρωση Δ. Πεύκης. Εκτός διαχείρισης έκταση 50,0 Ha. Στην έκταση των 20,0 Ha καλλιεργητικές υλοτομίες σε Ι έως ΙΙΙ κλάσεις διαμέτρου με σκοπό την εξυγίανση και την ποιοτική αύξηση του ξυλώδους κεφαλαίου. Αναγεννητικές υλοτομίες στην ανώτερη κλάση διαμέτρων. Απαγόρευση βοσκής 5 χρόνια για τα πρόβατα, 7 χρόνια για τα μεγάλα ζώα και 10 χρόνια για τα γίδια. Υπάρχουν εγκαταλειμμένοι αγροί που έχουν δασωθεί.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ
5ε	Δ.π.	0,7-0,8	50-100	Σπ.ακ.υποκ	12.152	8.608	319,79	226,53	70,84	Νέκρωση Δ. Πεύκης. Εκτός διαχείρισης έκταση 13,0 Ha. Στην έκταση των 25,0 Ha καλλιεργητικές υλοτομίες σε Ι έως ΙΙΙ κλάσεις διαμέτρου με σκοπό την εξυγίανση και την ποιοτική αύξηση του ξυλώδους κεφαλαίου. Αναγεννητικές υλοτομίες στην ανώτερη κλάση διαμέτρων. Απαγόρευση βοσκής 5 χρόνια για τα πρόβατα, 7 χρόνια για τα μεγάλα ζώα και 10 χρόνια για τα γίδια. Υπάρχουν εγκαταλειμμένοι αγροί που έχουν δασωθεί.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	ΣΥ συστάδας	V κλάσεων διαμέτρου >34 cm	ΣΥ συστάδας / ha	V κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
5στ	Δ.π.	0,7-0,9	50-90	Σπ.ακ.υποκ	17.811	13.178	287,27	212,55	73,99	Νέκρωση Δ. Πεύκης. Εκτός διαχείρισης έκταση 42,0 Ha. Στην έκταση των 20,0 Ha καλλιεργητικές υλοτομίες σε I έως III κλάσεις διαμέτρου με σκοπό την εξυγίανση και την ποιοτική αύξηση του ξυλώδους κεφαλαίου. Αναγεννητικές υλοτομίες στην ανώτερη κλάση διαμέτρων. Απαγόρευση βοσκής 5 χρόνια για τα πρόβατα, 7 χρόνια για τα μεγάλα ζώα και 10 χρόνια για τα γίδια. Στα ψηλότερα της συστάδας τεχνητές αναδασώσεις με Δ. Πεύκη. Παλαιότερα η συστάδα κάηκε και λαθροϋλοτομούνταν.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ
5ζ	Δ.π.	0,7-0,8	50-100	Σπ.ακ.υποκ	6.098	4.796	179,35	141,06	78,65	Νέκρωση Δ. Πεύκης. Εκτός διαχείρισης έκταση 19,0 Ha. Στην έκταση των 15,0 Ha καλλιεργητικές υλοτομίες σε I έως III κλάσεις διαμέτρου με σκοπό την εξυγίανση και την ποιοτική αύξηση του ξυλώδους κεφαλαίου. Αναγεννητικές υλοτομίες στην ανώτερη κλάση διαμέτρων. Απαγόρευση βοσκής 5 χρόνια για τα πρόβατα, 7 χρόνια για τα μεγάλα ζώα και 10 χρόνια για τα γίδια. Κατά θέσεις ομάδες παλαιού δάσους.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ
5η	Δ.π.	0,7-1,0	50-90	Σπ.ακ.υποκ	15.984	9.675	249,75	151,17	60,53	Νέκρωση Δ. Πεύκης. Εκτός διαχείρισης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ
5θ	Δ.π.	0,6-0,7	50-90	Σπ.ακ.υποκ	25.896	4.706	184,97	33,61	18,17	Νέκρωση Δ. Πεύκης. Εκτός διαχείρισης έκταση 125,0 Ha. Στην έκταση των 15,0 Ha καλλιεργητικές υλοτομίες σε I έως III κλάσεις διαμέτρου με σκοπό την εξυγίανση και την ποιοτική αύξηση του ξυλώδους κεφαλαίου. Αναγεννητικές υλοτομίες στην ανώτερη κλάση διαμέτρων. Απαγόρευση βοσκής 5 χρόνια για τα πρόβατα, 7 χρόνια για τα μεγάλα ζώα και 10 χρόνια για τα γίδια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ
6α	Δ.π.	0,8-0,9	50-100	Σπ.ακ.υποκ	20.882	15316	298,31	218,8	73,35	Νέκρωση Δ. Πεύκης. Σε έκταση 50,0 Ha καλλιεργητικές υλοτομίες σε I έως III κλάσεις διαμέτρου με σκοπό την εξυγίανση και την ποιοτική αύξηση του ξυλώδους κεφαλαίου. Αναγεννητικές υλοτομίες στην ανώτερη κλάση διαμέτρων. Απαγόρευση βοσκής 5 χρόνια για τα πρόβατα, 7 χρόνια για τα μεγάλα ζώα και 10 χρόνια για τα γίδια. Στο μέσο της συστάδας υπάρχουν δασωθέντες αγροί εκ των οποίων έχουν αναγνωρισθεί 17 δασοτεμάχια συνολικής έκτασης 114,27 στρ.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ
6β	Δ.π.	0,8-0,9	50-100	Σπ.ακ.υποκ	15.243	10.902	282,28	201,89	71,52	Νέκρωση Δ. Πεύκης. Σε έκταση 45,0 Ha καλλιεργητικές υλοτομίες σε I έως III κλάσεις διαμέτρου με σκοπό την εξυγίανση και την ποιοτική αύξηση του ξυλώδους κεφαλαίου. Αναγεννητικές υλοτομίες στην ανώτερη κλάση διαμέτρων. Απαγόρευση βοσκής 5 χρόνια για τα πρόβατα, 7 χρόνια για τα μεγάλα ζώα και 10 χρόνια για τα γίδια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ
6γ	Δ.π.	0,7-0,8	70-80	Σπ.ακ.υποκ	5.106	2.375	182,36	84,82	46,51	Νέκρωση Δ. Πεύκης. Σε έκταση 25,0 Ha καλλιεργητικές υλοτομίες σε I έως III κλάσεις διαμέτρου με σκοπό την εξυγίανση και την ποιοτική αύξηση του ξυλώδους κεφαλαίου. Αναγεννητικές υλοτομίες στην ανώτερη κλάση διαμέτρων. Απαγόρευση βοσκής 5 χρόνια για τα πρόβατα, 7 χρόνια για τα μεγάλα ζώα και 10 χρόνια για τα γίδια. Στο βόρειο τμήμα της συστάδας υπάρχουν δασωθέντες αγροί εκ των οποίων έχουν αναγνωρισθεί 7 δασοτεμάχια συνολικής έκτασης 38,26 στρ.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ
6δ	Δ.π.	0,7-0,8	60-100	Σπ.ακ.υποκ	17.031	12.848	340,62	256,96	75,44	Νέκρωση Δ. Πεύκης. Σε έκταση 40,0 Ha καλλιεργητικές υλοτομίες σε I έως III κλάσεις διαμέτρου με σκοπό την εξυγίανση και την ποιοτική αύξηση του ξυλώδους κεφαλαίου. Αναγεννητικές υλοτομίες στην ανώτερη κλάση διαμέτρων. Απαγόρευση βοσκής 5 χρόνια για τα πρόβατα, 7 χρόνια για τα μεγάλα ζώα και 10 χρόνια για τα γίδια. Στο κατάντη τμήμα της συστάδας υπάρχουν δασωθέντες αγροί εκ των οποίων έχουν αναγνωρισθεί 8 δασοτεμάχια συνολικής έκτασης 63,71 στρ.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ
6στ	Δ.π.	0,7-0,8	50-100	Σπ.ακ.υποκ	13.995	8.801	205,22	129,43	63,07	Νέκρωση Δ. Πεύκης. Σε έκταση 60,0 Ha καλλιεργητικές υλοτομίες σε I έως III κλάσεις διαμέτρου με σκοπό την εξυγίανση και την ποιοτική αύξηση του ξυλώδους κεφαλαίου. Αναγεννητικές υλοτομίες στην ανώτερη κλάση διαμέτρων. Απαγόρευση βοσκής 5 χρόνια για τα πρόβατα, 7 χρόνια για τα μεγάλα ζώα και 10 χρόνια για τα γίδια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	ΣΥ συστάδας	V κλάσεων διαμέτρου >34 cm	ΣΥ συστάδας / ha	V κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
										Στο κατάντη τμήμα της συστάδας υπάρχουν δασωθέντες αγροί εκ των οποίων έχουν αναγνωρισθεί 8 δασοτεμάχια συνολικής έκτασης 44,89 στρ.	
7α	Μ.π., Δ.π.	0,7-0,9	50-100	Σπ.ακ.υποκ	Μ.π.:3.250 Δ.π.:3.845	Μ.π.:2.132 Δ.π.:2.630	Μ.π.:212,67 Δ.π.:192,3	Μ.π.:142,13 Δ.π.:131,50	Μ.π.:65,60 Δ.π.:68,40	Νέκρωση Δ. Πεύκης. Σε έκταση 24,0 Ha καλλιεργητικές υλοτομίες σε I έως III κλάσεις διαμέτρου με σκοπό την εξυγίανση και την ποιοτική αύξηση του ξυλώδους κεφαλαίου. Αναγεννητικές υλοτομίες στην ανώτερη κλάση διαμέτρων. Απαγόρευση βοσκής 5 χρόνια για τα πρόβατα, 7 χρόνια για τα μεγάλα ζώα και 10 χρόνια για τα γίδια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ
7β	Μ.π., Δ.π.	0,7-0,9	50-100	Σπ.ακ.υποκ	Μ.π.:1.300 Δ.π.:8.557	Μ.π.:853 Δ.π.:6.637	Μ.π.:216,67 Δ.π.:213,93	Μ.π.:142,20 Δ.π.:165,90	Μ.π.:65,62 Δ.π.:77,56	Νέκρωση Δ. Πεύκης. Σε έκταση 30,0 Ha καλλιεργητικές υλοτομίες σε I έως III κλάσεις διαμέτρου με σκοπό την εξυγίανση και την ποιοτική αύξηση του ξυλώδους κεφαλαίου. Αναγεννητικές υλοτομίες στην ανώτερη κλάση διαμέτρων. Απαγόρευση βοσκής 5 χρόνια για τα πρόβατα, 7 χρόνια για τα μεγάλα ζώα και 10 χρόνια για τα γίδια. Στα ανάντη της συστάδας απαντώνται κατά θέσεις κορμοί μεγάλης διαμέτρου που απέμειναν από πυρκαγιά.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ
8α	Μπ., Ελ., Οξ.	0,8-1,0	Μ.π.:60-100 Ελ.:50-100 Οξ: 20-60	Σπ.ακ.υποκ	Μ.π: 11.571 Ελ.:12.053 Οξ: 713	Μ.π: 5.235,0 Ελ.:1.963,0 Οξ: 85,00	Μ.π: 241,06 Ελ.:200,88 Οξ: 59,42	Μ.π: 109,06 Ελ.:32,72 Οξ: 7,08	Μ.π: 45,24 Ελ.:16,29 Οξ: 11,92	Μεγάλες κλίσεις εδαφών. Σε έκταση 15,0 Ha καλλιεργητικές υλοτομίες σε I έως III κλάσεις διαμέτρου με σκοπό την εξυγίανση και την ποιοτική αύξηση του ξυλώδους κεφαλαίου. Αναγεννητικές υλοτομίες στην ανώτερη κλάση διαμέτρων. Απαγόρευση βοσκής 5 χρόνια για τα πρόβατα, 7 χρόνια για τα μεγάλα ζώα και 10 χρόνια για τα γίδια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ
8β	Μπ., Ελ.	0,7-0,8	Μ.π.:60-100 Ελ.:50-100	Σπ.ακ.υποκ	Μ.π: 20.230 Ελ.:748	Μ.π: 10.079 Ελ.:241	Μ.π: 354 Ελ.:17,40	Μ.π: 194,37 Ελ.:5,02	Μ.π: 54,77 Ελ.:32,22	Ζημιές παρατηρούνται λόγω των μεγάλων κλίσεων του εδάφους στο ξυλαπόθεμα. Σε έκταση 16,0 Ha καλλιεργητικές υλοτομίες σε I έως III κλάσεις διαμέτρου με σκοπό την εξυγίανση και την ποιοτική αύξηση του ξυλώδους κεφαλαίου. Αναγεννητικές υλοτομίες στην ανώτερη κλάση διαμέτρων. Απαγόρευση βοσκής 5 χρόνια για τα πρόβατα, 7 χρόνια για τα μεγάλα ζώα και 10 χρόνια για τα γίδια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ
8γ	Μπ., Ελ.	0,7-0,8	Μ.π.:60-100 Ελ.:50-100	Σπ.ακ.υποκ	Μ.π: 14.477 Ελ.:8.110	Μ.π: 1.085 Ελ.:4.518	Μ.π: 268,09 Ελ.:450,56	Μ.π: 20,09 Ελ.:251,00	Μ.π: 7,49 Ελ.:55,71	Η συστάδα κάηκε το 1942 και στη συνέχεια αναδασώθηκε τεχνητά. Στην περιοχή του ρέματος πλήρης εγκατάσταση της ελάτης. Σε έκταση 12,0 Ha καλλιεργητικές υλοτομίες σε I έως III κλάσεις διαμέτρου με σκοπό την εξυγίανση και την ποιοτική αύξηση του ξυλώδους κεφαλαίου. Αναγεννητικές υλοτομίες στην ανώτερη κλάση διαμέτρων. Απαγόρευση βοσκής 5 χρόνια για τα πρόβατα, 7 χρόνια για τα μεγάλα ζώα και 10 χρόνια για τα γίδια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ
8δ	Μπ., Οξ., Άτομα Ελ.	0,7-0,8	Μ.π.:60-100 Οξ:50-100	Σπ.ακ.υποκ	Μ.π: 14.512 Οξ: 1.050	Μ.π: 698 Οξ: 84	Μ.π: 315,48 Οξ: 45,65	Μ.π: 15,17 Οξ: 6,65	Μ.π: 4,81 Οξ: 8,00	Η συστάδα έχει σημάδια παλιάς πυρκαγιάς. Σε έκταση 16,0 Ha καλλιεργητικές υλοτομίες σε I έως III κλάσεις διαμέτρου με σκοπό την εξυγίανση και την ποιοτική αύξηση του ξυλώδους κεφαλαίου. Αναγεννητικές υλοτομίες στην ανώτερη κλάση διαμέτρων. Απαγόρευση βοσκής 5 χρόνια για τα πρόβατα, 7 χρόνια για τα μεγάλα ζώα και 10 χρόνια για τα γίδια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ
8ε	Μπ., Δρ.	0,5-0,6	50-90	Σπ.ακ.υποκ	5.043	3.509	201,7	140,35	69,58	Παρατηρούνται άτομα καχεκτικά, κλωνοβριθή και χαμηλού ύψους, λόγω του εδάφους που είναι κακής ποιότητας και με μεγάλες κλίσεις. Εκτός διαχείρισης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ
8στ	Μ.π	0,8-0,9	60-100	Σπ.ακ.υποκ	20.294	8.429	390,27	162,10	41,53	Σε έκταση 16,0 Ha καλλιεργητικές υλοτομίες σε I έως III κλάσεις διαμέτρου με σκοπό την εξυγίανση και την ποιοτική αύξηση του ξυλώδους κεφαλαίου. Αναγεννητικές υλοτομίες στην ανώτερη κλάση διαμέτρων. Απαγόρευση βοσκής 5 χρόνια για τα πρόβατα, 7 χρόνια για τα μεγάλα ζώα και 10 χρόνια για τα γίδια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ
9α	Μ.π	0,6-0,7	60-100	Σπ.ακ.υποκ	12.784	6.210	272,00	132,13	48,58	Στα ρέματα εισχωρεί η Ελάτη.Μεγάλες κλίσεις στα ανάντη της συστάδας. Σε έκταση 13,0 Ha καλλιεργητικές υλοτομίες σε I έως III κλάσεις διαμέτρου με σκοπό την εξυγίανση και την ποιοτική αύξηση του ξυλώδους κεφαλαίου. Αναγεννητικές υλοτομίες στην ανώτερη κλάση διαμέτρων. Απαγόρευση βοσκής 5 χρόνια για τα πρόβατα, 7 χρόνια για τα μεγάλα ζώα και 10 χρόνια για τα γίδια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ
9β	Μ.π	0,6-0,7	60-100	Σπ.ακ.υποκ	8.964	5.955	471,86	313,42	66,43	Πολύ ισχυρές κλίσεις. Εκτός διαχείρισης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	ΣΥ συστάδας	V κλάσεων διαμέτρου >34 cm	ΣΥ συστάδας / ha	V κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
9γ	Μ.Π	0,6-0,7	50-100	ΣΠ.ΑΚ.ΥΠΟΚ	25.264	6.689	319,80	84,67	26,48	Η συστάδα έχει καεί στο παρελθόν και λαθροϋλοτομηθεί. Σε έκταση 25,0 Ha καλλιεργητικές υλοτομίες σε I έως III κλάσεις διαμέτρου με σκοπό την εξυγίανση και την ποιοτική αύξηση του ξυλώδους κεφαλαίου. Αναγεννητικές υλοτομίες στην ανώτερη κλάση διαμέτρων. Απαγόρευση βοσκής 5 χρόνια για τα πρόβατα, 7 χρόνια για τα μεγάλα ζώα και 10 χρόνια για τα γίδια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ
9δ	Μ.Π	0,6-0,9	20-100	ΣΠ.ΑΚ.ΥΠΟΚ	13.264	8.118,50	323,52	198,01	61,20	Υπαρξη δασοτεμαχίων στα ανάντη του δρόμου. Σε έκταση 25,0 Ha καλλιεργητικές υλοτομίες σε I έως III κλάσεις διαμέτρου με σκοπό την εξυγίανση και την ποιοτική αύξηση του ξυλώδους κεφαλαίου. Αναγεννητικές υλοτομίες στην ανώτερη κλάση διαμέτρων. Απαγόρευση βοσκής 5 χρόνια για τα πρόβατα, 7 χρόνια για τα μεγάλα ζώα και 10 χρόνια για τα γίδια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ
9ε	Μ.Π	0,6-0,7	20-100	ΣΠ.ΑΚ.ΥΠΟΚ	7.554,80	2.452,90	198,81	64,55	32,47	Καλλιεργητικές υλοτομίες σε I έως III κλάσεις διαμέτρου με σκοπό την εξυγίανση και την ποιοτική αύξηση του ξυλώδους κεφαλαίου. Αναγεννητικές υλοτομίες στην ανώτερη κλάση διαμέτρων. Απαγόρευση βοσκής 5 χρόνια για τα πρόβατα, 7 χρόνια για τα μεγάλα ζώα και 10 χρόνια για τα γίδια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ
9στ	Μ.Π	0,8-0,9	20-90	ΣΠ.ΑΚ.ΥΠΟΚ	13.952,70	4.992,00	465,09	166,40	35,78	Παλαιότερες λαθροϋλοτομίες, ανεμορριπίες και πυρκαγιές. Καλλιεργητικές υλοτομίες σε I έως III κλάσεις διαμέτρου με σκοπό την εξυγίανση και την ποιοτική αύξηση του ξυλώδους κεφαλαίου. Αναγεννητικές υλοτομίες στην ανώτερη κλάση διαμέτρων. Απαγόρευση βοσκής 5 χρόνια για τα πρόβατα, 7 χρόνια για τα μεγάλα ζώα και 10 χρόνια για τα γίδια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ
9ζ	Μ.Π	0,7-0,9	20-130	ΣΠ.ΑΚ.ΥΠΟΚ	14.591,40	6.789,20	255,99	119,11	46,50	Δασωθέντες αγροί στα ανάντη του δρόμου. Καλλιεργητικές υλοτομίες σε I έως III κλάσεις διαμέτρου με σκοπό την εξυγίανση και την ποιοτική αύξηση του ξυλώδους κεφαλαίου. Αναγεννητικές υλοτομίες στην ανώτερη κλάση διαμέτρων. Απαγόρευση βοσκής 5 χρόνια για τα πρόβατα, 7 χρόνια για τα μεγάλα ζώα και 10 χρόνια για τα γίδια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ
10α	Μ.Π	0,8-0,9	20-90	ΣΠ.ΑΚ.ΥΠΟΚ	13.087,60	6.829,10	396,59	206,94	52,18	Δασωθέντες αγροί στα ανάντη και κατόντη του δρόμου. Καλλιεργητικές υλοτομίες σε I έως III κλάσεις διαμέτρου με σκοπό την εξυγίανση και την ποιοτική αύξηση του ξυλώδους κεφαλαίου. Αναγεννητικές υλοτομίες στην ανώτερη κλάση διαμέτρων. Απαγόρευση βοσκής 5 χρόνια για τα πρόβατα, 7 χρόνια για τα μεγάλα ζώα και 10 χρόνια για τα γίδια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ
10β	Μ.Π	0,8-1,0	20-110	ΣΠ.ΑΚ.ΥΠΟΚ	21.364,00	10.064,30	381,50	179,72	47,11	Δασωθέντες αγροί στα ανάντη και κατόντη του δρόμου. Καλλιεργητικές υλοτομίες σε I έως III κλάσεις διαμέτρου με σκοπό την εξυγίανση και την ποιοτική αύξηση του ξυλώδους κεφαλαίου. Αναγεννητικές υλοτομίες στην ανώτερη κλάση διαμέτρων. Απαγόρευση βοσκής 5 χρόνια για τα πρόβατα, 7 χρόνια για τα μεγάλα ζώα και 10 χρόνια για τα γίδια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ
10γ	Μ.Π	0,8-1,0	60-100	ΣΠ.ΑΚ.ΥΠΟΚ	19.977,00	10.029,00	407,69	204,67	50,20	Υπάρχουν αρκετοί δασωθέντες αγροί από τους οποίους έχουν αναγνωρισθεί 7 με συνολική έκταση 45,40 στρ..Σε έκταση 12,0 Ha καλλιεργητικές υλοτομίες σε I έως III κλάσεις διαμέτρου με σκοπό την εξυγίανση και την ποιοτική αύξηση του ξυλώδους κεφαλαίου. Αναγεννητικές υλοτομίες στην ανώτερη κλάση διαμέτρων. Απαγόρευση βοσκής 5 χρόνια για τα πρόβατα, 7 χρόνια για τα μεγάλα ζώα και 10 χρόνια για τα γίδια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ
10δ	Μ.Π	0,9-1,0	60-100	ΣΠ.ΑΚ.ΥΠΟΚ	18.046	8.538	451,15	213,45	47,31	Υπάρχουν αρκετοί δασωθέντες αγροί από τους οποίους έχουν αναγνωρισθεί 25 με συνολική έκταση 156,184 στρ..Σε έκταση 7,0 Ha καλλιεργητικές υλοτομίες σε I έως III κλάσεις διαμέτρου με σκοπό την εξυγίανση και την ποιοτική αύξηση του ξυλώδους κεφαλαίου. Αναγεννητικές υλοτομίες στην ανώτερη κλάση διαμέτρων. Απαγόρευση βοσκής 5 χρόνια για τα πρόβατα, 7 χρόνια για τα μεγάλα ζώα και 10 χρόνια για τα γίδια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ
10ε	Μ.Π	0,8-0,9	50-100	ΣΠ.ΑΚ.ΥΠΟΚ	10.059	2.646	502,95	132,30	26,30	Υπάρχουν αρκετοί δασωθέντες αγροί από τους οποίους έχουν αναγνωρισθεί 18 με συνολική έκταση 108,024 στρ. Σε έκταση 7,0 Ha καλλιεργητικές υλοτομίες σε I έως III κλάσεις διαμέτρου με σκοπό την εξυγίανση και την ποιοτική αύξηση του ξυλώδους	ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	ΣΥ συστάδας	Υ κλάσεων διαμέτρου >34 cm	ΣΥ συστάδας / ha	Υ κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
										κεφαλαίου. Αναγεννητικές υλοτομίες στην ανώτερη κλάση διαμέτρων. Απαγόρευση βοσκής 5 χρόνια για τα πρόβατα, 7 χρόνια για τα μεγάλα ζώα και 10 χρόνια για τα γίδια.	
10στ	Μ.π	0,6	30-60	Σπ.ακ.υποκ	9.105	1.687	505,86	93,73	18,53	Έλλειψη δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων. Εκτός διαχείρισης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ
11α	Μ.π Φυλ. πλ.	0,8-0,9	50-100	Σπ.ακ.υποκ	Μ.π: 17.537 Φυλ. πλατ: 863	Μ.π: 5.171 Φυλ. πλατ: 0	Μ.π: 417,55 Φυλ. πλατ: 1 0	Μ.π: 123,12 Φυλ. πλατ: 0	Μ.π: 29,49 Φυλ. πλατ:0	Υπάρχουν αρκετοί δασωθέντες αγροί που έχουν αναγνωρισθεί υπέρ ιδιωτών. Σε έκταση20,0 Ha καλλιεργητικές υλοτομίες σε Ι έως ΙΙΙ κλάσεις διαμέτρου με σκοπό την εξυγίανση και την ποιοτική αύξηση του ξυλώδους κεφαλαίου. Αναγεννητικές υλοτομίες στην ανώτερη κλάση διαμέτρων. Απαγόρευση βοσκής 5 χρόνια για τα πρόβατα, 7 χρόνια για τα μεγάλα ζώα και 10 χρόνια για τα γίδια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ
11β	Μ.π Φυλ. πλ.	0,5-0,6	50-100	Σπ.ακ.υποκ	Μ.π: 8.008 Φυλ. πλατ: 578	Μ.π: 2.987 Φυλ. πλατ: 0	Μ.π: 283,97 Φυλ. πλατ: 1 0	Μ.π: 105,92 Φυλ. πλατ: 0	Μ.π:37,3 Φυλ. πλατ: 0	Εκτός διαχείρισης λόγω ισχυρών κλίσεων.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ
11γ	Μ.π., Δ.π.	0,7-0,9	Μ.π.:40-80 Δ.π: 20-60	Σπ.ακ.υποκ	Μ.π:46.355 Δ.π:10.534	Μ.π:12.377 Δ.π:4.837	Μ.π:321,91 Δ.π:146,31	Μ.π:85,95 Δ.π:67,18	Μ.π:26,70 Δ.π:45,92	Ζημιές παρατηρούνται λόγω των μεγάλων κλίσεων του εδάφους. Σε έκταση 16,0 Ha καλλιεργητικές υλοτομίες σε Ι έως ΙΙΙ κλάσεις διαμέτρου με σκοπό την εξυγίανση και την ποιοτική αύξηση του ξυλώδους κεφαλαίου. Αναγεννητικές υλοτομίες στην ανώτερη κλάση διαμέτρων. Απαγόρευση βοσκής 5 χρόνια για τα πρόβατα, 7 χρόνια για τα μεγάλα ζώα και 10 χρόνια για τα γίδια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ
11δ	Μ.π	0,7	40-80	Σπ.ακ.υποκ	3.842	1.562	85,35	34,71	40,66	Εκτός διαχείρισης λόγω ισχυρών κλίσεων.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ
3	Δρ,Πλ	κλ-αρ	Δρ:20- Πλ:-120	Υπ.,ακ.	Δρ: 95 Πλ:740	Δρ: - Πλ:605	Δρ.39,36 Πλ:180,52	Δρ: - Πλ:147,56	Δρ: - Πλ:81,76	Παλαιά έχει υποστεί ζημιές από λαθρουλοτομίες και αιγοβοσκή. Καλλιεργητική -αναγωγική υλοτομία στη Δρυ. Εξυγιαντική - αναγεννητική στον Πλάτανο στα άτομα με διάμετρο άνω των 45εκ. και κακόμορφων λαμβάνοντας υπόψη τον προστατευτικό τους ρόλο. Απαγόρευση βοσκής αίγες 10 έτη, μεγάλα ζώα 7 έτη και πρόβατα 5ετία.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΤΚ ΜΗΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
4	Δρ., Πλ. Φυλ. πλατ.	κλ-χαλ-αρ	Δρ:8- Πλ:50-110	Δρ: Πρ.,ομ. Πλ:υπ.	Δρ: 1.925	Δρ: 0	Δρ: 60,17	Δρ: 0	Δρ: 0	Καλλιεργητική-αναγωγική υλοτομία Δρυός. Εξευγενιστική αραιώση στα λεπτά και χονδρά κορμίδια με ευνόηση εκλεκτών ατόμων και υλοτομία οξύτερων ανταγωνιστών και κακών τύπων. Θα αφαιρούνται πρωτίστως καχεκτικά, στρεβλά κλπ. άτομα και θα παρακρατούνται τα καλλίκορμα με καλά διαμορφωμένη κόμη, χωρίς προσβολές άτομα. Καμία επέμβαση στον Πλάτανο. Απαγόρευση βοσκής αίγες 10 έτη, μεγάλα ζώα 7 έτη και πρόβατα 5ετία.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΤΚ ΜΗΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
5	Δρ,Πλ	κλ-χαλ-αρ	Δρ:10- Πλ:50-110	Δρ: Πρ.,ανομ. Πλ:υπ.	Δρ: 2.197	Δρ: 0	Δρ: 35,43	Δρ: 0	Δρ: 0	Έντονες ανθρωπογενείς επιδράσεις. Καλλιεργητική-αναγωγική υλοτομία Δρυός. Εξευγενιστική αραιώση στα λεπτά και χονδρά κορμίδια με ευνόηση εκλεκτών ατόμων και υλοτομία οξύτερων ανταγωνιστών και κακών τύπων. Θα αφαιρούνται πρωτίστως καχεκτικά, στρεβλά κλπ. άτομα και θα παρακρατούνται τα καλλίκορμα με καλά διαμορφωμένη κόμη, χωρίς προσβολές άτομα. Καμία επέμβαση στον Πλάτανο. Απαγόρευση βοσκής αίγες 10 έτη, μεγάλα ζώα 7 έτη και πρόβατα 5ετία.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΤΚ ΜΗΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
6	Δρ., άτομα Πλ. Φυλ. πλατ.		Δρ:3 ετών	Δρ: Πρ.,ομ.						Αποψιλωτικά το 2010	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΤΚ ΜΗΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
7	Δρ., άτομα Φυλ. πλατ.	κλ-χαλ-αρ	Δρ:10 ετών	Δρ: Πρ.,ομ.						Αποψιλωτικά το 2003. Υποβαθμισμένη λόγω παλαιών λαθροϋλοτομιών και έντονης αιγοβοσκής. Αρκετές εκτάσεις δρυός καλύπτουν σχεδόν όλες τις πλαγιές με ισχυρές κλίσεις	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΤΚ ΜΗΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	ΣΥ συστάδας	Υ κλάσεων διαμέτρου >34 cm	ΣΥ συστάδας / ha	Υ κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
8	Δρ., άτομα Φυλ. πλατ.	κλ-χαλ-αρ	Δρ:17-18 ετών	Δρ: Πρ.,ομ.	Δρ: 2.208	Δρ: 0	Δρ: 37,44	Δρ: 0	Δρ: 0	Αποψιλωτική υλοτομία με παρακράτηση του 12% σε ομάδες και λόχμες στους καλλίτερους τόπους. Καλλιέργεια-αραιώση στα παρακρατήματα ώστε η απόσταση να ανέρχεται στο 30πλάσιο της στηθιαίας διαμέτρου. Υποβαθμισμένη λόγω παλαιών λαθροϋλοτομιών και αιγοβοσκής. Απαγόρευση βοσκής αίγες 10 έτη, μεγάλα ζώα 7 έτη και πρόβατα 5ετία.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΤΚ ΜΗΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
9	Δρ., άτομα Πλ. Φυλ. πλατ.	κλ-χαλ-αρ	Δρ:40-55 Πλ:-110	Δρ: Πρ., Πλ: υπ., ακ.	Δρ: 495 Πλ:452	Δρ: - Πλ:369	Δρ.55,00 Πλ:90,27	Δρ: - Πλ:73,80	Δρ: - Πλ:81,63	Εκτός διαχείρισης. Ανάμεικτες κατά θέσεις δασοσκεπείς και θαμνοσκεπείς εκτάσεις δρυός, υποβαθμισμένης μορφής λόγω παλαιών λαθροϋλοτομιών και έντονης αιγοβοσκής. Κατά μήκος του Καρυώτικου λάκκου εμφάνιση πλατάνου σε μέτρια έως ικανοποιητική μορφή κατά θέσεις και κατά άτομα διεσπαρμένα.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΤΚ ΜΗΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
10	Δρ., άτομα Πλ. Φυλ. πλατ.	κλ-χαλ-αρ	Δρ:10 ετών	Δρ: Πρ.,ομ.	Δρ: 919	Δρ: 0	Δρ: 13,00	Δρ: 0	Δρ: 0	Αποψιλωτικά το 2003. Υποβαθμισμένη λόγω παλαιών λαθροϋλοτομιών και έντονης αιγοβοσκής. Σύμπτυκνες ενώσεις.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΤΚ ΜΗΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
11	Δρ., άτομα Κασ. Φυλ. πλατ.	κλ-χαλ-αρ & συμπ.	Δρ:19 ετών	Δρ: Πρ.,ομ.	Δρ: 1.349	Δρ: 7	Δρ:46,50 μ.ο σε 4Ha 116,43(παλια παρακρατή-ματα) σε 25Ha 35,30	Δρ: 1,84	Δρ: 1,50	Αποψιλωτική υλοτομία με παρακράτηση του 12% σε ομάδες και λόχμες στους καλλίτερους τόπους. Καλλιέργεια-αραιώση στα παρακρατήματα ώστε η απόσταση να ανέρχεται στο 30πλάσιο της στηθιαίας διαμέτρου. Υποβαθμισμένη λόγω παλαιών λαθροϋλοτομιών και αιγοβοσκής. Απαγόρευση βοσκής αίγες 10 έτη, μεγάλα ζώα 7 έτη και πρόβατα 5ετία.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΤΚ ΜΗΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
12	Δρ., άτομα Κασ. Φυλ. πλατ.	κλ-χαλ-αρ	Δρ:13 ετών	Δρ: Πρ.,ομ.	Δρ: 1.271	Δρ: 0	Δρ: 32,25	Δρ: 0	Δρ: 0	Αποψιλωτική υλοτομία με παρακράτηση του 12% σε ομάδες και λόχμες στους καλλίτερους τόπους. Καλλιέργεια-αραιώση στα παρακρατήματα ώστε η απόσταση να ανέρχεται στο 30πλάσιο της στηθιαίας διαμέτρου. Υποβαθμισμένη λόγω παλαιών λαθροϋλοτομιών και αιγοβοσκής. Απαγόρευση βοσκής αίγες 10 έτη, μεγάλα ζώα 7 έτη και πρόβατα 5ετία.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΤΚ ΜΗΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
13	Δρ., Κασ. άτομα Φυλ. πλατ.	κλ-χαλ.	Δρ:14 ετών	Δρ: Πρ.,ομ.	Δρ:1.080 Κασ:691	Δρ:0 Κασ:0	Δρ.36,00 Κασ:138,22	Δρ: 0 Κασ:0	Δρ: 0 Κασ:0	Αποψιλωτική υλοτομία και των δύο ειδών με παρακράτηση του 12% σε ομάδες και λόχμες στους καλλίτερους τόπους. Καλλιέργεια-αραιώση στα παρακρατήματα ώστε η απόσταση να ανέρχεται στο 30πλάσιο της στηθιαίας διαμέτρου. Υποβαθμισμένη λόγω παλαιών λαθροϋλοτομιών και αιγοβοσκής. Απαγόρευση βοσκής αίγες 10 έτη, μεγάλα ζώα 7 έτη και πρόβατα 5ετία.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΤΚ ΜΗΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
14	Κασ., Μπ., Δρ.,Οξ., Ελ.	κλ-χαλ.	35-100	Υπ. πρεμ.σε αν.	Κασ: 2.578 Μ.π: 1.086 Δρ:527 Οξ:400 Ελ:390	Κασ: 134 Μ.π: 992 Δρ:0 Οξ:120 Ελ:51	Κασ: 112,60 Μ.π: 47,43 Δρ:23,01 Οξ:17,48 Ελ:17	Κασ: 5,83 Μ.π: 43,32 Δρ:0 Οξ:5,22 Ελ:2,22	Κασ: 5,20 Μ.π: 91,34 Δρ:0 Οξ:30 Ελ:13,08	Εξευγενιστική αραιώση στα κορμίδια με ευνόηση των εκάστοτε εκλεκτών ατόμων με υλοτομία των οξύτερων ανταγωνιστών και κακών τύπων. Υπεραραιώσεις στους λεππούς, μέσους και χονδρούς κορμούς. Διεύρυνση υπαρχόντων κέντρων αναγέννησης και δημιουργία νέων στις ανώτερες κλάσεις με απομάκρυνση ευρύκορμων, κακόμορφων, βαρέων και ζημιωθέντων δένδρων. Παραμονή 1-2 άτομα γηραιά, κουφαλερά αλλά υγιή άτομα ως ενδιάιτημα της πανίδας. Απαγόρευση βοσκής αίγες 10 έτη, μεγάλα ζώα 7 έτη και πρόβατα 5ετία.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΤΚ ΜΗΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
15	Κασ., Δρ.,Οξ.,	κλ-συμπ.	20-100	Πρεμ. Αν., Κασ:πρεμ.,ομ.	Κασ: 2.013 Δρ:1.168 Οξ:1.106	Κασ: 0 Δρ:105 Οξ:0	Κασ: 95,39 Δρ:55,38 Οξ:52,43	Κασ: 0 Δρ:4,98 Οξ:0	Κασ: 0 Δρ:8,99 Οξ:0	Εξευγενιστική αραιώση στα κορμίδια με ευνόηση των εκάστοτε εκλεκτών ατόμων με υλοτομία των οξύτερων ανταγωνιστών και κακών τύπων. Υπεραραιώσεις στους λεππούς, μέσους και χονδρούς κορμούς. Διεύρυνση υπαρχόντων κέντρων αναγέννησης και δημιουργία νέων στις ανώτερες κλάσεις με απομάκρυνση ευρύκορμων, κακόμορφων, βαρέων και ζημιωθέντων δένδρων. Παραμονή 1-2 άτομα γηραιά, κουφαλερά αλλά υγιή άτομα ως ενδιάιτημα της πανίδας. Απαγόρευση βοσκής αίγες 10 έτη, μεγάλα ζώα 7 έτη και πρόβατα 5ετία.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΤΚ ΜΗΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
18	Κασ., Δρ.,Οξ., Μ.π.	Κλ.	1-110	Διφ.,υπ.	Κασ: 4.350 Μ.π: 1.322 Δρ:1.628 Οξ:1.356	Κασ: 220 Μ.π: 1.322 Δρ:0 Οξ:821	Κασ: 98,85 Μ.π: 30,06 Δρ:37,00 Οξ:30,82	Κασ: 5,0 Μ.π: 30,06 Δρ:0 Οξ:18,65	Κασ: 5,06 Μ.π: 100 Δρ:0 Οξ:60,55	Μικτή συστάδα με επικράτηση της Καστανιάς βόρεια. Αρκετά γηραιά άτομα Μ.π και Οξυάς. Εξευγενιστική αραιώση στα κορμίδια με ευνόηση των εκάστοτε εκλεκτών ατόμων με υλοτομία των οξύτερων ανταγωνιστών και κακών τύπων. Υπεραραιώσεις στους λεππούς, μέσους και χονδρούς κορμούς. Διεύρυνση υπαρχόντων κέντρων αναγέννησης και δημιουργία νέων στις ανώτερες κλάσεις με απομάκρυνση ευρύκορμων, κακόμορφων, βαρέων και ζημιωθέντων δένδρων. Παραμονή 1-2 άτομα γηραιά, κουφαλερά	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΤΚ ΜΗΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	ΣΥ συστάδας	Υ κλάσεων διαμέτρου >34 cm	ΣΥ συστάδας / ha	Υ κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
										αλλά υγιή άτομα ως ενδιαίτημα της πανίδας. Απαγόρευση βοσκής αίγες 10 έτη, μεγάλα ζώα 7 έτη και πρόβατα 5ετία.	
19	Οξ.,Δρ., Μπ., Ελ., Κασ.	Κλ.	1-110	Διφ.,υπ.,ακ.	Οξ: 2.940 Δρ:436 Μ.π:1.035 Ελ:871	Οξ: 263 Δρ:0 Μ.π:1.035 Ελ:80	Οξ: 121,03 Δρ:17,96 Μ.π:42,61 Ελ:35,85	Οξ: 10,84 Δρ:0 Μ.π:42,60 Ελ:3,28	Οξ: 8,95 Δρ:0 Μ.π:100 Ελ:9,18	Αρκετά γηραιά άτομα Μ.π. Εξευγενιστική αραιώση στα κορμίδα με ευνόηση των εκάστοτε εκλεκτών ατόμων με υλοτομία των οξύτερων ανταγωνιστών και κακών τύπων. Υπεραραιώσεις στους λεπτούς, μέσους και χονδρούς κορμούς. Διεύρυνση υπαρχόντων κέντρων αναγέννησης και δημιουργία νέων στις ανώτερες κλάσεις με απομάκρυνση ευρύκορμων, κακόμορφων, βαρέων και ζημιωθέντων δένδρων. Παραμονή 1-2 άτομα γηραιά, κουφαλερά αλλά υγιή άτομα ως ενδιαίτημα της πανίδας. Απαγόρευση βοσκής αίγες 10 έτη, μεγάλα ζώα 7 έτη και πρόβατα 5ετία.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΤΚ ΜΗΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
20	Οξ.,Ελ. Μ.π	Κλ.	1-110	Υπ.	Οξ: 8.932 Ελ:1.400 Μ.π:246	Οξ: 6.679 Ελ:1.195 Μ.π:246	Οξ: 212,15 Ελ: 33,25 Μ.π:5,85	Οξ: 158,65 Ελ: 28,39 Μ.π:5,85	Οξ: 74,78 Ελ: 85,36 Μ.π:100	Εξευγενιστική αραιώση στα κορμίδα με ευνόηση των εκάστοτε εκλεκτών ατόμων με υλοτομία των οξύτερων ανταγωνιστών και κακών τύπων. Υπεραραιώσεις στους λεπτούς, μέσους και χονδρούς κορμούς. Διεύρυνση υπαρχόντων κέντρων αναγέννησης και δημιουργία νέων στις ανώτερες κλάσεις με απομάκρυνση ευρύκορμων, κακόμορφων, βαρέων και ζημιωθέντων δένδρων. Παραμονή 1-2 άτομα γηραιά, κουφαλερά αλλά υγιή άτομα ως ενδιαίτημα της πανίδας. Απαγόρευση βοσκής αίγες 10 έτη, μεγάλα ζώα 7 έτη και πρόβατα 5ετία.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΤΚ ΜΗΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
21	Οξ.,Κασ., Μπ., Ελ.	Κλ.	1-100	Υπ., ακ.	Οξ: 3.909 Κασ:901 Μ.π:152 Ελ:66	Οξ: 995 Κασ:218 Μ.π:152 Ελ:0	Οξ:167,04 Κασ:38,50 Μ.π:6,48 Ελ:2,83	Οξ:42,52 Κασ:9,32 Μ.π:6,48 Ελ:0	Οξ:25,45 Κασ:24,20 Μ.π:100 Ελ:0	Εξευγενιστική αραιώση στα κορμίδα με ευνόηση των εκάστοτε εκλεκτών ατόμων με υλοτομία των οξύτερων ανταγωνιστών και κακών τύπων. Υπεραραιώσεις στους λεπτούς, μέσους και χονδρούς κορμούς. Διεύρυνση υπαρχόντων κέντρων αναγέννησης και δημιουργία νέων στις ανώτερες κλάσεις με απομάκρυνση ευρύκορμων, κακόμορφων, βαρέων και ζημιωθέντων δένδρων. Παραμονή 1-2 άτομα γηραιά, κουφαλερά αλλά υγιή άτομα ως ενδιαίτημα της πανίδας. Απαγόρευση βοσκής αίγες 10 έτη, μεγάλα ζώα 7 έτη και πρόβατα 5ετία.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΤΚ ΜΗΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
22	Οξ.	Κλ.	1-100	Διφ.,υπ.,ακ.	13.330	4.956	183,87	68,26	37,18	Κατά θέσεις μείξη με Καστανιά, Μ.π. και δρυ. Εξευγενιστική αραιώση στα κορμίδα με ευνόηση των εκάστοτε εκλεκτών ατόμων με υλοτομία των οξύτερων ανταγωνιστών και κακών τύπων. Υπεραραιώσεις στους λεπτούς, μέσους και χονδρούς κορμούς. Διεύρυνση υπαρχόντων κέντρων αναγέννησης και δημιουργία νέων στις ανώτερες κλάσεις με απομάκρυνση ευρύκορμων, κακόμορφων, βαρέων και ζημιωθέντων δένδρων. Παραμονή 1-2 άτομα γηραιά, κουφαλερά αλλά υγιή άτομα ως ενδιαίτημα της πανίδας. Απαγόρευση βοσκής αίγες 10 έτη, μεγάλα ζώα 7 έτη και πρόβατα 5ετία.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΤΚ ΜΗΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
23	Οξ.,Κασ., Μπ.	Κλ.	1-100	Διφ.,υπ.,ακ.	Οξ: 1.831 Κασ:472 Μ.π:595	Οξ: 407 Κασ:0 Μ.π:481	Οξ: 102,29 Κασ:26,35 Μ.π:33,28	Οξ: 22,76 Κασ:0 Μ.π:26,89	Οξ: 22,23 Κασ:0 Μ.π:80,84	Εξευγενιστική αραιώση στα κορμίδα με ευνόηση των εκάστοτε εκλεκτών ατόμων με υλοτομία των οξύτερων ανταγωνιστών και κακών τύπων. Υπεραραιώσεις στους λεπτούς, μέσους και χονδρούς κορμούς. Διεύρυνση υπαρχόντων κέντρων αναγέννησης και δημιουργία νέων στις ανώτερες κλάσεις με απομάκρυνση ευρύκορμων, κακόμορφων, βαρέων και ζημιωθέντων δένδρων. Παραμονή 1-2 άτομα γηραιά, κουφαλερά αλλά υγιή άτομα ως ενδιαίτημα της πανίδας. Απαγόρευση βοσκής αίγες 10 έτη, μεγάλα ζώα 7 έτη και πρόβατα 5ετία.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΤΚ ΜΗΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
24	Οξ.,Δρ., άτομα Κασ.	Κλ.-συμπ.	1-110 και >	Υπ.	Οξ: 5.914 Δρ:857	Οξ: 1.725 Δρ:0	Οξ: 159,84 Δρ:23,16	Οξ: 46,63 Δρ:0	Οξ: 29,17 Δρ:0	Εξευγενιστική αραιώση στα κορμίδα με ευνόηση των εκάστοτε εκλεκτών ατόμων με υλοτομία των οξύτερων ανταγωνιστών και κακών τύπων. Υπεραραιώσεις στους λεπτούς, μέσους και χονδρούς κορμούς. Διεύρυνση υπαρχόντων κέντρων αναγέννησης και δημιουργία νέων στις ανώτερες κλάσεις με απομάκρυνση ευρύκορμων, κακόμορφων, βαρέων και ζημιωθέντων δένδρων. Παραμονή 1-2 άτομα γηραιά, κουφαλερά αλλά υγιή άτομα ως ενδιαίτημα της πανίδας. Απαγόρευση βοσκής αίγες 10 έτη, μεγάλα ζώα 7 έτη και πρόβατα 5ετία.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΤΚ ΜΗΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	ΣΥ συστάδας	Υ κλάσεων διαμέτρου >34 cm	ΣΥ συστάδας / ha	Υ κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
26	Οξ.	Κλ.-συμπ.	1-100 και >	Διφ.,υπ.	9.838	2.647	226,16	60,84	26,91	Εξευγενιστική αραίωση στα κορμίδια με ευνόηση των εκάστοτε εκλεκτών ατόμων με υλοτομία των οξύτερων ανταγωνιστών και κακών τύπων. Υπεραραιώσεις στους λεπτούς, μέσους και χονδρούς κορμούς. Διεύρυνση υπάρχοντων κέντρων αναγέννησης και δημιουργία νέων στις ανώτερες κλάσεις με απομάκρυνση ευρύκορμων, κακόμορφων, βαρέων και ζημιωθέντων δένδρων. Παραμονή 1-2 άτομα γηραιά, κουφαλερά αλλά υγιή άτομα ως ενδίαίτημα της πανίδας. Απαγόρευση βοσκής αίγες 10 έτη, μεγάλα ζώα 7 έτη και πρόβατα 5ετία.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΤΚ ΜΗΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
27	Οξ.	Κλ.-συμπ.	1-120 και >	Υπ.	15.779	8.707	315,57	174,14	55,18	Εξευγενιστική αραίωση στα κορμίδια με ευνόηση των εκάστοτε εκλεκτών ατόμων με υλοτομία των οξύτερων ανταγωνιστών και κακών τύπων. Υπεραραιώσεις στους λεπτούς, μέσους και χονδρούς κορμούς. Διεύρυνση υπάρχοντων κέντρων αναγέννησης και δημιουργία νέων στις ανώτερες κλάσεις με απομάκρυνση ευρύκορμων, κακόμορφων, βαρέων και ζημιωθέντων δένδρων. Παραμονή 1-2 άτομα γηραιά, κουφαλερά αλλά υγιή άτομα ως ενδίαίτημα της πανίδας. Απαγόρευση βοσκής αίγες 10 έτη, μεγάλα ζώα 7 έτη και πρόβατα 5ετία.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΤΚ ΜΗΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
28	Οξ.	Κλ.-συμπ.	1-110 και >	Υπ.,ακ.	9.879	6.431	235,2	153,11	65,1	Εξευγενιστική αραίωση στα κορμίδια με ευνόηση των εκάστοτε εκλεκτών ατόμων με υλοτομία των οξύτερων ανταγωνιστών και κακών τύπων. Υπεραραιώσεις στους λεπτούς, μέσους και χονδρούς κορμούς. Διεύρυνση υπάρχοντων κέντρων αναγέννησης και δημιουργία νέων στις ανώτερες κλάσεις με απομάκρυνση ευρύκορμων, κακόμορφων, βαρέων και ζημιωθέντων δένδρων. Παραμονή 1-2 άτομα γηραιά, κουφαλερά αλλά υγιή άτομα ως ενδίαίτημα της πανίδας. Απαγόρευση βοσκής αίγες 10 έτη, μεγάλα ζώα 7 έτη και πρόβατα 5ετία.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΤΚ ΜΗΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
29	Οξ.	Κλ.-συμπ.	1-110 και >	Υπ.,ακ.	2.673	794	178,19	52,91	29,7	Εξευγενιστική αραίωση στα κορμίδια με ευνόηση των εκάστοτε εκλεκτών ατόμων με υλοτομία των οξύτερων ανταγωνιστών και κακών τύπων. Υπεραραιώσεις στους λεπτούς, μέσους και χονδρούς κορμούς. Διεύρυνση υπάρχοντων κέντρων αναγέννησης και δημιουργία νέων στις ανώτερες κλάσεις με απομάκρυνση ευρύκορμων, κακόμορφων, βαρέων και ζημιωθέντων δένδρων. Παραμονή 1-2 άτομα γηραιά, κουφαλερά αλλά υγιή άτομα ως ενδίαίτημα της πανίδας. Απαγόρευση βοσκής αίγες 10 έτη, μεγάλα ζώα 7 έτη και πρόβατα 5ετία.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΤΚ ΜΗΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
30	Οξ., Ελ., Δρ.,Κασ., Μπ.	Κλ.-συμπ.	1-120 και >	Υπ.	Οξ: 7.699 Ελ: 3.009 Δρ:882 Κασ:408 Μ.π:345	Οξ: 4.900 Ελ: 2.043 Δρ:560 Κασ:408 Μ.π:345	Οξ: 167,36 Ελ: 65,41 Δρ:19,15 Κασ:8,88 Μ.π:7,49	Οξ: 106,52 Ελ: 44,41 Δρ:12,15 Κασ:8,88 Μ.π:7,49	Οξ:63,64 Ελ:67,90 Δρ:63,49 Κασ:100 Μ.π:100	Εξευγενιστική αραίωση στα κορμίδια με ευνόηση των εκάστοτε εκλεκτών ατόμων με υλοτομία των οξύτερων ανταγωνιστών και κακών τύπων. Υπεραραιώσεις στους λεπτούς, μέσους και χονδρούς κορμούς. Διεύρυνση υπάρχοντων κέντρων αναγέννησης και δημιουργία νέων στις ανώτερες κλάσεις με απομάκρυνση ευρύκορμων, κακόμορφων, βαρέων και ζημιωθέντων δένδρων. Παραμονή 1-2 άτομα γηραιά, κουφαλερά αλλά υγιή άτομα ως ενδίαίτημα της πανίδας. Απαγόρευση βοσκής αίγες 10 έτη, μεγάλα ζώα 7 έτη και πρόβατα 5ετία.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΤΚ ΜΗΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
31	Οξ., Κασ., Δρ., Μπ.	Κλ.-συμπ.	1-120 και >	Υπ. Διφ.	Οξ: 8.761 Κασ:3.437 Δρ:494 Μ.π:3.424	Οξ: 3.010 Κασ:380 Δρ:290 Μ.π:135	Οξ: 161,36 Κασ:63,30 Δρ:9,09 Μ.π:216,72	Οξ: 55,43 Κασ:7,00 Δρ:5,34 Μ.π:8,55	Οξ: 34,36 Κασ:11,06 Δρ:58,70 Μ.π:3,94	Εξευγενιστική αραίωση στα κορμίδια με ευνόηση των εκάστοτε εκλεκτών ατόμων με υλοτομία των οξύτερων ανταγωνιστών και κακών τύπων. Υπεραραιώσεις στους λεπτούς, μέσους και χονδρούς κορμούς. Διεύρυνση υπάρχοντων κέντρων αναγέννησης και δημιουργία νέων στις ανώτερες κλάσεις με απομάκρυνση ευρύκορμων, κακόμορφων, βαρέων και ζημιωθέντων δένδρων. Παραμονή 1-2 άτομα γηραιά, κουφαλερά αλλά υγιή άτομα ως ενδίαίτημα της πανίδας. Απαγόρευση βοσκής αίγες 10 έτη, μεγάλα ζώα 7 έτη και πρόβατα 5ετία.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΤΚ ΜΗΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
32	Οξ., Ελ., Δρ., Μπ.	Κλ.-συμπ.	1-120 και >	Υπ. Διφ.	Οξ: 5.995 Ελ: 969 Μ.π:85 Δρ:470 Μ.π:3.143	Οξ: 1.285 Ελ: 969 Μ.π:85 Δρ:210 Μ.π:124	Οξ: 157,72 Ελ: 25,51 Μ.π:2,23 Δρ:12,39 Μ.π: 216,72	Οξ: 33,8 Ελ: 25,51 Μ.π:2,23 Δρ:5,53 Μ.π: 8,55	Οξ: 21,43 Ελ: 100 Μ.π:100 Δρ:44,68 Μ.π: 3,95	Εξευγενιστική αραίωση στα κορμίδια με ευνόηση των εκάστοτε εκλεκτών ατόμων με υλοτομία των οξύτερων ανταγωνιστών και κακών τύπων. Υπεραραιώσεις στους λεπτούς, μέσους και χονδρούς κορμούς. Διεύρυνση υπάρχοντων κέντρων αναγέννησης και δημιουργία νέων στις ανώτερες κλάσεις με	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΤΚ ΜΗΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	ΣΥ συστάδας	Υ κλάσεων διαμέτρου >34 cm	ΣΥ συστάδας / ha	Υ κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
										απομάκρυνση ευρύκορμων, κακόμορφων, βαρέων και ζημιωθέντων δένδρων. Παραμονή 1-2 άτομα γηραιά, κουφαλερά αλλά υγιή άτομα ως ενδιαίτημα της πανίδας. Απαγόρευση βοσκής αίγες 10 έτη, μεγάλα ζώα 7 έτη και πρόβατα 5ετία.	
33	Οξ., Ελ.	Κλ.-συμπ.	1-110 και >	Υπ. Διφ.ακ.	Οξ: 6.364 Ελ: 1.309	Οξ:1.328 Ελ: 358	Οξ:151,54 Ελ: 31,15	Οξ:31,63 Ελ: 8,52	Οξ:20,87 Ελ: 27,34	Εξευγενιστική αραίωση στα κορμίδια με ευνόηση των εκάστοτε εκλεκτών ατόμων με υλοτομία των οξύτερων ανταγωνιστών και κακών τύπων. Υπερραραιώσεις στους λεππούς, μέσους και χονδρούς κορμούς. Διεύρυνση υπάρχοντων κέντρων αναγέννησης και δημιουργία νέων στις ανώτερες κλάσεις με απομάκρυνση ευρύκορμων, κακόμορφων, βαρέων και ζημιωθέντων δένδρων. Παραμονή 1-2 άτομα γηραιά, κουφαλερά αλλά υγιή άτομα ως ενδιαίτημα της πανίδας. Απαγόρευση βοσκής αίγες 10 έτη, μεγάλα ζώα 7 έτη και πρόβατα 5ετία.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΤΚ ΜΗΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
34	Μ.π	Κλ.-συμπ.	1-100 και >	Υπ.	4.080	831	261,58	52,96	20,37	Εξευγενιστική αραίωση στα κορμίδια με ευνόηση των εκάστοτε εκλεκτών ατόμων με υλοτομία των οξύτερων ανταγωνιστών και κακών τύπων. Υπερραραιώσεις στους λεππούς, μέσους και χονδρούς κορμούς. Διεύρυνση υπάρχοντων κέντρων αναγέννησης και δημιουργία νέων στις ανώτερες κλάσεις με απομάκρυνση ευρύκορμων, κακόμορφων, βαρέων και ζημιωθέντων δένδρων. Παραμονή 1-2 άτομα γηραιά, κουφαλερά αλλά υγιή άτομα ως ενδιαίτημα της πανίδας. Απαγόρευση βοσκής αίγες 10 έτη, μεγάλα ζώα 7 έτη και πρόβατα 5ετία.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΤΚ ΜΗΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
35	Μ.π., Οξ.	Κλ.-συμπ.	20-100	Υπ.,σπ.	Μ.π: 3.879 Οξ: 747	Μ.π: 153 Οξ: 468	Μ.π: 216,72 Οξ: 186,81	Μ.π: 8,55 Οξ: 117,13	Μ.π: 3,94 Οξ: 62,65	Εξευγενιστική αραίωση στα κορμίδια με ευνόηση των εκάστοτε εκλεκτών ατόμων με υλοτομία των οξύτερων ανταγωνιστών και κακών τύπων. Υπερραραιώσεις στους λεππούς, μέσους και χονδρούς κορμούς. Διεύρυνση υπάρχοντων κέντρων αναγέννησης και δημιουργία νέων στις ανώτερες κλάσεις με απομάκρυνση ευρύκορμων, κακόμορφων, βαρέων και ζημιωθέντων δένδρων. Παραμονή 1-2 άτομα γηραιά, κουφαλερά αλλά υγιή άτομα ως ενδιαίτημα της πανίδας. Απαγόρευση βοσκής αίγες 10 έτη, μεγάλα ζώα 7 έτη και πρόβατα 5ετία.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΤΚ ΜΗΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
36	Οξ., Μ.π. άτομα Ελ.	Κλ.-συμπ.	1-120 και >	Υπ.	Οξ: 8.728 Μ.π:3.395 Μ.π:3.898 Οξ.:182	Οξ: 4.881 Μ.π:3.168 Μ.π:3.898 Οξ.:182	Οξ: 173,2 Μ.π:67,35 Μ.π:229,30 Οξ.:10,73	Οξ: 96,86 Μ.π:62,85 Μ.π:229,30 Οξ.:10,73	Οξ: 55,92 Μ.π:93,31 Μ.π:100 Οξ.:100	Εξευγενιστική αραίωση στα κορμίδια με ευνόηση των εκάστοτε εκλεκτών ατόμων με υλοτομία των οξύτερων ανταγωνιστών και κακών τύπων. Υπερραραιώσεις στους λεππούς, μέσους και χονδρούς κορμούς. Διεύρυνση υπάρχοντων κέντρων αναγέννησης και δημιουργία νέων στις ανώτερες κλάσεις με απομάκρυνση ευρύκορμων, κακόμορφων, βαρέων και ζημιωθέντων δένδρων. Παραμονή 1-2 άτομα γηραιά, κουφαλερά αλλά υγιή άτομα ως ενδιαίτημα της πανίδας. Απαγόρευση βοσκής αίγες 10 έτη, μεγάλα ζώα 7 έτη και πρόβατα 5ετία.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΤΚ ΜΗΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
37	Οξ.	Κλ.-χαλ.	1-100 και >	Υπ.,σπ.	10.096	2.068	198,72	40,71	20,48	Εξευγενιστική αραίωση στα κορμίδια με ευνόηση των εκάστοτε εκλεκτών ατόμων με υλοτομία των οξύτερων ανταγωνιστών και κακών τύπων. Υπερραραιώσεις στους λεππούς, μέσους και χονδρούς κορμούς. Διεύρυνση υπάρχοντων κέντρων αναγέννησης και δημιουργία νέων στις ανώτερες κλάσεις με απομάκρυνση ευρύκορμων, κακόμορφων, βαρέων και ζημιωθέντων δένδρων. Παραμονή 1-2 άτομα γηραιά, κουφαλερά αλλά υγιή άτομα ως ενδιαίτημα της πανίδας. Απαγόρευση βοσκής αίγες 10 έτη, μεγάλα ζώα 7 έτη και πρόβατα 5ετία.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΤΚ ΜΗΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
38	Οξ.	Κλ.-χαλ.	1-100 και >	Υπ.,σπ.	7.934	3.350	220,4	93,07	42,22	Εξευγενιστική αραίωση στα κορμίδια με ευνόηση των εκάστοτε εκλεκτών ατόμων με υλοτομία των οξύτερων ανταγωνιστών και κακών τύπων. Υπερραραιώσεις στους λεππούς, μέσους και χονδρούς κορμούς. Διεύρυνση υπάρχοντων κέντρων αναγέννησης και δημιουργία νέων στις ανώτερες κλάσεις με απομάκρυνση ευρύκορμων, κακόμορφων, βαρέων και ζημιωθέντων δένδρων. Παραμονή 1-2 άτομα γηραιά, κουφαλερά αλλά υγιή άτομα ως ενδιαίτημα της πανίδας. Απαγόρευση βοσκής αίγες 10 έτη, μεγάλα ζώα 7 έτη και πρόβατα 5ετία.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΤΚ ΜΗΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	ΣΥ συστάδας	Υ κλάσεων διαμέτρου >34 cm	ΣΥ συστάδας / ha	Υ κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
39	Οξ.	Κλ.-συμ.	1-120 και >	Υπ.,σπ.	8.948	4.060	248,57	112,79	47,78	Εξευγενιστική αραιώση στα κορμίδια με ευνόηση των εκάστοτε εκλεκτών ατόμων με υλοτομία των οξύτερων ανταγωνιστών και κακών τύπων. Υπεραραιώσεις στους λεπτούς, μέσους και χονδρούς κορμούς. Διεύρυνση υπάρχοντων κέντρων αναγέννησης και δημιουργία νέων στις ανώτερες κλάσεις με απομάκρυνση ευρύκορμων, κακόμορφων, βαρέων και ζημιωθέντων δένδρων. Παραμονή 1-2 άτομα γηραιά, κουφαλερά αλλά υγιή άτομα ως ενδιάιτημα της πανίδας. Απαγόρευση βοσκής αίγες 10 έτη, μεγάλα ζώα 7 έτη και πρόβατα 5ετία.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΤΚ ΜΗΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
40	Οξ.	Κλ.-συμ.	1-120 και >	Υπ.,σπ.	8.778	3.636	250,83	103,89	41,42	Εξευγενιστική αραιώση στα κορμίδια με ευνόηση των εκάστοτε εκλεκτών ατόμων με υλοτομία των οξύτερων ανταγωνιστών και κακών τύπων. Υπεραραιώσεις στους λεπτούς, μέσους και χονδρούς κορμούς. Διεύρυνση υπάρχοντων κέντρων αναγέννησης και δημιουργία νέων στις ανώτερες κλάσεις με απομάκρυνση ευρύκορμων, κακόμορφων, βαρέων και ζημιωθέντων δένδρων. Παραμονή 1-2 άτομα γηραιά, κουφαλερά αλλά υγιή άτομα ως ενδιάιτημα της πανίδας. Απαγόρευση βοσκής αίγες 10 έτη, μεγάλα ζώα 7 έτη και πρόβατα 5ετία.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΤΚ ΜΗΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
41	Οξ.	Κλ.	1-120 και >	Υπ.,σπ.	12.850	7.672	235,36	140,52	59,7	Αρκετά κακόμορφα και γηραιά άτομα. Λαθρουλοτομίες στα ανώτερα, άνω του δρόμου.Εξευγενιστική αραιώση στα κορμίδια με ευνόηση των εκάστοτε εκλεκτών ατόμων με υλοτομία των οξύτερων ανταγωνιστών και κακών τύπων. Υπεραραιώσεις στους λεπτούς, μέσους και χονδρούς κορμούς. Διεύρυνση υπάρχοντων κέντρων αναγέννησης και δημιουργία νέων στις ανώτερες κλάσεις με απομάκρυνση ευρύκορμων, κακόμορφων, βαρέων και ζημιωθέντων δένδρων. Παραμονή 1-2 άτομα γηραιά, κουφαλερά αλλά υγιή άτομα ως ενδιάιτημα της πανίδας. Απαγόρευση βοσκής αίγες 10 έτη, μεγάλα ζώα 7 έτη και πρόβατα 5ετία.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΤΚ ΜΗΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
42	Οξ.	Κλ.-χαλ.	1-120 και >	Υπ.	2.142	477	278,25	61,97	22,27	Αρκετά προσβεβλημένα από μύκητες άτομα. Στα υψηλότερα ισχυρές με απόκρημνες κλίσεις. Λαθρουλοτομίες στα ανώτερα, άνω του δρόμου.Εξευγενιστική αραιώση στα κορμίδια με ευνόηση των εκάστοτε εκλεκτών ατόμων με υλοτομία των οξύτερων ανταγωνιστών και κακών τύπων. Υπεραραιώσεις στους λεπτούς, μέσους και χονδρούς κορμούς. Διεύρυνση υπάρχοντων κέντρων αναγέννησης και δημιουργία νέων στις ανώτερες κλάσεις με απομάκρυνση ευρύκορμων, κακόμορφων, βαρέων και ζημιωθέντων δένδρων. Παραμονή 1-2 άτομα γηραιά, κουφαλερά αλλά υγιή άτομα ως ενδιάιτημα της πανίδας. Απαγόρευση βοσκής αίγες 10 έτη, μεγάλα ζώα 7 έτη και πρόβατα 5ετία.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΤΚ ΜΗΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
43	Οξ., Ελ.	Κλ.-χαλ.	1-100 και >	Υπ.,σπ.	Οξ: 3.980 Ελ: 1.783	Οξ: 3.368 Ελ: 461	Οξ: 180,87 Ελ: 81,04	Οξ: 107,62 Ελ:20,96	Οξ: 59,50 Ελ:25,86	Εξευγενιστική αραιώση στα κορμίδια με ευνόηση των εκάστοτε εκλεκτών ατόμων με υλοτομία των οξύτερων ανταγωνιστών και κακών τύπων. Υπεραραιώσεις στους λεπτούς, μέσους και χονδρούς κορμούς. Διεύρυνση υπάρχοντων κέντρων αναγέννησης και δημιουργία νέων στις ανώτερες κλάσεις με απομάκρυνση ευρύκορμων, κακόμορφων, βαρέων και ζημιωθέντων δένδρων. Παραμονή 1-2 άτομα γηραιά, κουφαλερά αλλά υγιή άτομα ως ενδιάιτημα της πανίδας. Απαγόρευση βοσκής αίγες 10 έτη, μεγάλα ζώα 7 έτη και πρόβατα 5ετία.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΤΚ ΜΗΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
44	Οξ.	Κλ.-χαλ.	1-120 και >	Υπ.,σπ.	5.600	2.716	159,98	77,59	48,5	Εξευγενιστική αραιώση στα κορμίδια με ευνόηση των εκάστοτε εκλεκτών ατόμων με υλοτομία των οξύτερων ανταγωνιστών και κακών τύπων. Υπεραραιώσεις στους λεπτούς, μέσους και χονδρούς κορμούς. Διεύρυνση υπάρχοντων κέντρων αναγέννησης και δημιουργία νέων στις ανώτερες κλάσεις με απομάκρυνση ευρύκορμων, κακόμορφων, βαρέων και ζημιωθέντων δένδρων. Παραμονή 1-2 άτομα γηραιά, κουφαλερά αλλά υγιή άτομα ως ενδιάιτημα της πανίδας. Απαγόρευση βοσκής αίγες 10 έτη, μεγάλα ζώα 7 έτη και πρόβατα 5ετία.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΤΚ ΜΗΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	ΣΥ συστάδας	Υ κλάσεων διαμέτρου >34 cm	ΣΥ συστάδας / ha	Υ κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
45	Μ.π., Δ.π.	Κλ.-χαλ.	1-110 και >	Υπ.,ακ.	Μ.π:11.286	Μ.π:2.384	Μ.π: 251,35	Μ.π: 53,10	21,12	Εξευγενιστική αραίωση στα κορμίδια με ευνόηση των εκάστοτε εκλεκτών ατόμων με υλοτομία των οξύτερων ανταγωνιστών και κακών τύπων. Υπεραραιώσεις στους λεπτούς, μέσους και χονδρούς κορμούς. Διεύρυνση υπάρχοντων κέντρων αναγέννησης και δημιουργία νέων στις ανώτερες κλάσεις με απομάκρυνση ευρύκορμων, κακόμορφων, βαρέων και ζημιωθέντων δένδρων. Παραμονή 1-2 άτομα γηραιά, κουφαλερά αλλά υγιή άτομα ως ενδιάιτημα της πανίδας. Απαγόρευση βοσκής αίγες 10 έτη, μεγάλα ζώα 7 έτη και πρόβατα 5ετία.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΤΚ ΜΗΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
46	Μ.π., Δ.π., Οξ., Ελ.	Κλ.-χαλ.	1-110 και >	Υπ.,διφ.,ακ.	Μ.π:9.012 Οξ:2.404 Ελ:76	Μ.π:5.249 Οξ:1.677 Ελ:0	Μ.π:327,68 Οξ:231,13 Ελ:7,33	Μ.π:190,87 Οξ:161,28 Ελ:0	Μ.π:58,24 Οξ:69,76 Ελ:0	Εξευγενιστική αραίωση στα κορμίδια με ευνόηση των εκάστοτε εκλεκτών ατόμων με υλοτομία των οξύτερων ανταγωνιστών και κακών τύπων. Υπεραραιώσεις στους λεπτούς, μέσους και χονδρούς κορμούς. Διεύρυνση υπάρχοντων κέντρων αναγέννησης και δημιουργία νέων στις ανώτερες κλάσεις με απομάκρυνση ευρύκορμων, κακόμορφων, βαρέων και ζημιωθέντων δένδρων. Παραμονή 1-2 άτομα γηραιά, κουφαλερά αλλά υγιή άτομα ως ενδιάιτημα της πανίδας. Απαγόρευση βοσκής αίγες 10 έτη, μεγάλα ζώα 7 έτη και πρόβατα 5ετία.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΤΚ ΜΗΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
47	Οξ., Μ.π	Κλ.-χαλ.	1-120 και >	Υπ.,σπ.	Οξ: 3.906 Μ.π: 309	Οξ: 2.039 Μ.π: 111	Οξ: 310,10 Μ.π: 308,61	Οξ: 161,88 Μ.π: 111	Οξ: 52,20 Μ.π: 35,92	Εξευγενιστική αραίωση στα κορμίδια με ευνόηση των εκάστοτε εκλεκτών ατόμων με υλοτομία των οξύτερων ανταγωνιστών και κακών τύπων. Υπεραραιώσεις στους λεπτούς, μέσους και χονδρούς κορμούς. Διεύρυνση υπάρχοντων κέντρων αναγέννησης και δημιουργία νέων στις ανώτερες κλάσεις με απομάκρυνση ευρύκορμων, κακόμορφων, βαρέων και ζημιωθέντων δένδρων. Παραμονή 1-2 άτομα γηραιά, κουφαλερά αλλά υγιή άτομα ως ενδιάιτημα της πανίδας. Απαγόρευση βοσκής αίγες 10 έτη, μεγάλα ζώα 7 έτη και πρόβατα 5ετία.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΤΚ ΜΗΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
48	Οξ.	Κλ..	1-120 και >	Υπ.	2.581	1.312	260,7	132,56	50,83	Εξευγενιστική αραίωση στα κορμίδια με ευνόηση των εκάστοτε εκλεκτών ατόμων με υλοτομία των οξύτερων ανταγωνιστών και κακών τύπων. Υπεραραιώσεις στους λεπτούς, μέσους και χονδρούς κορμούς. Διεύρυνση υπάρχοντων κέντρων αναγέννησης και δημιουργία νέων στις ανώτερες κλάσεις με απομάκρυνση ευρύκορμων, κακόμορφων, βαρέων και ζημιωθέντων δένδρων. Παραμονή 1-2 άτομα γηραιά, κουφαλερά αλλά υγιή άτομα ως ενδιάιτημα της πανίδας. Απαγόρευση βοσκής αίγες 10 έτη, μεγάλα ζώα 7 έτη και πρόβατα 5ετία.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΤΚ ΜΗΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
49										Γυμνές χορτολιβαδικές εκτάσεις με διάσπαρτα κυρίως άτομα Μ.π., Οξ., Ελ. Ανέκαθεν ως βοσκότοπος.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΤΚ ΜΗΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
1α	Οξ., Δρ., άτομα Κασ.,Ελ.,Φυλ.πλ.	0,8-1,1	1-110 ετών	Σπ.,υπ.	Οξ:13.472 Δρ:332	Οξ: 4.789 Δρ:0	Οξ: 207,15 Δρ:115,43	Οξ: 73,64 Δρ:0	Οξ: 35,55 Δρ:0	Καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά. Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεπτών κορμών οξυάς σε έκταση 70 στρεμμάτων. Εξυγιαντικές υλοτομίες στη Δρυ με απομάκρυνση των κακόμορφων και γενικά ανεπιθύμητων ατόμων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
1β	Οξ., Δρ., άτομα Κασ., Φυλ.πλ.	0,9-1,1	Οξ:1-80 Δρ:1-60	Σπ.,υπ.	Οξ:12.231 Δρ:1.592 Κασ: 406	Οξ:5.604 Δρ:0 Κασ: 0	Οξ:52,82 Δρ:13,79 Κασ: 52,82	Οξ:106,09 Δρ:0 Κασ: 0	Οξ:45,82 Δρ:0 Κασ: 0	Καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά. Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεπτών κορμών οξυάς σε έκταση 70 στρεμμάτων. Εξυγιαντικές υλοτομίες στη Δρυ με απομάκρυνση των κακόμορφων και γενικά ανεπιθύμητων ατόμων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	ΣΥ συστάδας	Υ κλάσεων διαμέτρου >34 cm	ΣΥ συστάδας / ha	Υ κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
1γ	Οξ., Δρ., άτομα Κασ., Φυλ.πλ.	0,7-1,1	Οξ:1-120 Δρ:1-50	Σπ.,υπ.	Οξ:10.533 Δρ:7.714	Οξ:6.246 Δρ:944	Οξ:292,98 Δρ:209,06	Οξ:173,74 Δρ:25,57	Οξ:59,30 Δρ:12,24	Εκτός διαχείρισης, εντάχθηκε στη διαχειριστική κλάση του Φυσικού Αποθέματος	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
4β	Οξ., Δρ., άτομα Κασ., Μ.π. Φυλ.πλ.	0,7-1,0	Οξ:1-120 Δρ:40-70	Σπ.,υπ.	Οξ:6.830 Δρ:300	Οξ:3.323 Δρ:-	Οξ:205,23 Δρ:-	Οξ:99,85 Δρ:-	Οξ:48,65 Δρ:-	Καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά. Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεπτών κορμών οξυάς σε έκταση 40 στρεμμάτων. Εξυγιαντικές υλοτομίες στη Δρυ με απομάκρυνση των κακόμορφων και γενικά ανεπιθυμητών ατόμων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
4γ	Οξ., Δρ., άτομα Κασ., Μ.π. Φυλ.πλ.	0,7-1,0	Οξ:1-120 Δρ:40-90	Οξ:Σπ.,υπ. Δρ:πρ., ακ.	Οξ:1.822 Δρ:1.181	Οξ:737 Δρ:206	Οξ:102,97 Δρ:66,73	Οξ:41,65 Δρ:11,62	Οξ:40,45 Δρ:17,44	Καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά. Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεπτών κορμών οξυάς σε έκταση 20 στρεμμάτων. Εξυγιαντικές υλοτομίες στη Δρυ με απομάκρυνση των κακόμορφων και γενικά ανεπιθυμητών ατόμων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
4δ	Οξ., Δρ., άτομα Κασ., Φυλ.πλ.	0,7-1,1	Οξ:1-120 Δρ:40-100	Οξ:Σπ.,υπ. Δρ:πρ., ακ.	Οξ:3.715 Δρ:3.442	Οξ:- Δρ:1.670	Οξ:370 Δρ:208,12	Οξ:- Δρ:100,98	Οξ:1- Δρ:48,52	Εκτός Διαχείρισης (Δεν μπορεί να υλοτομηθεί λόγω ισχυροτάτων κλίσεων και έλλειψης δασοδρόμων)	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
19α	Οξ.	0,7-1,1	1-100	Σπ.,υπ.	6.764	4.207	220,69	137,26	62,2	0,67 Ha αναδασώσεις κωνοφόρων, άτομα δρυός και υδροχαρής βλάστηση νότια. Καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά. Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεπτών κορμών οξυάς σε έκταση 30 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Καλλιέργεια κορμιδίων και λεπτών κορμών κωνοφόρων σε έκταση 10 στρεμμάτων. Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
19β	Οξ.	0,7-1,1	1-120	Σπ.,υπ.	5.570	3.152	232,45	131,53	56,59	Άτομα δρυός και υδροχαρής βλάστηση νότια. Καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά. Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεπτών κορμών οξυάς σε έκταση 30 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
20α	Οξ.	0,8-1,1	Οξ:1-100 Μ.π:1-150	Σπ.,υπ.	Οξ: 6.948	3.775	144,89	78,72	54,33	Διάσπαρτα άτομα Μ.Πεύκης στα ΒΑ(7,37 Ha).Αναδασώσεις κωνοφόρων στο Γιατάκι(2,87 Ha). Καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά. Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεπτών κορμών οξυάς σε έκταση 25 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
20γ	Οξ.	0,7-1,0	1-100	Σπ.,υπ.	6.899	2.900	163,49	68,73	42,04	1,01 Ha αναδασώσεις κωνοφόρων ανατολικά προς τη ράχη. Καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά. Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεπτών κορμών οξυάς σε έκταση 40 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Καλλιέργεια κορμιδίων και λεπτών κορμών κωνοφόρων σε έκταση 10 στρεμμάτων. Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	ΣΥ συστάδας	V κλάσεων διαμέτρου >34 cm	ΣΥ συστάδας / ha	V κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
23α	Οξ.	0,7-1,1	1-120	Σπ.,υπ.	6.346	2.503	150,03	59,16	39,44	3,00 Ha αναδασώσεις κωνοφόρων. Καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά. Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεπτών κορμών οξυάς σε έκταση 20 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Καλλιέργεια κορμιδίων και λεπτών κορμών κωνοφόρων σε έκταση 30 στρεμμάτων. Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
23ε	Οξ., Μ.π.		Οξ:1-120 Μ.π:60-140	Οξ:Σπ.,υπ. Μ.π:ομ.	Οξ:5.697 Μ.π:2.011	Οξ:3.913 Μ.π:2.011	Οξ:188,77 Μ.π:211,70	Οξ:129,66 Μ.π:211,70	Οξ:68,69 Μ.π:100	Εκτός διαχείρισης, εντάχθηκε στη διαχειριστική κλάση του Φυσικού Αποθέματος	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
25α	Οξ.	0,7-1,1	1-120	Σπ.,υπ.	7.922	6.668	196,96	165,78	84,17	Άτομα Μ. Πεύκης. Καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά. Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεπτών κορμών οξυάς σε έκταση 40 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
25β	Οξ.	0,7-1,1	1-100	Σπ.,υπ.	6.440	6.204	304,19	293,06	96,34	Καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά. Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεπτών κορμών οξυάς σε έκταση 20 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
25γ	Οξ.	0,7-1,1	1-100	Σπ.,υπ.	6.541	5.989	233,6	213,89	91,56	Καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά. Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεπτών κορμών οξυάς σε έκταση 20 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
25δ	Οξ.	0,8-1,1	1-120	Σπ.,υπ.	12.416	10.823	294,91	257,08	87,17	0,51 Ha αναδασώσεις κωνοφόρων. Καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά. Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεπτών κορμών οξυάς σε έκταση 40 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
26α	Οξ.	0,7-1,1	1-100	Σπ.,υπ.	6.860	5.793	302,21	255,2	84,45	Καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά. Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεπτών κορμών οξυάς σε έκταση 20 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
26β	Οξ.	0,7-1,1	1-120	Σπ.,υπ.	13.768	8.542	310,22	192,47	62,04	2,59 Ha αναδασώσεις κωνοφόρων. Καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά. Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεπτών κορμών οξυάς σε έκταση 50 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
32γ	Οξ.	0,7-1,1	1-100	Σπ.,υπ.& Διφ.	10.630	7.369	247,21	171,37	69,32	1,77 Ha αναδασώσεις κωνοφόρων. Καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά. Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεπτών κορμών οξυάς σε έκταση 40 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	ΣΥ συστάδας	Υ κλάσεων διαμέτρου >34 cm	ΣΥ συστάδας / ha	Υ κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
										των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια.	
32δ	Οξ.	0,7-1,1	1-100	Σπ.,υπ.	4.775	3.262	247,02	168,75	68,31	Καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά. Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεπτών κορμών οξυάς σε έκταση 20 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
32ε	Οξ., Μ.π, Δ.π.	0,7-1,1	Οξ:1-100 Πευ:60-100	Οξ:Σπ.,υπ. Πευ:ομ.	Οξ:5.992 Πευ:2.091	Οξ:5.992 Πευ:1.793	Οξ:200 Πευ:299,62	Οξ:200 Πευ:256,88	Οξ:100 Πευ:85,75	Οξυά, προς το δρόμο μαύρη και δασική πεύκη, στα ΝΑ αναδασώσεις κωνοφόρων. Καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά. Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεπτών κορμών οξυάς σε έκταση 30 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Καλλιέργεια κορμιδίων και λεπτών κορμών κωνοφόρων σε έκταση 30 στρεμμάτων. Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
33α	Μ.π	0,7-1,0	20-100	ομ.	1.129	1.020	116,58	105,37	90,35	Στα χαμηλά λίγη οξυά, νεαρές αναδασώσεις Μ. Πεύκης. Καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην πεύκη μόνο όπου υπάρχει αναγέννηση σε εξέλιξη. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Περιποιήσεις αναδασώσεων Μ. Πεύκης, συνολικής έκτασης 20 στρεμμάτων. Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
33γ	Μ.π, Δ.π.	0,7-0,9	110	ομ.	3.507	3.080	158,8	139,49	87,82	Νεαρές αναδασώσεις Μ. Πεύκης στο Β. άκρο. Καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην πεύκη μόνο όπου υπάρχει αναγέννηση σε εξέλιξη. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Περιποιήσεις αναδασώσεων Μ. Πεύκης, συνολικής έκτασης 15 στρεμμάτων. Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
33δ	Μ.π, Δ.π.	0,7-0,9	120	ομ.	3.585	2.791	154,38	120,2	77,85	Καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην πεύκη μόνο όπου υπάρχει αναγέννηση σε εξέλιξη. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
33ε	Δ.π, Μ.π	0,7-0,9	120	ομ.	2.604	2.347	138,2	124,58	90,13	Καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην πεύκη μόνο όπου υπάρχει αναγέννηση σε εξέλιξη. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
34α	Μ.π, Δ.π.	0,6-0,7	60-100	ομ.	2.095	1.923	167,43	153,72	91,79	Νότια Οξυά(0,89ha). Καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην πεύκη μόνο όπου υπάρχει αναγέννηση σε εξέλιξη. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
34β	Δ.π.	0,7	60-100	ομ.	3.288	2.934	139,94	124,85	89,23	Βόρεια σε μίξη με μαύρη. Αναγεννητικές υλοτομίες στην πεύκη μόνο όπου υπάρχει αναγέννηση σε εξέλιξη. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Τεχνητή υποβοήθηση αναγέννησης, συνολικής έκτασης 100	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	ΣΥ συστάδας	Υ κλάσεων διαμέτρου >34 cm	ΣΥ συστάδας / ha	Υ κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
										στρεμμάτων. Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια.	
34γ	Δ.π, Μ.π	0,6-0,7	60-100	ομ.	5.205	3.522	109,56	74,13	67,67	Εξυγιαντικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην πεύκη μόνο όπου υπάρχει αναγέννηση σε εξέλιξη. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
35α	Δ.π, Μ.π	0,6-0,7	60-100	ομ.	3.722	2.867	155,39	136,13	87,62	1,68 Ha αναδασώσεις κωνοφόρων. Καλλιέργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην πεύκη. Καλλιέργεια κορμιδίων πεύκης και λεπτών κορμών αυτής σε έκταση 20 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Καλλιέργεια κορμιδίων και λεπτών κορμών κωνοφόρων σε έκταση 20 στρεμμάτων. Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
35β	Μ.π, Δ.π.	0,8-1,0	1-100	υπ.	8.185	6.920	245,5	207,56	84,54	Οξύ στο ΝΔ άκρο, αναδάσωση κωνοφόρων στα Α. Καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξύ. Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεπτών κορμών οξυάς σε έκταση 20 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Καλλιέργεια κορμιδίων και λεπτών κορμών κωνοφόρων σε έκταση 100 στρεμμάτων. Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
35γ	Μ.π	0,8-1,0	1-120	υπ.& ομ.	5.560	4.833	186,47	162,07	86,92	Στα Β άτομα δασικής, αναδασώσεις κωνοφόρων στα ΝΔ. Καλλιεργητικές και εξυγιαντικές υλοτομίες στην πεύκη. Καλλιέργεια κορμιδίων πεύκης και λεπτών κορμών πεύκης σε έκταση 100 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Καλλιέργεια κορμιδίων και λεπτών κορμών κωνοφόρων σε έκταση 100 στρεμμάτων. Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
35δ	Μ.π, Δ.π.	0,6-1,0	20-90	υπ.	2.604	2.405,00	178,32	164,73	92,36	Αναγεννητικές και εξυγιαντικές υλοτομίες στην πεύκη μόνο όπου υπάρχει αναγέννηση σε εξέλιξη. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Τεχνητή υποβοήθηση αναγέννησης ,συνολικής έκτασης 50 στρεμμάτων. Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
35ε	Μ.π, Δ.π.	0,6-1,0	-140	ακ.	308	308	280	280	100	Κατά την μεγάλη πυρκαγιά το καλοκαίρι του 2007 κάηκαν 15,34 Ha δασοσκεπούς έκτασης Πεύκης. Υλοτομία και απομάκρυνση των τελείως καμένων ατόμων όπου μπορεί να είναι ανώδυνη για την υπάρχουσα αναγέννηση. Τεχνητή υποβοήθηση αναγέννησης ,συνολικής έκτασης 10 στρεμμάτων. Εκτός Διαχείρισης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
36α	Οξ.,Μ.π.,άτομα Δ.π.	0,7-1,1	Οξ:1-90 Πευ:-120	Σπ.,υπ.	Οξ:2.911 Πευ:2.825	Οξ:907 Πευ:1.768	Οξ:133,81 Πευ:227,25	Οξ:41,69 Πευ:142,24	Οξ:31,16 Πευ:62,58	Άτομα Δ.π. στα ΒΑ, σε μίξη στα Β. Αναδασώσεις κωνοφόρων στο όριο με 36Β. Καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξύ. Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεπτών κορμών οξυάς, σε έκταση 20 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Καλλιέργεια κορμιδίων και λεπτών κορμών κωνοφόρων σε έκταση 40 στρεμμάτων. Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
36β	Μ.π,Οξ.	0,8-1,1	Οξ:1-90 Πευ:-120	Σπ.,υπ.	Πευ:4.148 Οξ:1.785	Πευ:3.000 Οξ:989	Πευ:220 Οξ:198,86	Πευ:159,32 Οξ:110,21	Πευ:72,32 Οξ:55,41	Μίξη των δύο ειδών στα νότια. Αναδασώσεις κωνοφόρων στις ράχες. Εξυγενιστικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξύ και	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	ΣΥ συστάδας	Υ κλάσεων διαμέτρου >34 cm	ΣΥ συστάδας / ha	Υ κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
										την πεύκη. Αραιώσεις κορμιδίων οξυάς και λεππών κορμών σε έκταση 10 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Καλλιέργεια κορμιδίων και λεππών κορμών κωνοφόρων σε έκταση 100 στρεμμάτων. Τεχνητή υποβοήθηση της αναγέννησης (15 στρ.). Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια.	ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
37α	Μ.π.,Οξ.	0,8-1,0	Οξ:-90 Πευ:-120	Μ.π:Σπ.,υπ. Οξ:Διφ.ακ	Πευ:4.721 Οξ:1.902	Πευ:3.712 Οξ:1.857	Πευ:263,89 Οξ:150	Πευ:207,49 Οξ:146,42	Πευ:78,63 Οξ:97,63	Στα ΝΔ και Δ σε μίξη. Εξευγενιστικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά και την πεύκη. Αραιώσεις κορμιδίων οξυάς και λεππών κορμών σε έκταση 10 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Καλλιέργεια κορμιδίων και λεππών κορμών κωνοφόρων σε έκταση 10 στρεμμάτων. Τεχνητή υποβοήθηση της αναγέννησης (15 στρ.). Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
37β	Μ.π.									Τμήμα της συστάδας καταλαμβάνει ο οικισμός Φτέρης. Εκτός διαχείρισης. Διαχειριστική κλάση Βοσκοτόπων	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
37γ	Μ.π.,Οξ.	0,6-0,7	Οξ:-70 Πευ:-100	Μ.π:Σπ.,υπ. Οξ:Διφ.ακ	Πευ:1.172 Οξ:853	Πευ:732 Οξ:126	Πευ:99,25 Οξ:72,25	Πευ:61,98 Οξ:10,65	Πευ:62,46 Οξ:14,77	Εκτός διαχείρισης. Διαχειριστική κλάση Βοσκοτόπων	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
38α	Μ.π, Δ.π.	0,7-1,0	30-120	υπ.	5.035	4.170	177,57	147,04	82,82	Εξυγιαντικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην πεύκη μόνο όπου υπάρχει αναγέννηση σε εξέλιξη. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Περιποιήσεις αναδασώσεων Μ. Πεύκης, συνολικής έκτασης 100 στρεμμάτων. Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
38β	Μ.π, Δ.π.	0,8-1,1	10-120	υπ.	4.583	2.415	187,79	98,93	52,69	Εξυγιαντικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην πεύκη μόνο όπου υπάρχει αναγέννηση σε εξέλιξη. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Περιποιήσεις αναδασώσεων Μ. Πεύκης, συνολικής έκτασης 100 στρεμμάτων. Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
38γ	Μ.π, Δ.π.	0,8-1,1	-90	ακ.	5.763	3.799	221,8	146,23	65,92	Λίγη Οξυά. Εκτός διαχείρισης. Διαχειριστική κλάση Βοσκοτόπων	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
38δ	Μ.π, Δ.π.	0,7-0,8	-140	ακ.	1.265	1.167	139,04	128,38	92,25	Εκτός διαχείρισης. Διαχειριστική κλάση Βοσκοτόπων	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
39α	Μ.π., άτομα Δ.π.	0,8-1,0	-110	ακ.	1.247	907	226,7	164,91	72,73	Εκτός διαχείρισης. Διαχειριστική κλάση Βοσκοτόπων	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
39β	Μ.π., άτομα Δ.π.	0,8-1,0	1-110	υπ.	5.567	4.911	155,67	137,77	88,22	Αναγεννητικές και εξυγιαντικές υλοτομίες στην πεύκη μόνο όπου υπάρχει αναγέννηση σε εξέλιξη. Η συστάδα βρίσκεται πάνω από τον οικισμό της Φτέρης. Στην καείσα έκταση: Υλοτομία και απομάκρυνση των τελείως καμένων ατόμων όπου μπορεί να είναι ανώδυνη για την υπάρχουσα αναγέννηση. Τεχνητή υποβοήθηση αναγέννησης, συνολικής έκτασης 150 στρεμμάτων. Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	ΣΥ συστάδας	Υ κλάσεων διαμέτρου >34 cm	ΣΥ συστάδας / ha	Υ κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
39γ	Μ.π., άτομα Δ.π.	0,8-0,9	20-110	υπ.						Εκτός διαχείρισης. Διαχειριστική κλάση Βοσκοτόπων. Κατά την μεγάλη πυρκαγιά το καλοκαίρι του 2007 κάηκαν 8,16 Ha δασοσκεπούς έκτασης Πεύκης, δηλαδή όλη η δασοσκεπής έκταση της συστάδας. Στην καείσα έκταση: Υλοτομία και απομάκρυνση των τελείως καμένων ατόμων όπου μπορεί να είναι ανώδυνη για την υπάρχουσα αναγέννηση.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
39δ	Μ.π	0,8-0,9	30-80	ομ.	3.140	2.661	165,24	140,05	84,75	Εκτός διαχείρισης. Η συστάδα γειτνιάζει με τον οικισμό της Φτέρης και εκμεταλλεύεται σαν βοσκότοπος.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
40α	Δ.π.	0,7-1,0	50-120	Ομ.	1.473	1.444	296,32	290,54	98,03	Εκτός διαχείρισης. Κατά την μεγάλη πυρκαγιά το καλοκαίρι του 2007 κάηκαν 19,52 Ha δασοσκεπούς έκτασης Πεύκης. Στην καείσα έκταση: Υλοτομία και απομάκρυνση των τελείως καμένων ατόμων όπου μπορεί να είναι ανώδυνη για την υπάρχουσα αναγέννηση. Τεχνητή υποβοήθηση αναγέννησης ,συνολικής έκτασης 100 στρεμμάτων	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
40β	Μ.π	0,7-1,0	50-120	Ομ.	1.509	1.465	197,15	191,50	97,08	Εκτός διαχείρισης. Κατά την μεγάλη πυρκαγιά το καλοκαίρι του 2007 κάηκαν 9,84 Ha δασοσκεπούς έκτασης Πεύκης. Στην καείσα έκταση: Υλοτομία και απομάκρυνση των τελείως καμένων ατόμων όπου μπορεί να είναι ανώδυνη για την υπάρχουσα αναγέννηση. Τεχνητή υποβοήθηση αναγέννησης ,συνολικής έκτασης 50 στρεμμάτων.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
40γ	Μ.π,Οξ.	Μ.π:0,8-1,0 . Οξ:0,7-1,1	Μ.π:50-130 Οξ:1-120	Μ.π:ομ. Οξ:σπ.,υπ.	Μ.π:4.334 Οξ:2.004	Μ.π:4.110 Οξ:744	Μ.π:184,04 Οξ:270,01	Μ.π:174,52 Οξ:98,28	Μ.π:94,83 Οξ:36,40	Άτομα δασικής, οξυά στα ανατολικά προς το ρέμα. Εξευγενιστικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά και την πεύκη. Αραιώσεις κορμιδίων οξυάς και λεπτών κορμών σε έκταση 10 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Τεχνητή υποβοήθηση της αναγέννησης πεύκης σε έκταση 15 στρεμμάτων. Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
40δ	Μ.π,Οξ.	0,8-1,1	Μ.π:-120 Οξ:-90	υπ.	Μ.π:4.057 Οξ:998	Μ.π:3.278 Οξ:818	Μ.π:140,43 Οξ:94,77	Μ.π:113,46 Οξ:77,61	Μ.π:80,80 Οξ:81,96	Εξευγενιστικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά και την πεύκη. Αραιώσεις κορμιδίων οξυάς και λεπτών κορμών σε έκταση 10 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Τεχνητή υποβοήθηση της αναγέννησης πεύκης σε έκταση 10 στρεμμάτων. Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
40ε	Μ.π,Οξ.	0,7-1,1	-130	Σπ.,υπ.	Μ.π:4.919 Οξ:1.514	Μ.π:4.022 Οξ:680	Μ.π:90,92 Οξ:66,68	Μ.π:74,34 Οξ:29,95	Μ.π:81,76 Οξ:44,91	Σποραδικά άτομα δρυός. Εξευγενιστικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά και την πεύκη. Αραιώσεις κορμιδίων οξυάς και λεπτών κορμών σε έκταση 100 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Τεχνητή υποβοήθηση της αναγέννησης πεύκης σε έκταση 20 στρεμμάτων. Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
40στ	Δ.π.	0,6-0,8	40-120	ομ.						Πολλά ξερά, ιστάμενα και κατακείμενα, ακόρυφα, σπασμένα κλπ. Κατά την μεγάλη πυρκαγιά το καλοκαίρι του 2007 κάηκε όλη η δασοσκεπής έκταση της συστάδας. Εκτός διαχείρισης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
41α	Μ.π,Οξ.	0,8-1,0	-120	υπ. & ομ.	Μ.π:1.063 Οξ:646	Μ.π:657 Οξ:646	Μ.π:188,68 Οξ:200	Μ.π:116,49 Οξ:200	Μ.π:61,81 Οξ:100	Εκτός διαχείρισης. Κατά την μεγάλη πυρκαγιά το καλοκαίρι του 2007 κάηκαν 21,79 Ha δασοσκεπούς έκτασης Πεύκης. Τεχνητή υποβοήθηση της αναγέννησης πεύκης (αναμόχλευση του εδάφους), σε έκταση 100 στρεμμάτων. Στην καείσα έκταση: Υλοτομία και απομάκρυνση των τελείως καμένων ατόμων όπου μπορεί να είναι ανώδυνη για την υπάρχουσα αναγέννηση.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
41β	Μ.π,Δ.π,Οξ.	0,8-1,0	20-140	ομ. & υπ.	Πευ:3.260 Οξ:560	Πευ:2.481 Οξ:560	Πευ:282,73 Οξ:200	Πευ:215,18 Οξ:200	Πευ:76,10 Οξ:100	Εκτός διαχείρισης. Κατά την μεγάλη πυρκαγιά το καλοκαίρι του 2007 κάηκαν 18,09 Ha δασοσκεπούς έκτασης Πεύκης. Τεχνητή υποβοήθηση της αναγέννησης πεύκης (αναμόχλευση του	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	ΣΥ συστάδας	Υ κλάσεων διαμέτρου >34 cm	ΣΥ συστάδας / ha	Υ κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
										εδάφους), σε έκταση 100 στρεμμάτων. Στην καείσα έκταση: Υλοτομία και απομάκρυνση των τελείως καμένων ατόμων όπου μπορεί να είναι ανώδυνη για την υπάρχουσα αναγέννηση.	ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
41γ	Άτομα Δ.Π.									Διαχειριστική κλάση βοσκοτόπων. Εκτός διαχείρισης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
41δ	Δ.π,Μ.π,Οξ.	0,6-0,7	-120	ακ. & ομ.	Πευ:3.084 Οξ:174	Πευ:2.688 Οξ:174	Πευ:199,58 Οξ:200	Πευ:173,98 Οξ:200	Πευ:87,16 Οξ:100	Εκτός διαχείρισης, εντάχθηκε στη διαχειριστική κλάση Φυσικού αποθέματος. Κατά την μεγάλη πυρκαγιά το καλοκαίρι του 2007 κάηκαν 19,62 Ha δασοσκεπούς έκτασης Πεύκης. Το 2008 υλοτομήθηκαν 431,66 κ.μ καμένων δέντρων πεύκης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
41ε	Μ.π.	0,8-0,9	30-80	ομ.						Εκτός Διαχείρισης. Η συστάδα χρησιμοποιείται σαν βοσκότοπος. Κατά την μεγάλη πυρκαγιά το καλοκαίρι του 2007 κάηκε όλη η δασοσκεπής έκταση της συστάδας.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
42α	Μ.π,Οξ.	0,8-1,0	20-140	ομ.	Μ.π:2.349 Οξ:131	Μ.π:1.870 Οξ:0	Μ.π:223,29 Οξ:24,24	Μ.π:177,76 Οξ:0	Μ.π:79,60 Οξ:0	Εκτός διαχείρισης. Κατά την μεγάλη πυρκαγιά το καλοκαίρι του 2007 κάηκαν 18,02 Ha δασοσκεπούς έκτασης Πεύκης. Τεχνητή υποβοήθηση της αναγέννησης πεύκης (αναμόχλευση του εδάφους), σε έκταση 100 στρεμμάτων. Στην καείσα έκταση: Υλοτομία και απομάκρυνση των τελείως καμένων ατόμων όπου μπορεί να είναι ανώδυνη για την υπάρχουσα αναγέννηση.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
42β	Μ.π,Οξ.	0,9-1,0	1-140	ομ.	Μ.π:1.540 Οξ:474	Μ.π:1.448 Οξ:-	Μ.π:247,45 Οξ:100	Μ.π:232,80 Οξ:-	Μ.π:94,03 Οξ:-	Εκτός διαχείρισης. Κατά την μεγάλη πυρκαγιά το καλοκαίρι του 2007 κάηκαν 10,28 Ha δασοσκεπούς έκτασης Πεύκης. Το 2008 υλοτομήθηκαν 1170,23 κ.μ καμένων δέντρων πεύκης. Τεχνητή υποβοήθηση της αναγέννησης πεύκης (αναμόχλευση του εδάφους), σε έκταση 50 στρεμμάτων. Στην καείσα έκταση: Υλοτομία και απομάκρυνση των τελείως καμένων ατόμων όπου μπορεί να είναι ανώδυνη για την υπάρχουσα αναγέννηση.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
42γ	Μ.π.,Δ.π Οξ.	Πευ:0,9-1,0 Οξ:0,8-1,1	Πευ:-140 Οξ:-90	Πευ:ομ. Οξ:υπ.	Οξ:1.281	Οξ:1.151	Οξ:241,67	Οξ:217,17	Οξ:89,85	Εκτός διαχείρισης. Κατά την μεγάλη πυρκαγιά το καλοκαίρι του 2007 κάηκε όλη η δασοσκεπής έκταση Πεύκης της συστάδας. Το 2008 υλοτομήθηκαν 1052,58 κ.μ καμένων δέντρων πεύκης. Τεχνητή υποβοήθηση της αναγέννησης πεύκης (αναμόχλευση του εδάφους), σε έκταση 100 στρεμμάτων. Στην καείσα έκταση: Υλοτομία και απομάκρυνση των τελείως καμένων ατόμων όπου μπορεί να είναι ανώδυνη για την υπάρχουσα αναγέννηση.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
42δ	Μ.π.,Δ.π Οξ.	Πευ:0,9-1,0 Οξ:0,8-1,1	Πευ:-100 Οξ:-90	υπ.	Πευ:1.316 Οξ:132	Πευ:1.145 Οξ:-	Πευ:263,41 Οξ:100	Πευ:229 Οξ:-	Πευ:87,01 Οξ:-	Εκτός διαχείρισης. Το 2008 υλοτομήθηκαν 598,19 κ.μ καμένων δέντρων πεύκης .Κατά την μεγάλη πυρκαγιά το καλοκαίρι του 2007 κάηκαν 5,10 Ha δασοσκεπούς έκτασης Πεύκης. Τεχνητή υποβοήθηση της αναγέννησης πεύκης (αναμόχλευση του εδάφους), σε έκταση 50 στρεμμάτων. Περιποιήσεις αναδασώσεων Μ. Πεύκης ,συνολικής έκτασης 15 στρεμμάτων. Στην καείσα έκταση: Υλοτομία και απομάκρυνση των τελείως καμένων ατόμων όπου μπορεί να είναι ανώδυνη για την υπάρχουσα αναγέννηση.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
42ε	Δ.π,Μ.π.	0,8-0,9	-150	ακ.	Πευ:3.161	Πευ:2.672	Πευ:154,92	Πευ:130,98	Πευ:84,53	Εκτός Διαχείρισης. Διαχειρίζεται σαν βοσκότοπος	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
43α	Μ.π.,Δ.π άτομα	0,9-1,0	40-120	ομ.	Πευ:2.036	Πευ:1.762	Πευ:151,87	Πευ:13,39	Πευ:86,54	Αναγεννητικές και εξυγιαντικές υλοτομίες στην πεύκη μόνο όπου υπάρχει αναγέννηση σε εξέλιξη. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Τεχνητή υποβοήθηση της αναγέννησης πεύκης (αναμόχλευση του εδάφους), σε έκταση 50 στρεμμάτων. Περιποιήσεις αναδασώσεων Μ. Πεύκης, συνολικής έκτασης 50 στρεμμάτων. Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
43β	Μ.π.,Δ.π άτομα, Οξ.	Πευ:0,9-1,0 Οξ:0,8-1,1	Πευ:30-120 Οξ:-90	Πευ:ομ. Οξ:υπ.	Πευ:2.499 Οξ:444	Πευ:2.161 Οξ:-	Πευ:118,90 Οξ:100	Πευ:102,81 Οξ:-	Πευ:86,47 Οξ:-	Εξυγιαντικές και εξευγενιστικές αραιώσεις στην πεύκη και στην οξυά μόνο όπου υπάρχει αναγέννηση σε εξέλιξη. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	ΣΥ συστάδας	Υ κλάσεων διαμέτρου >34 cm	ΣΥ συστάδας / ha	Υ κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
										ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Περιποιήσεις αναδασώσεων Μ. Πεύκης ,συνολικής έκτασης 100 στρεμμάτων. Στην καείσα έκταση: Υλοτομία και απομάκρυνση των τελείως καμένων ατόμων όπου μπορεί να είναι ανώδυνη για την υπάρχουσα αναγέννηση. Τεχνητή υποβοήθηση της αναγέννησης πεύκης (αναμόχλευση του εδάφους), σε έκταση 200 στρεμμάτων Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια.	ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
43γ	Οξ.,Μ.π., Δ.π.	0,8-1,0	Οξ:-90 Πευ:-140	Οξ: Σπ.,ακ. & διφ. Πευ:ομ.	Οξ:6.267 Πευ:2.457	Οξ:3.551 Πευ:1.943	Οξ:208,82 Πευ:107,38	Οξ:118,33 Πευ:84,88	Οξ:56,66 Πευ:79,08	Εξυγενιστικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά και την πεύκη. Αραιώσεις κορμιδίων οξυάς και λεπτών κορμών σε έκταση 30 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Περιποιήσεις αναδασώσεων Μ.Πεύκης, συνολικής έκτασης 20 στρεμμάτων. Τεχνητή υποβοήθηση της αναγέννησης πεύκης (αναμόχλευση του εδάφους), σε έκταση 200 στρεμμάτων. Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
43δ	Μ.π.,Δ.π.	0,8-0,9	-80	ομ.	1.100	1.100	260,00	260,00	100	Εκτός Διαχείρισης. Διαχειρίζεται σαν βοσκότοπος.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
44α	Μ.π., Οξ.	Μ.π:0,7-0,9 Οξ:0,7-1,1	-120	Σπ., υπ.	Μ.π:2.269 Οξ:1.714	Μ.π:1.866 Οξ:1.268	Μ.π:161,33 Οξ:265,34	Μ.π:132,72 Οξ:196,28	Μ.π:82,24 Οξ:73,,97	Εκτός διαχείρισης. Κατά την μεγάλη πυρκαγιά το καλοκαίρι του 2007 κάηκαν 15 Ha δασοσκεπούς έκτασης Πεύκης. Τεχνητή υποβοήθηση της αναγέννησης πεύκης (αναμόχλευση του εδάφους),σε έκταση 100 στρεμμάτων. Στην καείσα έκταση: Υλοτομία και απομάκρυνση των τελείως καμένων ατόμων όπου μπορεί να είναι ανώδυνη για την υπάρχουσα αναγέννηση.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
44β	Μ.π., Οξ.	0,7-1,1	-110	Σπ., υπ.	Μ.π:1.991 Οξ:2.173	Μ.π:1.342 Οξ:1.464	Μ.π:162,19 Οξ:200,25	Μ.π:109,28 Οξ:134,93	Μ.π:67,40 Οξ:67,38	Εκτός διαχείρισης. Κατά την μεγάλη πυρκαγιά το καλοκαίρι του 2007 κάηκαν 18,79 Ha δασοσκεπούς έκτασης Πεύκης. Τεχνητή υποβοήθηση της αναγέννησης πεύκης (αναμόχλευση του εδάφους),σε έκταση 100 στρεμμάτων. Στην καείσα έκταση: Υλοτομία και απομάκρυνση των τελείως καμένων ατόμων όπου μπορεί να είναι ανώδυνη για την υπάρχουσα αναγέννηση.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
45α	Μ.π.Δρ,Οξ.	0,9-1,0 Οξ:0,9-1,1	Μ.π:30-40 Οξ:-90	Μ.π:ομ. Οξ:υπ.	Μ.π:4.426 Δρ.: 873 Οξ:415	Μ.π:208 Δρ.: 0 Οξ:-	Μ.π:80,19 Δρ.:15,82 Οξ:100	Μ.π:3,76 Δρ.: 0 Οξ:-	Μ.π:4,70 Δρ.: 0 Οξ:-	Εκτός Διαχείρισης. Η Μ.π. από αναδασώσεις. Διαχειριζόταν στο παρελθόν ως βοσκότοπος. Δεν υλοτομείται λόγω του εντόνου αναγλύφου και της έλλειψης δασοδρόμων. Τεχνητή υποβοήθηση της αναγέννησης πεύκης (αναμόχλευση του εδάφους),σε έκταση 300 στρεμμάτων.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
45β	Οξ., Μ.π.	0,7-1,1	Οξ:-100 Μ.π:-140	υπ.	Οξ:1.106 Μ.π:1.067	Οξ:0 Μ.π:-	Οξ: 46,55 Μ.π:150,00	Οξ:0 Μ.π:-	Οξ:0 Μ.π:-	Εκτός Διαχείρισης. Δεν υλοτομείται λόγω του εντόνου αναγλύφου και της έλλειψης δασοδρόμων.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
45γ	Οξ.,άτομα Μ.π.,Δρ.	0,7-1,1	1-100	υπ.	2.234	1.490	181,48	121,04	66,7	Εκτός Διαχείρισης. Διαχειρίζεται ως βοσκότοπος.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
45δ	Μ.π.	0,8-0,9	20-70	ομ.	852	289	133,31	45,18	33,92	Εκτός Διαχείρισης. Διαχειρίζεται ως βοσκότοπος.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
45ε	Οξ.,Δρ., άτομα Μ.π	Οξ:0,8-1,1 Δρ:0,9-1,0	Οξ:-120 Δρ:-50	Οξ:σπ.,υπ. Δρ:διφ.,ομ.	Οξ:1.104 Δρ:58	Οξ:796 Δρ:-	Οξ:156,90 Δρ:23,66	Οξ:113,23 Δρ:-	Οξ:72,10 Δρ:-	Εκτός Διαχείρισης. Δεν υλοτομείται λόγω του εντόνου αναγλύφου και της έλλειψης δασοδρόμων.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
45στ	Δρ., Μ.π.	0,9-1,0	Δρ:-70	Δρ: Διφ.ομ.	Δρ:3.956	Δρ:0	Δρ:65,57	Δρ:0	Δρ:0	Καλλιεργητικές υλοτομίες στην δρυ, μόνο όπου υπάρχει αναγέννηση σε εξέλιξη. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Απαγόρευση	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	ΣΥ συστάδας	Υ κλάσεων διαμέτρου >34 cm	ΣΥ συστάδας / ha	Υ κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
										βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια.	
46α	Οξ.,Δρ., Μ.π	0,9-1,0	Οξ: -120 Δρ.& Μ.π: -60	Δρ: Διφ.ακ.	Οξ: 2.459 Δρ: 1.467 Μ.π:603	Οξ: 695 Δρ: 0 Μ.π:23	Οξ:76,25 Δρ: 53,23 Μ.π:146,56	Οξ:21,56 Δρ: 0,0 Μ.π:5,61	Οξ:28,26 Δρ: 0,0 Μ.π:3,81	Εξυγιαντικές και εξευγενιστικές αραιώσεις στην δρυ και στην οξυά μόνο όπου υπάρχει αναγέννηση σε εξέλιξη. Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
46β	Οξ.,Δρ.	Οξ:0,7-1,1 Δρ:0,9-1,0	Οξ:-140 Δρ:-50	Οξ:Διφ.,υπ. Δρ:διφ.,ομ.	Οξ:2.729 Δρ:664	Οξ:1.290 Δρ:0	Οξ:105,17 Δρ:65,91	Οξ:49,71 Δρ:0	Οξ:47,27 Δρ:0	Εκτός Διαχείρισης. Υποβαθμισμένη συστάδα, παρατηρούνται ζημιές από φυσικά αίτια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
46γ	Οξ.	0,8-1,1	-130	Σπ.,υπ.	2.932	1.588	121,38	65,73	54,16	Εκτός Διαχείρισης. Υποβαθμισμένη συστάδα, παρατηρούνται ζημιές από φυσικά αίτια. Άτομα Λεύκης και άλλων Φυλ. πλατ.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
46δ	Οξ.	0,8-1,1	-150	Σπ.,υπ.	5.110	2.791	120,57	65,87	54,62	Εκτός Διαχείρισης. Υποβαθμισμένη συστάδα, παρατηρούνται ζημιές από φυσικά αίτια. Δεν υλοτομείται λόγω του εντόνου αναγλύφου και της έλλειψης δασοδρόμων.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
46ε	Οξ.,Μ.π., Δ.π.	Οξ:0,8-1,1 Πευ:0,8-0,9	-140	Σπ.,ακ.	Οξ:2.244 Πευ:138	Οξ:1.053 Πευ:-	Οξ:113,62 Πευ:23,66	Οξ:53,32 Πευ:-	Οξ:46,93 Πευ:-	Εκτός Διαχείρισης. Διαχειρίζεται ως βοσκότοπος.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
46στ	Οξ., Μ.π	0,7-1,1	Οξ: -120 Μ.π: -70	ομ., Οξ: Διφ.	Οξ: 2.363 Μ.π:695	Οξ: 1.366 Μ.π:366	Οξ: 126,51 Μ.π:37,19	Οξ: 73,13 Μ.π:19,57	Οξ: 57,81 Μ.π:52,66	Εκτός Διαχείρισης. Υποβαθμισμένη συστάδα, παρατηρούνται ζημιές από φυσικά αίτια.Στην πυρκαγιά του 2007 κήκαν πολλά άτομα πεύκης. Διαχειριζόταν στο παρελθόν ως βοσκότοπος. Δεν υλοτομείται λόγω του εντόνου αναγλύφου και της έλλειψης δασοδρόμων.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
46ζ	Οξ.,Δρ., Μ.π	0,7-0,9	Οξ: -100 Δρ.-70 Μ.π:-80	Οξ.& Δρ: Διφ.ομ., Μ.π:υπ.	Οξ: 609 Δρ: 200 Μ.π:400	Οξ: 536 Δρ:0 Μ.π:0	Οξ:95,25 Δρ: 100 Μ.π:100	Οξ:84,01 Δρ: 0 Μ.π:0	Οξ:88,01 Δρ: 0 Μ.π:0	Εκτός Διαχείρισης. Απαγόρευση της βοσκής και προστασία από λαθρουλοτομίες.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
46η	Οξ., Μ.π	0,7-1,0	-100	Σπ.,ακ.	Οξ: 336 Μ.π:358	Οξ: 336 Μ.π:358	Οξ: 120 Μ.π:70	Οξ: 120 Μ.π:70	Οξ: 100 Μ.π:100	Εκτός Διαχείρισης. Η συστάδα χρησιμοποιείται ως βοσκότοπος. Στην πυρκαγιά του 2007 κήκαν πολλά άτομα πεύκης	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
47α	Οξ., Μ.π	0,7-1,1	Οξ: -150 Μ.π: -70	Οξ: Σπ.υπ., Μ.π:ομ.	Οξ: 2.313 Μ.π:308	Οξ: 1.712 Μ.π:308	Οξ: 93,32 Μ.π:50	Οξ: 69,06 Μ.π:50	Οξ: 74,02 Μ.π:100	Εκτός Διαχείρισης. Συστάδα με πολλά κακόμορφα άτομα. Δεν υλοτομείται λόγω του εντόνου αναγλύφου και της έλλειψης δασοδρόμων. Παρατηρούνται ζημιές από φυσικά αίτια. Στην πυρκαγιά του 2007 κήκαν πολλά άτομα πεύκης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
47β	Οξ., Μ.π.,άτομα Δ.π, Λεύκη	0,7-1,1	-110	Σπ.υπ.	Οξ: 8.971 Μ.π:1.058	Οξ: 6.852 Μ.π:222	Οξ: 280,09 Μ.π:197,40	Οξ: 213,92 Μ.π:41,41	Οξ: 76,38 Μ.π:20,98	Εκτός Διαχείρισης. Στην πυρκαγιά του 2007 κήκαν πολλά άτομα πεύκης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
47γ	Οξ., Μ.π	Οξ:0,7-1,1 Μ.π:0,8-1,0	Οξ: -140 Μ.π: -70	Οξ: Σπ.υπ., Μ.π:ομ.	Οξ: 6.186 Μ.π:564	Οξ: 2.338 Μ.π:-	Οξ:125,75 Μ.π:100,00	Οξ: 47,53 Μ.π:-	Οξ: 37,80 Μ.π:-	Εκτός Διαχείρισης. Υποβαθμισμένη συστάδα, παρατηρούνται ζημιές από φυσικά αίτια. Δεν υλοτομείται λόγω του εντόνου αναγλύφου και της έλλειψης δασοδρόμων.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
47δ	Οξ., Μ.π., άτομα Δ.π.	Οξ:0,7-1,1 Μ.π:0,8-1,0	Οξ: -140 Μ.π: -70	Οξ: Σπ.υπ., Μ.π:ομ.	Οξ: 3.692 Μ.π:305	Οξ: 1.353 Μ.π:305	Οξ: 101,70 Μ.π:100,00	Οξ: 37,27 Μ.π:100,00	Οξ: 36,65 Μ.π:100,00	Εξυγενιστικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς του κυρίου είδους και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό του κυρίου είδους. Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
47ε	Οξ.	0,7-1,1	-120	Σπ.,υπ.	2.453	1.025	133,58	55,83	41,7	ΝΑ άτομα πεύκης και οστρυάς. Εξευγενιστικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς του κυρίου είδους και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό του κυρίου είδους. Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	ΣΥ συστάδας	Υ κλάσεων διαμέτρου >34 cm	ΣΥ συστάδας / ha	Υ κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
47στ	Οξ.	0,7-1,1	-130	Σπ.,υπ.	1.762	1.223	169,83	117,94	69,41	Εκτός Διαχείρισης. Υποβαθμισμένη συστάδα, παρατηρούνται ζημιές από φυσικά αίτια. Δεν υλοτομείται λόγω του εντόνου αναγλύφου.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
47ζ	Δρ., Οξ., Μ.π	0,7-1,1	-60 & υπέργηρα Οξ:-120	Οξ:σπ.,υπ. Δρ:διφ.,ομ.	Δρ:1.215 Οξ:445 Μ.π:549	Δρ:0 Οξ:445 Μ.π:549	Δρ:45,57 Οξ:100 Μ.π:100	Δρ:0 Οξ:100 Μ.π:100	Δρ:0 Οξ:100 Μ.π:100	Η Μ.π. από παλαιές αναδασώσεις. Εκτός Διαχείρισης. Υποβαθμισμένη συστάδα, παρατηρούνται ζημιές από φυσικά αίτια. Δεν υλοτομείται λόγω του εντόνου αναγλύφου.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
48α	Δρ.,Οξ. Άτομα πευκ.	0,7-1,1	Δρ:-60 & υπέργηρα	Δρ: Διφ.ομ.	Δρ:1.649	Δρ:141	Δρ:58,75	Δρ:5,04	Δρ:8,55	Εκτός Διαχείρισης. Πολύ υποβαθμισμένη συστάδα με πολλά διάκενα, παρατηρούνται έντονες ζημιές από φυσικά και ανθρωπογενή αίτια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
48β	Δρ.	0,7-1	Δρ:-60 & υπέργηρα	Διφ.ομ.	1.733	0	100,38	0	0	Εκτός Διαχείρισης. Πολύ υποβαθμισμένη συστάδα με πολλά διάκενα, παρατηρούνται έντονες ζημιές από φυσικά και ανθρωπογενή αίτια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
48γ	Δρ,πευκ Κασ	0,7-1	Δρ:-60 & υπέργηρα	Δρ: Διφ.ομ.	2.645	305	73,03	8,42	11,53	Εξυγιαντικές υλοτομίες και απομάκρυνση γαύρου. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς του κυρίου είδους και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό του κυρίου είδους. Απαγόρευση βοσκής για 10 χρόνια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
48δ	Άτομα, Δρ.,Μ.π,Λεύκης									Διαχειρίζεται σαν βοσκότοπος. Καμία επέμβαση.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
49α	Δρ.	0,7-1,0	Δρ:-60 & υπέργηρα	Διφ.ομ.	2.386	1.154	52,10	25,21	48,37	Εξευγενιστικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην δρυ .Απομάκρυνση του γαύρου σε μικτές ενώσεις για να ευνοηθεί η δρυς. Απαγόρευση βοσκής κάθε ζώου για 10 χρόνια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
49β	Δρ.,Οξ. Φυλ.πλ.	0,7-1,1	Δρ:-60 & υπέργηρα	Δρ: Διφ.ομ.	Δρ:2.556	Δρ:147	Δρ:50,49	Δρ:2,91	Δρ:5,75	Εκτός Διαχείρισης. Πολλή υποβαθμισμένη συστάδα με πολλά διάκενα, παρατηρούνται έντονες ζημιές από φυσικά και ανθρωπογενή αίτια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
49γ	Άτομα, Οξ., Δρ.,Μ.π,Λεύκης									Διαχειρίζεται σαν βοσκότοπος. Καμία επέμβαση.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
49δ	Δρ,άτομα Οξ. Φυλ.πλ,πευκ.	0,9-1	Δρ:-60 & υπέργηρα Οξ:-120	Διφ.ακ.	646	282	117,85	51,44	43,65	Διαχειρίζεται σαν βοσκότοπος. Καμία επέμβαση.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
49ε	Δρ.	0,8-1,1	-60 & υπέργηρα	Διφ.ομ.	1.867	0	59,38	0	0	Εκτός Διαχείρισης. Πολύ υποβαθμισμένη συστάδα με πολλά διάκενα, παρατηρούνται έντονες ζημιές από φυσικά και ανθρωπογενή αίτια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
49στ	Δρ,άτομα Οξ, Φυλ.πλ., Κασ	0,8-1,1	-60 & υπέργηρα	Διφ.ομ.	2.380	0	54,57	0	0	Εκτός Διαχείρισης. Πολύ υποβαθμισμένη συστάδα με πολλά διάκενα, παρατηρούνται έντονες ζημιές από φυσικά και ανθρωπογενή αίτια. Δεν υλοτομείται λόγω του εντόνου αναγλύφου και της έλλειψης δασοδρόμων.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
50α	Οξ.,Δρ., Άτομα Φυλ. Πλ.	0,8-1,1	-120	Σπ. υπ.	Οξ: 2.726 Δρ: 815	Οξ: 159 Δρ: 0	Οξ: 53,69 Δρ:28,71	Οξ: 5,61 Δρ: 0	Οξ: 5,83 Δρ: 0	Εκτός Διαχείρισης. Πολύ υποβαθμισμένη συστάδα με πολλά διάκενα, παρατηρούνται έντονες ζημιές από φυσικά και ανθρωπογενή αίτια. Διαχειριζόταν στο παρελθόν ως βοσκότοπος. Δεν υλοτομείται λόγω του εντόνου αναγλύφου.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
50β	Οξ, άτομα Δρ.	0,8-1,1	-120	Σπ. υπ.	2.080	188	60,74	5,49	9,04	Εκτός Διαχείρισης. Πολύ υποβαθμισμένη συστάδα με πολλά διάκενα, παρατηρούνται έντονες ζημιές από φυσικά και ανθρωπογενή αίτια. Διαχειριζόταν στο παρελθόν ως βοσκότοπος. Δεν υλοτομείται λόγω του εντόνου αναγλύφου.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	ΣΥ συστάδας	Υ κλάσεων διαμέτρου >34 cm	ΣΥ συστάδας / ha	Υ κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
50γ	Οξ., Μ.π., άτομα λεύκης, φυλ.πλ.	0,8-1,1	-140	Σπ. υπ.	3.418	0	60,23	0	0	Εκτός Διαχείρισης. Πολύ υποβαθμισμένη συστάδα με πολλά διάκενα, παρατηρούνται έντονες ζημιές από φυσικά και ανθρωπογενή αίτια. Δεν υλοτομείται λόγω του εντόνου αναγλύφου και της έλλειψης δασοδρόμων.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
50δ	Οξ., πευκ.,ΕλΦυλ. πλ.	0,8-1,1	-120	Σπ.& διφ., υπ., ακ.	Οξ: 3.171 Κων:634	Οξ: 761 Κων:87	Οξ: 53,2 Κων:32,06	Οξ: 19,09 Κων:4,41	Οξ: 24,00 Κων:13,72	Εκτός Διαχείρισης. Πολύ υποβαθμισμένη συστάδα με πολλά διάκενα, παρατηρούνται έντονες ζημιές από φυσικά και ανθρωπογενή αίτια. Διαχειριζόταν στο παρελθόν ως βοσκότοπος. Δεν υλοτομείται λόγω του εντόνου αναγλύφου.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
50ε	Οξ., άτομα λεύκης	0,8-1,1	-60 & υπέργηρα	Διφ.ομ.	1.109	274	101,21	25	24,71	Διαχειρίζεται σαν βοσκότοπος. Καμία επέμβαση.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
51α	Οξ., άτομα Δρ.	0,8-1,1	-120	Σπ. ομ.	4.188	601	71,33	10,24	14,35	Εκτός Διαχείρισης. Πολύ υποβαθμισμένη συστάδα με πολλά διάκενα, παρατηρούνται έντονες ζημιές από φυσικά και ανθρωπογενή αίτια. Δεν υλοτομείται λόγω του εντόνου αναγλύφου και της ύπαρξης πολλών αγρών που παρεμποδίζουν την μετατόπιση των δασικών προϊόντων.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
51β	Οξ., άτομα, πευκ.,Ελ Δρ., λεύκης Φυλ. πλ.	0,8-1,1	-160	Σπ. υπ.	3.140	735	72,95	17,08	23,41	Εκτός Διαχείρισης. Πολύ υποβαθμισμένη συστάδα με πολλά διάκενα, παρατηρούνται έντονες ζημιές από φυσικά και ανθρωπογενή αίτια. Δεν υλοτομείται λόγω του εντόνου αναγλύφου και της έλλειψης δασοδρόμων.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
51γ	Οξ., άτομα, Ελ.	0,8-1,1	-160	Σπ. υπ.	1.020	0	31,39	0	0	Εκτός Διαχείρισης. Πολύ υποβαθμισμένη συστάδα με πολλά διάκενα, παρατηρούνται έντονες ζημιές από φυσικά και ανθρωπογενή αίτια. Δεν υλοτομείται λόγω του εντόνου αναγλύφου και της έλλειψης δασοδρόμων.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
52α	Δρ, άτομα Οξ. Φυλ.πλ, Κασ	0,8-1,1	Δρ:-60 Οξ:-130 & υπέργηρα	Δρ:Διφ. ομ., Οξ:Σπ.υπ.	Δρ: 2.076	161	57,75	4,49	7,76	Εκτός Διαχείρισης. Πολύ υποβαθμισμένη συστάδα με πολλά διάκενα, παρατηρούνται έντονες ζημιές από φυσικά και ανθρωπογενή αίτια. Δεν υλοτομείται λόγω του εντόνου αναγλύφου και της ύπαρξης πολλών αγρών που παρεμποδίζουν την μετατόπιση των δασικών προϊόντων.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
52β	Δρ.	0,9-1,0	-60 & υπέργηρα	Διφ.,ομ.	4.211	745	51,19	9,06	17,69	Εκτός Διαχείρισης. Πολύ υποβαθμισμένη συστάδα με πολλά διάκενα, παρατηρούνται έντονες ζημιές από φυσικά και ανθρωπογενή αίτια. Δεν υλοτομείται λόγω του εντόνου αναγλύφου και της ύπαρξης πολλών αγρών που παρεμποδίζουν την μετατόπιση των δασικών προϊόντων.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
52γ	Δρ, Άτομα Φυλ.πλ	0,8-1,1	-60	Διφ.,ομ.	1.581	0	86,09	0	0	Εκτός διαχείρισης. Η συστάδα βρίσκεται ακριβώς πάνω από τον οικισμό Σκοτεινών και ασκεί προστατευτική επίδραση στα κατάντη αυτής εδάφη. Πολύ υποβαθμισμένη συστάδα με πολλά διάκενα, παρατηρούνται έντονες ζημιές από φυσικά και ανθρωπογενή αίτια. Χρησιμοποιείται σαν βοσκότοπος.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
53α	Δρ, Οξ. Άτομα Φυλ.πλ	0,9-1,1	-100	Δρ:Διφ. ομ., Οξ:υπ.	Δρ: 1.109 Οξ:943	Δρ: 168 Οξ:-	Δρ: 74,06 Οξ:80	Δρ: 11,24 Οξ:-	Δρ: 15,15 Οξ:-	Εκτός Διαχείρισης. Πολύ υποβαθμισμένη συστάδα με πολλά διάκενα, παρατηρούνται έντονες ζημιές από φυσικά και ανθρωπογενή αίτια. Δεν υλοτομείται λόγω του εντόνου αναγλύφου και της έλλειψης δασοδρόμων.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
53β	Οξ., Δρ.	0,8-1,1	Οξ: -100 Δρ.-60	Οξ.: σπ., ακ.,Δρ: Διφ.ομ.	Οξ: 1.542 Δρ: 214	Οξ: 175 Δρ: 0	Οξ: 52,40 Δρ: 50	Οξ: 5,94 Δρ: 0	Οξ: 11,35 Δρ: 0	Εκτός διαχείρισης. Πολύ υποβαθμισμένη συστάδα με πολλά διάκενα, παρατηρούνται έντονες ζημιές από φυσικά και ανθρωπογενή αίτια. Δεν υλοτομείται λόγω του εντόνου αναγλύφου και της ύπαρξης πολλών αγρών που παρεμποδίζουν την μετατόπιση των δασικών προϊόντων.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
53γ	Οξ., Δρ.	0,8-1,1	Οξ: -160 Δρ.-80	Οξ.: σπ., ακ.,Δρ: Διφ.ομ.	Οξ:1.145 Δρ: 2.965	Οξ:817 Δρ: 2.552	Οξ:110,94 Δρ: 77,54	Οξ:79,09 Δρ: 66,72	Οξ:71,35 Δρ: 86,07	Εκτός διαχείρισης. Η Δρυς με πολλά κακόμορφα και ασθενή υπέργηρα άτομα. Η οξυά με πολλά υπερμεγέθη άτομα. Δεν υλοτομείται λόγω του εντόνου αναγλύφου και της έλλειψης δασοδρόμων.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
1α	Δ.π,Οξ.,άτομα Ελ.	0,9-1,1	1-130	Δ.π: ομ., Οξ.:υπ.,	Δ.π: 28.839 Οξ:1.498	Δ.π: 28.047 Οξ:811	Δ.π: 457,05 Οξ:192,1	Δ.π: 444,5 Οξ:104	Δ.π: 97,25 Οξ:54,14	Καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες. Οι επεμβάσεις στην Πεύκη θα γίνουν κατά κύριο λόγο στην IV κλάση διαμέτρων. Καλλιέργεια λεπτών κορμών στην οξυά σε έκταση 5 Ha.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΡΗΤΙΝΗΣ -ΒΡΥΑΣ

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	ΣΥ συστάδας	Υ κλάσεων διαμέτρου >34 cm	ΣΥ συστάδας / ha	Υ κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
										Απομάκρυνση όλων των ατόμων της Δασικής Πεύκης που προσβλήθηκαν από το μύκητα PERIDERIUM PINI. Αναδάσωση στα κενά με Δασ. Πεύκη και Ελάτη. Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια.	
1β	Δ.π,Οξ.,άτομα Ελ.	0,9-1,1	1-130	Δ.π: ομ., Οξ.:υπ..	Δ.π: 20.483 Οξ:2.979	Δ.π: 16.585 Οξ:1.613	Δ.π: 522,1 Οξ:192,1	Δ.π: 422,8 Οξ:104	Δ.π: 80,97 Οξ:54,15	Καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες. Οι επεμβάσεις στην Πεύκη θα γίνουν κατά κύριο λόγο στην IV και III κλάσεις διαμέτρων. Καλλιέργεια λεπτών κορμών στην οξυά σε έκταση 10 Ha. Απομάκρυνση όλων των ατόμων της Δασικής Πεύκης που προσβλήθηκαν από το μύκητα PERIDERIUM PINI. Αναδάσωση στα κενά με Δασ. Πεύκη και Ελάτη. Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΡΗΤΙΝΗΣ -ΒΡΥΑΣ
2	Δ.π.	0,3-0,4	30-130							Αλπικός Βοσκότοπος. Απομάκρυνση όλων των ατόμων της Δασικής Πεύκης που προσβλήθηκαν από το μύκητα PRIDERIUM PINI. Καλλιέργεια νεοφυτειών-πυκνοφυτειών-κορμιδίων σε όλη τη δασοσκεπή έκταση.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΡΗΤΙΝΗΣ -ΒΡΥΑΣ
3α	Δ.π,Οξ.	0,6-0,8	40-130	ομ.	Δ.π: 10.190 Οξ:695	Δ.π: 10.190 Οξ:470	Δ.π: 259,80 Οξ:377,60	Δ.π: 259,80 Οξ:255,40	Δ.π: 100 Οξ:67,63	Καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες. Οι επεμβάσεις στην Πεύκη θα γίνουν κατά κύριο λόγο στην IV κλάση διαμέτρων. Απομάκρυνση όλων των ατόμων της Δασικής Πεύκης που προσβλήθηκαν από το μύκητα PERIDERIUM PINI. Αναδάσωση στα κενά με Δασ. Πεύκη και Ελάτη. Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΡΗΤΙΝΗΣ -ΒΡΥΑΣ
3β	Δ.π	0,6-0,8	40-130	ομ.	8.634	8.634	317,3	317,3	100	Καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες. Οι επεμβάσεις στην Πεύκη θα γίνουν κατά κύριο λόγο στην IV κλάση διαμέτρων. Απομάκρυνση όλων των ατόμων της Δασικής Πεύκης που προσβλήθηκαν από το μύκητα PERIDERIUM PINI. Αναδάσωση στα κενά με Δασ. Πεύκη και Ελάτη με ταυτόχρονη απαγόρευση της βοσκής αλλά και περίφραξη αυτών. Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΡΗΤΙΝΗΣ -ΒΡΥΑΣ
3γ	Δ.π,Οξ.	0,8-1,0	1-130	Δ.π: ομ., Οξ.:υπ..	Δ.π: 10.783 Οξ:3.768	Δ.π: 10.570 Οξ:2.549	Δ.π: 293 Οξ:377,6	Δ.π: 287,2 Οξ:255	Δ.π: 98,02 Οξ:67,65	Καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες. Καλλιέργεια λεπτών κορμών στην οξυά σε έκταση 5 Ha. Απομάκρυνση όλων των ατόμων της Δασικής Πεύκης που προσβλήθηκαν από το μύκητα PRIDERIUM PINI. Αναδάσωση στα μικρά διάκενα με Δασική Πεύκη και Ελάτη και ταυτόχρονη απαγόρευση της βοσκής αλλά και περίφραξη της αναδασωτέας έκτασης. Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια. Έχει γίνει πειραματικά αναδάσωση με Δασική και Μαύρη Πεύκη και περίφραξη της αναδασωτέας έκτασης, σε έκταση 70 στρεμμάτων με μεγάλη επιτυχία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΡΗΤΙΝΗΣ -ΒΡΥΑΣ
4α	Μ.π, Δ.π,Οξ.	0,7-1,0	1-130	ομ.	πευκ: 18.477 Οξ:4.613	πευκ: 14.006 Οξ:2.486	πευκ: 304,80 Οξ:256,3	πευκ: 231,05 Οξ:138,11	Δ.π: 75,80 Οξ:53,89	Καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες. Οι επεμβάσεις στην Πεύκη θα γίνουν κατά κύριο λόγο στην IV και III κλάσεις διαμέτρων. Καλλιέργεια λεπτών κορμών στην οξυά σε έκταση 10 Ha. Απομάκρυνση όλων των ατόμων της Δασικής Πεύκης που προσβλήθηκαν από το μύκητα PERIDERIUM PINI. Αναδάσωση στα κενά με Δασ. Πεύκη και Ελάτη. Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΡΗΤΙΝΗΣ -ΒΡΥΑΣ
4β	Μ.π,Οξ. άτομα Δρ.,Ελ.	0,8-1,0	1-130	Μ.π: ομ., Οξ.:υπ..	Μ.π:8.436 Οξ.:6.092	Μ.π:5.498 Οξ.:3.183	Μ.π:344,47 Οξ.:298,15	Μ.π:224,5 Οξ.:155,8	Δ.π: 65,17 Οξ:52,25	Καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες. Καλλιέργεια λεπτών κορμών στην οξυά σε έκταση 10 Ha. Αναδάσωση στα κενά με Δασ. Πεύκη και Ελάτη. Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΡΗΤΙΝΗΣ -ΒΡΥΑΣ
5α	Μ.π, Δ.π,Οξ.	0,8-1,0	1-130	ομ.	Μ.π:12.754 Οξ.:311	Μ.π:11.448 Οξ.:237	Μ.π:228,4 Οξ.:194,3	Μ.π:204,98 Οξ.:148,13	Μ.π:89,76 Οξ.:76,21	Καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες. Οι επεμβάσεις στην Πεύκη θα γίνουν κατά κύριο λόγο στην IV και III κλάσεις διαμέτρων. Απομάκρυνση όλων των ατόμων της Δασικής Πεύκης που προσβλήθηκαν από το μύκητα PERIDERIUM PINI. Αναδάσωση στα κενά με Δασ. Πεύκη και Ελάτη. Απαγόρευση βοσκής για τα	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΡΗΤΙΝΗΣ -ΒΡΥΑΣ

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	ΣΥ συστάδας	Υ κλάσεων διαμέτρου >34 cm	ΣΥ συστάδας / ha	Υ κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
										πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια.	
5β	Μ.π,Οξ. άτομα Ελ.	0,8-1,0	1-130	Μ.π: ομ., Οξ.:υπ..	Μ.π:9.271 Οξ.:1.625	Μ.π:7.041 Οξ.:1.236	Μ.π:338,5 Οξ.:194,3	Μ.π:257,1 Οξ.:147,7	Μ.π:75,95 Οξ.:76,06	Καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες. Αναδάσωση στα μικρά διάκενα με Δασική Πεύκη και Ελάτη. Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΡΗΤΙΝΗΣ -ΒΡΥΑΣ
6α	Μ.π, Δ.π,Οξ.	0,8-1,0	1-130	ομ.	πευκ: 6.478	πευκ: 5.523	πε: 167,19	πε:142,57	πευκ: 85,26	Καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες. Οι επεμβάσεις στην Πεύκη θα γίνουν κατά κύριο λόγο στην IV και III κλάσεις διαμέτρων. Απομάκρυνση όλων των ατόμων της Δασικής Πεύκης που προσβλήθηκαν από το μύκητα PERIDERIUM PINI. Αναδάσωση στα κενά με Δασ. Πεύκη και Ελάτη. Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια. Τα γυμνά, εκτάσεως 4,45 Ha, θα είναι ελεύθερα στη θερινή βοσκή.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΡΗΤΙΝΗΣ -ΒΡΥΑΣ
6β	Μ.π, Δ.π,Οξ.	0,8-1,0	1-130	ομ.	Μ.π:11.925 Οξ.:122	Μ.π:11.213 Οξ.:73	Μ.π:253,7 Οξ.:90,65	Μ.π:238,5 Οξ.:54,07	Μ.π:54,03 Οξ.:59,84	Καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες. Οι επεμβάσεις στην Πεύκη θα γίνουν κατά κύριο λόγο στην IV και III κλάσεις διαμέτρων. Απομάκρυνση όλων των ατόμων της Δασικής Πεύκης που προσβλήθηκαν από το μύκητα PERIDERIUM PINI. Αναδάσωση στα κενά με Δασ. Πεύκη και Ελάτη. Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΡΗΤΙΝΗΣ -ΒΡΥΑΣ
7α	Οξ., Μ.π,Δ.π,Ελ.	0,9-1,0	1-130	Μ.π: ομ., Οξ.,Ελ.:υπ..	Οξ:6.921 πευ:2.885 Ελ:2.394	Οξ:5.489 πευ:2.759 Ελ:1.546	Οξ:176,78 πευ:152,36 Ελ:61,14	Οξ:140,20 πευ:145,75 Ελ:39,49	Οξ:79,31 πευ:95,63 Ελ:64,58	Καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες. Οι επεμβάσεις θα γίνουν κατά κύριο λόγο στην IV κλάση διαμέτρων. Καλλιέργεια λεπτών κορμών στην οξυά σε έκταση 20 Ha και στην ελάτη σε έκταση 10 Ha. Απομάκρυνση όλων των ατόμων της Δασικής Πεύκης που προσβλήθηκαν από το μύκητα PRIDERIUM PINI. Αναδάσωση στα μικρά διάκενα με Δασική Πεύκη, Μαύρη Πεύκη και Ελάτη. Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΡΗΤΙΝΗΣ -ΒΡΥΑΣ
7β	Οξ., Μ.π,Δ.π,Ελ.	0,9-1,0	1-130	Μ.π: ομ., Οξ.,Ελ.:υπ..	Οξ:970 πευ:7.890 Ελ:336	Οξ:769 πευ:7.572 Ελ:217	Οξ:176,78 πευ:196,7 Ελ:61,14	Οξ:140,07 πευ:188,78 Ελ:39,53	Οξ:79,28 πευ:95,97 Ελ:64,58	Καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες. Οι επεμβάσεις θα γίνουν κατά κύριο λόγο στην IV κλάση διαμέτρων. Απομάκρυνση όλων των ατόμων της Δασικής Πεύκης που προσβλήθηκαν από το μύκητα PRIDERIUM PINI. Αναδάσωση στα μικρά διάκενα με Δασική Πεύκη και Ελάτη. Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια. Τα γυμνά, εκτάσεως 1,90 Ha, θα είναι ελεύθερα στη θερινή βοσκή.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΡΗΤΙΝΗΣ -ΒΡΥΑΣ
8α	Οξ., Μ.π,Δ.π,Ελ.	0,8-1,2	1-130	Μ.π: ομ., Οξ.,Ελ.:υπ..	Οξ:11.637 πευ:11.338 Ελ:600	Οξ:4.797 πευ:8.612 Ελ:-	Οξ:206,96 πευ:338,48 Ελ:-	Οξ:85,31 πευ:257,07 Ελ:-	Οξ:41,22 πευ:75,96 Ελ:-	Καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες. Οι επεμβάσεις θα γίνουν κατά κύριο λόγο στις III και IV κλάση διαμέτρων. Καλλιέργεια λεπτών κορμών στην οξυά σε έκταση 25 Ha και στην πεύκη σε έκταση 15 Ha. Αναδάσωση στα μικρά διάκενα με Δασική Πεύκη και Ελάτη. Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια. Τα γυμνά, εκτάσεως 7,62 Ha, θα είναι ελεύθερα στη θερινή βοσκή.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΡΗΤΙΝΗΣ -ΒΡΥΑΣ
8β	Οξ., Μ.π,Δ.π,Ελ.	0,9-1,0	1-130	Μ.π: ομ., Οξ.,Ελ.:υπ..	Οξ:5.338 πευ:7.374 Ελ:600	Οξ:1.048 πευ:7.256 Ελ:-	Οξ:21,67 πευ:242,7 Ελ:-	Οξ:21,67 πευ:242,7 Ελ:-	Οξ:19,63 πευ:98,40 Ελ:-	Καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες. Οι επεμβάσεις θα γίνουν κατά κύριο λόγο στην IV κλάση διαμέτρων. Καλλιέργεια λεπτών κορμών στην οξυά σε έκταση 25 Ha. Καλλιέργεια στην πεύκη λεπτών κορμών και κορμίδων σε έκταση 26,4 Ha που αναδασώθηκε. Αναδάσωση στα μικρά διάκενα με Δασική Πεύκη και Ελάτη. Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια. Τα γυμνά, εκτάσεως 7,62 Ha, θα είναι ελεύθερα στη θερινή βοσκή.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΡΗΤΙΝΗΣ -ΒΡΥΑΣ
9α	Οξ., Μ.π,Δ.π,Ελ.	0,9-1,1	Οξ.,Ελ.:1- 120, πευ:70-120	Μ.π: ομ., Οξ.,Ελ.:υπ..	Οξ:9.829 πευ:362 Ελ:2.114	Οξ:8.752 πευ:360 Ελ:1.177	Οξ:193,87 πευ:189 Ελ:111,26	Οξ:172,62 πευ:187,5 Ελ:61,95	Οξ:89,04 πευ:99,45 Ελ:55,68	Καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες. Οι επεμβάσεις θα γίνουν κατά κύριο λόγο στις III και IV κλάση διαμέτρων. Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια. Τα γυμνά, εκτάσεως 7,62 Ha, θα είναι ελεύθερα στη θερινή βοσκή.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΡΗΤΙΝΗΣ -ΒΡΥΑΣ

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	ΣΥ συστάδας	Υ κλάσεων διαμέτρου >34 cm	ΣΥ συστάδας / ha	Υ κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
9β	Οξ., Δ.π,Ελ.	0,6-0,8	1-140	Μ.π: ομ.	ΠΕΥ:9.650 ΟΞ:1.941 ΕΛ:600	ΠΕΥ:8.027 ΟΞ:1.790 ΕΛ:-	ΠΕΥ:168,12 ΟΞ:208,71 ΕΛ:-	ΠΕΥ:139,84 ΟΞ:192,47 ΕΛ:-	ΠΕΥ:83,18 ΟΞ: 92,22 ΕΛ:-	Καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες. Οι επεμβάσεις θα γίνουν κατά κύριο λόγο στην IV κλάση διαμέτρων. Καλλιέργεια λεπτών κορμών στην πεύκη σε έκταση 25 Ha. Αναδάσωση στα μικρά διάκενα με Δασική Πεύκη και Ελάτη. Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΡΗΤΙΝΗΣ -ΒΡΥΑΣ
10α	Οξ.,Ελ. Άτομα Μ.π	0,9-1,1	Οξ.,Ελ.:1- 120, ΠΕΥ:80-130	ΥΠ.	ΟΞ:8.956 ΕΛ:5.420	ΟΞ:5.546 ΕΛ:2.053	ΟΞ:205,3 ΕΛ:124,2	ΟΞ:127,11 ΕΛ:47,05	ΟΞ:61,931 ΕΛ:37,88	Καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες. Καλλιέργεια λεπτών κορμών στην πεύκη σε έκταση 10 Ha και 10 Ha στην οξυά καθώς και κορμιδίων στην πεύκη σε έκταση 10 Ha και 10 Ha στην οξυά. Απομάκρυνση των διάφορων ατόμων της Μ. Πεύκης. Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΡΗΤΙΝΗΣ -ΒΡΥΑΣ
10β	Οξ.,Ελ. Άτομα Μ.π,Δ.π	0,9-1,1	Οξ.,Ελ.:1- 120	ΥΠ.	ΟΞ:11.135 ΕΛ:3.251 ΠΕΥ:387	ΟΞ:4.630 ΕΛ:2.358 ΠΕΥ:363	ΟΞ:275,14 ΕΛ:144,7 ΠΕΥ:193	ΟΞ:114,41 ΕΛ:104,94 ΠΕΥ:181,5	ΟΞ:41,58 ΕΛ:42,65 ΠΕΥ:93,80	Καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες. Καλλιέργεια λεπτών κορμών στην οξυά σε έκταση 20 Ha. Απομάκρυνση των διάφορων ατόμων της Μ. Πεύκης. Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΡΗΤΙΝΗΣ -ΒΡΥΑΣ
10γ	Οξ.,Δ.π,Ελ.	0,6-0,8	1-150	ομ.	Δ.π.:10.094 ΟΞ:4.500 ΕΛ:2.646	Δ.π.:9.468 ΟΞ:1.448 ΕΛ:1.920	Δ.π.:193,4 ΟΞ:246,1 ΕΛ:144,7	Δ.π.:181,38 ΟΞ:79,17 ΕΛ:104,98	Δ.π.:93,80 ΟΞ:32,18 ΕΛ:72,56	Καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες. Οι επεμβάσεις στη πεύκη θα γίνουν κατά κύριο λόγο στην IV κλάση διαμέτρων. Καλλιέργεια λεπτών κορμών στην οξυά σε έκταση 10 Ha και 10 Ha στην ελάτη καθώς και κορμιδίων στην οξυά σε έκταση 5 Ha . Αναδάσωση στα μικρά διάκενα με Δασική Πεύκη και Ελάτη. Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια. Τα γυμνά, εκτάσεως θα είναι ελεύθερα στη θερινή βοσκή.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΡΗΤΙΝΗΣ -ΒΡΥΑΣ
11α	Οξ.,Ελ. Άτομα Μ.π, λεύκη	0,9-1,1	Οξ.,Ελ.:1- 120, Μ.π:1- 140	Μ.π: ομ., ΟΞ.,Ελ.:ΥΠ..	ΟΞ:5.460 ΕΛ:2.865 Μ.π:160	ΟΞ:3.087 ΕΛ:2.490 Μ.π:74,00	ΟΞ:214,62 ΕΛ:112,62 Μ.π:60,38	ΟΞ:121,34 ΕΛ:97,88 Μ.π:27,92	ΟΞ:56,54 ΕΛ:86,91 Μ.π:46,25	Καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες. Καλλιέργεια λεπτών κορμών στην οξυά σε έκταση 5 Ha και κορμιδίων επίσης 5 Ha. Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΡΗΤΙΝΗΣ -ΒΡΥΑΣ
11β	Οξ.,Ελ., Δ.π.	0,9-1,1	Οξ.,Ελ.:1- 120, Δ.π:1- 140	Δ.π: ομ., ΟΞ.,Ελ.:ΥΠ.	ΟΞ:13.264 ΕΛ:938 Δ.π:3.866	ΟΞ:3.923 ΕΛ:758 Δ.π:3.570	ΟΞ:282,09 ΕΛ:76,66 Δ.π:153,05	ΟΞ:83,43 ΕΛ:62,03 Δ.π:141,33	ΟΞ:29,58 ΕΛ:80,81 Δ.π:92,34	Καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες. Καλλιέργεια λεπτών κορμών στην οξυά σε έκταση 10 Ha καθώς και κορμιδίων στην οξυά σε έκταση 10 Ha . Αναδάσωση στα μικρά διάκενα με Δασική Πεύκη και Ελάτη. Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΡΗΤΙΝΗΣ -ΒΡΥΑΣ
12α	Οξ.,Ελ. Άτομα Μ.π, λεύκη	0,9-1,1	Οξ.,Ελ.:1- 120, Μ.π:1- 140	Μ.π: ομ., ΟΞ.,Ελ.:ΥΠ..	ΟΞ:11.265 ΕΛ:2.013 Μ.π:845	ΟΞ:6.626 ΕΛ:833 Μ.π:706	ΟΞ:265,06 ΕΛ:47,36 Μ.π:60,36	ΟΞ:155,91 ΕΛ:19,60 Μ.π:50,43	ΟΞ:58,82 ΕΛ:41,38 Μ.π:83,55	Καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες. Καλλιέργεια λεπτών κορμών στην οξυά σε έκταση 10 Ha και στην Ελάτη σε 20Ha καθώς και κορμιδίων στην οξυά σε έκταση 10 Ha . . Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΡΗΤΙΝΗΣ -ΒΡΥΑΣ
12β	Οξ.,Ελ., Μ.π,Δ.π	0,8-1,1	Οξ.,Ελ.:1- 120 ΠΕΥ:1- 130	ΠΕΥΚ: ομ., ΟΞ.,Ελ.:ΥΠ.	ΟΞ:8.055 ΕΛ:3.442 ΠΕΥ:2.606	ΟΞ:2.566 ΕΛ:0 ΠΕΥ:2.092	ΟΞ:149,00 ΕΛ:122,80 ΠΕΥ:100,3	ΟΞ:47,49 ΕΛ:0 ΠΕΥ:80,46	ΟΞ:31,86 ΕΛ:0 ΠΕΥ:80,28	Καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες. Καλλιέργεια λεπτών κορμών στην οξυά σε έκταση 15 Ha και στην Ελάτη σε 15Ha καθώς και κορμιδίων στην οξυά σε έκταση 10 Ha . Αναδάσωση στα μικρά διάκενα με Δασική Πεύκη και Ελάτη. Τα γυμνά θα είναι ελεύθερα στη θερινή βοσκή. Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΡΗΤΙΝΗΣ -ΒΡΥΑΣ
13α	Μ.π,Δ.π,Οξ.	0,6-0,9	1-140	ομ.	ΠΕΥ:18.735	ΠΕΥ:17.287	ΠΕΥ:303,2	ΠΕΥ:279,7	ΠΕΥ:92,27	Καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες. Οι επεμβάσεις στην Πεύκη θα γίνουν κατά κύριο λόγο στις IV και III κλάσεις διαμέτρων. Αναδάσωση στα διάκενα με Δασική, Μαύρη Πεύκη και Ελάτη. Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΡΗΤΙΝΗΣ -ΒΡΥΑΣ
13β	Μ.π,Δ.π,Οξ. άτομα Δρ., Ελ, Κασ.	0,8-1,1	ΟΞ.:1-110 ΠΕΥ:1-120	ομ.	ΟΞ:5.633 ΠΕΥ:11.213	ΟΞ:3.214 ΠΕΥ:9.541	ΟΞ:85,07 ΠΕΥ:169,33	ΟΞ:48,53 ΠΕΥ:144,08	ΟΞ:57,06 ΠΕΥ:85,09	Καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες. Οι επεμβάσεις στην Πεύκη θα γίνουν κατά κύριο λόγο στις IV και III κλάσεις διαμέτρων. Καλλιέργεια λεπτών κορμών στην οξυά σε έκταση 30 Ha. Καλλιέργεια στην πεύκη λεπτών κορμών 15 Ha και κορμιδίων 15 σε έκταση 30,81 Ha που αναδασώθηκε. Αναδάσωση στα γυμνά και στα μικρά διάκενα με Δασική, Μαύρη Πεύκη και Ελάτη. Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΡΗΤΙΝΗΣ -ΒΡΥΑΣ

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	ΣΥ συστάδας	Υ κλάσεων διαμέτρου >34 cm	ΣΥ συστάδας / ha	Υ κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
14	Μ.π,Δ.π,Οξ. άτομα Δρ., Κασ.	0,8-1,1	Οξ.:1-110 Πευ:1-120	ομ.	Οξ:1.808 Πευ:14.590	Οξ:945 Πευ:11.005	Οξ:28,47 Πευ:229,73	Οξ:14,88 Πευ:173,28	Οξ:52,27 Πευ:75,43	Καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες. Οι επεμβάσεις στην Πεύκη θα γίνουν κατά κύριο λόγο στις IV και III κλάσεις διαμέτρων. Καλλιέργεια λεπτών κορμών στην οξυά σε έκταση 10 Ha. Καλλιέργεια στην πεύκη λεπτών κορμών 25 Ha και κορμιδίων Οξυάς σε έκταση 10 Ha. Αναδάσωση στα μικρά διάκενα με Δασική, Μαύρη Πεύκη και Ελάτη. Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΡΗΤΙΝΗΣ -ΒΡΥΑΣ
15α	Δρ., Κασ. άτομα Οξ.	0,5-0,6	Δρ.:20-80 Κασ:10-40	ακ.	Δρ:9.164 Κασ:3.333	Δρ:8.232 Κασ:1.745	Δρ:93,30 Κασ:33,94	Δρ:83,81 Κασ:17,77	Δρ:89,83 Κασ:52,36	Έντονη βόσκηση και λαθροϋλοτομίες κατά το παρελθόν. Γηραιά άτομα Δρυός και Καστανιάς. Στη Δρυ αναγωγή, με την διενέργεια καλλιεργητικών υλοτομιών.Στην Καστανιά καλλιεργητικές υλοτομίες. Αποφιλωτική υλοτομία του Γαύρου ώστε να ευνοηθεί η ανάπτυξη και η εξάπλωση της Δρυός. Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΡΗΤΙΝΗΣ -ΒΡΥΑΣ
15β	Κασ., Δρ., άτομα Οξ., Μ.π.	0,7-0,9	Δρ.:20-80 Κασ:33-37 Οξ:1-40	Κασ: πρ., Δρ.& Οξ: ακ.	Δρ:900 Κασ:9.000	Δρ:94,74 Κασ:71,41	Δρ:- Κασ:-	Δρ:- Κασ:-	Δρ:- Κασ:-	Η καστανιά διαχειρίζεται από τον Α.Δ.Σ. "Καστανωτό" Ρητίνης (επικαρπία έκτασης). Θα γίνουν αποφιλωτικές υλοτομίες και στην συνέχεια εμβολιασμός, για μετατροπή του καστανωτού σε καστανариό. Οι ομάδες λόχμες και ενώσεις της δρυός θα διαχειρίζονται από το δημόσιο. Θα γίνει αναγωγή της Δρυός, με τη διενέργεια καλλιεργητικών υλοτομιών. Η συγκόμωση να μην κατέρχεται του 0,8. Απαγόρευση της βοσκής 5 χρόνια για τα πρόβατα, 7 για τα μεγάλα ζώα και 10 για τα γίδια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΡΗΤΙΝΗΣ -ΒΡΥΑΣ
16	Μ.π, Δ.π,Οξ., Δρ.,Κασ.	0,8-1,1	1-120	ομ.	Πευ:22.602 Οξ:311 Δρ: 467 Κασ:170	Πευ:22.021 Οξ:224 Δρ: 419 Κασ:89	Πευκ:259,5 Οξ:83,26 Δρ: 93,4 Κασ:34	Πευκ:252,8 Οξ:59,89 Δρ: 83,8 Κασ:17,834	Πευκ:97,43 Οξ:72,03 Δρ: 89,7 Κασ:52,35	Καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες. Οι επεμβάσεις στην Πεύκη θα γίνουν κατά κύριο λόγο στην IV κλάση διαμέτρων.Καλλιέργεια στην πεύκη λεπτών κορμών 4 Ha και κορμιδίων 4 σε έκταση 8,06 Ha που αναδασώθηκε. Να συμπληρωθούν όσες εκτάσεις δεν πέτυχαν στην αναδάσωση καθώς και τα διάκενα, με Μ. Πεύκη, Δ. Πεύκη και Ελάτη. Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΡΗΤΙΝΗΣ -ΒΡΥΑΣ
17α	Οξ., Μ.π, Δρ.	0,8-1,2	Οξ:1-130 Μ.π:1-110 Δρ.:10-80	Οξ: υπ., Μ.π: ομ.	Οξ:3.220 Πευ:7.546 Δρ: 437	Οξ:1.479 Πευ:4.478 Δρ: 318	Οξ:74,71 Πευ:187,85 Δρ: 34,57	Οξ:34,31 Πευ:111,48 Δρ: 25,16	Οξ:45,93 Πευ:59,34 Δρ: 72,77	Καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες. Αναγωγή της Δρυός με την διενέργεια καλλιεργητικών υλοτομιών. Η συγκόμωση στην υπ' αναγωγή Δρυ δεν θα κατέρχεται του 0,8. Αναδάσωση στα κενά, έκτασης 4,00 Ha και τα μικροδιάκενα της συστάδας με Μ. Πεύκη και Ελάτη. Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΡΗΤΙΝΗΣ -ΒΡΥΑΣ
17β	Οξ., Μ.π, Δρ. ατομα Μ.π,Ελ.,Κασ	0,8-1,2	Οξ:1-130	υπ.	Οξ:10.346 Πευ:2.781 Δρ: 937	Οξ:2.958 Πευ:61 Δρ: 0	Οξ:181,4 Πευ:344,1 Δρ: 34,65	Οξ:51,86 Πευ:7,55 Δρ: 0	Οξ:57,04 Πευ:8,08 Δρ: 0	Καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες. Αναγωγή της Δρυός με την διενέργεια καλλιεργητικών υλοτομιών. Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΡΗΤΙΝΗΣ -ΒΡΥΑΣ
18α	Οξ., Μ.π, Δπ. ατομα Ελ.	0,6-1,0	Οξ:1-90 Μ.π:80-120	Οξ: υπ., Πευ: ομ.	Οξ:2.595 Πευ:5.897	Οξ:1.127 Πευ:5.158	Οξ:118,01 Πευ:277,35	Οξ:51,25 Πευ:242,62	Οξ:43,43 Πευ:87,47	Καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες. Οι επεμβάσεις στην Πεύκη θα γίνουν κατά κύριο λόγο στις IV και III κλάσεις διαμέτρων. Καλλιέργεια στην πεύκη λεπτών κορμών 7 Ha και κορμιδίων 7 Ha σε έκταση 14,6 Ha που αναδασώθηκε και στην οξυά λεπτών κορμών 5 Ha και κορμιδίων 5 Ha. Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια. Να συμπληρωθούν τα διάκενα των αναδασώσεων και να αναδασωθούν τα μικροδιάκενα της συστάδας με Μ. Πεύκη, Δ. Πεύκη και Ελάτη.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΡΗΤΙΝΗΣ -ΒΡΥΑΣ
18β	Οξ., Μ.π, Ελ.	0,7-1,1	Οξ:1-110 Μ.π.,Ελ:80- 120	Οξ,Ελ: υπ., Μ.π.: ομ.	Οξ:12.033 Μ.π:5.051 Ελ: 2.814	Οξ:5.426 Μ.π:4.526 Ελ: 761	Οξ:124,05 Μ.π:168,37 Ελ: 85,27	Οξ:55,9 Μ.π:150,87 Ελ: 23,06	Οξ:45,11 Μ.π:89,61 Ελ: 27,04	Καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες. Οι επεμβάσεις στην Πεύκη θα γίνουν κατά κύριο λόγο στις IV και III κλάσεις διαμέτρων. Καλλιέργεια στην ελάτη λεπτών κορμών σε έκταση 10 Ha και κορμιδίων 10 Ha και στην οξυά σε έκταση λεπτών κορμών 15 Ha και κορμιδίων 15 Ha. Να αναδασωθούν οι γυμνές εκτάσεις καθώς και τα μικροδιάκενα. Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΡΗΤΙΝΗΣ -ΒΡΥΑΣ
19α	Οξ., άτομα Μ.π,Ελ.,Φυλ. πλ, Δρ	0,8-1,1	1-120	υπ.	Οξ:11.479 Δρ: 131	Οξ:7.403 Δρ:95	Οξ:270,22 Δρ:34,75	Οξ:174,27 Δρ:72,52	Οξ:64,49 Δρ:75,52	Καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες. Αναγωγή της Δρυός με την διενέργεια καλλιεργητικών υλοτομιών. Αναδάσωση στα μικροδιάκενα της συστάδας με Μ. Πεύκη και Ελάτη. Απαγόρευση	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΡΗΤΙΝΗΣ -ΒΡΥΑΣ

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	ΣΥ συστάδας	Υ κλάσεων διαμέτρου >34 cm	ΣΥ συστάδας / ha	Υ κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
										βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια.	
19β	Οξ., ατομα Μ.π,Ελ.,Φυλ. πλ, Δρ	0,8-1,1	1-130	υπ.	Οξ:9.675 πευ:2.701 Δρ: 1.123	Οξ:5.698 πευ:2.146 Δρ: 816	Οξ:128,52 πευ:162,03 Δρ: 34,66	Οξ:75,69 πευ:128,73 Δρ: 25,19	Οξ:58,89 πευ:79,45 Δρ: 72,66	Καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες. Αναδάσωση στα μικροδιάκενα της συστάδας με Μ. Πεύκη και Ελάτη. Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΡΗΤΙΝΗΣ -ΒΡΥΑΣ
20α	Οξ., ατομα Μ.π,Ελ.	0,7-1,1	1-120	υπ	12.766	3.088	236,54	57,21	24,19	Καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες. Καλλιέργεια στην οξυά λεπτών κορμών σε έκταση 10 Ha και κορμιδίων σε έκταση 10 Ha. Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΡΗΤΙΝΗΣ -ΒΡΥΑΣ
20β	Οξ., ατομα Μ.π,Ελ.,Δρ	0,8-1,2	1-120	υπ.	14.950	11.090	307,8	228,33	74,18	Καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες. Καλλιέργεια στην οξυά λεπτών κορμών σε έκταση 15 Ha. Αναδάσωση στα μικροδιάκενα της συστάδας με Μ. Πεύκη και Ελάτη. Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΡΗΤΙΝΗΣ -ΒΡΥΑΣ
21α	Οξ., ατομα Μ.π.,Δρ,Κασ	0,9-1,3	1-140	υπ.	3.416	2.262	177,99	117,88	66,22	Γηραιά άτομα Δρυος στα Δυτικά και χαμηλά. Καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες. Καλλιέργεια στην οξυά λεπτών κορμών σε έκταση 5 Ha και κορμιδίων σε έκταση 5 Ha. Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΡΗΤΙΝΗΣ -ΒΡΥΑΣ
21β	Οξ., Δρ ατομα Κασ.,Ελ.	0,8-1,1	Οξ:1-110 Δρ:30-40	υπ.	Οξ:6.907 Δρ: 3.811	Οξ:1.095 Δρ: 0	Οξ:104,83 Δρ: 95,28	Οξ:16,26 Δρ: 0	Οξ:15,85 Δρ: 0	Καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες. Καλλιέργεια στην οξυά λεπτών κορμών σε έκταση 15 Ha και κορμιδίων σε έκταση 15 Ha και στην δρυ λεπτών κορμών σε έκταση 20 Ha και κορμιδίων σε έκταση 20 Ha. Στη δρύ αναγωγή με τη διενέργεια καλλιεργητικών υλοτομιών. Αναδάσωση στα μικρά διάκενα με Μαύρη Πεύκη και Ελάτη. Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΡΗΤΙΝΗΣ -ΒΡΥΑΣ
21γ	Οξ., Δρ ατομα Κασ.	Οξ:1-1,2 Δρ:0,6-0,9	Οξ:1-60 Δρ:30-40	Οξ: υπ., Δρ: ομ.	Οξ:12.788 Δρ: 813	Οξ:6.018 Δρ: 0	Οξ:243,6 Δρ: 52,46	Οξ:114,65 Δρ: 0	Οξ:47,06 Δρ: 0	Καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες. Καλλιέργεια στην οξυά λεπτών κορμών σε έκταση 15 Ha και κορμιδίων σε έκταση 15 Ha και στην δρυ λεπτών κορμών σε έκταση 7 Ha και κορμιδίων σε έκταση 7 Ha. Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΡΗΤΙΝΗΣ -ΒΡΥΑΣ
22α	Οξ., Ελ ατομα Μ.π,Δ.π	0,6-1,0	Οξ:1-130 Ελ:1-110	υπ.	Οξ:4.495 Ελ:1.629 πευ:153	Οξ:1.645 Ελ:1.149 πευ:139	Οξ:184,8 Ελ:66,96 πευ:306,2	Οξ:67,64 Ελ:47,25 πευ:278,00	Οξ:36,60 Ελ:70,53 πευ:90,85	Καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες. Καλλιέργεια στην οξυά λεπτών κορμών σε έκταση 5 Ha και κορμιδίων σε έκταση 5 Ha και στην ελάτη λεπτών κορμών σε έκταση 5 Ha. Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΡΗΤΙΝΗΣ -ΒΡΥΑΣ
22β	Οξ., Ελ ατομα Μ.π	0,8-1,1	Οξ:1-130 Ελ:1-110	υπ.	Οξ:10.166 Ελ:2.008	Οξ:3.362 Ελ:1.416	Οξ:287,1 Ελ:66,96	Οξ:72,93 Ελ:47,20	Οξ:33,07 Ελ:70,52	Καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες. Καλλιέργεια στην οξυά λεπτών κορμών σε έκταση 10 Ha και κορμιδίων σε έκταση 5 Ha και στην ελάτη λεπτών κορμών σε έκταση 10 Ha. Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΡΗΤΙΝΗΣ -ΒΡΥΑΣ
22γ	Οξ., Ελ ατομα Δ.π	0,7-1,0	Οξ:1-130 Ελ:1-110	υπ.	Οξ:4.008 Ελ:721 πευ:1.012	Οξ:820 Ελ:497 πευ:855	Οξ:126,44 Ελ:22,73 πευ:189,02	Οξ: 25,87 Ελ:15,68 πευ:159,81	Οξ:20,46 Ελ:68,93 πευ:84,49	Καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες. Καλλιέργεια στην οξυά λεπτών κορμών σε έκταση 7 Ha και κορμιδίων σε έκταση 7 Ha και στην ελάτη λεπτών κορμών σε έκταση 5 Ha. Αναδάσωση στα κενά και μικροδιάκενα της συστάδας με Μ. Πεύκη, Δασική Πεύκη και Ελάτη. Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΡΗΤΙΝΗΣ -ΒΡΥΑΣ
23α	Οξ., Μ.π, ατομα Ελ., Δ.π	0,7-1,0	Οξ:1-130 Ελ:1-110	υπ.	πευ:6.602 Οξ:5.238	πευ:3.737 Οξ:2.976	πευ:353,19 Οξ:280,27	πευ:199,95 Οξ:159,23	πευ:56,60 Οξ:56,82	Καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες. Καλλιέργεια στην οξυά λεπτών κορμών σε έκταση 5 Ha και κορμιδίων σε έκταση 5 Ha και στην πεύκη λεπτών κορμών σε έκταση 5 Ha και κορμιδίων σε 5 Ha. Απομάκρυνση όλων των ατόμων της Δασικής Πεύκης που προσβλήθηκαν από το μύκητα PRIDERIUM PINI. Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΡΗΤΙΝΗΣ -ΒΡΥΑΣ
23β	Οξ., Δ.π, ατομα Ελ., Μ.π	0,7-1,0	Οξ:1-120 Ελ:1-110 πευ:1-140	υπ.	Οξ:8.383 πευ:5.004	Οξ:4.763 πευ:3.986	Οξ:280,27 πευ:318,47	Οξ:159,24 πευ:253,72	Οξ:56,82 πευ:79,66	Καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες. Καλλιέργεια στην οξυά λεπτών κορμών σε έκταση 10 Ha και κορμιδίων σε έκταση 10 Ha. Απομάκρυνση όλων των ατόμων της Δασικής Πεύκης που	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΡΗΤΙΝΗΣ -ΒΡΥΑΣ

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	ΣΥ συστάδας	Υ κλάσεων διαμέτρου >34 cm	ΣΥ συστάδας / ha	Υ κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
										προσβλήθηκαν από το μύκητα PRIDERIUM PINI. Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια.	
23γ	Οξ., Μ.π,Δ.π. ατομα Δρ,Κασ	0,9-1,3	Οξ. & Ελ:1- 120 πευ:1-150	Οξ: υπ., πευ: ομ.	Οξ:11.722 πευ:1.163	Οξ:9.367 πευ:441	Οξ:176,27 πευ:246,95	Οξ:257,05 πευ:93,63	Οξ:79,91 πευ:37,92	Αναδασώσεις Πεύκης στη συστάδα. Καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες. Απομάκρυνση όλων των ατόμων της Δασικής Πεύκης που προσβλήθηκαν από το μύκητα PRIDERIUM PINI. Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΡΗΤΙΝΗΣ -ΒΡΥΑΣ
24α	Οξ., Μ.π, ατομα Ελ.	09-,1,2	Οξ:1-110 Ελ:1-60 Μ.π:1-120	Οξ: υπ., πευ: ομ.	Οξ:5.560 πευ:2.221 Ελ:782	Οξ:1.812 πευ:2.041 Ελ:585	Οξ:92,40 πευ:78,12 Ελ:27,51	Οξ:30,11 πευ:71,79 Ελ:20,57	Οξ:32,59 πευ:91,90 Ελ:74,80	Καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες. Καλλιέργεια στην οξυά λεπτών κορμών σε έκταση 20 Ha και κορμιδίων σε έκταση 20 Ha. Τα γυμνά, έκτασης 1,41 Ha, θα είναι ελεύθερα στη θερινή βοσκή. Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΡΗΤΙΝΗΣ -ΒΡΥΑΣ
24β	Οξ., Μ.π, ατομα Ελ.	09-,1,2	Οξ:1-110 Μ.π:1-120	Οξ: υπ., πευ: ομ.	Οξ:12.221 πευ:2.545	Οξ:3.752 πευ:2.296	Οξ:167,83 πευ:101,23	Οξ:51,52 πευ:91,33	Οξ:30,70 πευ:90,22	Καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες. Καλλιέργεια στην οξυά λεπτών κορμών σε έκταση 15 Ha και κορμιδίων σε έκταση 15 Ha. Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΡΗΤΙΝΗΣ -ΒΡΥΑΣ
24γ	Οξ., Μ.π, ατομα Ελ.	09-,1,2	Οξ:1-90 Μ.π:1-120	Οξ: υπ., πευ: ομ.	Οξ:3.558 πευ:4.379 Ελ:484	Οξ:1.149 πευ:4.032 Ελ:249	Οξ:131,54 πευ:161,90 Ελ:45,19	Οξ:42,49 πευ:149,04 Ελ:23,31	Οξ:32,30 πευ:92,06 Ελ:51,58	Καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες. Καλλιέργεια στην οξυά λεπτών κορμών σε έκταση 5 Ha και κορμιδίων σε έκταση 5 Ha. Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια. Αναδάσωση στο γυμνό έκτασης 2,59 Ha και στα μικροδιάκενα της συστάδας με Μαύρη Πεύκη και Ελάτη.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΡΗΤΙΝΗΣ -ΒΡΥΑΣ
24δ	Ελ., Μ.π, Οξ., ατομα Δ.π.	0,8-1,1	Ελ.& πευ:1- 120	Οξ. & Ελ: υπ., πευ: ομ.	Ελ:5.051 πευ:3.422 Οξ:1.818	Ελ:4.033 πευ:2.748 Οξ:651	Ελ:197,38 πευ:124,03 Οξ:93,81	Ελ:157,60 πευ:99,60 Οξ:33,59	Ελ:79,85 πευ:80,30 Οξ:35,81	Καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες. Καλλιέργεια στην οξυά λεπτών κορμών σε έκταση 5 Ha και κορμιδίων σε έκταση 5 Ha. Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΡΗΤΙΝΗΣ -ΒΡΥΑΣ
25α	Οξ., ατομα Ελ., Μ.π, Δρ., Φυλ.πλ.	09-,1,1	Οξ.& Ελ:1- 120	υπ.	Οξ:5.779 Ελ:2.474	Οξ:3.128 Ελ:800	Οξ:203,8 Ελ:87,19	Οξ:110,30 Ελ:28,21	Οξ:54,13 Ελ:32,34	Καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες. Καλλιέργεια στην οξυά λεπτών κορμών σε έκταση 5 Ha και κορμιδίων σε έκταση 5 Ha καθώς και στην ελάτη λεπτών κορμών σε έκταση 5 Ha και κορμιδίων σε έκταση 5 Ha. Απομάκρυνση των διάσπαρτων ατόμων της Μαύρης Πεύκης. Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΡΗΤΙΝΗΣ -ΒΡΥΑΣ
25β	Οξ., ατομα Ελ., Μ.π, Δρ., Φυλ.πλ.	09-,1,2	1-120	υπ.	Οξ:10.434 Ελ:1.856	Οξ:6.793 Ελ:184	Οξ:270 Ελ:48	Οξ:175,76 Ελ:4,76	Οξ:65,10 Ελ:9,91	Καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες. Καλλιέργεια στην οξυά λεπτών κορμών σε έκταση 5 Ha και κορμιδίων σε έκταση 5 Ha καθώς και στην ελάτη λεπτών κορμών σε έκταση 5 Ha και κορμιδίων σε έκταση 5 Ha. Απομάκρυνση σταδιακά των διάσπαρτων γηραιών ατόμων της Μαύρης Πεύκης. Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΡΗΤΙΝΗΣ -ΒΡΥΑΣ
25γ	Οξ., ατομα Μ.π, Ελ.,Δρ., Φυλ.πλ.	09-,1,2	Οξ:1-130 Ελ:1-120 Μ.π:1-110	υπ.	Οξ:11.807 πευ:4.096 Ελ:5.790	Οξ:5.798 πευ:3.169 Ελ:3.075	Οξ:147,36 πευ:81,92 Ελ:72,27	Οξ:72,25 πευ:63,38 Ελ:38,37	Οξ:49,03 πευ:77,37 Ελ:53,11	Καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες. Καλλιέργεια στην οξυά λεπτών κορμών σε έκταση 10 Ha και κορμιδίων σε έκταση 10 Ha καθώς και στην ελάτη λεπτών κορμών σε έκταση 10 Ha και κορμιδίων σε έκταση 10 Ha. Απομάκρυνση σταδιακά των διάσπαρτων γηραιών ατόμων της Μαύρης Πεύκης από το χώρο της Οξυάς και της Ελάτης. Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΡΗΤΙΝΗΣ -ΒΡΥΑΣ
26α	Οξ., Δρ ατομα Μ.π.,Ελ.,Κασ., Φυλ.πλ.	Δ: 0,9-1,0 Α:0,6-0,7	Οξ&Ελ:1- 130 Δρ:1-100	ακ.	Οξ:6.370 Δρ: 4.163	Οξ:4.035 Δρ: 2.427	Οξ:127,2 Δρ: 111,6	Οξ:80,60 Δρ: 65,07	Οξ:63,34 Δρ:60,15	Καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες. Καλλιέργεια στην οξυά λεπτών κορμών σε έκταση 10 Ha και κορμιδίων σε έκταση 10 Ha καθώς και στην δρυ λεπτών κορμών σε έκταση 10 Ha και κορμιδίων σε έκταση 10 Ha. Στη Δρύ καλλιεργητικές και αναγωγικές υλοτομίες. Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΡΗΤΙΝΗΣ -ΒΡΥΑΣ
26β (+26γ χαρτη)	Οξ.,Μ.π., Δρ. ατομα, Φυλ.πλ.,Κασ., Πλατ.	Οξ:0,8-0,9 Δρ:0,6-0,7	Οξ:1-130 Μ.π:1-120 Δρ:1-100	ακ.	Οξ:5.090 πευ:1.216 Δρ:2.537	Οξ:3.224 πευ:1.045 Δρ:1.764	Οξ:127,2 πευ:46,63 Δρ:72,49	Οξ:80,6 πευ:40,07 Δρ:50,40	Οξ:63,33 πευ:85,94 Δρ:69,53	Καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες. Καλλιέργεια στην οξυά λεπτών κορμών σε έκταση 10 Ha και κορμιδίων σε έκταση 10 Ha. Απομάκρυνση σταδιακά των γηραιών ατόμων Μ. Πεύκης. Στη Δρύ αναγωγή, με τη διενέργεια καλλιεργητικών υλοτομιών.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΡΗΤΙΝΗΣ -ΒΡΥΑΣ

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	ΣΥ συστάδας	Υ κλάσεων διαμέτρου >34 cm	ΣΥ συστάδας / ha	Υ κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
										Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια.	
27α	Οξ.,Μ.π., Δρ. ατομα, Φυλ.πλ.,Κασ., Πλατ.	0,9-1,2	Οξ:1-100 Μ.π:1-120	Οξ.: υπ., πευ: ομ.	Οξ:3.943 πευ:4.184 Δρ:1.841	Οξ:2.786 πευ:4.059 Δρ:1.280	Οξ:53,02 πευ:129,90 Δρ:72,51	Οξ:37,46 πευ:126,02 Δρ:50,41	Οξ:70,66 πευ:97,01 Δρ:69,53	Καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες, τελικές στην Πεύκη. Καλλιέργεια στην οξυά λεπτών κορμών σε έκταση 20 Ha. Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΡΗΤΙΝΗΣ -ΒΡΥΑΣ
27β	Οξ.,Κασ., Δρ. ατομα, Φυλ.πλ.,Πλατ.	Οξ:0,9-1,2 Δρ&Κασ0,8- 0,9	Οξ&Κασ:1- 110 Δρ:1-140	Οξ:υπ., Δρ&Κασ:πρ.,ακ.	Οξ:4.862 Κασ:1.799 Δρ:1.813	Οξ:2.268 Κασ:685 Δρ:1.260	Οξ:79,82 Κασ:53,27 Δρ:90,65	Οξ:37,24 Κασ:20,28 Δρ:63,00	Οξ:46,65 Κασ:38,08 Δρ:69,50	Καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες. Καλλιέργεια στην οξυά λεπτών κορμών σε έκταση 15 Ha και κορμιδίων σε έκταση 15 Ha. Στην Καστανιά αποφιλωτική υλοτομία, με παρακράτηση 1-2 ατόμων, κατά φωλέα. Στη Δρύ αναγωγή, με τη διενέργεια καλλιεργητικών υλοτομιών. Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΡΗΤΙΝΗΣ -ΒΡΥΑΣ
27γ	Οξ.,Κασ., Δρ. ατομα, Ελ., Φυλ.πλ.,Πλατ.	Οξ:0,8-1,1 Δρ&Κασ0,8- 0,9	Οξ:1-110 Ελ:1-60 Δρ&Κασ:1- 140	Οξ:υπ., Δρ&Κασ:πρ.,ακ.	Δρ:3.414 Κασ:3.583 Οξ:2.575	Δρ:1.794 Κασ:1.492 Οξ:1.469	Δρ:170,7 Κασ:119,5 Οξ:88,92	Δρ:89,70 Κασ:49,73 Οξ:50,74	Δρ:52,55 Κασ:41,64 Οξ:57,05	Καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες. Καλλιέργεια στην οξυά λεπτών κορμών σε έκταση 5 Ha και κορμιδίων σε έκταση 5 Ha. Στην Καστανιά αποφιλωτική υλοτομία, με παρακράτηση 1-2 ατόμων, κατά φωλέα. Στη Δρύ αναγωγή, με τη διενέργεια καλλιεργητικών υλοτομιών. Καλλιέργεια λεπτών κορμών σε έκταση 5 Ha και κορμιδίων σε έκταση 5 Ha. Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΡΗΤΙΝΗΣ -ΒΡΥΑΣ
28α	Δρ. ατομα, Φυλ.πλ.,Πλατ.	0,8-1,2	10-35	πρ.,ακ.	3.612	0	66,14	0	0	Αναγωγή της Δρυός, με την διενέργεια καλλιεργητικών υλοτομιών. Απομάκρυνση του Γαύρου στις μικτές ενώσεις, αλλά επιλογικά όπου φύεται μόνος του. Καλλιέργεια λεπτών κορμών σε έκταση 5 Ha και κορμιδίων σε έκταση 5 Ha. Απαγόρευση της βοσκής για τα πρόβατα 5, για τα μεγάλα ζώα 7 και για τα γίδια 10 χρόνια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΡΗΤΙΝΗΣ -ΒΡΥΑΣ
28β	Δρ. ατομα, Φυλ.πλ.,Πλατ.	0,8-1,2	10-35	πρ.,ακ.	2.138	0	41,84	0	0	Αναγωγή της Δρυός, με την διενέργεια καλλιεργητικών υλοτομιών. Απομάκρυνση του Γαύρου στις μικτές ενώσεις, αλλά επιλογικά όπου φύεται μόνος του. Καλλιέργεια κορμιδίων σε έκταση 5 Ha. Απαγόρευση της βοσκής για τα πρόβατα 5, για τα μεγάλα ζώα 7 και για τα γίδια 10 χρόνια. Στις συδενδρίες και τα άτομα της Φιλύρας θα διενεργούνται καλλιεργητικές υλοτομίες, εξυγιαντικού χαρακτήρα.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΡΗΤΙΝΗΣ -ΒΡΥΑΣ
22α	Οξ. Άτομα Ελ.	0,8-1,2	-130 & γηραιότ.	Σπ. υπ.ακ.	Οξ:13.390 Ελ:172,87	Οξ:6.502,43 Ελ:0	Οξ:284,90 Ελ:3,68	Οξ:138,35 Ελ:0	Οξ:48,56 Ελ:0	Καλλιεργητικές, εξυγιαντικές, αναγεννητικές, υλοτομίες σε ποσοστό 15% ανάλογα με τις επιμέρους καταστάσεις. Απαγόρευση της βοσκής για τα πρόβατα 5, για τα μεγάλα ζώα 7 και για τα γίδια 10 χρόνια.	ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΔΑΣΟΣ ΕΛΑΤΟΧΩΡΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
22β	Οξ. Ελ. Δρ.	0,7-1,1	10-130 & γηραιότ.	Οξ.,Ελ:Σπ. υπ.ακ.	Οξ:14.422 Ελ:321,96 Δρ.:900	Οξ:7.695,46 Ελ:151,29 Δρ.:0	Οξ:437,03 Ελ:8,25 Δρ.:150	Οξ:233,20 Ελ:3,88 Δρ.:0	Οξ:53,36 Ελ:46,99 Δρ.:0	Καλλιεργητικές, εξυγιαντικές, αναγεννητικές, υλοτομίες ανάλογα με τις επιμέρους καταστάσεις σε ποσοστό 15% για Οξ., Ελ. και 10% για Δρ. Απαγόρευση της βοσκής για τα πρόβατα 5, για τα μεγάλα ζώα 7 και για τα γίδια 10 χρόνια.	ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΔΑΣΟΣ ΕΛΑΤΟΧΩΡΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
23α	Οξ., Δρ. ατομα, Ελ., Μ.π.,ΚασΦυλ.πλ.	0,8-1,1	Οξ:10-110 Δρ:70-90 και γηραιότ. Μ.π γηραιά άτομα	Οξ:πρ.υπ.ακ. Σπ. Κατά θέσεις, Δρ:πρ.,ακ., ομ. κατά θέσεις	Οξ:1.512,79 Δρ.:3.913,7	Οξ:353,58 Δρ.:578,45	Οξ:75,64 Δρ.:186,37	Οξ:17,68 Δρ.:27,5	Οξ:23,37 Δρ.:48,56	Καλλιεργητικές, εξυγιαντικές, αναγεννητικές, υλοτομίες σε ποσοστό 15% ανάλογα με τις επιμέρους καταστάσεις και για τα δύο είδη. Απομάκρυνση όλων των ατόμων Καστανιάς. Απαγόρευση της βοσκής για τα πρόβατα 5, για τα μεγάλα ζώα 7 και για τα γίδια 10 χρόνια.	ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΔΑΣΟΣ ΕΛΑΤΟΧΩΡΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
23β	Οξ., Δρ. ατομα, Ελ., Μ.π.,ΚασΦυλ.πλ.	0,8-1,1	Οξ:10-110 Δρ:50-90 και γηραιότ. Κασ γηραιά άτομα και νεοτ.	Οξ:υπ.ακ. , Δρ: ομ.	Οξ:1.884,19 Δρ:1.859,1 Κασ:14,38	Οξ:353,58 Δρ:234,28 Κασ:0	Οξ:53,83 Δρ:132,79 Κασ:14,39	Οξ:10,10 Δρ:16,73 Κασ:0	Οξ:18,77 Δρ:12,60 Κασ:0	Καλλιεργητικές, εξυγιαντικές, αναγεννητικές, υλοτομίες σε ποσοστό 15% ανάλογα με τις επιμέρους καταστάσεις και για τα δύο είδη. Απομάκρυνση όλων των ατόμων Καστανιάς. Απαγόρευση της βοσκής για τα πρόβατα 5, για τα μεγάλα ζώα 7 και για τα γίδια 10 χρόνια.	ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΔΑΣΟΣ ΕΛΑΤΟΧΩΡΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	ΣΥ συστάδας	Υ κλάσεων διαμέτρου >34 cm	ΣΥ συστάδας / ha	Υ κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
24α	Οξ., Δρ. ατομα, Ελ.,ΚασΦυλ.πλ.	0,9-1,1	-110 & ανω	πρ.,ομ.ακ.,κατά θέσεις σπ.	Οξ:2.290,03 Κασ:258,58 Δρ:559,10	Οξ:505,93 Κασ:133,58 Δρ:82,64	Οξ:190,84 Κασ:51,72 Δρ:186,37	Οξ:42,16 Κασ:26,72 Δρ:27,55	Οξ:22,09 Κασ:51,66 Δρ:14,78	Καλλιεργητικές, εξυγιαντικές, αναγεννητικές, υλοτομίες σε ποσοστό 15% ανάλογα με τις επιμέρους καταστάσεις και για τα δύο είδη. Απομάκρυνση του 50% των ατόμων Καστανιάς και το υπόλοιπο την επόμενη διαχ. Περίοδο πλην των ιδιόκτητων. Απαγόρευση της βοσκής για τα πρόβατα 5, για τα μεγάλα ζώα 7 και για τα γίδια 10 χρόνια.	ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΔΑΣΟΣ ΕΛΑΤΟΧΩΡΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
24β	Οξ., Δρ. ατομα, Κασ, Ελ.,Φυλ.πλ.	0,9-1,1	-110 & ανω	Οξ:πρ.υπ.ακ. Σπ. Κατά θέσεις, Δρ:ακ.	Οξ:4.734,37 Δρ:2.122,9 Κασ:703,30	Οξ:774,04 Δρ:0 Κασ:505,15	Οξ:143,47 Δρ:141,53 Κασ:46,89	Οξ:23,46 Δρ:0 Κασ:33,68	Οξ:16,35 Δρ:0 Κασ:71,83	Καλλιεργητικές, εξυγιαντικές, αναγεννητικές, υλοτομίες σε ποσοστό 15% ανάλογα με τις επιμέρους καταστάσεις και για τα δύο είδη. Απομάκρυνση του 50% των ατόμων Καστανιάς και το υπόλοιπο την επόμενη διαχ. περίοδο πλην των ιδιόκτητων. Συλλογή των υπολειμμάτων υλοτομιών (καθαρισμοί). Απαγόρευση της βοσκής για τα πρόβατα 5, για τα μεγάλα ζώα 7 και για τα γίδια 10 χρόνια.	ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΔΑΣΟΣ ΕΛΑΤΟΧΩΡΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
25α	Οξ., Μ.π.,Δ.π άτομα Ελ.	0,8-1,1	100-110	Οξ:ακ., ακ.-ομ.	Μ.π:4.429,3 Οξ:15.132 Δ.π:4.722,5	Μ.π:589,17 Οξ:10.084,6 Δ.π:4.415,6	Μ.π:246,07 Οξ:504,4 Δ.π:314,83	Μ.π:32,73 Οξ:336,15 Δ.π:294,37	Μ.π:13,30 Οξ:66,64 Δ.π:93,507	Καλλιεργητικές, εξυγιαντικές, αναγεννητικές, υλοτομίες σε ποσοστό 20% ανάλογα με τις επιμέρους καταστάσεις για τις πεύκες και σε ποσοστό 15% στην Οξυά. Απαγόρευση της βοσκής για τα πρόβατα 5, για τα μεγάλα ζώα 7 και για τα γίδια 10 χρόνια.	ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΔΑΣΟΣ ΕΛΑΤΟΧΩΡΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
25β	Οξ., Δρ. ατομα, Μ.π., Φυλ.πλ.	0,8-1,1	100-110	ακ.-ομ.	Οξ:6.670,18 Δρ.:2.795,5	Οξ:3.300,42 Δρ.:413,18	Οξ:370,57 Δρ.:186,37	Οξ:183,36 Δρ.:27,55	Οξ:49,48 Δρ.:14,78	Καλλιεργητικές, εξυγιαντικές, αναγεννητικές, υλοτομίες σε ποσοστό 15% ανάλογα με τις επιμέρους καταστάσεις και για τα δύο είδη. Απαγόρευση της βοσκής για τα πρόβατα 5, για τα μεγάλα ζώα 7 και για τα γίδια 10 χρόνια.	ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΔΑΣΟΣ ΕΛΑΤΟΧΩΡΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
26α	Δ.π,Οξ. Ελ	0,7-0,9	10-140 και >	υπ., ακ.-ομ. κατά θέσεις	Δ.π:2.982,6 Οξ:851,51 Ελ:2.528,27	Δ.π:1.627,8 Οξ:206,39 Ελ:693,80	Δ.π:102,85 Οξ:60,82 Ελ:180,59	Δ.π:56,13 Οξ:14,74 Ελ:49,56	Δ.π:54,58 Οξ:24,24 Ελ:27,44	Καλλιεργητικές, εξυγιαντικές, αναγεννητικές και φωτοδότιδες υλοτομίες σε ποσοστό 15% ανάλογα με τις επιμέρους καταστάσεις και για τη Δασική πεύκη και Οξυά. Στην Ελάτη καλλιεργητικές, εξυγιαντικές, αναγεννητικές υλοτομίες σε ποσοστό 12% ανάλογα με τις επιμέρους καταστάσεις. Απαγόρευση της βοσκής για τα πρόβατα 5, για τα μεγάλα ζώα 7 και για τα γίδια 10 χρόνια.	ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΔΑΣΟΣ ΕΛΑΤΟΧΩΡΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
26β	Δ.π,Οξ.	0,5-0,8	μέση- υπέργ.	υπ., ακ.	Δ.π:14.115,90 Οξ:4.947,21	Δ.π:12.608,38 Οξ:2.533,70	Δ.π:276,78 Οξ:247,22	Δ.π:247,22 Οξ:120,65	Δ.π:89,32 Οξ:51,21	Έντονες καλλιεργητικές, εξυγιαντικές, αναγεννητικές και φωτοδότιδες υλοτομίες σε ποσοστό 20% ανάλογα με τις επιμέρους καταστάσεις για την Οξυά. Δασική πεύκη πολύ έντονες καλλιεργητικές, εξυγιαντικές, αναγεννητικές υλοτομίες με έμφαση στην απομάκρυνση γηραιών και κουφαλερών ατόμων σε ποσοστό 25%. Απαγόρευση της βοσκής για τα πρόβατα 5, για τα μεγάλα ζώα 7 και για τα γίδια 10 χρόνια.	ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΔΑΣΟΣ ΕΛΑΤΟΧΩΡΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
4β	Δρ.Κασ.,Φυλ.πλ., Ρείκι	0,9	5 έως 12	πρ.,ομ.με παρακρατ.	759	0	46	0	0	Υλοτομήθηκε αποψιλωτικά το 2010. Εκτός διαχείρισης την τρέχουσα δεκαετία	ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΔΑΣΟΣ ΚΑΡΥΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ
5α	Δρ., αιφ.πλ.Πλατ.	0,9	12	πρ.,ομ.με παρακρατ.	Δρ. 923 Πλατ:180	Δρ. 0 Πλατ:0	Δρ. 26 Πλατ:120	Δρ. 0 Πλατ:0	Δρ. 0 Πλατ:0	Υλοτομήθηκε αποψιλωτικά το 2011. Εκτός διαχείρισης την τρέχουσα δεκαετία	ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΔΑΣΟΣ ΚΑΡΥΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ
5β	Δρ., αιφ.πλ.Πλατ.	0,9	4 έως 12	πρ.,ομ.με παρακρατ.	Δρ. 720 Πλατ:300	Δρ. 0 Πλατ:100	Δρ. 20 Πλατ:150	Δρ. 0 Πλατ:50	Δρ. 0 Πλατ:33,33	Υλοτομήθηκε αποψιλωτικά το 2012. Εκτός διαχείρισης την τρέχουσα δεκαετία	ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΔΑΣΟΣ ΚΑΡΥΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ
6α	Δρ.ΚουμΦυλ.πλ. Ρείκι	0,45	5 έως 25	πρ.,ομ.	Δρ. 451 Αειφ.πλ:75,59	Δρ.0 Αειφ.πλ:0	Δρ.14,17 Αειφ.πλ:2,38	Δρ.0 Αειφ.πλ:0	Δρ.0 Αειφ.πλ:0	Αποψιλωτική υλοτομία με παρακρατήματα σε ομάδες και λόχμες της Δρυός σε ποσοστό 10-12% της δασοσκεπούς έκτασης και αποψιλωτική των λοιπών πλατ. Ειδών Στα παρακρατήματα καλλιεργητικές υλοτομίες. Απαγόρευση βοσκής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.	ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΔΑΣΟΣ ΚΑΡΥΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ
6β	Δρ.Ρείκι Φυλ.πλ.	0,6	5 έως 15	πρ.,ομ.	469	0	74,1	0	0	Αποψιλωτική υλοτομία με παρακρατήματα σε ομάδες και λόχμες της Δρυός σε ποσοστό 10-12% της δασοσκεπούς έκτασης. Στα παρακρατήματα καλλιεργητικές υλοτομίες. Απαγόρευση βοσκής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.	ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΔΑΣΟΣ ΚΑΡΥΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ
1	Δρ., Φυλ.πλ.Πλατ.	0,5-1,0	50-110	πρ.,ακ.	Δρ&Φυλ.πλ 5.393	Δρ&Φυλ.πλ985	Δρ&Φυλ.πλ127,50	Δρ&Φυλ.πλ23,30	Δρ&Φυλ.πλ 18,26	Υλοτομήθηκε αποψιλωτικά το 2007. Εκτός διαχείρισης την τρέχουσα δεκαετία. Ισχύει απαγόρευση βοσκής.	ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΔΑΣΟΣ ΟΡΕΙΝΟΝ

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	ΣΥ συστάδας	Υ κλάσεων διαμέτρου >34 cm	ΣΥ συστάδας / ha	Υ κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
											ΤΜΗΜΑ ΠΑΛΛΗΟΖΑΖΑΚΟΝ ΠΙΕΡΙΑΣ
6α	Κασ., Δρ.,Φυλ. πλ. Πλατ.	0,9-1,2	24	πρ.,ομ.	3.513,17	0	155,45	0	0	Αποφιλωτική υλοτομία Καστανιάς και λοιπών φυλ. πλατ. Πλην των ευγενών πλατυφύλλων και του Πλατάνου. Παρακράτηση 3-5 ατόμων ανά στρέμμα από σπερμοφυή άτομα, άριστης μορφής και υγείας ή ελλείψει τους ατομικοποιημένα πρεμνοβλαστήματα. 8 έτη μετά την επέμβαση απομάκρυνση -ξεσκαρτάρισμα μέχρι του μισού περίπου του αριθμού των πρεμνοβλαστημάτων, καχεκτικά, κακόμορφα, στρεβλά, υπολειπόμενα κλπ. Απομάκρυνση γαύρου, οστράς. Απαγόρευση βοσκής, μεγάλα ζώα 7 έτη, πρόβατα 5 έτη, γίδια 10 έτη.	ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΔΑΣΟΣ ΟΡΕΙΝΟΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΛΛΗΟΖΑΖΑΚΟΝ ΠΙΕΡΙΑΣ
26	Μ.π., Δ.π., Ελ.	0,8-1,1	30-50 και άνω των 80 Ελ:20-40 και άνω	Σπ., ακ., υπ.	Μ.π: 7.755,16 Δ.π:2.470,0 Ελ:372,97	Μ.π: 4.069,93 Δ.π:2.054,67 Ελ:180,98	Μ.π: 352,51 Δ.π:199,19 Ελ:10,84	Μ.π: 185 Δ.π:165,7 Ελ:5,26	Μ.π: 52,48 Δ.π:83,19 Ελ:48,52	Αναγνωρισμένα δασοτεμάχια στη συστάδα. Αναγεννητικές υλοτομίες στην ανώτερη και ανώτατη κλάση διαμέτρων με διεύρυνση υφιστάμενων και δημιουργία νέων κέντρων αναγέννησης. Καλλιεργητικές στη μέση και κατώτερη κλάση διαμέτρων. Θετικές και αρνητικές αραιώσεις εξυγιαντικού και βελτιωτικού χαρακτήρα. Στη Δασική πεύκη κατά προτεραιότητα να υλοτομούνται τα προσβεβλημένα άτομα. Στην ελάτη καλλιεργητικές υλοτομίες όπως παραπάνω και υλοτομία του 15% του ξυλαποθέματος στην ανώτατη κλάση διαμέτρων. Όχι υλοτομία μεμονωμένων ατόμων ελάτης. Διατήρηση 10-11 κουφαλερών υπέργηρων ατόμων στη συστάδα για βιολογικούς σκοπούς. Απαγόρευση βοσκής.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
2ε	Μ.π., Δ.π., Ελ.	0,8-1,1	30-50 και άνω των 80 Ελ:20-40 και άνω	Σπ., ακ., υπ.	Μ.π: 7.755,16 Δ.π:2.529,95 Ελ:373,91	Μ.π: 4.069,93 Δ.π:2.104,38 Ελ:180,98	Μ.π: 352,51 Δ.π:199,21 Ελ:10,78	Μ.π: 185,00 Δ.π:165,70 Ελ:5,22	Μ.π: 52,48 Δ.π:83,18 Ελ:48,40	Αναγνωρισμένα δασοτεμάχια στη συστάδα. Αναγεννητικές υλοτομίες στην ανώτερη και ανώτατη κλάση διαμέτρων με διεύρυνση υφιστάμενων και δημιουργία νέων κέντρων αναγέννησης. Καλλιεργητικές στη μέση και κατώτερη κλάση διαμέτρων. Θετικές και αρνητικές αραιώσεις εξυγιαντικού και βελτιωτικού χαρακτήρα. Στη Δασική πεύκη κατά προτεραιότητα να υλοτομούνται τα προσβεβλημένα άτομα. Όχι υλοτομία μεμονωμένων ατόμων ελάτης. Διατήρηση 10-11 κουφαλερών υπέργηρων ατόμων στη συστάδα για βιολογικούς σκοπούς. Απαγόρευση βοσκής.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
3στ	Μ.π., άτομα Δ.π., Ελ.	0,8-1,1	άνω των 80	Σπ., ακ.	Μ.π: 4.312,51 Ελ:62,96	Μ.π: 2.241,18 Ελ:0	Μ.π: 431,25 Ελ:6,30	Μ.π: 224,12 Ελ:0	Μ.π: 51,97 Ελ:0	Αναγνωρισμένα δασοτεμάχια στη συστάδα. Αναγεννητικές υλοτομίες στην ανώτερη και ανώτατη κλάση διαμέτρων με διεύρυνση υφιστάμενων και δημιουργία νέων κέντρων αναγέννησης. Καλλιεργητικές στη μέση και κατώτερη κλάση διαμέτρων. Θετικές και αρνητικές αραιώσεις εξυγιαντικού και βελτιωτικού χαρακτήρα. Όχι υλοτομία μεμονωμένων ατόμων ελάτης. Διατήρηση 2-3 κουφαλερών υπέργηρων ατόμων στη συστάδα για βιολογικούς σκοπούς. Απαγόρευση βοσκής.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΟΡΟΣ ΤΙΤΑΡΟΣ: ΕΖΔ GR1250003

ΥΠΟΜΝΗΜΑ:

Δασοπονικά Είδη: Δ= Δρυς, Μ.Π.= Μαύρη Πεύκη, Λ.Π.= Λευκόδερμη Πεύκη, Ο=Οξυά, Ε=Ελάτη, Γ.= Γαύρος, Λ.= Λεύκη Κ.= Καστανιά, Φιλύρ.= Φιλύρα, Οστρ.= Οστριά, Λ.πλ.= Λοιπά πλατύφυλλα, Λ.Φ.= Λοιπά φυλλοβόλα, Φ.πλ.= Φυλλοβόλα πλατύφυλλα, Α.πλ.= Αείφυλλα πλατύφυλλα, Αν. κων.= Αναδασώσεις κωνοφόρων, Θ.= Θαμνώνες Διασ. ατ.= Διάσπαρτα άτομα, Β.=Βραχύκορμα

Διαχειριστική, μορφή: Πρεμν.= Πρεμνοφυής, Σπερ= Σπερμοφυής, Διφ.=Διφυής

Δασοπονική μορφή: Ομήλ.= Ομήλικη, Ανομ./Ανομηλ.= Ανομήλικη, Αν.= Αναμοιόμορφη, Ομ.= Ομοιόμορφη, Πλ. Αν.= Πλήρως Αναμοιόμορφη, Ακαν.= Ακανόνιστη, Υποκηπτ.= Υποκηπευτή, Κηπ.= κηπευτή, Αθρ.= Αθροίσματα, Τμ.= τμήμα

Ηλικία: Ηλ.= Ηλικία, Υπερωρ.= Υπερώριμα, Ωρ.= Ώριμα, Νεαρ.= Νεαρά, Γηρ.= Γηραιά, Υπεργ. Ατ.= Υπέργηρα Άτομα, Παρ.= Παρακρατήματα, Υλोट. Εκτ.= Υλοτομημένη Έκταση, Ανωτ.= Ανώτερη, Κατώτ.= Κατώτερη, Ακαθορ.= Ακαθόριστη, Μεμ.= Μεμονωμένα, Επικρ.= Επικρατούσα, Μερ. Δασ.= Μερικώς Δασοσκεπής

Συγκόμωση: Συμπ.= Σύμπυκτη, Οριζ.= Οριζόντια, Κλιμ.= Κλιμακωτή, Κλ.= Κλειστή, Φωτ.= Φωτεινή, Χαλ.= Χαλαρή

Κοινές συντομεύσεις: Ανομ./Ανομηλ.= Ανομήλικη, Επικρ.= Επικρατούσα, Κατώτ.= Κατώτερη, Ανωτ.= Ανώτερη, Διασ. ατ.= Διάσπαρτα άτομα

Πίνακας 2.2.5 -4 Συγκρότηση δασικής βλάστησης στη περιοχή Τίταρου

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας / ha	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
1α	Ο.	0.8-1.1	1-110	Σπερ. υποκηπ.	13.472,00	4.789,00	207,17	73,64	35,55	Συστάδα συνεχόμενη, συμπαγής, ικανοποιητικής έως πολύ καλής αυξητικότητας και εξέλιξης. Ξυλαπόθεμα καλής υγείας, χωρίς ιδιαίτερες ζημιές. Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 2006 και απολήφθηκαν 1151,32 κ.μ. οξυάς. Προτείνονται: καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά. Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεπτών κορμών οξυάς σε έκταση 70 στρεμμάτων. Εξυγιαντικές υλοτομίες στη Δρυ με απομάκρυνση των κακόμορφων και γενικά ανεπιθύμητων ατόμων. Οι επεμβάσεις με προσοχή ώστε η συγκόμωση να μην κατέρχεται του 0,8.Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
	Δ.				332,00	0,00	115,68	0,00	0,00		
1β	Ο.	0.9-1.1	Ο: 1-80	Σπερ. υποκηπ.	12.231,00	5.604,00	231,56	106,10	45,82	Οξυά,(52,82 Ha) Δρυς στο ΒΑ άκρο(13,79 Ha) και διάσπαρτα άτομα καστανιάς, οστρυάς, ελάτης, φράξου. Συστάδα συνεχόμενη, συμπαγής, ικανοποιητικής έως πολύ καλής αυξητικότητας και εξέλιξης. Ξυλαπόθεμα καλής υγείας, χωρίς ιδιαίτερες ζημιές. Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 2006 και απολήφθηκαν 1151,32 κ.μ. οξυάς. Προτείνονται: Καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά. Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεπτών κορμών οξυάς σε έκταση 70 στρεμμάτων. Εξυγιαντικές υλοτομίες στη Δρυ με απομάκρυνση των κακόμορφων και ανεπιθύμητων ατόμων. Επεμβάσεις με προσοχή ώστε η συγκόμωση να μην κατέρχεται του 0,8. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
	Δ.		Δ: 1-60		1.592,00	0,00	115,45	0,00	0,00		
	Κ.				406,00	0,00	7,69	0,00	0,00		
1γ	Ο	0.7-1.1	Ο.: 1-120	Ο: σπερ. υποκηπ.	10.533,00	6.246,00	292,99	173,74	59,30	Οξυά στα βόρεια(35.95 Ha), Δρυς στα νότια (36.90 Ha). Συδενδρίες καστανιάς,οστρυάς και διάσπαρτα άτομα, σφενδάμου, φράξου κλπ. Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 1996 και απολήφθηκαν 1157,91 κ.μ. οξυάς και 41,98 κ.μ. δρυός. Εντάχθηκε στη διαχειριστική κλάση του Φυσικού Αποθέματος Εκτός διαχείρισης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
	Δ.		Δ.: 1-50	Δ. + Διασ.ατ.: πρεμν. ανομ.	7.714,00	944,00	209,05	25,58	12,24		
2α	Ο.	0.9-1.1	Ο: 1-120	Σπερ. υποκηπ.	8.894,00	3.971,00	261,13	116,59	44,65	Οξυά αμιγής, διάσπαρτα άτομα καστανιάς, δρυός, οστρυάς, τρέμουσας λεύκης. Συστάδα συνεχόμενη, συμπαγής, ικανοποιητικής έως πολύ καλής αυξητικότητας και εξέλιξης. Ξυλαπόθεμα καλής υγείας, χωρίς ιδιαίτερες ζημιές. Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 2006 και απολήφθηκαν 1348 κ.μ. οξυάς και 11κ.μ. δρυός. Προτείνονται: καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά. Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεπτών κορμών οξυάς σε έκταση 35 στρεμμάτων. Εξυγιαντικές υλοτομίες στη Δρυ με απομάκρυνση των κακόμορφων και γενικά ανεπιθύμητων ατόμων. Οι επεμβάσεις με προσοχή ώστε η συγκόμωση να μην κατέρχεται του 0,8. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας / ha	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
										ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Απαγόρευση βόσκησης.	
2β	Ο.	0.7-1.1	Ο: 1-110	Σπερ. υποκτηπ.	14.333,00	8.616,00	259,19	155,80	60,11	Οξυά αμιγής, διάσπαρτα άτομα καστανιάς, δρυός, τρέμουσας λεύκης, μαύρης πεύκης. Συστάδα συνεχόμενη, συμπαγής, ικανοποιητικής έως πολύ καλής αυξητικότητας και εξέλιξης. Ξυλαπόθεμα καλής υγείας, χωρίς ιδιαίτερες ζημιές. Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 2006 και απολήφθηκαν 1212 κ.μ. οξυάς. Προτείνονται: Καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά. Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεπτών κορμών οξυάς σε έκταση 60 στρεμμάτων. Εξυγιαντικές υλοτομίες στη Δρυ με απομάκρυνση των κακόμορφων και γενικά ανεπιθύμητων ατόμων. Οι επεμβάσεις με προσοχή ώστε η συγκόμωση να μην κατέρχεται του 0,8.Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
2γ	Ο.	0.7-1.1	Ο.: 1-110	Σπερ. υποκτηπ.	12.894,00	5.797,00	221,17	99,43	44,96	Συστάδα συνεχόμενη, συμπαγής, ικανοποιητικής έως πολύ καλής αυξητικότητας και εξέλιξης .Ξυλαπόθεμα καλής υγείας, χωρίς ιδιαίτερες ζημιές. Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 2006 και απολήφθηκαν 1212 κ.μ. οξυάς. Προτείνονται: καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά. Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεπτών κορμών οξυάς σε έκταση 60 στρεμμάτων. Εξυγιαντικές υλοτομίες στη Δρυ με απομάκρυνση των κακόμορφων και γενικά ανεπιθύμητων ατόμων. Οι επεμβάσεις με προσοχή ώστε η συγκόμωση να μην κατέρχεται του 0,8. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών . Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
2δ	Ο.	0.7-1.1	Ο.: 1-120	Σπερ. υποκτηπ.	12.458,00	5.674,00	243,23	110,78	45,55	Οξυά αμιγής, εμφανίζονται συδενδρίες καστανιάς, δρυός, τρέμουσας λεύκης και άτομα μ.πεύκης, ελάτης, σκλήθρου. Συστάδα συνεχόμενη, συμπαγής, ικανοποιητικής έως πολύ καλής αυξητικότητας και εξέλιξης. Ξυλαπόθεμα καλής υγείας, χωρίς ιδιαίτερες ζημιές. Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 2006 και απολήφθηκαν 426 κ.μ. οξυάς. Προτείνονται: καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά. Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεπτών κορμών οξυάς σε έκταση 80 στρεμμάτων. Εξυγιαντικές υλοτομίες στη Δρυ με απομάκρυνση των κακόμορφων και γενικά ανεπιθύμητων ατόμων. Οι επεμβάσεις με προσοχή ώστε η συγκόμωση να μην κατέρχεται του 0,8.Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
3α	Ο.	0.7-1.1	Ο.: 1-120	Διφ. υποκτηπ. ανομ.	15.878,00	9.540,00	223,57	134,33	60,08	Οξυά αμιγής, συδενδρίες δρυός, καστανιάς, οστρυάς, ελάτης, άτομα λεύκης. Συστάδα συνεχόμενη, συμπαγής, ικανοποιητικής αυξητικότητας μέτριας έως καλής εξέλιξης. Ξυλαπόθεμα καλής υγείας, χωρίς ιδιαίτερες ζημιές. Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 2006 και απολήφθηκαν 1418 κ.μ. οξυάς. Προτείνονται: καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά. Οι επεμβάσεις με προσοχή ώστε η συγκόμωση να μην κατέρχεται του 0.8. Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεπτών κορμών οξυάς σε έκταση 100 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
3β	Ο.	0.8-1.1	Ο.:1-120	Σπερ. υποκτηπ.	17.889,00	34.542,00	245,56	474,15	193,09	Οξυά αμιγής (75,85 Ha) και αναδασώσεις κωνοφόρων(6,90 Ha). Συδενδρίες δρυός, καστανιάς. Άτομα οστρυάς, λεύκης, σκλήθρου, ελάτης. Συστάδα συνεχόμενη, συμπαγής, ικανοποιητικής αυξητικότητας, πολύ καλής μορφής- εξέλιξης. Ξυλαπόθεμα καλής υγείας, χωρίς ιδιαίτερες ζημιές. Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 2006 και απολήφθηκαν 2814 κ.μ. οξυάς. Προτείνονται: καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά. Οι επεμβάσεις με προσοχή ώστε η συγκόμωση να μην κατέρχεται του 0,8.Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεπτών κορμών οξυάς σε έκταση 75 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Καλλιέργεια κορμιδίων και λεπτών κορμών κωνοφόρων σε έκταση 70 στρεμμάτων. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
	Αν.κων		Κων.: 50		235,00	0,00	34,06	0,00	0,00		

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας / ha	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
3γ	Ο	0.8-1.1	Ο.: 1-120	Σπερ. υποκτηπ.	11.239,00	6.433,00	229,60	131,42	57,24	Οξυά αμιγής (48.95Ha) και νησίδες αναδασώσεων κωνοφόρων (0,91Ha). Άτομα τρέμουσας λεύκης. Συστάδα συνεχόμενη, συμπαγής, ικανοποιητικής αυξητικότητας , καλής μορφής-εξέλιξης. Ξυλαπόθεμα καλής υγείας, χωρίς ιδιαίτερες ζημιές. Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 2008 και απολήφθηκαν 1269 κ.μ. οξυάς. Προτείνονται: καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά. Οι επεμβάσεις με προσοχή ώστε η συγκόμωση να μην κατέρχεται του 0,8.Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεπτών κορμών οξυάς σε έκταση 50 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Καλλιέργεια κορμιδίων και λεπτών κορμών κωνοφόρων σε έκταση 10 στρεμμάτων. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
	Αν.κων				91,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
4α	Ο.	0.7-1.1	Ο.:1-100	Σπερ. υποκτηπ.	5.660,00	4.086,00	228,59	165,02	72,19	Οξυά αμιγής (24,76 Ha) και στα Βορειοδυτικά Δρυς (3,25 Ha). Άτομα γαύρου, οστρυάς. Συστάδα συνεχόμενη, συμπαγής, ικανοποιητικής αυξητικότητας, καλής μορφής-εξέλιξης. Ξυλαπόθεμα καλής υγείας, χωρίς ιδιαίτερες ζημιές. Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 2008 και απολήφθηκαν 307 κ.μ. οξυάς. Η μισή περίπου συστάδα δεν υλοτομείται λόγω έλλειψης δασοδρόμων και ύπαρξης πολλών αγρών που εμποδίζουν την μετατόπιση των δασικών προϊόντων. Προτείνονται: καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά. Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεπτών κορμών οξυάς σε έκταση 30 στρεμμάτων. Εξυγιαντικές υλοτομίες στη Δρυ με απομάκρυνση των κακόμορφων και γενικά ανεπιθύμητων ατόμων. Οι επεμβάσεις με προσοχή ώστε η συγκόμωση να μην κατέρχεται του 0,8. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών . Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
	Δ.		Δ.:40-70		325,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
4β	Ο.	0.7-1	Ο.:1-120	Σπερ. υποκτηπ.	6.830,00	3.323,00	205,23	99,85	48,65	Οξυά αμιγής και στα Βορειοανατολικά Δρυς (0,13 Ha). Άτομα καστανιάς ,οστρυάς, μαύρης πεύκης. Συστάδα συμπαγής, καλής μορφής και ανάπτυξης στην οξυά , μέτρια στη δρυ. Ξυλαπόθεμα καλής έως μέτριας ποιότητας, ανεμοθλασίες. Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 2009 και απολήφθηκαν 284 κ.μ. οξυάς. Η μισή περίπου συστάδα δεν υλοτομείται λόγω έλλειψης δασοδρόμων. Προτείνονται: καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά. Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεπτών κορμών οξυάς σε έκταση 40 στρεμμάτων. Εξυγιαντικές υλοτομίες στη Δρυ με απομάκρυνση των κακόμορφων και γενικά ανεπιθυμητών ατόμων. Οι επεμβάσεις με προσοχή ώστε η συγκόμωση να μην κατέρχεται του 0,8.Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
	Δ.		Δ.:40-70		300,00	0,00	2.307,69	0,00	0,00		
4γ	Ο.	0.7-1	Ο.:1-120	Ο.: σπερ. υποκτηπ.	1.822,00	737,00	103,00	41,66	40,45	Οξυά και Δρυς σε μίξη. Άτομα καστανιάς, πεύκης και γαύρου. Συστάδα συμπαγής, καλής μορφής και ανάπτυξης στην οξυά, μέτρια στη δρυ. Ξυλαπόθεμα καλής έως μέτριας ποιότητας, ανεμοθλασίες. Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 2008 και απολήφθηκαν 327 κ.μ. οξυάς. Η μισή περίπου συστάδα δεν υλοτομείται λόγω έλλειψης δασοδρόμων. Προτείνονται: καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά. Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεπτών κορμών οξυάς σε έκταση 20 στρεμμάτων. Εξυγιαντικές υλοτομίες στη Δρυ με απομάκρυνση των κακόμορφων και γενικά ανεπιθύμητων ατόμων. Οι επεμβάσεις με προσοχή ώστε η συγκόμωση να μην κατέρχεται του 0,8. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
	Δ.		Δ.:40-90	Δ.: πρεμν. ακαν.	1.181,00	206,00	66,76	11,64	17,44		
4δ	Ο.	0.7-1.1	Ο.:1-120	Ο.: σπερ. υποκτηπ.	3.715,00	0,00	370,02	0,00	0,00	Οξυά στο νότιο τμήμα (16,54 Ha) στο βόρειο Δρυς(10,04 Ha). Άτομα καστανιάς, οστρυάς, φράξου. Συστάδα ,συμπαγής,καλής μορφής και ανάπτυξης στην οξυά, μέτρια στη δρυ. Ξυλαπόθεμα καλής έως μέτριας ποιότητας, ανεμοθλασίες. Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 1996 και απολήφθηκαν 281,84 κ.μ. οξυάς. Εκτός Διαχείρισης λόγω ισχυροτάτων κλίσεων και έλλειψης δασοδρόμων.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
	Δ.		Δ.:40-100	Δ.: πρεμν. ακαν.	3.442,00	1.670,00	208,10	100,97	48,52		
5α	Ο.	0.8-1.1	Ο.: 1-100	Σπερ. υποκτηπ.	6.758,00	3.307,00	143,76	70,35	48,93	Οξυά αμιγής (47,01 Ha) και νησίδες αναδασώσεων κωνοφόρων (1,10 Ha). Άτομα δρυός πεύκης, ελάτης. Συστάδα συνεχόμενη, συμπαγής, ικανοποιητικής αυξητικότητας, καλής μορφής-εξέλιξης. Ξυλαπόθεμα καλής υγείας, χωρίς ιδιαίτερες	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ -

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας / ha	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
	Αν.κων				110,00	0,00	100,00	0,00	0,00	ζημίες. Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 2008 και απολήφθηκαν 1247 κ.μ. οξυάς. Προτείνονται: καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά. Οι επεμβάσεις θα γίνουν με προσοχή ώστε η συγκόμωση να μην κατέρχεται του 0,8.Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεπτών κορμών οξυάς σε έκταση 50 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών.Καλλιέργεια κορμιδίων και λεπτών κορμών κωνοφόρων σε έκταση 10 στρεμμάτων. Απαγόρευση βόσκησης.	ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
5β	Ο.	0.7-1.1	Ο.: 1-100	Σπερ. υποκτηπ.	173,22	0,00	5,91	0,00	0,00	Οξυά αμιγής (29,31 Ha) και νησίδες αναδασώσεων κωνοφόρων (1,79 Ha). Συστάδα συνεχόμενη, συμπαγής, καλής μορφής-εξέλιξης στο βόρειο τμήμα, μέτριας στο νότιο. Ξυλαπόθεμα καλής υγείας, χωρίς ιδιαίτερες ζημίες. Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 2007 και απολήφθηκαν 876 κ.μ. οξυάς. Προτείνονται: καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά. Οι επεμβάσεις με προσοχή ώστε η συγκόμωση να μην κατέρχεται του 0,8.Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεπτών κορμών οξυάς σε έκταση 30 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Καλλιέργεια κορμιδίων και λεπτών κορμών κωνοφόρων σε έκταση 15 στρεμμάτων. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
	Αν.κων				5,21	0,00	2,91	0,00	0,00		
5γ	Ο.	0.7-1.1	Ο.: 1-120	Σπερ. υποκτηπ.	221,37	0,00	6,06	0,00	0,00	Οξυά αμιγής (36,53 Ha) και νησίδες αναδασώσεων κωνοφόρων (0,96 Ha). Συστάδα συνεχόμενη, συμπαγής, εξαιρετικής μορφής, δομής, αυξητικότητας και εξέλιξης. Ξυλαπόθεμα πολύκαλής υγείας, με ελάχιστες ζημίες. Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 2007 και απολήφθηκαν 1167 κ.μ. οξυάς. Προτείνονται: καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά. Οι επεμβάσεις με προσοχή ώστε η συγκόμωση να μην κατέρχεται του 0,8.Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεπτών κορμών οξυάς σε έκταση 40 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Καλλιέργεια κορμιδίων και λεπτών κορμών κωνοφόρων σε έκταση 10 στρεμμάτων. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
	Αν.κων				2,79	0,00	2,91	0,00	0,00		
5δ	Ο.	0.7-1.1	Ο.: 1-120	Σπερ. υποκτηπ.	20.277,00	15.196,00	303,78	227,66	74,94	Οξυά αμιγής και νησίδες αναδασώσεων κωνοφόρων (0,50 Ha). Συστάδα συνεχόμενη,συμπαγής, εξαιρετικής μορφής, δομής, αυξητικότητας και εξέλιξης. Ξυλαπόθεμα πολύ καλής υγείας, με ελάχιστες ζημίες. Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 2007 και απολήφθηκαν 3810 κ.μ. οξυάς. Προτείνονται: καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά. Οι επεμβάσεις με προσοχή ώστε η συγκόμωση να μην κατέρχεται του 0,8.Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεπτών κορμών οξυάς σε έκταση 70 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Καλλιέργεια κορμιδίων και λεπτών κορμών κωνοφόρων σε έκταση 5 στρεμμάτων. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
	Αν.κων				50,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
6α	Ο.	0.7-1.1	1-120	Σπερ. υποκτηπ.	8.019,00	6.618,00	171,20	141,29	82,53	Οξυά αμιγής, άτομα οστρύας. Συστάδα συνεχόμενη, συμπαγής, πολύ καλής μορφής, δομής, αυξητικότητας και εξέλιξης. Ξυλαπόθεμα καλής υγείας, ζημίες στα ανατολικά. Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 2008 και απολήφθηκαν 813 κ.μ. οξυάς. Η μισή περίπου συστάδα δεν υλοτομείται λόγω έλλειψης δασοδρόμων και ισχυρών κλίσεων. Προτείνονται: καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά. Οι επεμβάσεις με προσοχή ώστε η συγκόμωση να μην κατέρχεται του 0,8. Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεπτών κορμών οξυάς σε έκταση 50 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
6β	Ο.	0.7-1.1	Ο.:1-100	Ο.: σπερ. υποκτηπ.	7.008,00	4.317,00	202,31	124,62	61,60	Οξυά κυρίως (34,64Ha) και στα Βορειοανατολικά Δρυς(6,16Ha). Άτομα καστανιάς, οστρύας, μαύρης πεύκης. Συστάδα συνεχόμενη, συμπαγής, καλής μορφής, δομής, αυξητικότητας και εξέλιξης. Ξυλαπόθεμα καλής υγείας, ανεμοθλασίες. Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 2008 και απολήφθηκαν 1023 κ.μ. οξυάς. Προτείνονται: καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά. Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεπτών κορμών οξυάς σε έκταση 40 στρεμμάτων. Εξυγιαντικές υλοτομίες στη Δρυ με απομάκρυνση των κακόμορφων και γενικά ανεπιθυμητών	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
	Δ.		Δ.:40-70	Δ.: πρεμν. ακαν.	616,00	0,00	100,00	0,00	0,00		

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας / ha	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
										ατόμων. Οι επεμβάσεις με προσοχή ώστε η συγκόμωση να μην κατέρχεται του 0,8. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών . Απαγόρευση βόσκησης.	
7α	Ο.	0.7-1.1	Ο.:1-100	Σπερ. υποκηπ.	4.447,00	3.282,00	199,78	147,44	73,80	Οξυά αμιγής , άτομα οστρυάς και προς το ρέμα ελάτης. Συστάδα συνεχόμενη,συμπαγής, καλής μορφής, δομής, αυξητικότητας και εξέλιξης. Ξυλαπόθεμα καλής υγείας, ζημίες από ανεμορριψίες. Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 2009 και απολήφθηκαν 437 κ.μ. οξυάς. Προτείνονται: καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά. Οι επεμβάσεις με προσοχή ώστε η συγκόμωση να μην κατέρχεται του 0,8.Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεππών κορμών οξυάς σε έκταση 30 στρεμμάτων.Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Απαγόρευση βόσκησης	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
7β	Ο.	0.7-1.1	Ο.:1-100	Σπερ. υποκηπ.	5.538,00	4.247,00	230,75	176,96	76,69	Οξυά αμιγής , άτομα οστρυάς και προς το ρέμα ελάτης. Συστάδα συνεχόμενη, συμπαγής, καλής μορφής, δομής, αυξητικότητας και εξέλιξης. Ξυλαπόθεμα καλής υγείας, ζημίες απο ανεμορριψίες. Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 2009 και απολήφθηκαν 726 κ.μ. οξυάς. Προτείνονται: Καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά. Οι επεμβάσεις με προσοχή ώστε η συγκόμωση να μην κατέρχεται του 0,8. Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεππών κορμών οξυάς σε έκταση 30 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
7γ	Ο.	0.7-1.1	Ο.:1-100	Σπερ. υποκηπ.	4.141,00	2.702,00	222,28	145,03	65,25	Οξυά αμιγής, άτομα οστρυάς και προς το ρέμα ελάτης. Συστάδα συνεχόμενη, συμπαγής, καλής μορφής, δομής, αυξητικότητας και εξέλιξης. Ξυλαπόθεμα καλής υγείας, ζημίες απο ανεμορριψίες. Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 2009 και απολήφθηκαν 742 κ.μ. οξυάς. Προτείνονται: καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά. Οι επεμβάσεις με προσοχή ώστε η συγκόμωση να μην κατέρχεται του 0,8. Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεππών κορμών οξυάς σε έκταση 20 στρεμμάτων.Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
7δ	Ο.	0.7-1.1	Ο.:1-120	Σπερ. υποκηπ.	5.911,00	4.057,00	191,29	131,29	68,63	Οξυά αμιγής, άτομα οστρυάς και προς το ρέμα ελάτης. Συστάδα συνεχόμενη, συμπαγής, πολύ καλής μορφής, δομής, αυξητικότητας και εξέλιξης. Ξυλαπόθεμα καλής υγείας, ζημίες απο ανεμορριψίες. Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 2009 και απολήφθηκαν 776 κ.μ. οξυάς. Προτείνονται: καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά. Οι επεμβάσεις θα γίνουν με προσοχή ώστε η συγκόμωση να μην κατέρχεται του 0,8.Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεππών κορμών οξυάς σε έκταση 30 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
7ε	Ο.	0.7-1.1	Ο.:1-100	Σπερ. υποκηπ.	7.022,00	4.177,00	182,96	108,83	59,48	Οξυά αμιγής, άτομα οστρυάς και προς το ρέμα ελάτης. Συστάδα συνεχόμενη, συμπαγής, μέτριας έως καλής μορφής, δομής, αυξητικότητας και εξέλιξης. Ξυλαπόθεμα καλής υγείας, ζημίες από ανεμορριψίες. Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 2001 και απολήφθηκαν 720,42 κ.μ. οξυάς. Προτείνονται: Καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά. Οι επεμβάσεις με προσοχή ώστε η συγκόμωση να μην κατέρχεται του 0,8. Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεππών κορμών οξυάς σε έκταση 40 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
7στ	Ο.	0.7-1.1	Ο.:1-100	Σπερ. υποκηπ.	495,34	0,00	7,46	0,00	0,00	Οξυά αμιγής ,άτομα οστρυάς και προς το ρέμα ελάτης. Στα ΒΔ νησίδα αναδασώσεων κωνοφόρων (0.21 Ha). Συστάδα συνεχόμενη, συμπαγής, καλής έως πολύ καλής μορφής, δομής, αυξητικότητας και εξέλιξης. Ξυλαπόθεμα πολύ καλής υγείας, με ζημίες. Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 2009 και απολήφθηκαν 1295 κ.μ. οξυάς. Προτείνονται: Καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά. Οι επεμβάσεις με προσοχή ώστε η συγκόμωση να μην κατέρχεται του 0,8. Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεππών κορμών οξυάς σε έκταση 70 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
	Αν.κων				0,61	0,00	2,90	0,00	0,00		

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας / ha	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
										χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Απαγόρευση βόσκησης.	
8α	Ο.	0.7-1	Ο.:1-130	Σπερ. υποκτηπ.	2.486,00	1.683,00	139,98	94,76	67,70	Οξυά αμιγής, νησίδες αναδασώσεων κωνοφόρων (0.74 Ha), άτομα ελάτης, λεύκης. Συστάδα μέτριας έως καλής μορφής, υγείας, και ανάπτυξης. Ξυλαπόθεμα αρκετά καλής ποιότητας, με αρκετά κουφαλερά και πολύκλαδα άτομα. Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 2010 και απολήφθηκαν 151 κ.μ. οξυάς. Η συστάδα δεν υλοτομείται ολόκληρη λόγω έλλειψης δασοδρόμων. Προτείνονται: καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά.Οι επεμβάσεις με προσοχή ώστε η συγκόμωση να μην κατέρχεται του 0,8.Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεπτών κορμών οξυάς σε έκταση 20 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Καλλιέργεια κορμιδίων και λεπτών κορμών κωνοφόρων σε έκταση 10 στρεμμάτων. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
	Αν.κων				74,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
8β	Ο.	0.7-1.1	Ο.:1-120	Σπερ. υποκτηπ.	12.795,00	7.978,00	198,93	124,04	62,35	Οξυά αμιγής, νησίδες αναδασώσεων κωνοφόρων (1,53 Ha), άτομα ελάτης, λεύκης. Συστάδα μέτριας μορφής στο νότιο τμήμα της ενώ καλύτερης στο βόρειο. Ξυλαπόθεμα καλής ποιότητας, ανεμορριπίες. Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 2001 και απολήφθηκαν 1211,10 κ.μ. οξυάς. Προτείνονται: καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά. Οι επεμβάσεις θα γίνουν με προσοχή ώστε η συγκόμωση να μην κατέρχεται του 0,8. Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεπτών κορμών οξυάς σε έκταση 70 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών.Καλλιέργεια κορμιδίων και λεπτών κορμών κωνοφόρων σε έκταση 10 στρεμμάτων. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
	Αν.κων				153,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
8γ	Ο.	0.7-1.0	Ο.:1-120	Σπερ. υποκτηπ.	4.078,00	2.697,00	125,79	83,19	66,14	Οξυά αμιγής, νησίδα αναδασώσεων κωνοφόρων (0,23 Ha). Συστάδα μέτριας μορφής, υποβαθμισμένη (λαθρουλοτομίες). Ξυλαπόθεμα μέτριας ποιότητας, αρκετά στρεβλά, πολύκλαδα και σάπια άτομα. Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 1991 και απολήφθηκαν 1200 κ.μ. οξυάς. Προτείνονται: Καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά. Οι επεμβάσεις με προσοχή ώστε η συγκόμωση να μην κατέρχεται του 0,8.Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεπτών κορμών οξυάς σε έκταση 35 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
	Αν.κων				46,00	0,00	200,00	0,00	0,00		
8δ	Ο.	0.7-0.9	1-100	Σπερ. υποκτηπ.	4.703,00	3.131,00	158,78	105,71	66,57	Οξυά αμιγής. Συστάδα μέτριας έως κακής μορφής, κακοποιημένη (λαθρουλοτομίες). Ξυλαπόθεμα μέτριας ποιότητας, αρκετά πολύκλαδα και κουφαλερά άτομα. Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 1991 και απολήφθηκαν 600 κ.μ. οξυάς. Προτείνονται: καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά. Οι επεμβάσεις με προσοχή ώστε η συγκόμωση να μην κατέρχεται του 0,8.Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεπτών κορμών οξυάς σε έκταση 30 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
9α	Ο.	0.7-0.9	1-70	Σπερ. υποκτηπ.	6.908,00	1.527,00	130,46	28,84	22,10	Οξυά αμιγής. Συστάδα μέτριας κατάστασης. Ξυλαπόθεμα μέτριας ποιότητας, αρκετά πολύκλαδα και κουφαλερά άτομα. Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 2010 και απολήφθηκαν 390 κ.μ. οξυάς. Προτείνονται: Καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά. Οι επεμβάσεις με προσοχή ώστε η συγκόμωση να μην κατέρχεται του 0,8.Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεπτών κορμών οξυάς σε έκταση 50 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
9β	Ο.	0.7-1.1	Ο.:1-120	Ο: Διφ. Ακαν	4.652,00	2.536,00	132,72	72,35	54,51	Οξυά αμιγής και 2,5 Ha αναδασώσεις κωνοφόρων. Συστάδα μέτριας μορφής. Ξυλαπόθεμα μέτριας ποιότητας, αρκετά στρεβλά, πολύκλαδα και άτομα. Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 2010 και απολήφθηκαν 371 κ.μ. οξυάς. Προτείνονται: Καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά. Οι επεμβάσεις με προσοχή ώστε η συγκόμωση να μην κατέρχεται του 0,8. Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεπτών κορμών οξυάς σε έκταση 40 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
	Αν.κων				250,00	0,00	100,00	0,00	0,00		

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας / ha	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
										τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Καλλιέργεια κορμιδίων και λεπτών κορμών κωνοφόρων σε έκταση 25 στρεμμάτων. Απαγόρευση βόσκησης	
10	Ο. + Μ.Π.				-	-	-	-	-	Διαχειριστική κλάση συστάδας: Βοσκοτόπων. Οξυά αμιγής και 0,7 Ha νησίδα μαύρης πεύκης στα ΝΔ. Στη συστάδα ασκείται γεωργοκτηνοτροφική εκμετάλλευση από τους κατοίκους Λιβαδίου.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
11α	Ο.	0.7-1	Ο.:1-70	Ο: σχεδόν σπερ. ομηλ	1.713,00	0,00	102,94	0,00	0,00	Οξυά αμιγής και 6,7Ha αναδασώσεις κωνοφόρων. Συστάδα καλής γενικά μορφής. Ξυλαπόθεμα συσσωρευμένο στις μικρές κλάσεις διαμέτρου. Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 2010 και απολήφθηκαν 102 κ.μ. οξυάς. Προτείνονται: καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά. Οι επεμβάσεις με προσοχή ώστε η συγκόμωση να μην κατέρχεται του 0,8. Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεπτών κορμών οξυάς σε έκταση 40 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Καλλιέργεια κορμιδίων και λεπτών κορμών κωνοφόρων σε έκταση 60 στρεμμάτων. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
	Αν.κων				670,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
11β	Ο.	0.7-1.1	Ο.:1-120	Ο.: διφ. ακαν.	4.176,00	1.524,00	122,57	44,73	36,49	Οξυά αμιγής και 10,38 Ha αναδασώσεις κωνοφόρων. Συστάδα μέτριας μορφής κυρίως λόγω ανθρωπογενών επεμβάσεων(βόσκηση-λαθρουλοτομίες). Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 2010 και απολήφθηκαν 369 κ.μ. οξυάς. Προτείνονται: Καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά. Οι επεμβάσεις με προσοχή ώστε η συγκόμωση να μην κατέρχεται του 0,8.Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεπτών κορμών οξυάς σε έκταση 50 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Καλλιέργεια κορμιδίων και λεπτών κορμών κωνοφόρων σε έκταση 105 στρεμμάτων. Απαγόρευση βόσκησης	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
	Αν.κων				1.038,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
11γ	Ο.	0.7-1.1	1-120		4.554,00	723,00	153,02	24,29	15,88	Οξυά αμιγής. Συστάδα μέτριας κατάστασης. Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 2010 και απολήφθηκαν 346 κ.μ. οξυάς. Προτείνονται: καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά. Οι επεμβάσεις με προσοχή ώστε η συγκόμωση να μην κατέρχεται του 0,8. Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεπτών κορμών οξυάς σε έκταση 30 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
11δ	Ο.	0.7-1	1αν-70	Διφ. Σχεδόν ομηλ.	4.498,00	0,00	127,46	0,00	0,00	Οξυά αμιγής. Συστάδα μέτριας κατάστασης, κυρίως λόγω ανθρωπογενών επεμβάσεων (λαθρουλοτομίες). Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 2010 και απολήφθηκαν 360 κ.μ. οξυάς. Προτείνονται: καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά. Οι επεμβάσεις με προσοχή ώστε η συγκόμωση να μην κατέρχεται του 0,8. Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεπτών κορμών οξυάς σε έκταση 40 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
12α	Ο.	0.7-1.1	Ο:1-90	Ο.: Διφ. Σχεδόν ομηλ.	5.002,00	0,00	200,32	0,00	0,00	Οξυά αμιγής και 7,8 Ha αναδασώσεις κωνοφόρων. Συστάδα μέτριας μορφής κυρίως λόγω ανθρωπογενών επεμβάσεων(βόσκηση-λαθρουλοτομίες). Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 2010 και απολήφθηκαν 228 κ.μ. οξυάς. Προτείνονται: καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά. Οι επεμβάσεις με προσοχή ώστε η συγκόμωση να μην κατέρχεται του 0,8. Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεπτών κορμών οξυάς σε έκταση 35 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Καλλιέργεια κορμιδίων και λεπτών κορμών κωνοφόρων σε έκταση 80 στρεμμάτων. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
	Αν.κων				780,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
12β	Ο.	0.7-1.1	Ο.:1-90	Ο.: Διφ. Σχεδόν ομηλ.	3.612,00	746,00	153,05	31,61	20,65	Οξυά αμιγής και 1,03 Ha αναδασώσεις κωνοφόρων. Συστάδα μέτριας μορφής κυρίως λόγω ανθρωπογενών επεμβάσεων(βόσκηση-λαθρουλοτομίες). Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 2010 και απολήφθηκαν 157 κ.μ. οξυάς. Προτείνονται: καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά. Οι επεμβάσεις με προσοχή ώστε η συγκόμωση να μην κατέρχεται του 0,8. Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεπτών κορμών οξυάς σε έκταση 35 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
	Αν.κων				103,00	0,00	100,00	0,00	0,00		

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας / ha	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
										δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Καλλιέργεια κορμιδίων και λεπτών κορμών κωνοφόρων σε έκταση 80 στρεμμάτων. Απαγόρευση βόσκησης.	ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
12γ	Ο.	0.7-1.1	Ο.:1-100	Ο.: σπερ. Υποκτηπ	5.134,00	4.768,00	203,01	188,53	92,87	Οξυά αμιγής και 1,32 Ha αναδασώσεις κωνοφόρων. Συστάδα μέτρια έως καλή. Δέχεται κάποια πίεση λόγω ανθρωπογενών επεμβάσεων (παράνομη βόσκηση). Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 2010 και απολήφθηκαν 227 κ.μ. οξυάς. Προτείνονται: καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά. Οι επεμβάσεις θα γίνουν με προσοχή ώστε η συγκόμωση να μην κατέρχεται του 0,8. Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεπτών κορμών οξυάς σε έκταση 30 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Καλλιέργεια κορμιδίων και λεπτών κορμών κωνοφόρων σε έκταση 20 στρεμμάτων. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
	Αν.κων				132,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
12δ	Ο.	0.8-1.1	Ο.:1-100	Ο.: Διφ. Σχεδόν ομηλ.	5.708,00	1.856,00	255,05	82,93	32,52	Οξυά αμιγής και 1,82 Ha αναδασώσεις κωνοφόρων. Συστάδα μέτρια έως καλή. Δέχεται κάποια πίεση λόγω ανθρωπογενών επεμβάσεων (παράνομη βόσκηση). Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 2010 και απολήφθηκαν 453 κ.μ. οξυάς. Προτείνονται: Καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά. Οι επεμβάσεις θα γίνουν με προσοχή ώστε η συγκόμωση να μην κατέρχεται του 0,8.Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεπτών κορμών οξυάς σε έκταση 25 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Καλλιέργεια κορμιδίων και λεπτών κορμών κωνοφόρων σε έκταση 20 στρεμμάτων. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
	Αν.κων				182,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
12ε	Ο.	0.7-1.1	Ο.:1-120	Ο: σπερ. & κατά θέσεις διφ. σχεδόν υποκτηπ.	3.004,00	1.819,00	143,66	86,99	60,55	Οξυά αμιγής και 2 Ha αναδασώσεις κωνοφόρων. Συστάδα συμπαγής καλή. Ξυλαπόθεμα καλής ποιότητας και λίγες ανεμορριφίες. Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 2010 και απολήφθηκαν 217 κ.μ. οξυάς. Προτείνονται: καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά. Οι επεμβάσεις με προσοχή ώστε η συγκόμωση να μην κατέρχεται του 0,8. Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεπτών κορμών οξυάς σε έκταση 25 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Καλλιέργεια κορμιδίων και λεπτών κορμών κωνοφόρων σε έκταση 20 στρεμμάτων. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
	Αν.κων				200,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
12στ	Ο.	0.7-1	Ο.:1-120	Ο.: σπερ. υποκτηπ. & κατά θέσεις σχεδόν ομηλ.	4.514,00	1.250,00	163,31	45,22	27,69	Οξυά αμιγής και 0,32 Ha αναδασώσεις κωνοφόρων. Συστάδα μέτρια έως καλή κατά θέσεις. Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 2010 και απολήφθηκαν 249 κ.μ. οξυάς. Προτείνονται: καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά. Οι επεμβάσεις θα γίνουν με προσοχή ώστε η συγκόμωση να μην κατέρχεται του 0,8. Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεπτών κορμών οξυάς σε έκταση 30 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
	Αν.κων				32,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
13α	Ο.	0.7-1	Ο.:1-120	Ο.: σπερ. & κατά θέσεις διφ. Υποκτηπ	7.535,00	4.638,00	143,74	88,48	61,55	Οξυά αμιγής και 1,76 Ha αναδασώσεις κωνοφόρων. Συστάδα μέτρια έως καλή κατά θέσεις. Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 2010 και απολήφθηκαν 704 κ.μ. οξυάς. Προτείνονται: καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά. Οι επεμβάσεις με προσοχή ώστε η συγκόμωση να μην κατέρχεται του 0,8. Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεπτών κορμών οξυάς σε έκταση 50 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Καλλιέργεια κορμιδίων και λεπτών κορμών κωνοφόρων σε έκταση 20 στρεμμάτων. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
	Αν.κων				176,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
13β	Ο.	0.8-1.1	Ο.:1-120	Ο.: σπερ. & κατά θέσεις διφ. Υποκτηπ	11.137,00	6.511,00	188,03	109,93	58,46	Οξυά αμιγής και 5,06 Ha αναδασώσεις κωνοφόρων. Συστάδα συμπαγής μέτρια έως καλή κατά θέσεις. Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 2007-2008 και απολήφθηκαν 441 κ.μ. οξυάς. Προτείνονται: καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά. Οι επεμβάσεις με προσοχή ώστε η συγκόμωση να μην κατέρχεται του 0,8. Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεπτών κορμών οξυάς σε έκταση 60 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Καλλιέργεια κορμιδίων και λεπτών κορμών κωνοφόρων σε έκταση 50 στρεμμάτων. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
	Αν.κων				506,00	0,00	100,00	0,00	0,00		

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας / ha	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
14α	Ο.	0.7-1.1	1-120	Σπερ. υποκτηπ.	5.287,00	1.770,00	176,70	59,16	33,48	Οξυά αμιγής. Προς το ρέμα υδροχαρής βλάστηση. Συστάδα συμπαγής καλής υγείας και ανάπτυξης. Ξυλαπόθεμα συσσωρευμένο στις μικρές κλάσεις διαμέτρου. Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 2010 και απολήφθηκαν 323 κ.μ. οξυάς. Προτείνονται: καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά. Οι επεμβάσεις με προσοχή ώστε η συγκόμωση να μην κατέρχεται του 0,8. Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεπτών κορμών οξυάς σε έκταση 30 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
14β	Ο.	0.7-1	Ο.: 1-100	Σπερ. υποκτηπ.	4.506,00	2.799,00	143,05	88,86	62,12	Οξυά αμιγής. Άτομα τρέμουσας λεύκης. Συστάδα συμπαγής καλής υγείας και ανάπτυξης, ανεμορριψίες, ανεμοθλασίες. Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 2010 και απολήφθηκαν 350 κ.μ. οξυάς. Προτείνονται: καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά. Οι επεμβάσεις με προσοχή ώστε η συγκόμωση να μην κατέρχεται του 0,8. Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεπτών κορμών οξυάς σε έκταση 30 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
14γ	Ο.	0.7-1.1	Ο.: 1-130	Σπερ. υποκτηπ.	4.819,00	2.072,00	157,12	67,56	43,00	Οξυά αμιγής. Άτομα λεύκης και άτομα δρυός στα βόρεια. Συστάδα συμπαγής καλής υγείας και ανάπτυξης, μέτριας μορφής στα ψηλά καλής χαμηλότερα. Δεν υλοτομείται λόγω του εντόνου αναγλύφου και της έλλειψης δασοδρόμων.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
15α	Ο.	0.7-1	Ο.: 1-100	Σπερ. υποκτηπ.	4.995,00	2.796,00	158,57	88,76	55,98	Οξυά αμιγής. Άτομα δρυός. Προς το ρέμα υδροχαρής βλάστηση. Συστάδα συμπαγής καλής υγείας και ανάπτυξης ανεμορριψίες, ανεμοθλασίες. Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 2010 και απολήφθηκαν 350 κ.μ. οξυάς. Το ήμισυ περίπου της συστάδας δεν υλοτομείται λόγω έλλειψης δασοδρόμων. Προτείνονται: καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά. Οι επεμβάσεις με προσοχή ώστε η συγκόμωση να μην κατέρχεται του 0,8. Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεπτών κορμών οξυάς σε έκταση 30 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
15β	Ο.	0.7-1.1	Ο.: 1-120	Ο.: σπερ. υποκτηπ.	8.767,00	6.062,00	221,50	153,16	69,15	Οξυά αμιγής και 0,57 Ha αναδασώσεις κωνοφόρων. Συστάδα συμπαγής καλής μορφής και εξέλιξης. Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 2008 και απολήφθηκαν 700 κ.μ. οξυάς. Προτείνονται: καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά. Οι επεμβάσεις με προσοχή ώστε η συγκόμωση να μην κατέρχεται του 0,8. Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεπτών κορμών οξυάς σε έκταση 40 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
	Αν.κων				57,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
15γ	Ο.	0.7-1.1	Ο.: 1-120	Ο.: σπερ. υποκτηπ.	9.441,00	7.641,00	233,98	189,37	80,93	Οξυά αμιγής και 1,47 Ha αναδασώσεις κωνοφόρων. Συστάδα συμπαγής καλής μορφής και εξέλιξης. Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 2008 και απολήφθηκαν 735 κ.μ. οξυάς. Καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά. Οι επεμβάσεις με προσοχή ώστε η συγκόμωση να μην κατέρχεται του 0,8. Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεπτών κορμών οξυάς σε έκταση 40 στρεμμάτων Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Καλλιέργεια κορμιδίων και λεπτών κορμών κωνοφόρων σε έκταση 15 στρεμμάτων. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
	Αν.κων				147,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
15δ	Ο.	0.7-1.1	Ο.: 1-120	Ο.: σπερ. υποκτηπ.	261,81	0,00	6,49	0,00	0,00	Οξυά αμιγής 0,33 Ha αναδασώσεις κωνοφόρων και άτομα ελάτης. Συστάδα συμπαγής καλής έως μέτρια κατά θέσεις μορφής και εξέλιξης. Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 2008 και απολήφθηκαν 1237 κ.μ. οξυάς. Προτείνονται: καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά. Οι επεμβάσεις με προσοχή ώστε η συγκόμωση να μην κατέρχεται του 0,8. Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεπτών κορμών οξυάς σε έκταση 40 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
	Αν.κων				0,96	0,00	2,91	0,00	0,00		

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας / ha	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
16α	Ο.	0.7-1	Ο.: 1-120	Ο.: σπερ. υποκτηπ.	3.348,00	1.793,00	235,61	126,18	53,55	Οξύα αμιγής 0,39 Ha αναδασώσεις κωνοφόρων και άτομα Μ. πεύκης. Συστάδα συμπαγής καλής μορφής και εξέλιξης. Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 2009 και απολήφθηκαν 329 κ.μ. οξύας. Προτείνονται: καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξύα. Οι επεμβάσεις με προσοχή ώστε η συγκόμωση να μην κατέρχεται του 0,8. Καλλιέργεια κορμιδίων οξύας και λεπτών κορμών οξύας σε έκταση 30 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Καλλιέργεια κορμιδίων και λεπτών κορμών κωνοφόρων σε έκταση 5 στρεμμάτων. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
	Αν.κων				39,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
16β	Ο.	0.7-1.1	1-120	Σπερ. υποκτηπ.	6.065,00	3.448,00	236,08	134,22	56,85	Οξύα αμιγής. Συστάδα συμπαγής καλής υγείας και ανάπτυξης ανεμορριψίες, ανεμοθλασίες. Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 2009 και απολήφθηκαν 472 κ.μ. οξύας. Προτείνονται: καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξύα. Οι επεμβάσεις με προσοχή ώστε η συγκόμωση να μην κατέρχεται του 0,8. Καλλιέργεια κορμιδίων οξύας και λεπτών κορμών οξύας σε έκταση 25 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Απαγόρευση βόσκησης	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
16γ	Ο.	0.7-1.1	Ο.: 1-100	Ο.: σπερ. υποκτηπ.	4.863,00	3.977,00	261,73	214,05	81,78	Οξύα αμιγής, 0,15 Ha αναδασώσεις κωνοφόρων. Συστάδα συμπαγής καλής μορφής και εξέλιξης. Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 2009 και απολήφθηκαν 722 κ.μ. οξύας. Προτείνονται: καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξύα. Οι επεμβάσεις με προσοχή ώστε η συγκόμωση να μην κατέρχεται του 0,8. Καλλιέργεια κορμιδίων οξύας και λεπτών κορμών οξύας σε έκταση 20 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
	Αν.κων				15,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
16δ	Ο.	0.7-1	Ο.: 1-120	Ο.: σπερ. υποκτηπ.	8.933,00	8.483,00	308,67	293,12	94,96	Οξύα αμιγής, 4,37 Ha αναδασώσεις κωνοφόρων. Συστάδα συμπαγής καλής μορφής και εξέλιξης. Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 1999 και απολήφθηκαν 1561,73 κ.μ. οξύας. Προτείνονται: καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξύα. Οι επεμβάσεις με προσοχή ώστε η συγκόμωση να μην κατέρχεται του 0,8.Καλλιέργεια κορμιδίων οξύας και λεπτών κορμών οξύας σε έκταση 30 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Καλλιέργεια κορμιδίων και λεπτών κορμών κωνοφόρων σε έκταση 45 στρεμμάτων. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
	Αν.κων				437,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
16ε	Ο.	0.7-1.1	Ο.: 1-80	Ο.: σπερ. σχεδόν ομηλ.	9.967,00	8.443,00	352,19	298,34	84,71	Οξύα αμιγής, 1,34 Ha αναδασώσεις κωνοφόρων. Συστάδα συμπαγής καλής μορφής και εξέλιξης. Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 1999 και απολήφθηκαν 810,39 κ.μ. οξύας. Προτείνονται: Καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξύα. Οι επεμβάσεις με προσοχή ώστε η συγκόμωση να μην κατέρχεται του 0,8.Καλλιέργεια κορμιδίων οξύας και λεπτών κορμών οξύας σε έκταση 30 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Καλλιέργεια κορμιδίων και λεπτών κορμών κωνοφόρων σε έκταση 15 στρεμμάτων. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
	Αν.κων				134,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
16στ	Ο.	0.7-1.1	1-100	Σπερ. υποκτηπ.	8.159,00	4.773,00	259,43	151,76	58,50	Οξύα αμιγή. Συστάδα συμπαγής καλής υγείας και ανάπτυξης, απουσία ατόμων πρώτης κλάσης. Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 2009 και απολήφθηκαν 1901 κ.μ. οξύας. Προτείνονται: καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξύα. Οι επεμβάσεις με προσοχή ώστε η συγκόμωση να μην κατέρχεται του 0,8. Καλλιέργεια κορμιδίων οξύας και λεπτών κορμών οξύας σε έκταση 30 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
17α	Ο.	0.7-1.1	Ο.: 1-120	Ο.: σπερ. υποκτηπ.	6.035,00	3.633,00	220,82	132,93	60,20	Οξύα αμιγής, 1,35 Ha αναδασώσεις κωνοφόρων. Συστάδα συμπαγής καλής μορφής και εξέλιξης. Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 2010 και απολήφθηκαν 570 κ.μ. οξύας. Προτείνονται: καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξύα. Οι επεμβάσεις με προσοχή ώστε η συγκόμωση να μην κατέρχεται του 0,8. Καλλιέργεια κορμιδίων οξύας και λεπτών κορμών οξύας σε έκταση 30 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
	Αν.κων				135,00	0,00	100,00	0,00	0,00		

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας / ha	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
										κυρίων ειδών. Καλλιέργεια κορμιδίων και λεπτών κορμών κωνοφόρων σε έκταση 15 στρεμμάτων. Απαγόρευση βόσκησης.	
17β	Ο.	0.7-1.1	Ο.: 1-120	Ο.: σπερ. υποκηπ.	4.229,00	4.000,00	292,46	276,63	94,59	Οξυά αμιγής, 0,91 Ha αναδασώσεις κωνοφόρων. Συστάδα συμπαγής καλής μορφής και εξέλιξης. Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 2010 και απολήφθηκαν 504 κ.μ. οξυάς. Προτείνονται: καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά. Οι επεμβάσεις με προσοχή ώστε η συγκόμωση να μην κατέρχεται του 0,8. Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεπτών κορμών οξυάς σε έκταση 30 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Καλλιέργεια κορμιδίων και λεπτών κορμών κωνοφόρων σε έκταση 10 στρεμμάτων. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
	Αν.κων				137,00	0,00	150,55	0,00	0,00		
17γ	Ο.	0.7-1.1	Ο.: 1-120	Ο.: σπερ. υποκηπ.	9.082,00	7.557,00	297,19	247,28	83,21	Οξυά αμιγής,0,59 Ha αναδασώσεις κωνοφόρων. Συστάδα συμπαγής καλής μορφής και εξέλιξης. Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 1998 και απολήφθηκαν 1662,74 κ.μ. οξυάς. Προτείνονται: καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά. Οι επεμβάσεις με προσοχή ώστε η συγκόμωση να μην κατέρχεται του 0,8. Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεπτών κορμών οξυάς σε έκταση 30 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Καλλιέργεια κορμιδίων και λεπτών κορμών κωνοφόρων σε έκταση 10 στρεμμάτων. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
	Αν.κων				59,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
17δ	Ο.	0.7-1.1	Ο.: 1-120	Ο.: σπερ. υποκηπ.	5.381,00	3.395,00	233,15	147,10	63,09	Οξυά αμιγής, 0,39 Ha αναδασώσεις κωνοφόρων. Συστάδα καλής μορφής και εξέλιξης. Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 1998 και απολήφθηκαν 1237,01 κ.μ. οξυάς. Προτείνονται: καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά. Οι επεμβάσεις με προσοχή ώστε η συγκόμωση να μην κατέρχεται του 0,8.Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεπτών κορμών οξυάς σε έκταση 20 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Καλλιέργεια κορμιδίων και λεπτών κορμών κωνοφόρων σε έκταση 5 στρεμμάτων. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
	Αν.κων				39,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
18α	Ο.	0.7-1.1	Ο.: 1-100	Σπερ. υποκηπ.	3.625,00	1.312,00	192,31	69,60	36,19	Οξυά αμιγής και άτομα μαύρης πεύκης. Συστάδα συμπαγής καλής υγείας και ανάπτυξης. Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 1998 και απολήφθηκαν 473,44 κ.μ. οξυάς. Προτείνονται: καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά. Οι επεμβάσεις με προσοχή ώστε η συγκόμωση να μην κατέρχεται του 0,8. Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεπτών κορμών οξυάς σε έκταση 15 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
18β	Ο.	0.7-1.1	Ο.: 1-120	Ο.: σπερ. Υποκηπ	256,47	0,00	6,26	0,00	0,00	Οξυά αμιγής, 0,44 Ha αναδασώσεις κωνοφόρων. Συστάδα καλής μορφής και εξέλιξης. Ανεμορριπίες, χιονοθλασίες. Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 2011 και απολήφθηκαν 991 κ.μ. οξυάς. Προτείνονται: καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά. Οι επεμβάσεις με προσοχή ώστε η συγκόμωση να μην κατέρχεται του 0,8. Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεπτών κορμών οξυάς σε έκταση 40 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Καλλιέργεια κορμιδίων και λεπτών κορμών κωνοφόρων σε έκταση 5 στρεμμάτων. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
	Αν.κων				1,28	0,00	2,91	0,00	0,00		
18γ	Ο.	0.7-1.1	Ο.: 1-120	Ο.: σπερ. υποκηπ.	149,84	0,00	5,25	0,00	0,00	Οξυά αμιγής, 0,89 Ha αναδασώσεις κωνοφόρων ,άτομα μαύρης πεύκης και λεύκης στα ψηλότερα. Συστάδα καλής μορφής και εξέλιξης στο βόρειο μισό, μέτρια στο νότιο. Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 2011 και απολήφθηκαν 773 κ.μ. οξυάς. Προτείνονται: Καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά. Οι επεμβάσεις 19με προσοχή ώστε η συγκόμωση να μην κατέρχεται του 0,8. Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεπτών κορμών οξυάς σε έκταση 30 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Καλλιέργεια κορμιδίων και λεπτών κορμών κωνοφόρων σε έκταση 10 στρεμμάτων. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
	Αν.κων				2,59	0,00	2,91	0,00	0,00		

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας / ha	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
18δ	Ο.	0.7-1.1	Ο.: 1-120	Ο.: σπερ. Υποκηπ	6.747,00	3.835,00	278,80	158,47	56,84	Οξύα αμιγής, 0,90 Ha αναδασώσεις κωνοφόρων. Συστάδα καλής μορφής και εξέλιξης, ανεμορριψίες στο βόρειο τμήμα. Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 2011 και απολήφθηκαν 773 κ.μ. οξυάς. Προτείνονται: καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξύα. Οι επεμβάσεις με προσοχή ώστε η συγκόμωση να μην κατέρχεται του 0,8. Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεπτών κορμών οξυάς σε έκταση 25 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Καλλιέργεια κορμιδίων και λεπτών κορμών κωνοφόρων σε έκταση 10 στρεμμάτων. Απαγόρευση βόσκησης	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
	Αν.κων				180,00	0,00	200,00	0,00	0,00		
19α	Ο.	0.7-1.1	Ο.: 1-100	Ο.: σπερ. Υποκηπ	145,68	0,00	6,02	0,00	0,00	Οξύα αμιγής, 0,67 Ha αναδασώσεις κωνοφόρων, άτομα δρυός και υδροχαρής βλάστηση νότια. Συστάδα πολύ καλής μορφής και εξέλιξης. Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 2011 και απολήφθηκαν 638 κ.μ. οξυάς. Προτείνονται: καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξύα. Οι επεμβάσεις με προσοχή ώστε η συγκόμωση να μην κατέρχεται του 0,8. Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεπτών κορμών οξυάς σε έκταση 30 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Καλλιέργεια κορμιδίων και λεπτών κορμών κωνοφόρων σε έκταση 10 στρεμμάτων. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
	Αν.κων				2,62	0,00	2,91	0,00	0,00		
19β	Ο.	0.7-1.1	Ο.: 1-120	Ο.: σπερ. υποκηπ.	5.570,00	3.152,00	232,47	131,55	56,59	Οξύα αμιγής, άτομα δρυός και υδροχαρής βλάστηση νότια. Συστάδα καλής μορφής και εξέλιξης. Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 2011 και απολήφθηκαν 585 κ.μ. οξυάς. Προτείνονται: καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξύα. Οι επεμβάσεις με προσοχή ώστε η συγκόμωση να μην κατέρχεται του 0,8. Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεπτών κορμών οξυάς σε έκταση 25 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
19γ	Ο.	0.7-1.1	1-120	Σπερ. υποκηπ.	3.479,00	2.125,00	159,73	97,57	61,08	Οξύα αμιγής, στην κορυφή μαύρη πεύκη (0,98 Ha). Συστάδα καλής μορφής και εξέλιξης. Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 1998 και απολήφθηκαν 879,80 κ.μ. οξυάς. Μεγάλο μέρος της συστάδας δεν υλοτομείται λόγω έλλειψης δασοδρόμων. Προτείνονται: καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξύα. Οι επεμβάσεις με προσοχή ώστε η συγκόμωση να μην κατέρχεται του 0,8. Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεπτών κορμών οξυάς σε έκταση 25 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
	Μ.Π,				196,00	0,00	200,00	0,00	0,00		
20α	Ο.	0.8-1.1	Ο.: 1-100	Ο.: σπερ. υποκηπ.	6.948,00	3.775,00	144,87	78,71	54,33	Οξύα με διάσπαρτα άτομα Μ.Πεύκης. Μ.Πεύκη στα ΒΑ (7,37 Ha). Αναδασώσεις κωνοφόρων στο Γιατάκι(2,87 Ha). Συστάδα καλής μορφής και εξέλιξης. Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 2012 και απολήφθηκαν 615,10 κ.μ. οξυάς. Προτείνονται: καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξύα. Οι επεμβάσεις με προσοχή ώστε η συγκόμωση να μην κατέρχεται του 0,8. Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεπτών κορμών οξυάς σε έκταση 50 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Καλλιέργεια κορμιδίων και λεπτών κορμών κωνοφόρων σε έκταση 30 στρεμμάτων. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
	Μ.Π.		Μ.Π.: 1-150	Μ.Π.: υποκηπ.	1.474,00	0,00	200,00	0,00	0,00		
	Αν.κων				287,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
20β	Ο.	0.7-1.1	1-100	Σπερ. υποκηπ.	6.938,00	3.903,00	223,95	125,98	56,26	Οξύα αμιγής. Συστάδα καλής μορφής και εξέλιξης. Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 2012 και απολήφθηκαν 569,61 κ.μ. οξυάς. Προτείνονται: καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξύα. Οι επεμβάσεις με προσοχή ώστε η συγκόμωση να μην κατέρχεται του 0,8. Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεπτών κορμών οξυάς σε έκταση 30 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
20γ	Ο.	0.7-1	1-100	Σπερ. υποκηπ.	6.899,00	2.900,00	163,48	68,72	42,04	Οξύα αμιγής. 1,01 Ha αναδασώσεις κωνοφόρων ανατολικά προς τη ράχη. Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 2012 και απολήφθηκαν 633,84 κ.μ. οξυάς. Προτείνονται: καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξύα. Οι επεμβάσεις με προσοχή ώστε η συγκόμωση να μην κατέρχεται του 0,8. Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεπτών κορμών οξυάς σε έκταση 40 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
	Αν.κων				101,00	0,00	100,00	0,00	0,00		

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας / ha	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
										τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Καλλιέργεια κορμιδίων και λεπτών κορμών κωνοφόρων σε έκταση 10 στρεμμάτων. Απαγόρευση βόσκησης.	
21α	Ο.	0.7-1.1	1-100	Σπερ. υποκηπ.	5.683,00	2.862,00	238,68	120,20	50,36	Οξυά αμιγής. Συστάδα καλής μορφής και εξέλιξης. Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 2011 και απολήφθηκαν 325 κ.μ. οξυάς. Προτείνονται: καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά. Οι επεμβάσεις με προσοχή ώστε η συγκόμωση να μην κατέρχεται του 0,8.Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεπτών κορμών οξυάς σε έκταση 25 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
21β	Ο.	0.7-1.1	1-120	Σπερ. υποκηπ.	3.576,00	1.768,00	181,34	89,66	49,44	Οξυά αμιγής. Συστάδα καλής έως μέτριας μορφής και εξέλιξης. Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 2000 και απολήφθηκαν 558,64 κ.μ. οξυάς. Προτείνονται: Καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά. Οι επεμβάσεις με προσοχή ώστε η συγκόμωση να μην κατέρχεται του 0,8.Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεπτών κορμών οξυάς σε έκταση 20 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
21γ	Ο.	0.7-1.1	1-120	Σπερ. υποκηπ.	4.184,00	2.044,00	183,59	89,69	48,85	Οξυά αμιγής , 1,36 Ha αναδασώσεις κωνοφόρων . Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 2011 και απολήφθηκαν 406 κ.μ. οξυάς. Καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά. Οι επεμβάσεις θα γίνουν με προσοχή ώστε η συγκόμωση να μην κατέρχεται του 0,8.Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεπτών κορμών οξυάς σε έκταση 25 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Καλλιέργεια κορμιδίων και λεπτών κορμών κωνοφόρων σε έκταση 10 στρεμμάτων. Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
	Αν.κων				136,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
21δ	Ο.	0.7-1.1	1-120	Σπερ. υποκηπ.	6.474,00	3.715,00	201,24	115,48	57,38	Οξυά αμιγής. Συστάδα καλής έως μέτριας μορφής και εξέλιξης. Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 2011 και απολήφθηκαν 445 κ.μ. οξυάς. Προτείνονται: καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά. Οι επεμβάσεις με προσοχή ώστε η συγκόμωση να μην κατέρχεται του 0,8. Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεπτών κορμών οξυάς σε έκταση 35 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
21ε	Ο.	0.7-1	1-100	Σπερ. υποκηπ.	4.444,00	3.200,00	195,00	140,41	72,01	Οξυά αμιγής. Συστάδα αρκετά καλής μορφής και εξέλιξης. Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 2000 και απολήφθηκαν 373,54 κ.μ. οξυάς. Προτείνονται: καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά. Οι επεμβάσεις με προσοχή ώστε η συγκόμωση να μην κατέρχεται του 0,8. Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεπτών κορμών οξυάς σε έκταση 25 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
21ζ	Ο.	0.7-1	1-100	Σπερ. υποκηπ.	12.860,00	10.071,00	252,16	197,47	78,31	Οξυά αμιγής, 0,38 Ha αναδασώσεις κωνοφόρων. Μέτρια έως καλή κατά θέσεις. Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 2011 και απολήφθηκαν 1309 κ.μ. οξυάς. Προτείνονται: καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά. Οι επεμβάσεις με προσοχή ώστε η συγκόμωση να μην κατέρχεται του 0,8.Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεπτών κορμών οξυάς σε έκταση 50 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Καλλιέργεια κορμιδίων και λεπτών κορμών κωνοφόρων σε έκταση 5 στρεμμάτων. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
	Αν.κων				38,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
21στ	Ο.	0.7-1	1-120	Σπερ. υποκηπ.	4.132,00	3.237,00	262,85	205,92	78,34	Οξυά αμιγής. Συστάδα αρκετά καλής μορφής και εξέλιξης. Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 2012 και απολήφθηκαν 497,90 κ.μ. οξυάς. Προτείνονται: καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά. Οι επεμβάσεις με προσοχή ώστε η συγκόμωση να μην κατέρχεται του 0,8. Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεπτών κορμών οξυάς σε έκταση 15 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας / ha	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
22α	Ο.	0.7-1.1	1-100	Σπερ. υποκτηπ.	11.495,00	8.024,00	243,80	170,18	69,80	Οξυά αμιγής. Συστάδα αρκετά καλής μορφής και εξέλιξης. Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 2012 και απολήφθηκαν 1350,18 κ.μ. οξυάς. Προτείνονται: καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά. Οι επεμβάσεις με προσοχή ώστε η συγκόμωση να μην κατέρχεται του 0,8. Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεππών κορμών οξυάς σε έκταση 50 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
22β	Ο.	0.7-1.1	1-120	Σπερ. υποκτηπ.	14.237,00	9.480,00	275,75	183,61	66,59	Οξυά αμιγής, 3,15 Ha αναδασώσεις κωνοφόρων. Μέτρια έως καλή κατά θέσεις. Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 2012 και απολήφθηκαν 1755,76 κ.μ. οξυάς. Προτείνονται: καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά. Οι επεμβάσεις θα γίνουν με προσοχή ώστε η συγκόμωση να μην κατέρχεται του 0,8. Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεππών κορμών οξυάς σε έκταση 50 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Καλλιέργεια κορμιδίων και λεππών κορμών κωνοφόρων σε έκταση 30 στρεμμάτων. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
	Αν.κων				315,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
23α	Ο.	0.7-1.1	1-120	Σπερ. υποκτηπ.	6.346,00	2.503,00	150,02	59,17	39,44	Οξυά αμιγής, 3,00 Ha αναδασώσεις κωνοφόρων. Αρκετά καλή κατά θέσεις. Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 2012 και απολήφθηκαν 591,25 κ.μ. οξυάς. Προτείνονται: Καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά. Οι επεμβάσεις με προσοχή ώστε η συγκόμωση να μην κατέρχεται του 0,8. Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεππών κορμών οξυάς σε έκταση 20 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Καλλιέργεια κορμιδίων και λεππών κορμών κωνοφόρων σε έκταση 30 στρεμμάτων. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
	Αν.κων				300,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
23β	Ο.	0.7-1	1-100	Σπερ. υποκτηπ.	3.447,00	1.868,00	188,77	102,30	54,19	Οξυά αμιγής. Συστάδα μέτριας έως καλής κατά θέσεις μορφής και εξέλιξης. Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 2012 και απολήφθηκαν 307,06 κ.μ. οξυάς. Προτείνονται: καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά. Οι επεμβάσεις με προσοχή ώστε η συγκόμωση να μην κατέρχεται του 0,8.Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεππών κορμών οξυάς σε έκταση 20 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Απαγόρευση βόσκησης	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
23γ	Ο.	0.7-1.1	1-100	Σπερ. υποκτηπ.	9.254,00	4.188,00	251,54	113,84	45,26	Οξυά αμιγής. Συστάδα καλής μορφής και εξέλιξης. Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 2012 και απολήφθηκαν 703,48 κ.μ. οξυάς. Προτείνονται: Καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά. Οι επεμβάσεις με προσοχή ώστε η συγκόμωση να μην κατέρχεται του 0,8. Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεππών κορμών οξυάς σε έκταση 40 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Απαγόρευση βόσκησης	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
23δ	Ο.	0.7-1.1	1-120	Σπερ. υποκτηπ.	8.036,00	6.596,00	347,58	285,29	82,08	Οξυά αμιγής, 0,68 Ha αναδασώσεις κωνοφόρων. Αρκετά καλή κατά θέσεις. Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 2012 και απολήφθηκαν 854,46 κ.μ. οξυάς. Προτείνονται: καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά. Οι επεμβάσεις με προσοχή ώστε η συγκόμωση να μην κατέρχεται του 0,8. Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεππών κορμών οξυάς σε έκταση 20 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Καλλιέργεια κορμιδίων και λεππών κορμών κωνοφόρων σε έκταση 5 στρεμμάτων. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
	Αν.κων				68,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
23ε	Ο.		Ο.: 1-120	Ο.: σπερ. υποκτηπ	5.697,00	3.913,00	188,77	129,66	68,69	Οξυά αμιγής στα ΝΔ, σε μίξη με μαύρη πεύκη στα ΒΔ. Συστάδα καλής μορφής και εξέλιξης. Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 2003 και απολήφθηκαν 573,37 κ.μ. οξυάς.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
	Μ.Π.		Μ.Π.: 60-140	Μ.Π.: ομηλ.	2.011,00	2.011,00	211,68	211,68	100,00		
24α	Ο.	0.7-1	1-100	Σπερ. υποκτηπ.	6.564,00	3.198,00	205,32	100,03	48,72	Οξυά αμιγής. Συστάδα καλής μορφής και εξέλιξης. Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 2002 και απολήφθηκαν 909,12 κ.μ. οξυάς. Προτείνονται: καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά. Οι επεμβάσεις με προσοχή ώστε η συγκόμωση να μην κατέρχεται του 0,8. Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεππών κορμών οξυάς σε έκταση 30 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας / ha	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
										είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Απαγόρευση βόσκησης.	ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
24β	Ο.	0.7-1.1	1-100	Σπερ. υποκτηπ.	10.036,00	7.607,00	209,61	158,88	75,80	Οξυά αμιγής, 0,21 Ha αναδασώσεις κωνοφόρων. Αρκετά καλή. Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 2002 και απολήφθηκαν 1547,05 κ.μ. οξυάς. Προτείνονται: καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά. Οι επεμβάσεις με προσοχή ώστε η συγκόμωση να μην κατέρχεται του 0,8. Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεπτών κορμών οξυάς σε έκταση 50 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
	Αν.κων				21,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
24γ	Ο.	0.7-1.1	1-120	Σπερ. υποκτηπ.	9.214,00	8.710,00	214,73	202,98	94,53	Οξυά αμιγής, 5,31 Ha αναδασώσεις κωνοφόρων. Πολύ καλή κατάσταση. Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 2002 και απολήφθηκαν 1868,50 κ.μ. οξυάς. Προτείνονται: καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά. Οι επεμβάσεις με προσοχή ώστε η συγκόμωση να μην κατέρχεται του 0,8.Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεπτών κορμών οξυάς σε έκταση 50 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Καλλιέργεια κορμιδίων και λεπτών κορμών κωνοφόρων σε έκταση 55 στρεμμάτων. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
	Αν.κων				531,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
24δ	Ο.	0.7-1.1	1-120	Σπερ. υποκτηπ.	560,43	0,00	6,71	0,00	0,00	Οξυά αμιγής, 1,52 Ha αναδασώσεις κωνοφόρων. Αρκετά-πολύ καλή κατάσταση. Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 2002 και απολήφθηκαν 2070,60 κ.μ. οξυάς. Προτείνονται: καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά. Οι επεμβάσεις με προσοχή ώστε η συγκόμωση να μην κατέρχεται του 0,8. Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεπτών κορμών οξυάς σε έκταση 60 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Καλλιέργεια κορμιδίων και λεπτών κορμών κωνοφόρων σε έκταση 15 στρεμμάτων. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
	Αν.κων				4,42	0,00	2,91	0,00	0,00		
25α	Ο. + Μ.Π.	0.7-1.1	1-120	Σπερ. υποκτηπ.	7.922,00	6.668,00	196,97	165,79	84,17	Οξυά αμιγής και άτομα Μ.Πεύκης. Συστάδα αρκετά καλής μορφής και εξέλιξης ,αρκετές ανεμορριψίες ,χιονοθλασίες. Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 2004 και απολήφθηκαν 319 κ.μ. οξυάς. Προτείνονται: καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά. Οι επεμβάσεις με προσοχή ώστε η συγκόμωση να μην κατέρχεται του 0,8. Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεπτών κορμών οξυάς σε έκταση 40 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
25β	Ο.	0.7-1.1	1-100	Σπερ. υποκτηπ.	6.440,00	6.204,00	304,20	293,06	96,34	Οξυά αμιγής. Συστάδα αρκετά καλής μορφής και εξέλιξης, αρκετές ανεμορριψίες, χιονοθλασίες. Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 2004 και απολήφθηκαν 215 κ.μ. οξυάς. Προτείνονται: Καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά. Οι επεμβάσεις με προσοχή ώστε η συγκόμωση να μην κατέρχεται του 0,8.Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεπτών κορμών οξυάς σε έκταση 20 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
25γ	Ο.	0.7-1.1	1-100	Σπερ. υποκτηπ.	6.541,00	5.989,00	233,61	213,89	91,56	Οξυά αμιγής. Συστάδα αρκετά καλής μορφής και εξέλιξης, αρκετές ανεμορριψίες, χιονοθλασίες. Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 2004 και απολήφθηκαν 506 κ.μ. οξυάς. Προτείνονται: καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά. Οι επεμβάσεις με προσοχή ώστε η συγκόμωση να μην κατέρχεται του 0,8.Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεπτών κορμών οξυάς σε έκταση 20 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
25δ	Ο.	0.8-1.1	1-120	Σπερ. υποκτηπ.	12.416,00	10.823,00	294,92	257,08	87,17	Οξυά αμιγής, 0,51 Ha αναδασώσεις κωνοφόρων. Αρκετά καλή κατάσταση. Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 2004 και απολήφθηκαν 605 κ.μ. οξυάς. Προτείνονται: Καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά. Οι επεμβάσεις με προσοχή ώστε η συγκόμωση να μην κατέρχεται του 0,8.Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεπτών κορμών οξυάς σε έκταση 40 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
	Α. κων,				51,00	0,00	100,00	0,00	0,00		

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας / ha	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
26α	Ο.	0.7-1.1	1-100	Σπερ. υποκτηπ.	6.860,00	5.793,00	302,20	255,20	84,45	Οξυά αμιγής. Συστάδα αρκετά καλής μορφής και εξέλιξης, αρκετές ανεμορριψίες, χιονοθλασίες. Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 2004 και απολήφθηκαν 490 κ.μ. οξυάς. Προτείνονται: καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά. Οι επεμβάσεις με προσοχή ώστε η συγκόμωση να μην κατέρχεται του 0,8. Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεπτών κορμών οξυάς σε έκταση 20 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
26β	Ο.	0.7-1.1	1-120	Σπερ. υποκτηπ. & Νότιο τμ. διφ. ακαν.	13.768,00	8.542,00	310,23	192,47	62,04	Οξυά αμιγής, 2,59 Ha αναδασώσεις κωνοφόρων. Αρκετά καλή κατάσταση. Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 2004 και απολήφθηκαν 509 κ.μ. οξυάς. Προτείνονται: καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά. Οι επεμβάσεις με προσοχή ώστε η συγκόμωση να μην κατέρχεται του 0,8. Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεπτών κορμών οξυάς σε έκταση 50 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Καλλιέργεια κορμιδίων και λεπτών κορμών κωνοφόρων σε έκταση 25 στρεμμάτων. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
	Αν.κων				259,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
27α	Ο.	0.7-1.1	1-120	Σπερ. υποκτηπ.	3.853,00	3.470,00	164,45	148,10	90,06	Οξυά αμιγής, 0,82 Ha αναδασώσεις κωνοφόρων. Αρκετά καλή κατάσταση. Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 2002 και απολήφθηκαν 761,13 κ.μ. οξυάς. Προτείνονται: Καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά. Οι επεμβάσεις με προσοχή ώστε η συγκόμωση να μην κατέρχεται του 0,8. Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεπτών κορμών οξυάς σε έκταση 40 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Καλλιέργεια κορμιδίων και λεπτών κορμών κωνοφόρων σε έκταση 25 στρεμμάτων.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
	Αν.κων				82,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
27β	Ο	0.7-1.1	1-120	Σπερ. υποκτηπ.	10.674,00	9.964,00	319,58	298,32	93,35	Οξυά αμιγής, 4,03 Ha αναδασώσεις κωνοφόρων. Αρκετά καλή κατάσταση. Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 2004 και απολήφθηκαν 643 κ.μ. οξυάς. Προτείνονται: καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά. Οι επεμβάσεις θα γίνουν με προσοχή ώστε η συγκόμωση να μην κατέρχεται του 0,8. Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεπτών κορμών οξυάς σε έκταση 30 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Καλλιέργεια κορμιδίων και λεπτών κορμών κωνοφόρων σε έκταση 40 στρεμμάτων. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
	Αν.κων				403,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
27γ	Ο.	0.7-1.1	1-120	Σπερ. υποκτηπ. & Νότιο μισό τμ. διφ. ακαν.	15.467,00	2.787,00	188,19	33,91	18,02	Οξυά αμιγής. Καλή στο κατώτερο, μέτρια στο ανώτερο με ελλιπή αναγέννηση και αρκετά κακόμορφα. Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 2004 και απολήφθηκαν 1190 κ.μ. οξυάς. Προτείνονται: καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά. Οι επεμβάσεις με προσοχή ώστε η συγκόμωση να μην κατέρχεται του 0,8. Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεπτών κορμών οξυάς σε έκταση 80 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
28α	Ο.	0.7-1.1	1-100	Σπερ. υποκτηπ.	7.336,00	4.488,00	218,01	133,37	61,18	Οξυά αμιγής, άτομα μαύρης πεύκης. Μέτρια έως καλή κατά θέσεις, αρκετές ανεμορριψίες, χιονοθλασίες. Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 2004 και απολήφθηκαν 352 κ.μ. οξυάς. Προτείνονται: καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά. Οι επεμβάσεις με προσοχή ώστε η συγκόμωση να μην κατέρχεται του 0,8.Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεπτών κορμών οξυάς σε έκταση 30 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
28β	Ο.	0.7-1.1	1-100	Σπερ. υποκτηπ.	11.790,00	4.872,00	169,25	69,94	41,32	Οξυά αμιγής, 2,30 Ha αναδασώσεις κωνοφόρων. Αρκετά-πολύ καλή, ανεμορριψίες. Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 2004 και απολήφθηκαν 1064 κ.μ. οξυάς. Προτείνονται: καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά. Οι επεμβάσεις με προσοχή ώστε η συγκόμωση να μην κατέρχεται του 0,8.Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεπτών κορμών οξυάς σε έκταση 70 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Καλλιέργεια κορμιδίων και λεπτών κορμών κωνοφόρων σε έκταση 25 στρεμμάτων. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
	Αν.κων				230,00	0,00	100,00	0,00	0,00		

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας / ha	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
29α	Ο.	-	-	Σπερ. υποκτηπ.	890,00	224,00	99,44	25,03	25,17	Οξυά 8,94 Ha στα βόρεια, Μαύρη Πεύκη 4,01 Ha στα δυτικά. Στη συστάδα ασκείται γεωργοκτηνοτροφική εκμετάλλευση. Εκτός Διαχείρισης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
	Μ.Π.				389,00	389,00	97,01	97,01	100,00		
29β	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Αμιγώς χορτολιβαδική έκταση Στη συστάδα ασκείται γεωργοκτηνοτροφική εκμετάλλευση. Εκτός Διαχείρισης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
29γ	Ο.	-	1-150		2.571,00	2.253,00	234,58	205,57	87,63	Αμιγώς χορτολιβαδική έκταση Στη συστάδα ασκείται γεωργοκτηνοτροφική εκμετάλλευση. Εκτός Διαχείρισης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
30	Ο.	0,7-1	1-100	Σπερ. ακαν.	1.768,00	1.768,00	200,00	200,00	100,00	Μαύρη πεύκη αμιγής και σε μίξη με Οξυά προς το ρέμα.Μέτρια έως κακή.Στη συστάδα ασκείται γεωργοκτηνοτροφική εκμετάλλευση. Εκτός Διαχείρισης	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
	Μ.Π.				554,00	554,00	150,14	150,14	100,00		
31 α	Ο.	0.7-1.1	1-120	Σπερ., στα ανωτέρω διφυής, υποκτηπ.	7.437,00	4.037,00	174,66	94,81	54,28	Οξυά αμιγής. Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 2005 και απολήφθηκαν 725 κ.μ. οξυάς. Καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην οξυά. Οι επεμβάσεις θα γίνουν με προσοχή ώστε η συγκόμωση να μην κατέρχεται του 0,8.Καλλιέργεια κορμιδίων οξυάς και λεπτών κορμών οξυάς σε έκταση 40 στρεμμάτων. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών. Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
45 α	Μ.Π.	0,9-1,0	Μ.Π. 30-40	Ομήλ. της οξυάς υποκτηπ.	4.426,00	208,00	80,20	3,77	4,70	Μαύρη πεύκη από αναδασώσεις με άτομα δρυός και γκορτσιάς , οξυά στα ΝΔ(4,15 ha). Υποβαθμισμένη συστάδα, παρατηρούνται πολλές ζημιές από φυσικά αίτια. Διαχειριζόταν στο παρελθόν ως βοσκότοπος. Δεν υλοτομείται λόγω του εντόνου αναγλύφου και της έλλειψης δασοδρόμων. Εκτός Διαχείρισης. Προτείνεται Τεχνητή υποβοήθηση της αναγέννησης πεύκης (αναμόχλευση του εδάφους),σε έκταση 300 στρεμμάτων	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
	Ο.	Ο.:. 0,9-1,1			415,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
	Δ.	0,9-1,0			873,00	0,00	15,82	0,00	0,00		
45β	Ο.	0,7-1	Ο. έως 100	Υποκτηπ.	1.106,00	0,00	46,55	0,00	0,00	Οξυά και στα δυτικά σε μίξη με Μ.πεύκη, η οποία προοδευτικά γίνεται αμιγής. Στα άτομα δρυός & οστρυάς. υποβαθμισμένη συστάδα, παρατηρούνται ζημιές από φυσικά αίτια. Δεν υλοτομείται λόγω του εντόνου αναγλύφου και της έλλειψης δασοδρόμων. Εκτός Διαχείρισης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
	Μ.Π.		Μ.Π. έως 140		1.067,00	0,00	150,07	0,00	0,00		
45 στ	Δ.	0,9-1,0	έως 70	Διφυής, ομηλ.	3.956,00	0,00	65,57	0,00	0,00	Δρυς και διάσπαρτα άτομα πεύκης, οξυάς, γαύρου, στα ανατολικά αμιγής μαύρη πεύκη(2,76ha). Καλλιεργητικές υλοτομίες στην δρυ, μόνο όπου υπάρχει αναγέννηση σε εξέλιξη. Οι επεμβάσεις θα γίνουν με προσοχή ώστε η συγκόμωση	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ -

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας / ha	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
	Μ.Π				276,00	0,00	100,00	0,00	0,00	να μην κατέρχεται του 0,8. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς των κυρίων ειδών και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό των κυρίων ειδών.3.Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια.	ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
46 α	Ο.	0,9-1,0	Ο. έως 120	Διφυής ακαν.	2.459,00	695,00	76,25	21,55	28,26	Οξυά σε μίξη με δρυ, αμιγής προς το ρέμα. Μαύρη πεύκη στα Ν, διάσπαρτα άτομα. Μέτρια έως κακή, ακανόνιστη, ακαλλιέργητη συστάδα. Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 2005 και απολήφθησαν 337 κμ οξυάς και 403 κμ δρυός. Εξυγιαντικές και εξευγενιστικές αραιώσεις στην δρυ και στην οξυά μόνο όπου υπάρχει αναγέννηση σε εξέλιξη. Οι επεμβάσεις θα γίνουν με προσοχή ώστε η συγκόμωση να μην κατέρχεται του 0,8. Απαγόρευση βοσκής για τα πρόβατα 5 χρόνια, για τα μεγάλα ζώα 7 χρόνια και για τα γίδια 10 χρόνια.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
	Δ.		Δ.: έως 60		1.467,00	0,00	53,23	0,00	0,00		
	Μ.Π.		Μ.Π. έως 60		603,00	23,00	146,36	5,58	3,81		
47 ζ	Δ.	0,7-1,1	έως 60 και υπέργηρα άτομα, οξυάς έως 120	Δ. διφ. σχεδ. ομήλ.	74,91	0,00	2,81	0,00	0,00	Δρυς στο μέσον μ.πεύκη από παλαιές αναδασώσεις, οξυά στο ρέμα, άτομα γαύρου και οστρυάς. Υποβαθμισμένη συστάδα, παρατηρούνται ζημιές από φυσικά αίτια. Δεν υλοτομείται λόγω του εντόνου αναγλύφου και της έλλειψης δασοδρόμων. Εκτός Διαχείρισης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
	Ο.			Ο. σπερμ. υποκ/ειδής	22,12	0,00	4,97	0,00	0,00		
	Μ.Π.			Π. ομήλ.	15,21	0,00	2,77	0,00	0,00		
48α	Δ.	0,7-1,1	Έως 60 & υπέργηρα άτομα	Διφ. σχεδόν ομηλ.	1.649,00	141,00	58,77	5,02	8,55	Δρυς με διάσπαρτα άτομα γαύρου και πεύκης, οξυά προς το ρέμα. Πολλή υποβαθμισμένη συστάδα με πολλά διάκενα, παρατηρούνται έντονες ζημιές από φυσικά και ανθρωπογενή αίτια. Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 2009 και παρήχθησαν 978 κ.μ. δρυός. Εκτός Διαχείρισης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
	Ο.				45,00	45,00	19,91	19,91	100,00		
48β	Δ.	0,7-1	Έως 60 & υπέργηρα άτομα	Διφ. σχεδόν ομηλ.	1.733,00	0,00	100,35	0,00	0,00	Δρυς και άτομα γαύρου. Πολλή υποβαθμισμένη συστάδα με πολλά διάκενα, παρατηρούνται έντονες ζημιές από φυσικά και ανθρωπογενή αίτια. Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 2009 και παρήχθησαν 223 κ.μ. δρυός. Εκτός Διαχείρισης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
48γ	Δ.	0,7-1	Έως 60 & υπέργηρα άτομα	Διφ. σχεδόν ομηλ.	2.645,00	305,00	73,03	8,42	11,53	Δρυς και διάσπαρτα άτομα γαύρου ,οστρυάς, φράξου, καστανιάς, πεύκης. Μέτρια έως καλή κατά θέσεις. Προτείνονται: Εξυγιαντικές υλοτομίες και απομάκρυνση γαύρου. Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη θα ακολουθούν τους χειρισμούς του κυρίου είδους και το λήμμα τους θα συνυπολογίζεται με αυτό του κυρίου είδους .Η συγκόμωση να μην κατέρχεται του 0,8. Απαγόρευση βόσκησης	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
49α	Δ.	0,7-1	Έως 60 & υπέργηρα άτομα	Διφ. σχεδόν ομηλ.	2.386,00	1.154,00	52,12	25,21	48,37	Δρυς και αρκετά άτομα γαύρου. Μέτρια μεγάλο ποσοστό των ατόμων της Ι κλάσης αποτελείται από άτομα γαύρου. Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 2005. Προτείνονται: Εξευγενιστικές και αναγεννητικές υλοτομίες στην δρυ .Οι επεμβάσεις θα γίνουν με προσοχή ώστε η συγκόμωση να μην κατέρχεται του 0,8.Απομάκρυνση του γαύρου στις μικτές ενώσεις για να ευνοηθεί η δρυς. Απαγόρευση βόσκησης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)
49β	Δ.	0,7-1,1	Έως 60 & υπέργηρα άτομα	Διφ. σχεδόν ομηλ.	2.556,00	147,00	50,47	2,90	5,75	Δρυς άτομα οστρυάς και γαύρου , προς το ρέμα άτομα οξυάς. Πολλή υποβαθμισμένη συστάδα με πολλά διάκενα, παρατηρούνται έντονες ζημιές από φυσικά και ανθρωπογενή αίτια. Υλοτομήθηκε για τελευταία φορά το έτος 2007 και παρήχθησαν 337,89 κ.μ. δρυός. Εκτός διαχείρισης	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ - ΦΤΕΡΗΣ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2014-2023)

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας / ha	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
13α	Δ.	0,7-1,0	30-70 Διασ.γηρ. Ατ.	Δ: πρεμν.	3.249,00	0,00	43,83	0,00	0,00	Δρυς (74,12 Ha) , μικροομάδες Οξυάς στο κέντρο περίπου της συστάδας στο Ρ. Λυγαριά και στο ανώνυμο ρέμα (6,28Ha) και στο ρ. Ελικών διάφορα φυλλοβόλα πλατύφυλλα (3,25 Ha.Γενική κατάσταση: Μέτρια. Λόγω έντονης βοσκής και λαθροϋλοτομιών, η δρυς είναι αραιά και μόνο μέσα στα ρέματα είναι σε καλύτερη κατάσταση. Εκτός διαχείρισης	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2018 – 2027)
	Ο.			Ο: διφ	1.005,00	628,00	160,03	100,00	62,49		
	Φ.πλ.				488,00	293,00	150,15	90,15	60,04		
13β	Δ.	0,2 -0,8		Πρεμν.	978,00	978,00	28,85	28,85	100,00	Δρυς (33,9 Ha) . Υπάρχουν φυλλοβόλα πλατύφυλλα κατά μήκος του ρέματος Ελικών (6,45 Ha) και αείφυλλα πλατύφυλλα (1,71 Ha).Γενική κατάσταση: Κακή έως μέτρια. Λόγω έντονης βοσκής και λαθροϋλοτομιών, η δρυς είναι αραιά και μόνο μέσα στα ρέματα είναι σε καλύτερη κατάσταση. Εκτός διαχείρισης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2018 – 2027)
	Φ.πλ.				1.935,00	2.451,00	300,00	380,00	126,67		
	Α.πλ				51,00	51,00	29,82	29,82	100,00		
14α	Δ.	0,2 -0,6		Πρεμν., ομήλ	2.143,00	0,00	28,86	0,00	0,00	Δρυς (74,26 Ha) , Αείφυλλα πλατύφυλλα (6,2 Ha) και στο ρέμα Ελικών διάφορα φυλλοβόλα πλατύφυλλα. Γενική κατάσταση: Κακή ως μέτρια. Λόγω έντονης βοσκής η δρυς είναι αραιά, σε κακή κατάσταση και μόνο μέσα στα ρέματα είναι σε καλύτερη κατάσταση. Εκτός διαχείρισης	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2018 – 2027)
	Α.πλ.				186,00	0,00	30,00	0,00	0,00		
	Φ.πλ.				267,00	160,00	300,00	179,78	59,93		
14β	Δ.	-		Δ: πρεμν. ομήλ.	738,00	0,00	28,87	0,00	0,00	Δρυς 25,56 Ha, Οξύα 7,09Ha, κατά μήκος του ρέματος Ελικών. Γενική κατάσταση: Κακή.Από την συνολική γεωργική έκταση των 185.75 Ha των αγρών έχουν αναδασωθεί και έχουν ενταχθεί στον καν. 2080/92 της ΕΟΚ 96.23 Ha. Η δασοσκεπής έκταση περιορίζεται μόνο στα ρέματα. Η μεγαλύτερη έκταση είναι εγκαταλλειμένοι αγροί. . Έχουν παραχωρηθεί 1.12 Ha καστανοπερίβολα σύμφωνα με το αρθ. 16 του Ν.1734/87 Εκτός διαχείρισης	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2018 – 2027)
	Ο.			Ο: διφ	1.418,00	992,00	200,00	139,92	69,96		
14γ	Δ.	Δ.: 0,2-0,5		Δ: πρεμν. ομήλ.	6.135,00	0,00	29,15	0,00	0,00	Δρυς 210,46 Ha, οξύα 6,45 Ha και στο βόρειο μέρος της συστάδας μικροομάδες οξυάς , και αείφυλλα πλατύφυλλα 5,36 Ha. Γενική κατάσταση: Κακή. Από την συνολική γεωργική έκταση των 41,59 Ha των αγρών έχουν αναδασωθεί και έχουν ενταχθεί στον καν. 2080/92 της ΕΟΚ 13,74 Ha. Η δασοσκεπής έκταση αραιάς μορφής καταλαμβάνει εδάφη με μεγάλες κλίσεις. Εκτός διαχείρισης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2018 – 2027)
	Ο.	Ο.:0,4-1,0		Ο: διφ	1.290,00	904,00	200,00	140,16	70,08		
	Α.πλ.				161,00	0,00	30,04	0,00	0,00		
15	Δ.	0,2 – 0,8			3.731,00	0,00	29,15	0,00	0,00	Δρυς (αμιγής 128 Ha), Μ. Πεύκη (6,65Ha), Οξύα (34,27Ha) , Μέσα στις εκτάσεις αυτές υπάρχουν μικτές ενώσεις οξυάς δρυός. Γενική κατάσταση: Κακή Από την συνολική γεωργική έκταση των 130,17 Ha των αγρών έχουν αναδασωθεί και έχουν ενταχθεί στον καν. 2080/92 της ΕΟΚ 49,63 Ha. Τα καλύτερης ποιότητας εδάφη είναι αγροί και το δάσος περιορίζεται σε λωρίδες μεταξύ των αγρών και στα κατώτερης ποιότητας και μεγάλης κλίσης εδάφη. Εκτός διαχείρισης	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2018 – 2027)
	Ο.			Ο: διφ Δ:πρεμν.	3.427,00	2.742,00	100,00	80,01	80,01		
	Μ.Π.			Π.: σπερ. Σχεδόν ομήλ.	665,00	532,00	100,00	80,00	80,00		
17α	Δ.	Δ.: 0,5-0,8	Δ.:20-60	Δ.: πρεμν σχεδόν ομήλ.	307,00	0,00	30,04	0,00	0,00	Δρυς (10,22 Ha) , Οξύα (65,13 Ha).Γενική κατάσταση: της Οξυάς καλή, της Δρυός κακή Υπάρχουν πολλά γηραιά άτομα Οξυάς. Από την συνολική έκταση των 120,23 Ha έχουν αναδασωθεί και έχουν ενταχθεί στον καν. 2080/92 της ΕΟΚ 25,61 Ha. Εκτός διαχείρισης	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ (2018 – 2027)
	Ο.	Ο.: 0,8-1,10	Ο.:50-120	Ο.: διφ	6.869,00	1.564,00	105,47	24,01	22,77		
17β	Δ.	0,5-0,8	30-110	Δ.: πρεμν.	311,00	0,00	29,96	0,00	0,00	Δρυς 10,38 Ha. Μερικώς δασοσκεπής οξύα στο μεγαλύτερο τμήμα της συστάδας και αείφυλλα πλατύφυλλα 8,26 Ha. Γενική κατάσταση: Κακή. Από την συνολική έκταση των 63,39 Ha έχουν αναδασωθεί και έχουν ενταχθεί στον καν. 2080/92 της ΕΟΚ 28,93 Ha. Εκτός διαχείρισης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΠΕ
	Α.πλ.				248,00	0,00	30,02	0,00	0,00		

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας / ha	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
											ΠΙΕΡΙΑΣ (2018 – 2027)
4α*	Ο.+ Δ. + Οστρ. + Λ.	0,8-1,0	Ο.: 90 Δ.:40 Καστ.: 1	Ακαν., κατά θέσεις διφ. Υποκήπ.	7.108,00	2.096,00	181,79	53,61	29,49	Αμιγής οξυά. Κατά θέσεις οξυά σε μίξη κατ' άτομο και καθ'ο μάδα δρυ και οστρυά. Άτομα σφενδάμου και λευκής λεύκης. Ικανοποιητικά αναπτυσσόμενη συστάδα οξυάς με υγιές ξυλώδες κεφάλαιο. Λίγες ζημιές από ανεμορριψίες - χιονοθλασίες. Η συστάδα υλοτομήθηκε επιλογικά το έτος 2011. Απολήφθηκαν τα εξής: Καυσόξυλα οξυάς 443,82 χ.κ.μ., Τεχνική ξυλεία καστανιάς 236,71 κ.μ., καυσόξυλα καστανιάς 342 χ.κ.μ., καυσόξυλα δρυός 99,32 χ.κ.μ. Προτείνονται: καλλιεργητικές υλοτομίες - εξευγενιστικές αραιώσεις με τη μορφή της αρνητικής επιλογής προς ευνόηση των είδοξων ατόμων του μέλλοντος και ταυτόχρονη εξασφάλιση βαθμού συγκόμωσης 0,8. Φωτοδότιδες υλοτομίες με σκοπό την απελευθέρωση της αναγέννησης της οξυάς. Απομάκρυνση της οστρυάς και ατόμων λεύκης, όπου τα δύο είδη ανταγωνίζονται τα πολυτιμότερα είδη οξυά, καστανιά και δρύ. Σποραδική παρακράτηση ατόμων μεγάλης ηλικίας , ανεξάρτητα από δασοπονικό είδος, για οικολογικούς λόγους. Ευνόηση των απαντώμενων ατόμων του εδαφοβελτιωτικού σφενδάμου. Απαγόρευση βοσκής. Έτος υλοτομίας 2021	ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΔΑΣΟΣ "ΟΡΕΙΝΟΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΛΗΟΖΑΚΟΝ" Α.Δ.Σ ΛΟΦΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ
4β*	Ο.+ Δ. + Οστρ. + Καστ.	0,8-1,0	Ο.: 80 Δ.:50 Καστ.: 12	Σπερ. Ακαν., υποκηπ.	12.066,00	4.962,00	211,68	87,05	41,12	Οξυά σε μίξη κατ' άτομο και συδενδρίες με καστανιά, δρυ και οστρυά. Συστάδα οξυάς ικανοποιητικής ανάπτυξης χωρίς προβλήματα στην εξέλιξή της, υγιές ξυλώδες κεφάλαιο. Λίγες ζημιές από ανεμορριψίες - χιονοθλασίες. Η συστάδα υλοτομήθηκε επιλογικά το έτος 2011 και απολήφθηκαν καυσόξυλα οξυάς 960 χ.κ.μ. και καυσόξυλα δρυός 210 χ.κ.μ.. Προτείνονται: καλλιεργητικές υλοτομίες - εξευγενιστικές αραιώσεις με τη μορφή της αρνητικής επιλογής προς ευνόηση των είδοξων ατόμων του μέλλοντος και ταυτόχρονη εξασφάλιση βαθμού συγκόμωσης 0,8. Φωτοδότιδες υλοτομίες με σκοπό την απελευθέρωση της αναγέννησης της οξυάς. Απομάκρυνση της οστρυάς και ατόμων λεύκης, όπου τα δύο είδη ανταγωνίζονται τα πολυτιμότερα είδη οξυά, καστανιά και δρυ. Σποραδική παρακράτηση ατόμων μεγάλης ηλικίας , ανεξάρτητα από δασοπονικό είδος, για οικολογικούς λόγους. Απαγόρευση βοσκής. Έτος υλοτομίας 2021	ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΔΑΣΟΣ "ΟΡΕΙΝΟΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΛΗΟΖΑΚΟΝ" Α.Δ.Σ ΛΟΦΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ
5β*	Ο.+ Δ. + Οστρ. + Λ.+ Φιλύρ.	0,9-1,2	Ο.: 70 Καστ.: 15	Σπερ. Ακαν., υποκηπ.,κατά θέσεις διφ.	5.935,00	1.298,00	176,55	38,63	21,88	Οξυά σε μίξη με άτομα και συδενδρίες καστανιάς, δρυός, οστρυάς, γαύρου, φράξου, φιλύρας, σφενδάμου και λευκής λεύκης. Συστάδα καλής υγείας και ανάπτυξης χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα στην εξέλιξή της. Παρατηρήθηκαν ξηράνσεις πρεμνοβλαστημάτων καστανιάς κύρια λόγω της σκίασης από την καταπίεση της οξυάς και λιγότερο από προσβολές από την ασθένεια του έλκους. Η συστάδα υλοτομήθηκε αποφιλωτικά για την καστανιά και τη δρυ και επιλογικά για την οξυά και την λεύκη. Απολήφθηκαν τεχνική ξυλεία καστανιάς 290,06 κ.μ., καυσόξυλα καστανιάς 375 τόνοι, καυσόξυλα δρυός 1560 τόνοι, καυσόξυλα οξυάς 28 τόνοι, τεχνική ξυλεία λεύκης 10,54 κ.μ. , καπνόβεργες καστανιάς 5170 τεμάχια. Προτείνονται: καλλιεργητικές υλοτομίες - εξευγενιστικές αραιώσεις με τη μορφή της αρνητικής επιλογής προς ευνόηση των είδοξων ατόμων του μέλλοντος και ταυτόχρονη εξασφάλιση βαθμού συγκόμωσης 0,8. Φωτοδότιδες υλοτομίες με σκοπό την απελευθέρωση της αναγέννησης της οξυάς. Απομάκρυνση της οστρυάς, γαύρου και ατόμων λεύκης όπου τα είδη αυτά ανταγωνίζονται τα πολυτιμότερα είδη οξυά και καστανιά. Σποραδική παρακράτηση ατόμων μεγάλης ηλικίας , ανεξάρτητα από δασοπονικό είδος, για οικολογικούς λόγους. Απαγόρευση βοσκής. Έτος υλοτομίας 2018	ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΔΑΣΟΣ "ΟΡΕΙΝΟΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΛΗΟΖΑΚΟΝ" Α.Δ.Σ ΛΟΦΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ
1γ	Μ.Π.	0,7-1,0	40-60 σποραδικ ά γηραια	Σπερ. Ακαν., υποκηπ.	1.086,00	436,00	107,52	43,17	40,15	Ποιοτική-υγιεινή κατάσταση ξυλώδους κεφαλαίου μέτρια, υγεία συστάδας σταθερή έως ασταθής, ζημιές από τη βοσκή, άλλες ζημιές δεν παρατηρούνται. Συστάδα υποβαθμισμένη και διασπασμένη από μερικώς δασοσκεπείς, χορτολιβαδικές εκτάσεις και αγρούς. Προτείνονται: Καλλιεργητικές, εξυγιαντικές υλοτομίες με χαρακτήρα θετικής επιλογής ήτοι εξευγενιστικές αραιώσεις με σκοπό την επιλογή και ευνόηση των καλύτερων ατόμων, καταναμειμένων κατά το δυνατόν σε ολόκληρη την έκταση των συστάδων. Αφαίρεση κατά το μέσο όρο του 15% του υπάρχοντος ξυλαποθέματος. Βαθμός συγκόμωσης όχι κάτω του 0,7 - 0,8. Απομάκρυνση σταδιακά και προσεχτικά των διάσπαρτων γηραιών και υπέργηρων ατόμων ώστε να μην ανοίγονται μεγάλα διάκενα. Απαγόρευση βόσκησης. Έτος υλοτομίας 2011	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΣΕΡΒΙΩΝ

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας / ha	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
4α	Μ.Π.	0,7-1,0	20-60 σποραδικ ά γηραια, υπέργηρα Μ.Π.	Σπερ. Ακαν., υποκηπ., κατά θέσεις διφ. με υπόροφο Δ.	2.217,00	890,00	107,62	43,20	40,14	Μαύρη Πεύκη, στα χαμηλά δρυς, πρίνος. Ποιοτική-υγιεινή κατάσταση ξυλώδους κεφαλαίου μέτρια κακή, υγεία συστάδας ασταθής, ζημιές από τη βοσκή, άλλες ζημιές δεν παρατηρούνται. Προτείνονται: Καλλιεργητικές, εξυγιαντικές υλοτομίες με χαρακτήρα θετικής επιλογής ήτοι εξευγενιστικές αραιώσεις με σκοπό την επιλογή και ευνόηση των καλύτερων ατόμων, κατανεμμένων κατά το δυνατόν σε ολόκληρη την έκταση των συστάδων. Αφαίρεση κατά το μέσο όρο του 15% του υπάρχοντος ξυλαποθέματος. Βαθμός συγκόμωσης όχι κάτω του 0,7 - 0,8. Απομάκρυνση σταδιακά και προσεχτικά των διάσπαρτων γηραιών και υπέργηρων ατόμων ώστε να μην ανοίγονται μεγάλα διάκενα. Απαγόρευση βόσκησης, Έτος υλοτομίας 2011	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΣΕΡΒΙΩΝ

ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΓΡΑΜΜΟΣ: ΕΖΔ – ΖΕΠ GR1320002

ΥΠΟΜΝΗΜΑ:

Δασοπονικά Είδη: Δ/Δρ.= Δρυς, Δ.π.= Δρυς Πρεμνοφυής Μ.π.= Μαύρη Πεύκη, Πευκ.= Πεύκη Ο/Οξ.=Οξυά, Ελ.=Ελάτη, Γ.= Γαύρος, Λ.= Λεύκη Κασ.= Καστανιά, Φυλ.πλ./Φυλ.πλατ.= Φυλλοβόλα πλατύφυλλα, Αειφ.πλ.= Αείφυλλα πλατύφυλλα, Αναδ.= Αναδασώσεις, Ατ./α.= Άτομα

Διαχειριστική, μορφή: Πρ./Πρεμν.= Πρεμνοφυής, Σπ.= Σπερμοφυής, Διφ.=Διφυής

Δασοπονική μορφή: Αν./Ανομ.= Αναμοιόμορφη, Ομ.= Ομοιόμορφη, Ακ.= Ακανόνιστη, Υποκ./Υπ.= Υποκτηπευτή, Παρακρατ.= Παρακρατήματα

Ηλικία: Γηραιοτ.= Γηραιότερα, Νεότ.= Νεότερα

Συγκόμωση: Συμπ./Συμ.= Σύμπυκτη, Αρ.= Αραιή, Χαλ.= Χαλαρή

Πίνακας 2.2.5 -5 Συγκρότηση δασικής βλάστησης στη περιοχή Γράμμου

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	ΣΥ συστάδας	Υ κλάσεων διαμέτρου >34 cm	ΣΥ συστάδας / ha	Υ κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
4α	Μ.π.,Οξ.άτομ αΕλ.	0,9-1,2	Μ.π,Ελ: 20-120 Οξ:30-70	Μ.π,Ελ: Σπ.ακ., Οξ:διφ.,κορμ. ακ	Μ.Π: 14.705 Οξ:1096 Ελ:343	Μ.Π: 9.653 Οξ:332 Ελ:131	Μ.Π: 278,77 Οξ:111,63 Ελ:83,88	Μ.Π: 183,00 Οξ:33,81 Ελ:32,11	Μ.Π: 65,64 Οξ:30,29 Ελ:38,19	Αναγωγικές - εξυγιαντικές. Προπαρασκευαστικές, σποράς, φωτοδότιδες, τελικές. Εξυγιαντικές υλοτομίες σε όλες τις ενώσεις (στα γηραιά, κουφαλερά κακόμορφα, βεβλαμένα, κ.λ.π. άτομα) ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του ξυλαποθέματος με την πλήρη απομάκρυνσή τους. Παρακράτηση ορισμένων κουφαλερών, κλαδοβριθών ατόμων 1-2/ Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων στην συστάδα για διατροφή και φωλεοποίησης της ορνιθοπανίδας. Απαγόρευση μετά την υλοτομία της βοσκής αιγών επί 10ετία, μεγάλων ζώων επί 7ετία και προβάτων επί 5ετία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
4β	Μ.π.,άτομα Οξ.,Ελ.	0,8-1,1	40-100	Σπ.,ομ.	20.955	15.190	380,65	275,93	72,49	Εξυγιαντικές, εξευγενιστικές. Σποράς, φωτοδότιδες, τελικές. Παρακράτηση ορισμένων κουφαλερών, κλαδοβριθών ατόμων 1-2/ Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων στην συστάδα για διατροφή και φωλεοποίησης της ορνιθοπανίδας. Απαγόρευση μετά την υλοτομία της βοσκής αιγών επί 10ετία, μεγάλων ζώων επί 7ετία και προβάτων επί 5ετία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
4γ	Μ.π.,άτομα Οξ.,Ελ.	0,8-1,2	40-110	Σπ.,ομ.	13.569	9.402	342,29	236,71	69,29	Εξυγιαντικές, εξευγενιστικές. Προπαρασκευαστικές, σποράς, φωτοδότιδες, τελικές, εξυγιαντικές υλοτομίες σε όλες τις ενώσεις (στα γηραιά, κουφαλερά κακόμορφα, βεβλαμένα, κ.λ.π. άτομα) ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του ξυλαποθέματος με την πλήρη απομάκρυνσή τους. Παρακράτηση ορισμένων κουφαλερών, κλαδοβριθών ατόμων 1-2/ Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων στην συστάδα για διατροφή και φωλεοποίησης της ορνιθοπανίδας. Απαγόρευση μετά την υλοτομία της βοσκής αιγών επί 10ετία, μεγάλων ζώων επί 7ετία και προβάτων επί 5ετία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
4δ	Μ.π.,Οξ.άτομ α Δρ.	0,8-1,2	Μ.π: 30-130 Οξ:10-70	Μ.π: Σπ.υπ.,ακ., Οξ:διφ.,ομ.	Μ.Π: 2.494 Οξ:4.043	Μ.Π: 974 Οξ:1.752	Μ.Π: 227,76 Οξ:212,89	Μ.Π: 88,95 Οξ:92,26	Μ.Π: 39,05 Οξ:92,26	Εκτός διαχείρισης την παρούσα δεκαετία λόγω έλλειψης δασικού οδικού δικτύου.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
4ε	Μ.π.,Οξ.άτομ αΕλ.	0,8-1,2	Μ.π: 30-130 Οξ:10-70	Μ.π: Σπ.υπ.,ακ., Οξ:διφ.,ακ.	Μ.Π: 16.669 Οξ:2.203	Μ.Π: 14.718 Οξ:891	Μ.Π: 401,64 Οξ:215,94	Μ.Π: 354,65 Οξ:87,35	Μ.Π: 88,30 Οξ:40,44	Αν/γικές, εξυγιαντικές, εξευ/στικές. Προ/σκευαστικές, σποράς, φωτ/τιδες, τελικές υλοτομίες. Αναγωγικές υλοτομίες στα πρεμνοβλαστήματα Οξυάς ώστε να ατομικοποιηθούν τα πρεμνοβλαστήματα. Εξυγιαντικές υλοτομίες σε όλες τις ενώσεις (στα γηραιά, κουφαλερά κακόμορφα, βεβλαμένα, κ.λ.π. άτομα) ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του ξυλαποθέματος με την πλήρη απομάκρυνσή τους. Παρακράτηση ορισμένων κουφαλερών, κλαδοβριθών ατόμων 1-2/ Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων στην συστάδα για διατροφή και φωλεοποίησης της ορνιθοπανίδας. Απαγόρευση μετά την υλοτομία της βοσκής αιγών επί 10ετία, μεγάλων ζώων επί 7ετία και προβάτων επί 5ετία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
4στ	Μ.π.,άτομα Οξ.,Ελ.	0,7-1,1	40-140	Σπ.,υπ.,ακ.	11.634	8.769	390,38	294,26	75,37	Εξυγιαντικές, εξευγενιστικές. Προπαρασκευαστικές, σποράς, φωτοδότιδες, τελικές υλοτομίες. Εξυγιαντικές υλοτομίες σε όλες τις ενώσεις (στα γηραιά, κουφαλερά κακόμορφα, βεβλαμένα, κ.λ.π. άτομα) ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του ξυλαποθέματος με την πλήρη απομάκρυνσή τους. Παρακράτηση ορισμένων κουφαλερών, κλαδοβριθών ατόμων 1-2/ Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων στην συστάδα για διατροφή και φωλεοποίησης της ορνιθοπανίδας. Απαγόρευση μετά την υλοτομία της βοσκής αιγών επί 10ετία, μεγάλων ζώων επί 7ετία και προβάτων επί 5ετία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
5α	Μ.π., Οξ.,Ελ.	0,8-1,2	Μ.π,Ελ: 50-140 Οξ:10-60	Μ.π,Ελ: Σπ.ομ., Οξ:πρεμ.,αν., ακ	Μ.Π: 14.524 Οξ:1.805 Ελ:864	Μ.Π: 10.454 Οξ:743 Ελ:535	Μ.Π: 337,77 Οξ:182,30 Ελ:137,10	Μ.Π: 243,12 Οξ:75,05 Ελ:84,92	Μ.Π: 71,98 Οξ:41,16 Ελ:61,92	Αν/γικές, εξυγιαντικές, εξευ/στικές. Προ/σκευαστικές, σποράς, φωτ/τιδες, τελικές υλοτομίες. Αναγωγικές υλοτομίες στα πρεμνοβλαστήματα Οξυάς ώστε να ατομικοποιηθούν τα πρεμνοβλαστήματα. Εξυγιαντικές υλοτομίες σε όλες τις ενώσεις (στα γηραιά, κουφαλερά κακόμορφα, βεβλαμένα, κ.λ.π. άτομα) ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του ξυλαποθέματος με	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	ΣΥ συστάδας	V κλάσεων διαμέτρου >34 cm	ΣΥ συστάδας / ha	V κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
										την πλήρη απομάκρυνσή τους. Παρακράτηση ορισμένων κουφαλερών, κλαδοβριθών ατόμων 1-2/ Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων στην συστάδα για διατροφή και φωλεοποίησης της ορνιθοπανίδας. Απαγόρευση μετά την υλοτομία της βοσκής αιγών επί 10ετία, μεγάλων ζώων επί 7ετία και προβάτων επί 5ετία.	
5β	Μ.π., Οξ.	0,9-1,2	Μ.π.,: 50-140 Οξ:10-60	Μ.π: Σπ.ομ., Οξ:πρεμ.,αν., ακ	Μ.Π: 26.100 Οξ:10.326	Μ.Π: 20.877 Οξ:1.334	Μ.Π: 443,12 Οξ:409,78	Μ.Π: 354,45 Οξ:52,94	Μ.Π:79,99 Οξ:12,92	Αν/γικές, εξυγιαντικές, εξευ/στικές. Προ/σκευαστικές, σποράς, φωτ/τιδες, τελικές υλοτομίες. Αναγωγικές υλοτομίες στα πρεμνοβλαστήματα Οξυάς ώστε να ατομικοποιηθούν τα πρεμνοβλαστήματα. Εξυγιαντικές υλοτομίες σε όλες τις ενώσεις (στα γηραιά, κουφαλερά κακόμορφα, βεβλαμένα, κ.λ.π. άτομα) ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του ξυλαποθέματος με την πλήρη απομάκρυνσή τους. Παρακράτηση ορισμένων κουφαλερών, κλαδοβριθών ατόμων 1-2/ Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων στην συστάδα για διατροφή και φωλεοποίησης της ορνιθοπανίδας. Απαγόρευση μετά την υλοτομία της βοσκής αιγών επί 10ετία, μεγάλων ζώων επί 7ετία και προβάτων επί 5ετία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
5γ	Μ.π.,άτομα Οξ.,Ελ.	0,7-1,1	40-140	Σπ.,ομ.	8.394	5.228	394,02	245,45	62,28	Αν/γικές, εξυγιαντικές, εξευ/στικές. Προ/σκευαστικές, σποράς, φωτ/τιδες, τελικές υλοτομίες. Εξυγιαντικές υλοτομίες σε όλες τις ενώσεις (στα γηραιά, κουφαλερά κακόμορφα, βεβλαμένα, κ.λ.π. άτομα) ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του ξυλαποθέματος με την πλήρη απομάκρυνσή τους. Παρακράτηση ορισμένων κουφαλερών, κλαδοβριθών ατόμων 1-2/ Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων στην συστάδα για διατροφή και φωλεοποίησης της ορνιθοπανίδας. Απαγόρευση μετά την υλοτομία της βοσκής αιγών επί 10ετία, μεγάλων ζώων επί 7ετία και προβάτων επί 5ετία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
6α	Μ.π.,Οξ.,άτομ α Ελ.	0,9-1,2	Μ.π.,: 40-130 Οξ:20-60	Μ.π: Σπ.ακ., Οξ:διφ.,κορμ. ακ	Μ.Π: 27.435 Οξ:430	Μ.Π:18.070 Οξ:117	Μ.Π: 422,07 Οξ:145,87	Μ.Π: 278,00 Οξ:39,66	Μ.Π: 65,86 Οξ:27,21	Η συστάδα αποτέλεσε τμήμα πιλοτικής εφαρμογής ενός σχεδίου διαχείρισης παραγωγικού δάσους Μ. Πεύκης με ιδιαίτερο οικολογικό ρόλο στην περιοχή του Βορείου Γράμμου υπό την αιγίδα του ΕΘΙΑΓΕ (2002). Αναγ. εξυγιαντικές, εξευγενιστικές. Προ/σκευαστικές, σποράς, φωτοδότιδες,τελικές υλοτομίες. Αναγωγικές υλοτομίες στα πρεμνοβλαστήματα Οξυάς ώστε να ατομικοποιηθούν τα πρεμνοβλαστήματα (αποβλέποντας μελλοντικά στην δημιουργία συστάδων σπερμοφυούς μορφής).Εξυγιαντικές υλοτομίες σε όλες τις ενώσεις (στα γηραιά, κουφαλερά κακόμορφα, βεβλαμένα, κ.λ.π. άτομα) ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του ξυλαποθέματος με την πλήρη απομάκρυνσή τους. Παρακράτηση ορισμένων κουφαλερών, κλαδοβριθών ατόμων 1-2/ Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων στην συστάδα για διατροφή και φωλεοποίησης της ορνιθοπανίδας. Απαγόρευση μετά την υλοτομία της βοσκής αιγών επί 10ετία, μεγάλων ζώων επί 7ετία και προβάτων επί 5ετία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
6β	Μ.π.,Οξ.,άτομ α Ελ.	0,9-1,2	Μ.π.,: 20-120 Οξ:30-70	Μ.π: Σπ.ακ., Οξ:διφ.,κορμ. ακ	Μ.Π: 11.298 Οξ:3.208	Μ.Π: 8.229 Οξ:1.349	Μ.Π: 362,33 Οξ:246,80	Μ.Π: 263,92 Οξ:103,77	Μ.Π: 72,84 Οξ:42,05	Η συστάδα αποτέλεσε τμήμα πιλοτικής εφαρμογής ενός σχεδίου διαχείρισης παραγωγικού δάσους Μ. Πεύκης με ιδιαίτερο οικολογικό ρόλο στην περιοχή του Βορείου Γράμμου υπό την αιγίδα του ΕΘΙΑΓΕ (2002). Αναγ. εξυγιαντικές, εξευγενιστικές. Προ/σκευαστικές, σποράς, φωτοδότιδες, τελικές υλοτομίες. Αναγωγικές υλοτομίες στα πρεμνοβλαστήματα Οξυάς ώστε να ατομικοποιηθούν τα πρεμνοβλαστήματα (αποβλέποντας μελλοντικά στην δημιουργία συστάδων σπερμοφυούς μορφής).Εξυγιαντικές υλοτομίες σε όλες τις ενώσεις (στα γηραιά, κουφαλερά κακόμορφα, βεβλαμένα, κ.λ.π. άτομα) ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του ξυλαποθέματος με την πλήρη απομάκρυνσή τους. Παρακράτηση ορισμένων κουφαλερών, κλαδοβριθών ατόμων 1-2/ Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων στην συστάδα για διατροφή και φωλεοποίησης της ορνιθοπανίδας. Απαγόρευση μετά την υλοτομία της βοσκής αιγών επί 10ετία, μεγάλων ζώων επί 7ετία και προβάτων επί 5ετία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
6γ	Μ.π.,Οξ.,άτομ α Ελ.	0,8-1,1	Μ.π: 30-140 Οξ:30-70	Μ.π: Σπ.υπ., Οξ:διφ.,ακ.	Μ.Π: 17.251 Οξ:765	Μ.Π: 13.371 Οξ:459	Μ.Π: 423,87 Οξ:142,50	Μ.Π: 328,53 Οξ:85,47	Μ.Π: 77,51 Οξ:60,00	Η συστάδα αποτέλεσε τμήμα πιλοτικής εφαρμογής ενός σχεδίου διαχείρισης παραγωγικού δάσους Μ. Πεύκης με ιδιαίτερο οικολογικό ρόλο στην περιοχή του Βορείου Γράμμου υπό την αιγίδα του ΕΘΙΑΓΕ (2002). Αναγ. εξυγιαντικές, εξευγενιστικές. Προ/σκευαστικές, σποράς, φωτοδότιδες ,τελικές υλοτομίες. Αναγωγικές υλοτομίες στα πρεμνοβλαστήματα Οξυάς ώστε να ατομικοποιηθούν τα πρεμνοβλαστήματα (αποβλέποντας μελλοντικά στην δημιουργία συστάδων σπερμοφυούς μορφής).Εξυγιαντικές υλοτομίες σε όλες τις ενώσεις (στα γηραιά, κουφαλερά κακόμορφα, βεβλαμένα, κ.λ.π. άτομα) ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του ξυλαποθέματος με την πλήρη απομάκρυνσή τους. Παρακράτηση ορισμένων κουφαλερών, κλαδοβριθών ατόμων 1-2/ Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων στην συστάδα για διατροφή και φωλεοποίησης της ορνιθοπανίδας. Απαγόρευση μετά την υλοτομία της βοσκής αιγών επί 10ετία, μεγάλων ζώων επί 7ετία και προβάτων επί 5ετία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
6δ	Μ.π.,άτομα Οξ.	0,7-1,0	30-120	Σπ.,υπ.,ακ.	3.337	2.584	288,89	223,72	77,43	Η συστάδα αποτέλεσε τμήμα πιλοτικής εφαρμογής ενός σχεδίου διαχείρισης παραγωγικού δάσους Μ. Πεύκης με ιδιαίτερο οικολογικό ρόλο στην περιοχή του Βορείου Γράμμου υπό την αιγίδα του ΕΘΙΑΓΕ (2002). Πυκνοφυτείες Μ. Πεύκης στο ανώτερο τμήμα της συστάδας. Καλλιεργητικές, εξυγιαντικές, εξευγενιστικές. Προ/σκευαστικές, σποράς, φωτοδότιδες υλοτομίες. Εξυγιαντικές υλοτομίες σε όλες τις ενώσεις (στα γηραιά, κουφαλερά κακόμορφα, βεβλαμένα, κ.λ.π. Ατομα) ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του ξυλαποθέματος με την πλήρη απομάκρυνσή τους. Παρακράτηση ορισμένων κουφαλερών, κλαδοβριθών ατόμων 1-2/ Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων στην συστάδα για διατροφή και φωλεοποίησης της	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	ΣV συστάδας	V κλάσεων διαμέτρου >34 cm	ΣV συστάδας / ha	V κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
										ορνιθοπανίδας. Απαγόρευση μετά την υλοτομία της βοσκής αιγών επί 10ετία, μεγάλων ζώων επί 7ετία και προβάτων επί 5ετία.	
7α	Μ.π.,Οξ.,άτομ α Ελ.	0,8-1,1	Μ.π: 40-80 Οξ:10-70	Μ.π: Σπ.ομ., Οξ:διφ.,ακ.	Μ.Π: 1.888 Οξ:9.550	Μ.Π: 1.395 Οξ:1.850	Μ.Π: 109,44 Οξ:388,24	Μ.Π: 80,87 Οξ:75,20	Μ.Π:73,89 Οξ:19,37	Πυκνοφυτείες Μ. Πεύκης κατά θέσεις εντός της συστάδας. Αν/γικές, εξυγιαντικές, εξευ/στικές. Προπαρασκευαστικές, σποράς, φωτ/τίδες, τελικές υλοτομίες. Αναγωγικές υλοτομίες στα πρεμνοβλαστήματα Οξυάς ώστε να ατομικοποιηθούν τα πρεμνοβλαστήματα. Εξυγιαντικές υλοτομίες σε όλες τις ενώσεις (στα γηραιά, κουφαλερά κακόμορφα, βεβλαμένα, κ.λ.π. άτομα) ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του ξυλαποθέματος με την πλήρη απομάκρυνσή τους. Παρακράτηση ορισμένων κουφαλερών, κλαδοβριθών ατόμων 1-2/ Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων στην συστάδα για διατροφή και φωλεοποίησης της ορνιθοπανίδας. Απαγόρευση μετά την υλοτομία της βοσκής αιγών επί 10ετία, μεγάλων ζώων επί 7ετία και προβάτων επί 5ετία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
7β	Μ.π.,Οξ.,άτομ α Λ.π..	0,7-1,1	Μ.π: 40-100 Οξ:30-70	Μ.π: Σπ., ακ. Οξ:διφ.,ομ.	Μ.Π: 2.039 Οξ:2.184	Μ.Π: 1.181 Οξ:292	Μ.Π: 138,27 Οξ:235,97	Μ.Π: 80,07 Οξ:31,57	Μ.Π: 57,92 Οξ:13,37	Αναγωγικές, εξυγιαντικές, εξευγενιστικές. Προπ/σκευαστικές, σποράς, φωτοδότιδες υλοτομίες. Αναγωγικές υλοτομίες στα πρεμνοβλαστήματα Οξυάς ώστε να ατομικοποιηθούν τα πρεμνοβλαστήματα (αποβλέποντας μελλοντικά στην δημιουργία συστάδων σπερμοφυούς μορφής). Εξυγιαντικές υλοτομίες σε όλες τις ενώσεις (στα γηραιά, κουφαλερά κακόμορφα, βεβλαμένα, κ.λ.π. Ατομα) ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του ξυλαποθέματος με την πλήρη απομάκρυνσή τους. Παρακράτηση ορισμένων κουφαλερών, κλαδοβριθών ατόμων 1-2/ Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων στην συστάδα για διατροφή και φωλεοποίησης της ορνιθοπανίδας. Απαγόρευση μετά την υλοτομία της βοσκής αιγών επί 10ετία, μεγάλων ζώων επί 7ετία και προβάτων επί 5ετία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
7γ	Μ.π.,Οξ.,άτομ α Ελ.	0,8-1,1	Μ.π: 30-150 Οξ:30-70	Μ.π: Σπ.,υπ., ακ. Οξ:διφ.,ακ..	Μ.Π: 2.327 Οξ:4.485	Μ.Π: 1.852 Οξ:1.925	Μ.Π: 200,62 Οξ:250,59	Μ.Π: 159,66 Οξ:107,54	Μ.Π: 79,59 Οξ:42,92	Αναγωγικές, εξυγιαντικές, εξευγενιστικές. Προπ/σκευαστικές, σποράς, φωτοδότιδες υλοτομίες. Αναγωγικές υλοτομίες στα πρεμνοβλαστήματα Οξυάς ώστε να ατομικοποιηθούν τα πρεμνοβλαστήματα (αποβλέποντας μελλοντικά στην δημιουργία συστάδων σπερμοφυούς μορφής). Εξυγιαντικές υλοτομίες σε όλες τις ενώσεις (στα γηραιά, κουφαλερά κακόμορφα, βεβλαμένα, κ.λ.π. Ατομα) ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του ξυλαποθέματος με την πλήρη απομάκρυνσή τους. Παρακράτηση ορισμένων κουφαλερών, κλαδοβριθών ατόμων 1-2/ Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων στην συστάδα για διατροφή και φωλεοποίησης της ορνιθοπανίδας. Απαγόρευση μετά την υλοτομία της βοσκής αιγών επί 10ετία, μεγάλων ζώων επί 7ετία και προβάτων επί 5ετία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
8α	Μ.π.,Οξ.,άτομ α Ελ.	0,7-1,1	Μ.π: 30-140 Οξ:30-70	Μ.π: Σπ.,υπ., ακ. Οξ:διφ.,ακ..	Μ.Π: 5.564 Οξ:3.537	Μ.Π: 4.258 Οξ:1.862	Μ.Π: 220,78 Οξ:156,47	Μ.Π: 168,97 Οξ:82,39	Μ.Π: 76,53 Οξ:52,64	Αναγωγικές, εξυγιαντικές, εξευγενιστικές, Προπ/σκευαστικές, σποράς, φωτοδότιδες, τελικές υλοτομίες. Αναγωγικές υλοτομίες στα πρεμνοβλαστήματα Οξυάς ώστε να ατομικοποιηθούν τα πρεμνοβλαστήματα (αποβλέποντας μελλοντικά στην δημιουργία συστάδων σπερμοφυούς μορφής). Εξυγιαντικές υλοτομίες σε όλες τις ενώσεις (στα γηραιά, κουφαλερά κακόμορφα, βεβλαμένα, κ.λ.π. Ατομα) ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του ξυλαποθέματος με την πλήρη απομάκρυνσή τους. Παρακράτηση ορισμένων κουφαλερών, κλαδοβριθών ατόμων 1-2/ Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων στην συστάδα για διατροφή και φωλεοποίησης της ορνιθοπανίδας. Απαγόρευση μετά την υλοτομία της βοσκής αιγών επί 10ετία, μεγάλων ζώων επί 7ετία και προβάτων επί 5ετία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
8β	Μ.π.,Οξ.άτομ αΕλ.	0,8-1,2	Μ.π,Ελ: 20-120 Οξ:30-70	Μ.π,Ελ: Σπ.ακ., Οξ:διφ.,κορμ. ακ	Μ.Π: 2.258 Οξ:8.155 Ελ:1.304	Μ.Π: 1.590 Οξ:2.397 Ελ:220	Μ.Π: 179,93 Οξ:271,36 Ελ:263,30	Μ.Π: 321,21 Οξ:79,77 Ελ:44,44	Μ.Π: 70,42 Οξ:29,39 Ελ:16,87	Αναγωγικές - εξυγιαντικές. Προπαρασκευαστικές, σποράς, φωτοδότιδες, τελικές. Αναγωγικές υλοτομίες στα πρεμνοβλαστήματα Οξυάς ώστε να ατομικοποιηθούν τα πρεμνοβλαστήματα (αποβλέποντας μελλοντικά στην δημιουργία συστάδων σπερμοφυούς μορφής). Εξυγιαντικές υλοτομίες σε όλες τις ενώσεις (στα γηραιά, κουφαλερά κακόμορφα, βεβλαμένα, κ.λ.π. άτομα) ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του ξυλαποθέματος με την πλήρη απομάκρυνσή τους. Παρακράτηση ορισμένων κουφαλερών, κλαδοβριθών ατόμων 1-2/ Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων στην συστάδα για διατροφή και φωλεοποίησης της ορνιθοπανίδας. Απαγόρευση μετά την υλοτομία της βοσκής αιγών επί 10ετία, μεγάλων ζώων επί 7ετία και προβάτων επί 5ετία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
8γ	Ελ.,Οξ.άτομα. Μ.π	0,8-1,2	Ελ: 10-100 Οξ:10-60	Ελ: Σπ.υπ.,ακ., Οξ:διφ.,ακ.	Ελ: 7.688 Οξ:8.319 Μ.π :348	Ελ: 1.850 Οξ:1.508 Μ.π :255	Ελ: 189,59 Οξ:178,72 Μ.π :106,86	Ελ: 45,62 Οξ:32,40 Μ.π :78,46	Ελ: 24,06 Οξ:18,13 Μ.π :73,28	Αναγωγικές - εξυγιαντικές. Προπαρασκευαστικές, σποράς, φωτοδότιδες, τελικές. Εξυγιαντικές υλοτομίες σε όλες τις ενώσεις (στα γηραιά, κουφαλερά κακόμορφα, βεβλαμένα, κ.λ.π. άτομα) ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του ξυλαποθέματος με την πλήρη απομάκρυνσή τους. Παρακράτηση ορισμένων κουφαλερών, κλαδοβριθών ατόμων 1-2/ Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων στην συστάδα για διατροφή και φωλεοποίησης της ορνιθοπανίδας. Απαγόρευση μετά την υλοτομία της βοσκής αιγών επί 10ετία, μεγάλων ζώων επί 7ετία και προβάτων επί 5ετία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
8δ	Οξ., Ελ.,Μ.π.	0,9-1,2	Οξ,Ελ: 30-70 Μ.π :40-100	Ελ.,Μπ: Σπ.υπ.,ακ. Οξ:διφ.,ακ.	Ελ: 4.208 Οξ:5.614 Μ.π :602	Ελ: 1.013 Οξ:1.514 Μ.π :386	Ελ: 189,59 Οξ: 252,87 Μ.π :301,34	Ελ: 45,63 Οξ: 68,2 Μ.π :193,00	Ελ: 24,07 Οξ: 26,97 Μ.π :64,12	Αναγωγικές - εξυγιαντικές. Προπαρασκευαστικές, σποράς, φωτοδότιδες, τελικές. Αναγωγικές υλοτομίες στα πρεμνοβλαστήματα Οξυάς ώστε να ατομικοποιηθούν τα πρεμνοβλαστήματα (αποβλέποντας μελλοντικά στην δημιουργία συστάδων σπερμοφυούς μορφής). Εξυγιαντικές υλοτομίες σε όλες τις ενώσεις (στα γηραιά, κουφαλερά κακόμορφα, βεβλαμένα, κ.λ.π. άτομα) ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του ξυλαποθέματος με την πλήρη απομάκρυνσή τους.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	ΣΥ συστάδας	V κλάσεων διαμέτρου >34 cm	ΣΥ συστάδας / ha	V κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
										Παρακράτηση ορισμένων κουφαλερών, κλαδοβριθών ατόμων 1-2/ Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων στην συστάδα για διατροφή και φωλεοποίησης της ορνιθοπανίδας. Απαγόρευση μετά την υλοτομία της βοσκής αιγών επί 10ετία, μεγάλων ζώων επί 7ετία και προβάτων επί 5ετία.	
9α	Μ.π, Δρ.	0,7-1,1	Μ.π: 40-120 Δρ:30-70	Μ.π: Σπ.,ομ. Δρ:διφ.,ομ.	Μ.π: 16.636 Δρ:256	Μ.π: 16.313 Δρ:88	Μ.π: 265,74 Δρ:45,71	Μ.π: 260,59 Δρ:15,71	Μ.π: 98,06 Δρ:34,38	Αναγωγικές - εξυγιαντικές. Προπαρασκευαστικές, σποράς, φωτοδοτίδες, τελικές. Αναγωγικές υλοτομίες στα πρεμνοβλαστήματα Δρυός ώστε να ατομικοποιηθούν τα πρεμνοβλαστήματα (αποβλέποντας μελλοντικά στην δημιουργία συστάδων σπερμοφυούς μορφής). Εξυγιαντικές υλοτομίες σε όλες τις ενώσεις (στα γηραιά, κουφαλερά κακόμορφα, βεβλαμένα, κ.λ.π. άτομα) ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του ξυλαποθέματος με την πλήρη απομάκρυνσή τους. Παρακράτηση ορισμένων κουφαλερών, κλαδοβριθών ατόμων 1-2/ Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων στην συστάδα για διατροφή και φωλεοποίησης της ορνιθοπανίδας. Απαγόρευση μετά την υλοτομία της βοσκής αιγών επί 10ετία, μεγάλων ζώων επί 7ετία και προβάτων επί 5ετία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
9β	Μ.π, Δρ., Οξ.	0,8-1,1	Μ.π: 40-120 Δρ:30-70	Μ.π: Σπ.,ομ. Δρ:διφ.,ομ.	Μ.π: 10.122 Δρ:417	Μ.π: 8.297 Δρ:338	Μ.π: 210,88 Δρ:148,68	Μ.π: 172,85 Δρ:120,71	Μ.π: 81,97 Δρ:81,06	Παρατηρούνται φαινόμενα λαθροϋλοτομίας κυρίως στις ενώσεις Δρυός και Οξυάς. Αναγωγικές - εξυγιαντικές. Προπαρασκευαστικές, σποράς, φωτοδοτίδες υλοτομίες. Αναγωγικές υλοτομίες στα πρεμνοβλαστήματα Δρυός ώστε να ατομικοποιηθούν τα πρεμνοβλαστήματα (αποβλέποντας μελλοντικά στην δημιουργία συστάδων σπερμοφυούς μορφής). Εξυγιαντικές υλοτομίες σε όλες τις ενώσεις (στα γηραιά, κουφαλερά κακόμορφα, βεβλαμένα, κ.λ.π. άτομα) ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του ξυλαποθέματος με την πλήρη απομάκρυνσή τους. Παρακράτηση ορισμένων κουφαλερών, κλαδοβριθών ατόμων 1-2/ Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων στην συστάδα για διατροφή και φωλεοποίησης της ορνιθοπανίδας. Απαγόρευση μετά την υλοτομία της βοσκής αιγών επί 10ετία, μεγάλων ζώων επί 7ετία και προβάτων επί 5ετία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
10α	Μ.π.,Οξ.,άτομ α Δρ.	0,8-1,2	Μ.π.,: 20-120 Οξ:30-70	Μ.π: Σπ.,υπ.ακ., Οξ:διφ.,κορμ. ακ	Μ.Π:9.905 Οξ:4.277	Μ.Π:6.523 Οξ:1.996	Μ.Π:356,9 3 Οξ:324,06	Μ.Π:235,0 6 Οξ:151,21	Μ.Π:65,86 Οξ:46,67	Αναγωγικές - εξυγιαντικές. Προπαρασκευαστικές και υλοτομίες σποράς . Αναγωγικές υλοτομίες στα πρεμνοβλαστήματα Οξυάς ώστε να ατομικοποιηθούν τα πρεμνοβλαστήματα (αποβλέποντας μελλοντικά στην δημιουργία συστάδων σπερμοφυούς μορφής). Εξυγιαντικές υλοτομίες σε όλες τις ενώσεις (στα γηραιά, κουφαλερά κακόμορφα, βεβλαμένα, κ.λ.π. άτομα) ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του ξυλαποθέματος με την πλήρη απομάκρυνσή τους. Παρακράτηση ορισμένων κουφαλερών, κλαδοβριθών ατόμων 1-2/ Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων στην συστάδα για διατροφή και φωλεοποίησης της ορνιθοπανίδας. Απαγόρευση μετά την υλοτομία της βοσκής αιγών επί 10ετία, μεγάλων ζώων επί 7ετία και προβάτων επί 5ετία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
10β	Μ.π.,Οξ.	1,0-1,2	Μ.π.,: 20-120 Οξ:30-120	Μ.π: Σπ.,υπ.ακ., Οξ:διφ.,κορμ. ακ	Μ.Π:4.638 Οξ:7.639	Μ.Π:3.449 Οξ:2.299	Μ.Π:167,1 0 Οξ:358,80	Μ.Π:124,2 4 Οξ:107,98	Μ.π:74,36 Οξ:30,10	'Εχει χαρακτηριστεί ως Μνημείο της Φύσης. Καμία ανθρωπογενής επέμβαση.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
10γ	Μ.π.,Οξ.	1,0-1,2	Μ.π.,: 20-120 Οξ:30-160	Μ.π: Σπ.,υπ.ακ., Οξ:διφ.,κορμ. ακ	Μ.Π:5.998 Οξ:19.482	Μ.Π:3.651 Οξ:13.429	Μ.Π:172,3 2 Οξ:391,05	Μ.Π:104,8 8 Οξ:269,55	Μ.Π:60,87 Οξ:68,93	'Εχει χαρακτηριστεί ως Μνημείο της Φύσης. Καμία ανθρωπογενής επέμβαση.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
10δ	Μ.π.,Οξ.	0,8-1,2	Μ.π.,: 20-120 Οξ:30-160	Μ.π: Σπ.,υπ.ακ., Οξ:διφ.,κορμ. ακ	Μ.Π:3.409 Οξ:23.487	Μ.Π:2.762 Οξ:12.986	Μ.Π:150,5 4 Οξ:427,29	Μ.Π:121,9 4 Οξ:236,24	Μ.Π:81,02 Οξ:55,29	'Εχει χαρακτηριστεί ως Μνημείο της Φύσης. Καμία ανθρωπογενής επέμβαση.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
11α	άτομα Μ.π.,Οξ.	0,2-0,5	Μ.π.,: 20-120	Μ.π: Σπ.,ακ.,						Η συστάδα έχει τεθεί εκτός διαχείρισης λόγω έλλειψης ξυλώδους κεφαλαίου και μικρής συγκόμωσης. Σχεδόν ολόκληρη η έκταση καλύπτεται από χορτολιβαδικές εκτάσεις. Χρησιμοποιείται ως αλπικός βοσκότοπος	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
11β	άτομα Μ.π.,Οξ.	0,2-0,5	20-120	Μ.π: Σπ.,ακ.,						Η συστάδα έχει τεθεί εκτός διαχείρισης λόγω έλλειψης ξυλώδους κεφαλαίου και μικρής συγκόμωσης.Υπαρξη ναρκοπεδίου. Σχεδόν ολόκληρη η έκταση καλύπτεται από χορτολιβαδικές εκτάσεις. Χρησιμοποιείται ως αλπικός βοσκότοπος	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
11γ	Μ.π.,Οξ.	0,8-1,1	Μ.π.,: 20-90 Οξ:10-70	Μ.π: Σπ.,ακ., Οξ:διφ.,ακ	Μ.Π:18.908 Οξ:1.281	Μ.Π:7.531 Οξ:879	Μ.Π:366,5 1 Οξ:183,60	Μ.Π:145,9 8 Οξ:125,93	Μ.Π:39,83 Οξ:68,62	Αναγεννητικές εξυγιαντικές, εξευγενιστικές, προπαρασκευαστικές υλοτομίες. Εξυγιαντικές υλοτομίες σε όλες τις ενώσεις (στα γηραιά, κουφαλερά κακόμορφα, βεβλαμένα, κ.λ.π. άτομα) ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του ξυλαποθέματος με την πλήρη απομάκρυνσή τους. Παρακράτηση ορισμένων κουφαλερών, κλαδοβριθών ατόμων 1-2/ Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων στην συστάδα για διατροφή και φωλεοποίησης της ορνιθοπανίδας. Απαγόρευση μετά την υλοτομία της βοσκής αιγών επί 10ετία, μεγάλων ζώων επί 7ετία και προβάτων επί 5ετία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	ΣV συστάδας	V κλάσεων διαμέτρου >34 cm	ΣV συστάδας / ha	V κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
11δ	Μ.π.,Οξ.Ελ., Λεύκη	0,7-1,1	Μ.π.: 20-90 Οξ:10-70	Μ.π.: Σπ.,ομ.,υπ. Οξ:διφ.,ακ	Μ.Π:3.533 Οξ:10.413 Ελ:135 Λευ:588	Μ.Π:3.057 Οξ:5.417 Ελ:67 Λευ:0	Μ.Π:116,8 1 Οξ:285,58 Ελ:26,70 Λευ:151,04	Μ.Π:101,0 6 Οξ:148,57 Ελ:13,21 Λευ:0	Μ.Π:86,53 Οξ:52,02 Ελ:49,63 Λευ:0	Αναγεννητικές εξυγιαντικές, εξευγενιστικές, προπαρασκευαστικές, σποράς, φωτοδότιδες υλοτομίες. Εξυγιαντικές υλοτομίες σε όλες τις ενώσεις (στα γηραιά, κουφαλερά κακόμορφα, βεβλαμένα, κ.λ.π. άτομα) ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του ξυλαποθέματος με την πλήρη απομάκρυνσή τους. Παρακράτηση ορισμένων κουφαλερών, κλαδοβριθών ατόμων 1-2/ Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων στην συστάδα για διατροφή και φωλεοποίησης της ορνιθοπανίδας. Απαγόρευση μετά την υλοτομία της βοσκής αιγών επί 10ετία, μεγάλων ζώων επί 7ετία και προβάτων επί 5ετία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
12α	Μ.π.,Οξ.	0,7-1,1	Μ.π: 20-90 Οξ:30-70	Μ.π: Σπ.,ακ. Οξ:διφ.,αν.	Μ.Π:8.677 Οξ:7.278	Μ.Π:6.782 Οξ:4.260	Μ.Π:173,0 8 Οξ:249,08	Μ.Π:135,2 9 Οξ:145,79	Μ.Π:78,16 Οξ:58,53	Αναγεννητικές εξυγιαντικές, εξευγενιστικές, προπαρασκευαστικές, σποράς, φωτοδότιδες υλοτομίες. Εξυγιαντικές υλοτομίες σε όλες τις ενώσεις (στα γηραιά, κουφαλερά κακόμορφα, βεβλαμένα, κ.λ.π. άτομα) ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του ξυλαποθέματος με την πλήρη απομάκρυνσή τους. Παρακράτηση ορισμένων κουφαλερών, κλαδοβριθών ατόμων 1-2/ Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων στην συστάδα για διατροφή και φωλεοποίησης της ορνιθοπανίδας. Απαγόρευση μετά την υλοτομία της βοσκής αιγών επί 10ετία, μεγάλων ζώων επί 7ετία και προβάτων επί 5ετία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
12β	Μ.π, Οξ., Δρ.	0,8-1,1	Μ.π: 20-120 Οξ:30-70 Δρ:20-60	Μ.π: Σπ.,ακ. Οξ., Δρ:διφ.,κορ., ακ.	Μ.π: 11.791 Οξ:1.282 Δρ:1.613	Μ.π: 5.006 Οξ:538 Δρ:753	Μ.π: 230,04 Οξ:180,24 Δρ:69,40	Μ.π: 51,26 Οξ:75,67 Δρ:32,39	Μ.π:42,46 Οξ:41,97 Δρ:46,68	Αναγωγικές - εξυγιαντικές. Προπαρασκευαστικές, σποράς, φωτοδότιδες υλοτομίες. Αναγωγικές υλοτομίες στα πρεμνοβλαστήματα Δρυός και Οξυάς ώστε να ατομικοποιηθούν τα πρεμνοβλαστήματα (αποβλέποντας μελλοντικά στην δημιουργία συστάδων σπερμοφυούς μορφής). Εξυγιαντικές υλοτομίες σε όλες τις ενώσεις (στα γηραιά, κουφαλερά κακόμορφα, βεβλαμένα, κ.λ.π. άτομα) ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του ξυλαποθέματος με την πλήρη απομάκρυνσή τους. Παρακράτηση ορισμένων κουφαλερών, κλαδοβριθών ατόμων 1-2/ Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων στην συστάδα για διατροφή και φωλεοποίησης της ορνιθοπανίδας. Απαγόρευση μετά την υλοτομία της βοσκής αιγών επί 10ετία, μεγάλων ζώων επί 7ετία και προβάτων επί 5ετία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
12γ	Μ.π.,Οξ.	0,7-1,2	Μ.π: 20-100 Οξ:30-50	Μ.π: Σπ.,ακ. Οξ:διφ.,ομ.	Μ.Π:3.191 Οξ:6.767	Μ.Π:2.662 Οξ:502	Μ.Π:166,6 2 Οξ:290,02	Μ.Π:138,6 5 Οξ:21,52	Μ.Π:83,42 Οξ:7,42	Αναγωγικές - εξυγιαντικές. Προπαρασκευαστικές, σποράς υλοτομίες. Αναγωγικές υλοτομίες στα πρεμνοβλαστήματα Οξυάς ώστε να ατομικοποιηθούν τα πρεμνοβλαστήματα (αποβλέποντας μελλοντικά στην δημιουργία συστάδων σπερμοφυούς μορφής). Εξυγιαντικές υλοτομίες σε όλες τις ενώσεις (στα γηραιά, κουφαλερά κακόμορφα, βεβλαμένα, κ.λ.π. άτομα) ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του ξυλαποθέματος με την πλήρη απομάκρυνσή τους. Παρακράτηση ορισμένων κουφαλερών, κλαδοβριθών ατόμων 1-2/ Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων στην συστάδα για διατροφή και φωλεοποίησης της ορνιθοπανίδας. Απαγόρευση μετά την υλοτομία της βοσκής αιγών επί 10ετία, μεγάλων ζώων επί 7ετία και προβάτων επί 5ετία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
12δ	Μ.π, Οξ., Δρ.	0,8-1,2	Μ.π: 20-120 Οξ:30-70 Δρ:20-60	Μ.π: Σπ.,ακ. Οξ., Δρ:διφ.,κορ., ακ.	Μ.π: 18.244 Οξ:2.054 Δρ:4.095	Μ.π: 10.383 Οξ:241 Δρ:0	Μ.π: 236,37 Οξ:153,65 Δρ:64,11	Μ.π: 134,53 Οξ:18,03 Δρ:0	Μ.π: 56,91 Οξ:11,73 Δρ:0	Αναγωγικές - εξυγιαντικές. Προπαρασκευαστικές, σποράς, φωτοδότιδες, τελικές υλοτομίες. Αναγωγικές υλοτομίες στα πρεμνοβλαστήματα Δρυός και Οξυάς ώστε να ατομικοποιηθούν τα πρεμνοβλαστήματα (αποβλέποντας μελλοντικά στην δημιουργία συστάδων σπερμοφυούς μορφής). Εξυγιαντικές υλοτομίες σε όλες τις ενώσεις (στα γηραιά, κουφαλερά κακόμορφα, βεβλαμένα, κ.λ.π. άτομα) ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του ξυλαποθέματος με την πλήρη απομάκρυνσή τους. Παρακράτηση ορισμένων κουφαλερών, κλαδοβριθών ατόμων 1-2/ Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων στην συστάδα για διατροφή και φωλεοποίησης της ορνιθοπανίδας. Απαγόρευση μετά την υλοτομία της βοσκής αιγών επί 10ετία, μεγάλων ζώων επί 7ετία και προβάτων επί 5ετία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
12ε	Μ.π.,Οξ.Ελ.	0,8-1,1	Μ.π.: 20-120 Οξ.:30-80, Ελ:20-40	Μ.π: Σπ.,ομ. Οξ:διφ.,κορ., ακ	Μ.Π:10.656 Οξ:10.748 Ελ:419	Μ.Π:2.845 Οξ:2.335 Ελ:0	Μ.Π:323,4 2 Οξ:219,60 Ελ:44,24	Μ.Π:86,34 Οξ:47,71 Ελ:0	Μ.Π:26,70 Οξ:21,72 Ελ:0	Αναγωγικές - εξυγιαντικές. Προπαρασκευαστικές, σποράς, φωτοδότιδες, υλοτομίες σποράς. Αναγωγικές υλοτομίες στα πρεμνοβλαστήματα Οξυάς ώστε να ατομικοποιηθούν τα πρεμνοβλαστήματα (αποβλέποντας μελλοντικά στην δημιουργία συστάδων σπερμοφυούς μορφής). Εξυγιαντικές υλοτομίες σε όλες τις ενώσεις (στα γηραιά, κουφαλερά κακόμορφα, βεβλαμένα, κ.λ.π. άτομα) ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του ξυλαποθέματος με την πλήρη απομάκρυνσή τους. Παρακράτηση ορισμένων κουφαλερών, κλαδοβριθών ατόμων 1-2/ Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων στην συστάδα για διατροφή και φωλεοποίησης της ορνιθοπανίδας. Απαγόρευση μετά την υλοτομία της βοσκής αιγών επί 10ετία, μεγάλων ζώων επί 7ετία και προβάτων επί 5ετία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
13α	Μ.π.,Οξ.Ελ.	0,8-1,1	Μ.π.: 20-120 Οξ.:30-80, Ελ:20-40	Μ.π.:Ελ: Σπ.,ομ. Οξ:διφ.,κορ., ακ	Μ.Π:30.428 Οξ:4.342 Ελ:176	Μ.Π:14.435 Οξ:1.578 Ελ:64	Μ.Π:431,0 5 Οξ:141,20 Ελ:38,82	Μ.Π:204,4 9 Οξ:51,32 Ελ:14,13	Μ.Π:47,44 Οξ:36,34 Ελ:36,36	Αναγωγικές - εξυγιαντικές. Προπαρασκευαστικές, σποράς, φωτοδότιδες, υλοτομίες σποράς και τελικές. Αναγωγικές υλοτομίες στα πρεμνοβλαστήματα Οξυάς ώστε να ατομικοποιηθούν τα πρεμνοβλαστήματα (αποβλέποντας μελλοντικά στην δημιουργία συστάδων σπερμοφυούς μορφής). Εξυγιαντικές υλοτομίες σε όλες τις ενώσεις (στα γηραιά, κουφαλερά κακόμορφα, βεβλαμένα, κ.λ.π. άτομα) ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του ξυλαποθέματος με την πλήρη απομάκρυνσή τους. Παρακράτηση ορισμένων κουφαλερών, κλαδοβριθών ατόμων 1-2/ Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων στην συστάδα για διατροφή και φωλεοποίησης της ορνιθοπανίδας. Απαγόρευση μετά την υλοτομία της βοσκής αιγών επί 10ετία, μεγάλων ζώων επί 7ετία και προβάτων επί 5ετία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	ΣV συστάδας	V κλάσεων διαμέτρου >34 cm	ΣV συστάδας / ha	V κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
13β	Μ.π.,Οξ,Ελ.	0,7-1,1	Μ.π.,: 20-120 Οξ.:30-70, Ελ:20-80	Μ.π: Ελ: Σπ.,ομ. Οξ:διφ.,κορ., ακ	Μ.Π:13.378 Οξ:6.656 Ελ:710	Μ.Π:11.518 Οξ:3.440 Ελ:286	Μ.Π:202,7 9 Οξ:351,80 Ελ:36,30	Μ.Π:174,5 9 Οξ:181,82 Ελ:14,62	Μ.Π:86,10 Οξ:51,68 Ελ:40,28	Αναγωγικές - εξυγιαντικές. Προπαρασκευαστικές, σποράς, φωτοδότιδες, υλοτομίες σποράς και τελικές. Αναγωγικές υλοτομίες στα πρεμνοβλαστήματα Οξυάς ώστε να ατομικοποιηθούν τα πρεμνοβλαστήματα (αποβλέποντας μελλοντικά στην δημιουργία συστάδων σπερμοφυούς μορφής). Εξυγιαντικές υλοτομίες σε όλες τις ενώσεις (στα γηραιά, κουφαλερά κακόμορφα, βεβλαμένα, κ.λ.π. άτομα) ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του ξυλαποθέματος με την πλήρη απομάκρυνσή τους. Παρακράτηση ορισμένων κουφαλερών, κλαδοβριθών ατόμων 1-2/ Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων στην συστάδα για διατροφή και φωλεοποίησης της ορνιθοπανίδας. Απαγόρευση μετά την υλοτομία της βοσκής αιγών επί 10ετία, μεγάλων ζώων επί 7ετία και προβάτων επί 5ετία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
13γ	Μ.π.,Οξ,Ελ.	0,7-1,1	Μ.π.,: 20-120 Οξ.:30-70, Ελ:20-80	Μ.π: Ελ: Σπ.,ομ. Οξ:διφ.,κορ., ακ	Μ.Π:5.397 Οξ:5.949 Ελ:930	Μ.Π:3.557 Οξ:1.267 Ελ:554	Μ.Π:116,5 2 Οξ:232,30 Ελ:174,60	Μ.Π:76,81 Οξ:49,47 Ελ:103,94	Μ.Π:65,91 Οξ:21,30 Ελ:59,57	Αναγωγικές - εξυγιαντικές. Προπαρασκευαστικές, σποράς, φωτοδότιδες, υλοτομίες σποράς και τελικές. Αναγωγικές υλοτομίες στα πρεμνοβλαστήματα Οξυάς ώστε να ατομικοποιηθούν τα πρεμνοβλαστήματα (αποβλέποντας μελλοντικά στην δημιουργία συστάδων σπερμοφυούς μορφής). Εξυγιαντικές υλοτομίες σε όλες τις ενώσεις (στα γηραιά, κουφαλερά κακόμορφα, βεβλαμένα, κ.λ.π. άτομα) ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του ξυλαποθέματος με την πλήρη απομάκρυνσή τους. Παρακράτηση ορισμένων κουφαλερών, κλαδοβριθών ατόμων 1-2/ Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων στην συστάδα για διατροφή και φωλεοποίησης της ορνιθοπανίδας. Απαγόρευση μετά την υλοτομία της βοσκής αιγών επί 10ετία, μεγάλων ζώων επί 7ετία και προβάτων επί 5ετία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
14α	Μ.π.,Οξ.,Δρ., Λεύκη	0,8-1,2	Μ.π.,: 20-120 Οξ:30-70 Λευ:20-80	Μ.π: Σπ.,ομ.,υπ. Οξ:,Δρ.,Λευ: διφ.,κορμ.,ακ.	Μ.Π:8.679 Οξ:4.904 Δρ:239 Λευ:1.223	Μ.Π:5.907 Οξ:2.417 Δρ:132 Λευ:887	Μ.Π:326,7 5 Οξ:155,82 Δρ:92,58 Λευ:104,70	Μ.Π:222,4 0 Οξ:76,80 Δρ:51,16 Λευ:75,94	Μ.Π:68,06 Οξ:49,29 Δρ:55,23 Λευ:72,53	Αναγωγικές - εξυγιαντικές. Προπαρασκευαστικές, σποράς, φωτοδότιδες, υλοτομίες σποράς και τελικές. Αναγωγικές υλοτομίες στα πρεμνοβλαστήματα Οξυάς ώστε να ατομικοποιηθούν τα πρεμνοβλαστήματα (αποβλέποντας μελλοντικά στην δημιουργία συστάδων σπερμοφυούς μορφής). Εξυγιαντικές υλοτομίες σε όλες τις ενώσεις (στα γηραιά, κουφαλερά κακόμορφα, βεβλαμένα, κ.λ.π. άτομα) ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του ξυλαποθέματος με την πλήρη απομάκρυνσή τους. Παρακράτηση ορισμένων κουφαλερών, κλαδοβριθών ατόμων 1-2/ Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων στην συστάδα για διατροφή και φωλεοποίησης της ορνιθοπανίδας. Απαγόρευση μετά την υλοτομία της βοσκής αιγών επί 10ετία, μεγάλων ζώων επί 7ετία και προβάτων επί 5ετία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
14β	Μ.π.,Οξ.,Ελ., Δρ., Λεύκη	0,8-1,1	Μ.π: 20-120 Οξ:30-70 Λευ:20-80 Ελ:10-40	Μ.π.,Ελ: Σπ.,υπ. Οξ:,Δρ.,Λευ: πρεμ.,ακ.	Μ.Π:19.589 Οξ:1.980 Δρ:2.223 Λευ:3.326 Ελ.:653	Μ.Π:15.640 Οξ:0 Δρ:0 Λευ:3.326 Ελ.:125	Μ.Π:377,0 7 Οξ:75,47 Δρ:112,27 Λευ:110,25 Ελ.:36,78	Μ.Π:301,0 6 Οξ:0 Δρ:0 Λευ:110,25 Ελ.:7,05	Μ.Π:79,84 Οξ:0 Δρ:0 Λευ:100,00 Ελ.:19,14	Αναγωγικές - εξυγιαντικές-εξευγενιστικές. Προπαρασκευαστικές, φωτοδότιδες, υλοτομίες σποράς και τελικές. Αναγωγικές υλοτομίες στα πρεμνοβλαστήματα Οξυάς και Δρυός ώστε να ατομικοποιηθούν τα πρεμνοβλαστήματα (αποβλέποντας μελλοντικά στην δημιουργία συστάδων σπερμοφυούς μορφής). Εξυγιαντικές υλοτομίες σε όλες τις ενώσεις (στα γηραιά, κουφαλερά κακόμορφα, βεβλαμένα, κ.λ.π. άτομα) ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του ξυλαποθέματος με την πλήρη απομάκρυνσή τους. Παρακράτηση ορισμένων κουφαλερών, κλαδοβριθών ατόμων 1-2/ Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων στην συστάδα για διατροφή και φωλεοποίησης της ορνιθοπανίδας. Απαγόρευση μετά την υλοτομία της βοσκής αιγών επί 10ετία, μεγάλων ζώων επί 7ετία και προβάτων επί 5ετία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
14γ	Μ.π.,Οξ.,Δρ., Λεύκη	0,8-1,1	Μ.π.,: 20-120 Οξ:30-70 Λευ:20-80	Μ.π: Σπ.,υπ. Οξ:,Δρ.,Λευ: πρεμ.,ακ.	Μ.Π:8.096 Οξ:299 Δρ:3.402 Λευ:397	Μ.Π:5.120 Οξ:0 Δρ:303 Λευ:235	Μ.Π:131,3 5 Οξ:103,44 Δρ:60,62 Λευ:95,78	Μ.Π:83,08 Οξ:0 Δρ:5,40 Λευ:56,76	Μ.Π:63,24 Οξ:0 Δρ:8,91 Λευ:8,91	Αναγωγικές - εξυγιαντικές - εξευγενιστικές. Προπαρασκευαστικές, φωτοδότιδες, υλοτομίες σποράς και τελικές. Αναγωγικές υλοτομίες στα πρεμνοβλαστήματα Οξυάς και Δρυός ώστε να ατομικοποιηθούν τα πρεμνοβλαστήματα (αποβλέποντας μελλοντικά στην δημιουργία συστάδων σπερμοφυούς μορφής). Εξυγιαντικές υλοτομίες σε όλες τις ενώσεις (στα γηραιά, κουφαλερά κακόμορφα, βεβλαμένα, κ.λ.π. άτομα) ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του ξυλαποθέματος με την πλήρη απομάκρυνσή τους. Παρακράτηση ορισμένων κουφαλερών, κλαδοβριθών ατόμων 1-2/ Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων στην συστάδα για διατροφή και φωλεοποίησης της ορνιθοπανίδας. Απαγόρευση μετά την υλοτομία της βοσκής αιγών επί 10ετία, μεγάλων ζώων επί 7ετία και προβάτων επί 5ετία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
17β	Μ.π.,Οξ.,Δρ.	0,9-1,1	Μ.π.,: 40-100 Οξ:40-100 Δρ:10-40	Μ.π: Σπ.,υπ. Οξ:,Δρ.: πρεμ.,αν.	Μ.Π:5.582 Οξ:8.618 Δρ:1.295	Μ.Π:4.564 Οξ:6.814 Δρ:360	Μ.Π:182,7 3 Οξ:254,26 Δρ:75,17	Μ.Π:149,3 9 Οξ:201,06 Δρ:20,89	Μ.Π:81,76 Οξ:79,07 Δρ:27,80	Αναγωγικές - εξυγιαντικές,εξευγενιστικές, προπαρασκευαστικές και υλοτομίες σποράς. Αναγωγικές υλοτομίες στα πρεμνοβλαστήματα Οξυάς και Δρυός ώστε να ατομικοποιηθούν τα πρεμνοβλαστήματα (αποβλέποντας μελλοντικά στην δημιουργία συστάδων σπερμοφυούς μορφής). Εξυγιαντικές υλοτομίες σε όλες τις ενώσεις (στα γηραιά, κουφαλερά κακόμορφα, βεβλαμένα, κ.λ.π. άτομα) ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του ξυλαποθέματος με την πλήρη απομάκρυνσή τους. Παρακράτηση ορισμένων κουφαλερών, κλαδοβριθών ατόμων 1-2/ Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων στην συστάδα για διατροφή και φωλεοποίησης της ορνιθοπανίδας. Απαγόρευση μετά την υλοτομία της βοσκής αιγών επί 10ετία, μεγάλων ζώων επί 7ετία και προβάτων επί 5ετία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
17γ	Μ.π.,Οξ.,Δρ.	0,7-1,1	Μ.π.,: 60-100 Οξ., Δρ:10-40	Μ.π: Σπ.,υπ.,ακ. Οξ:,Δρ.: διφ.,ομ.	Μ.Π:14.420 Οξ:3.826 Δρ:15.376	Μ.Π:5.312 Οξ:0 Δρ:2.192	Μ.Π:202,4 9 Οξ:277,24 Δρ:202,03	Μ.Π:74,60 Οξ:0 Δρ:28,80	Μ.Π:36,84 Οξ:0 Δρ:14,26	Αναγωγικές - εξυγιαντικές, εξευγενιστικές, προπαρασκευαστικές, υλοτομίες σποράς, φωτοδότιδες και τελικές. Αναγωγικές υλοτομίες στα πρεμνοβλαστήματα Οξυάς και Δρυός ώστε να ατομικοποιηθούν τα πρεμνοβλαστήματα (αποβλέποντας μελλοντικά στην δημιουργία συστάδων σπερμοφυούς μορφής). Εξυγιαντικές υλοτομίες σε όλες τις ενώσεις (στα γηραιά, κουφαλερά κακόμορφα, βεβλαμένα, κ.λ.π. άτομα) ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του ξυλαποθέματος με την πλήρη απομάκρυνσή τους. Παρακράτηση ορισμένων	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	ΣV συστάδας	V κλάσεων διαμέτρου >34 cm	ΣV συστάδας / ha	V κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
										κουφαλερών, κλαδοβριθών ατόμων 1-2/ Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων στην συστάδα για διατροφή και φώλεοποίησης της ορνιθοπανίδας. Απαγόρευση μετά την υλοτομία της βοσκής αιγών επί 10ετία, μεγάλων ζώων επί 7ετία και προβάτων επί 5ετία.	
18α	Μ.π.,Δρ.	0,7-1,1	Μ.π.: 60-100 Δρ:10-40	Μ.π: Σπ.,υπ.,ομ. Δρ.: πρεμ.,ομ.	Μ.Π:11.582 Δρ:2.393	Μ.Π:1.971 Δρ:97	Μ.Π:285,27 Δρ:88,63	Μ.Π:48,55 Δρ:3,59	Μ.Π:17,02 Δρ:4,05	Αναγωγικές - εξυγιαντικές, εξευγενιστικές, προπαρασκευαστικές, υλοτομίες σποράς, φωτοδότιδες και τελικές. Αναγωγικές υλοτομίες στα πρεμνοβλαστήματα Δρυός ώστε να ατομικοποιηθούν τα πρεμνοβλαστήματα (αποβλέποντας μελλοντικά στην δημιουργία συστάδων σπερμοφυούς μορφής). Εξυγιαντικές υλοτομίες σε όλες τις ενώσεις (στα γηραιά, κουφαλερά κακόμορφα, βεβλαμένα, κ.λ.π. άτομα) ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του ξυλαποθέματος με την πλήρη απομάκρυνσή τους. Παρακράτηση ορισμένων κουφαλερών, κλαδοβριθών ατόμων 1-2/ Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων στην συστάδα για διατροφή και φώλεοποίησης της ορνιθοπανίδας. Απαγόρευση μετά την υλοτομία της βοσκής αιγών επί 10ετία, μεγάλων ζώων επί 7ετία και προβάτων επί 5ετία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
18β	Μ.π.,Δρ.	0,6-1,1	Μ.π.: 60-100 Δρ:10-70	Μ.π: Σπ.,υπ.,ομ. Δρ.: διφ.,ακ.	Μ.Π:6.119 Δρ:5.322	Μ.Π:1.748 Δρ:420	Μ.Π:147,45 Δρ:128,24	Μ.Π:42,12 Δρ:10,12	Μ.Π:28,57 Δρ:7,89	Αναγωγικές - εξυγιαντικές, εξευγενιστικές, προπαρασκευαστικές, υλοτομίες σποράς, φωτοδότιδες και τελικές. Αναγωγικές υλοτομίες στα πρεμνοβλαστήματα Δρυός ώστε να ατομικοποιηθούν τα πρεμνοβλαστήματα (αποβλέποντας μελλοντικά στην δημιουργία συστάδων σπερμοφυούς μορφής). Εξυγιαντικές υλοτομίες σε όλες τις ενώσεις (στα γηραιά, κουφαλερά κακόμορφα, βεβλαμένα, κ.λ.π. άτομα) ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του ξυλαποθέματος με την πλήρη απομάκρυνσή τους. Παρακράτηση ορισμένων κουφαλερών, κλαδοβριθών ατόμων 1-2/ Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων στην συστάδα για διατροφή και φώλεοποίησης της ορνιθοπανίδας. Απαγόρευση μετά την υλοτομία της βοσκής αιγών επί 10ετία, μεγάλων ζώων επί 7ετία και προβάτων επί 5ετία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
18γ	Μ.π.,Οξ.,Δρ.	0,9-1,3	Μ.π.: 60-100 Οξ., Δρ:10-70	Μ.π: Σπ.,υπ.,ομ. Οξ.,Δρ.: διφ.,ακ.	Μ.Π:8.765 Οξ:4.798 Δρ:2.078	Μ.Π:4.020 Οξ:0 Δρ:0	Μ.Π:174,95 Οξ:207,72 Δρ:117,49	Μ.Π:80,24 Οξ:0 Δρ:0	Μ.Π:45,86 Οξ:0 Δρ:0	Η συστάδα είναι εκτός διαχείρισης από την προηγούμενη δεκαετία και δεν απολήφθησαν δασικά προϊόντα λόγω του ότι η συστάδα ανήκει στο χώρο διαβίωσης της άγριας πανίδας και επίσης ασκεί προστατευτικό ρόλο. Η συστάδα βόσκειται από αιγοπρόβατα και βοοειδή.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
18δ	Μ.π.,Οξ.,Δρ.	0,9-1,2	Μ.π.: 60-100 Οξ., Δρ:10-50	Μ.π: Σπ.,ακ. Οξ.,Δρ.: πρεμ.,ομ.	Μ.Π:6.996 Οξ:5.659 Δρ:490	Μ.Π:5.924 Οξ:310 Δρ:0	Μ.Π:148,62 Οξ:164,40 Δρ:74,32	Μ.Π:125,83 Οξ:9,01 Δρ:0	Μ.Π:84,68 Οξ:5,48 Δρ:0	Αναγωγικές εξυγιαντικές, εξευγενιστικές. Προπαρασκευαστικές. Αναγωγικές υλοτομίες στα πρεμνοβλαστήματα Οξυάς και Δρυός ώστε να ατομικοποιηθούν τα πρεμνοβλαστήματα (αποβλέποντας μελλοντικά στην δημιουργία συστάδων σπερμοφυούς μορφής). Εξυγιαντικές υλοτομίες σε όλες τις ενώσεις (στα γηραιά, κουφαλερά κακόμορφα, βεβλαμένα, κ.λ.π. άτομα) ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του ξυλαποθέματος με την πλήρη απομάκρυνσή τους. Παρακράτηση ορισμένων κουφαλερών, κλαδοβριθών ατόμων 1-2/ Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων στην συστάδα για διατροφή και φώλεοποίησης της ορνιθοπανίδας. Απαγόρευση μετά την υλοτομία της βοσκής αιγών επί 10ετία, μεγάλων ζώων επί 7ετία και προβάτων επί 5ετία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
19α	Μ.π.,Οξ.,Δρ.	0,9-1,2	Μ.π.: 60-100 Οξ., Δρ:10-50	Μ.π: Σπ.,ακ. Οξ.,Δρ.: πρεμ.,ομ.	Μ.Π:6.756 Οξ:1.722	Μ.Π:6.756 Οξ:311	Μ.Π:184,68 Οξ:104,58	Μ.Π:184,68 Οξ:18,88	Μ.Π:100,00 Οξ:18,06	Η συστάδα είναι εκτός διαχείρισης από την προηγούμενη δεκαετία και δεν απολήφθησαν δασικά προϊόντα λόγω του ότι η συστάδα ανήκει στο χώρο διαβίωσης της άγριας πανίδας. Η συστάδα βόσκειται από αιγοπρόβατα και βοοειδή.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
19β	Μ.π.,Οξ.,Δρ.	0,9-1,2	Μ.π.: 60-100 Οξ., Δρ:10-50	Μ.π: Σπ.,ακ. Οξ.,Δρ.: πρεμ.,ομ.	Μ.Π:4.159 Οξ:12.197 Δρ:2.078	Μ.Π:3.253 Οξ:8.254 Δρ:500	Μ.Π:196,74 Οξ:245,37 Δρ:97,08	Μ.Π:153,88 Οξ:166,04 Δρ:34,20	Μ.Π:78,22 Οξ:67,67 Δρ:24,06	Η συστάδα είναι εκτός διαχείρισης από την προηγούμενη δεκαετία και δεν απολήφθησαν δασικά προϊόντα λόγω του ότι η συστάδα ανήκει στο χώρο διαβίωσης της άγριας πανίδας. Η συστάδα στα κατάντη βόσκειται από αιγοπρόβατα και βοοειδή.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
19γ	Μ.π.,Οξ.,Δρ.	0,7-1,2	Μ.π.: 20-70 Οξ.: 30-70, Δρ:20-80	Μ.π: Σπ.,ομ. Οξ.,Δρ.: διφ.,κορμ.,ακ.	Μ.Π:12.651 Οξ:12.701 Δρ:4.856	Μ.Π:9.294 Οξ:6.891 Δρ:1.062	Μ.Π:215,26 Οξ:239,70 Δρ:148,20	Μ.Π:158,14 Οξ:130,04 Δρ:32,41	Μ.Π:73,46 Οξ:54,26 Δρ:21,87	Η συστάδα έχει τεθεί εκτός διαχείρισης από την προηγούμενη δεκαετία και δεν απολήφθησαν δασικά προϊόντα. Χώρος διαβίωσης άγριας πανίδας και λόγω ύπαρξης ναρκοπεδίων.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
19δ	Μ.π.,Οξ.,Δρ.	0,7-1,2	Μ.π.: 20-80 Οξ.: 30-70, Δρ:20-80	Μ.π: Σπ.,ομ. Οξ.,Δρ.: διφ.,κορμ.,ακ.	Μ.Π:12.591 Οξ:16.645 Δρ:5.371	Μ.Π:6.706 Οξ:11.318 Δρ:2.160	Μ.Π:196,92 Οξ:303,75 Δρ:127,58	Μ.Π:104,88 Οξ:206,53 Δρ:51,31	Μ.Π:53,26 Οξ:68,00 Δρ:40,22	Η συστάδα έχει τεθεί εκτός διαχείρισης από την προηγούμενη δεκαετία και δεν απολήφθησαν δασικά προϊόντα. Χώρος διαβίωσης άγριας πανίδας.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
20α	Μ.π.,Οξ.,Δρ.	0,8-1,2	Μ.π.: 20-90 Οξ.: 30-70, Δρ:20-80	Μ.π: Σπ.,ομ. Οξ.,Δρ.: διφ.,κορμ.,ακ.	Μ.Π:4.263 Οξ:4.934 Δρ:13.246	Μ.Π:2.097 Οξ:1.452 Δρ:3.484	Μ.Π:153,00 Οξ:178,89 Δρ:116,35	Μ.Π:75,27 Οξ:56,76 Δρ:30,60	Μ.Π:49,19 Οξ:29,43 Δρ:26,30	Η συστάδα έχει τεθεί εκτός διαχείρισης από την προηγούμενη δεκαετία και δεν απολήφθησαν δασικά προϊόντα. Η συστάδα έχει προστατευτικό επί του εδάφους χαρακτήρα.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
20β	Μ.π.,Οξ.,Δρ.	0,6-1,1	Μ.π.: 20-70 Οξ.: 30-70, Δρ:20-50	Μ.π: Σπ.,ομ. Οξ.,Δρ.: διφ.,κορμ.,ακ.	Μ.Π:10.112 Οξ:7.999 Δρ:7.431	Μ.Π:0 Οξ:2.216 Δρ:976	Μ.Π:95,28 Οξ:190,05 Δρ:95,90	Μ.Π:0 Οξ:52,65 Δρ:12,60	Μ.Π:0 Οξ:27,70 Δρ:13,13	Εκτός διαχείρισης λόγω έλλειψης δασικού οδικού δικτύου και του ότι η συστάδα έχει προστατευτικό επί του εδάφους χαρακτήρα.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	ΣΥ συστάδας	V κλάσεων διαμέτρου >34 cm	ΣΥ συστάδας / ha	V κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
20γ	Μ.π.,Οξ.,Δρ.	0,6-1,1	Μ.π.: 20-60 Οξ.: 30-70, Δρ:20-50	Μ.π: Σπ.,ομ. Οξ.,Δρ.: διφ.,κορμ.,ακ.	Μ.Π:6.815 Οξ:3.047 Δρ:2.711	Μ.Π:0 Οξ:309 Δρ:356	Μ.Π:147,60 Οξ:172,83 Δρ:102,78	Μ.Π:0 Οξ:17,53 Δρ:13,50	Μ.Π:0 Οξ:10,14 Δρ:13,13	Υπαρξη ναρκοπεδίων και ύποπτων χώρων στο νοτιοδυτικό τμήμα της συστάδας. Εκτός διαχείρισης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
20δ	Μ.π.,Οξ.,Δρ.	0,6-1,1	Μ.π.: 20-60 Οξ.: 30-70, Δρ:20-50	Μ.π: Σπ.,ομ. Οξ.,Δρ.: διφ.,κορμ.,ακ.	Μ.Π:4.177 Οξ:5 Δρ:3.916	Μ.Π:590 Οξ:0 Δρ:0	Μ.Π:104,88 Οξ:5,15 Δρ:122,10	Μ.Π:14,81 Οξ:0 Δρ:0	Μ.Π:14,12 Οξ:0 Δρ:0	Εκτός διαχείρισης λόγω έλλειψης δασικού οδικού δικτύου.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
21α	Μ.π.,Δρ.	0,7-1,1	Μ.π.: 20-60 Δρ:10-40	Μ.π: Σπ.,ακ. Δρ.: διφ.,ομ.	Μ.Π:840 Δρ:3.257	Μ.Π:318 Δρ:1.736	Μ.Π:58,65 Δρ:89,68	Μ.Π:22,21 Δρ:47,80	Μ.Π:37,86 Δρ:53,30	Κατά την προηγούμενη δεκαετία δεν διενεργήθηκε καμία υλοτομία στην συστάδα. Έτονες κλίσεις και ύπαρξη ναρκοπεδίων και ύποτων χώρων στο ανατολικό μέσο τμήμα της συστάδας. Για την τρέχουσα περίοδο αναγωγικές εξυγιαντικές, εξευγενιστικές υλοτομίες. Αναγωγικές υλοτομίες στα πρεμνοβλαστήματα Δρυός ώστε να ατομικοποιηθούν τα πρεμνοβλαστήματα (αποβλέποντας μελλοντικά στην δημιουργία συστάδων σπερμοφυούς μορφής). Εξυγιαντικές υλοτομίες σε όλες τις ενώσεις (στα γηραιά, κουφαλερά κακόμορφα, βεβλαμένα, κ.λ.π. άτομα) ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του ξυλαποθέματος με την πλήρη απομάκρυνσή τους. Παρακράτηση ορισμένων κουφαλερών, κλαδοβριθών ατόμων 1-2/ Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων στην συστάδα για διατροφή και φωλεοποίησης της ορνιθοπανίδας.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
22α	Μ.π.,Οξ.,Δρ.	0,7-1,1	Μ.π.: 20-80 Οξ.: 10-60, Δρ:10-60	Μ.π: Σπ.,ακ. Οξ.,Δρ.: διφ.,ομ.	Μ.Π:6.472 Οξ:18.065 Δρ:3.181	Μ.Π:2.694 Οξ:4.146 Δρ:493	Μ.Π:222,74 Οξ:371,25 Δρ:185,80	Μ.Π:92,70 Οξ:85,20 Δρ:28,80	Μ.Π:41,63 Οξ:22,95 Δρ:15,50	Σε αρκετές θέσεις παρατηρήθηκαν λαθροϋλοτομίες. Ισχυρές κλίσεις σε τμήματα της συστάδας και ύπαρξης ναρκοπεδίου. Αναγωγικές εξυγιαντικές, εξευγενιστικές, προπαρασκευαστικές και υλοτομίες σποράς. Αναγωγικές υλοτομίες στα πρεμνοβλαστήματα Οξυάς και Δρυός ώστε να ατομικοποιηθούν τα πρεμνοβλαστήματα (αποβλέποντας μελλοντικά στην δημιουργία συστάδων σπερμοφυούς μορφής). Εξυγιαντικές υλοτομίες σε όλες τις ενώσεις (στα γηραιά, κουφαλερά κακόμορφα, βεβλαμένα, κ.λ.π. άτομα) ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του ξυλαποθέματος με την πλήρη απομάκρυνσή τους. Παρακράτηση ορισμένων κουφαλερών, κλαδοβριθών ατόμων 1-2/ Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων στην συστάδα για διατροφή και φωλεοποίησης της ορνιθοπανίδας. Απαγόρευση μετά την υλοτομία της βοσκής αιγών επί 10ετία, μεγάλων ζώων επί 7ετία και προβάτων επί 5ετία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
19α	Μ.π.,Δρ.	0,5-1,0	Μ.π.: 40-80 Δρ:10-80	Μ.π: Σπ.,ακ. Δρ.: διφ.,ομ.	Μ.Π:7.335 Δρ:1.430	Μ.Π:2.494 Δρ:108	Μ.Π:339,58 Δρ:190,72	Μ.Π:115,46 Δρ:14,40	Μ.Π:34,00 Δρ:7,55	Η συστάδα διακόπτεται από γυμνές, γεωργικές και μερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις. Κατά την τελευταία δεκαετία δεν διενεργήθηκε ουδεμία υλοτομία στην συστάδα ενώ προβλεπόταν να υλοτομηθεί το έτος 2009. Η Δρύς δεν θα υλοτομηθεί λόγω του ότι απαντάται διάσπαρτη κατά ομάδες σε όλη την έκταση της συστάδας και εντός ή πλησίον δασωμένων αγρών. Αναγωγικές εξυγιαντικές, εξευγενιστικές, Προπαρασκευαστικές υλοτομίες. Εξυγιαντικές υλοτομίες στις ενώσεις Μ. Πεύκης (στα γηραιά, κουφαλερά κακόμορφα, βεβλαμένα, κ.λ.π. άτομα) ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του ξυλαποθέματος με την πλήρη απομάκρυνσή τους. Παρακράτηση ορισμένων κουφαλερών, κλαδοβριθών ατόμων 1-2/ Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων στην συστάδα για διατροφή και φωλεοποίησης της ορνιθοπανίδας.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
19β	Μ.π.,Ελ.,Δρ.	0,5-1,0	Μ.π.: 40-70 Ελ.: 40-70, Δρ:40-70	Μ.π., Ελ: Σπ.,ακ. Δρ.: διφ.,κορμ.,ομ.	Μ.Π:5.392 Ελ:1.446 Δρ:2.200	Μ.Π:2.520 Ελ:453 Δρ:239	Μ.Π:213,99 Ελ:160,70 Δρ:141,00	Μ.Π:100,00 Ελ:50,33 Δρ:15,32	Μ.Π:46,74 Ελ:31,33 Δρ:10,86	Η συστάδα διακόπτεται από γυμνές, γεωργικές και μερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις. Κατά την τελευταία δεκαετία δεν διενεργήθηκε ουδεμία υλοτομία στην συστάδα ενώ προβλεπόταν να υλοτομηθεί το έτος 2009. Αναγωγικές εξυγιαντικές, εξευγενιστικές, Προπαρασκευαστικές υλοτομίες. Αναγωγικές υλοτομίες στα πρεμνοβλαστήματα Δρυός ώστε να ατομικοποιηθούν τα πρεμνοβλαστήματα (αποβλέποντας μελλοντικά στην δημιουργία συστάδων σπερμοφυούς μορφής). Εξυγιαντικές υλοτομίες (στα γηραιά, κουφαλερά κακόμορφα, βεβλαμένα, κ.λ.π. άτομα) ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του ξυλαποθέματος με την πλήρη απομάκρυνσή τους. Παρακράτηση ορισμένων κουφαλερών, κλαδοβριθών ατόμων 1-2/ Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων στην συστάδα για διατροφή και φωλεοποίησης της ορνιθοπανίδας.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
19γ	Μ.π.,Ελ.,Δρ.	0,5-1,0	Μ.π.: 40-70 Ελ.: 40-70, Δρ:40-70	Μ.π., Ελ: Σπ.,ακ. Δρ.: πρεμ.,κορμ.,ο μ.	Μ.Π:4.190 Ελ:301 Δρ:1.255	Μ.Π:1.827 Ελ:199 Δρ:270	Μ.Π:206,36 Ελ:158,26 Δρ:117,30	Μ.Π:90,00 Ελ:104,74 Δρ:25,23	Μ.Π:43,60 Ελ:66,11 Δρ:21,51	Η συστάδα διακόπτεται από γυμνές, γεωργικές και μερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις. Κατά την τελευταία δεκαετία δεν διενεργήθηκε ουδεμία υλοτομία στην συστάδα ενώ προβλεπόταν να υλοτομηθεί το έτος 2009. Αναγωγικές εξυγιαντικές, εξευγενιστικές, Προπαρασκευαστικές υλοτομίες. Αναγωγικές υλοτομίες στα πρεμνοβλαστήματα Δρυός ώστε να ατομικοποιηθούν τα πρεμνοβλαστήματα (αποβλέποντας μελλοντικά στην δημιουργία συστάδων σπερμοφυούς μορφής). Εξυγιαντικές υλοτομίες (στα γηραιά, κουφαλερά κακόμορφα, βεβλαμένα, κ.λ.π. άτομα) ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του ξυλαποθέματος με την πλήρη απομάκρυνσή τους. Παρακράτηση ορισμένων κουφαλερών, κλαδοβριθών ατόμων 1-2/ Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων στην συστάδα για διατροφή και φωλεοποίησης της ορνιθοπανίδας.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	ΣV συστάδας	V κλάσεων διαμέτρου >34 cm	ΣV συστάδας / ha	V κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
20	Μ.π.,Ελ.,Δρ.	0,5-1,0	Μ.π.: 40-70 Ελ.: 40-70, Δρ:40-70	Μ.π., Ελ: Σπ.,ακ. Δρ.: Σπ.,ομ.	Μ.Π:6.570 Ελ:2.146 Δρ:975	Μ.Π:833 Ελ:601 Δρ:0	Μ.Π:186,09 Ελ:241,00 Δρ:95,60	Μ.Π:23,60 Ελ:67,53 Δρ:0	Μ.Π:12,68 Ελ:28,01 Δρ:0	Πυκνοφυτείες Μ. Πεύκης στα μέσα και δυτικά της συστάδας. Αναγωγικές εξυγιαντικές, εξευγενιστικές, Προπαρασκευαστικές σποράς, φωτοδοτίδες, τελικές υλοτομίες. Αναγωγικές υλοτομίες στα πρεμνοβλαστήματα Δρυός ώστε να ατομικοποιηθούν τα πρεμνοβλαστήματα (αποβλέποντας μελλοντικά στην δημιουργία συστάδων σπερμοφυούς μορφής. Εξυγιαντικές υλοτομίες στις ενώσεις Μ. Πεύκης, Ελάτης και Δρυός (στα γηραιά, κουφαλερά κακόμορφα, βεβλαμένα, κ.λ.π. άτομα) ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του ξυλαποθέματος με την πλήρη απομάκρυνσή τους. Παρακράτηση ορισμένων κουφαλερών, κλαδοβριθών ατόμων 1-2/ Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων στην συστάδα για διατροφή και φωλεοποίησης της ορνιθοπανίδας. Απαγόρευση μετά την υλοτομία της βοσκής αιγών επί 10ετία, μεγάλων ζώων επί 7ετία και προβάτων επί 5ετία στην δασοσκεπή έκταση της Μ. Πεύκης.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
21	Μ.π.,Ελ.,Δρ.	0,5-1,0	Μ.π.: 10-150 Δρ:10-60	Μ.π., Ελ: Σπ.,ακ. Δρ.: πρεμ.,κορμ, ομ.	Μ.Π:2.608 Ελ:392 Δρ:3.646	Μ.Π:1.230 Ελ:212 Δρ:0	Μ.Π:127,16 Ελ:195,90 Δρ:123,57	Μ.Π:60,00 Ελ:106,00 Δρ:0	Μ.Π:47,16 Ελ:154,08 Δρ:0	Ζημιές από έντονη αιγοβοσκή και άτακτες ξυλεύσεις. Κατά την τελευταία δεκαετία δεν διενεργήθηκε ουδεμία υλοτομία στην συστάδα ενώ προβλεπόταν να υλοτομηθεί το έτος 2009. Αναγωγικές εξυγιαντικές, εξευγενιστικές. Προπαρασκευαστικές σποράς, φωτοδοτίδες, τελικές. Αναγωγικές υλοτομίες στα πρεμνοβλαστήματα Δρυός ώστε να ατομικοποιηθούν τα πρεμνοβλαστήματα (αποβλέποντας μελλοντικά στην δημιουργία συστάδων σπερμοφυούς μορφής. Εξυγιαντικές υλοτομίες στις ενώσεις Μ. Πεύκης, Ελάτης και Δρυός (στα γηραιά, κουφαλερά κακόμορφα, βεβλαμένα, κ.λ.π. άτομα) ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του ξυλαποθέματος με την πλήρη απομάκρυνσή τους. Παρακράτηση ορισμένων κουφαλερών, κλαδοβριθών ατόμων 1-2/ Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων στην συστάδα για διατροφή και φωλεοποίησης της ορνιθοπανίδας.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
22α	Μ.π.,Ελ.	0,5-1,0	Μ.π.,Ελ: 1-150	Μ.π., Ελ: Σπ.,ακ.	Μ.Π:193 Ελ:1.624	Μ.Π:149 Ελ:1.151	Μ.Π:87,55 Ελ:208,11	Μ.Π:67,73 Ελ:147,56	Μ.Π:77,20 Ελ:70,87	Ζημιές από έντονη αιγοβοσκή και άτακτες ξυλεύσεις. Αναγωγικές εξυγιαντικές, εξευγενιστικές. Προπαρασκευαστικές σποράς, φωτοδοτίδες, τελικές. Εξυγιαντικές υλοτομίες στις ενώσεις Ελάτης και Μ. Πεύκης (στα γηραιά, κουφαλερά κακόμορφα, βεβλαμένα, κ.λ.π. άτομα) ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του ξυλαποθέματος με την πλήρη απομάκρυνσή τους. Παρακράτηση ορισμένων κουφαλερών, κλαδοβριθών ατόμων 1-2/ Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων στην συστάδα για διατροφή και φωλεοποίησης της ορνιθοπανίδας. Απαγόρευση μετά την υλοτομία της βοσκής αιγών επί 10ετία, μεγάλων ζώων επί 7ετία και προβάτων επί 5ετία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
22β	Οξ.,Ελ. άτομα Μ.π	0,5-1,0	Οξ.,Ελ: 1-180	Οξ., Ελ: Σπ.,ακ.	Οξ:10.180 Ελ:3.302	Οξ:9.227 Ελ:2.593	Οξ:246,48 Ελ:191,99	Οξ:150,76 Ελ:223,41	Οξ:78,53 Ελ:90,64	Αναγωγικές εξυγιαντικές, εξευγενιστικές, Προπαρασκευαστικές σποράς, φωτοδοτίδες, τελικές υλοτομίες. Αναγωγικές υλοτομίες στα πρεμνοβλαστήματα Οξυάς ώστε να ατομικοποιηθούν τα πρεμνοβλαστήματα (αποβλέποντας μελλοντικά στην δημιουργία συστάδων σπερμοφυούς μορφής. Εξυγιαντικές υλοτομίες στις ενώσεις Οξυάς και Ελάτης (στα γηραιά, κουφαλερά κακόμορφα, βεβλαμένα, κ.λ.π. άτομα) ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του ξυλαποθέματος με την πλήρη απομάκρυνσή τους. Παρακράτηση ορισμένων κουφαλερών, κλαδοβριθών ατόμων 1-2/ Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων στην συστάδα για διατροφή και φωλεοποίησης της ορνιθοπανίδας. Απαγόρευση μετά την υλοτομία της βοσκής αιγών επί 10ετία, μεγάλων ζώων επί 7ετία και προβάτων επί 5ετία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
23α	Οξ.,Ελ. άτομα Μ.π	0,8-1,1	Οξ.,Ελ: 1-150	Οξ.:διφ.,ακ., Ελ: Σπ.,ακ.	Οξ:36.521 Ελ:8.187	Οξ:28.628 Ελ:6.420	Οξ:396,11 Ελ:195,88	Οξ:310,50 Ελ:153,59	Οξ:78,39 Ελ:78,42	Η συστάδα διακόπτεται από γυμνές, μερικώς δασοσκεπείς και βραχώδεις εκτάσεις. Ισχυρές κλίσεις και αδυναμία εξωδάσωσης των προϊόντων σε τμήμα της.Αναγωγικές εξυγιαντικές, εξευγενιστικές. Προπαρασκευαστικές σποράς, φωτοδοτίδες, τελικές. Αναγωγικές υλοτομίες στα πρεμνοβλαστήματα Οξυάς ώστε να ατομικοποιηθούν τα πρεμνοβλαστήματα (αποβλέποντας μελλοντικά στην δημιουργία συστάδων σπερμοφυούς μορφής. Εξυγιαντικές υλοτομίες στις ενώσεις Οξυάς και Ελάτης (στα γηραιά, κουφαλερά κακόμορφα, βεβλαμένα, κ.λ.π. άτομα) ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του ξυλαποθέματος με την πλήρη απομάκρυνσή τους. Παρακράτηση ορισμένων κουφαλερών, κλαδοβριθών ατόμων 1-2/ Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων στην συστάδα για διατροφή και φωλεοποίησης της ορνιθοπανίδας. Απαγόρευση μετά την υλοτομία της βοσκής αιγών επί 10ετία, μεγάλων ζώων επί 7ετία και προβάτων επί 5ετία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
23β	Οξ.,Ελ. άτομα Μ.π	0,8-1,1	Οξ.,Ελ: 10-90	Οξ.:διφ.,ακ., Ελ: Σπ.,ακ.	Οξ:15.806 Ελ:2.083	Οξ:13.284 Ελ:805	Οξ:463,50 Ελ:123,96	Οξ:389,56 Ελ:47,92	Οξ:84,04 Ελ:38,65	Αναγωγικές εξυγιαντικές, εξευγενιστικές. Προπαρασκευαστικές σποράς, φωτοδοτίδες, τελικές. Αναγωγικές υλοτομίες στα πρεμνοβλαστήματα Οξυάς ώστε να ατομικοποιηθούν τα πρεμνοβλαστήματα (αποβλέποντας μελλοντικά στην δημιουργία συστάδων σπερμοφυούς μορφής. Εξυγιαντικές υλοτομίες στις ενώσεις Οξυάς και Ελάτης (στα γηραιά, κουφαλερά κακόμορφα, βεβλαμένα, κ.λ.π. άτομα) ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του ξυλαποθέματος με την πλήρη απομάκρυνσή τους. Παρακράτηση ορισμένων κουφαλερών, κλαδοβριθών ατόμων 1-2/ Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων στην συστάδα για διατροφή και φωλεοποίησης της ορνιθοπανίδας. Απαγόρευση μετά την υλοτομία της βοσκής αιγών επί 10ετία, μεγάλων ζώων επί 7ετία και προβάτων επί 5ετία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	ΣΥ συστάδας	V κλάσεων διαμέτρου >34 cm	ΣΥ συστάδας / ha	V κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
23γ	Οξ.,Ελ. άτομα Μ.π	0,8-1,1	Οξ.,Ελ: 1-120	Οξ.:διφ.,ακ., Ελ: Σπ.,ακ.	Οξ:25.569 Ελ:854	Οξ:15.871 Ελ:650	Οξ:405,85 Ελ:112,28	Οξ:251,92 Ελ:85,53	Οξ:62,07 Ελ:76,11	Αναγωγικές εξυγιαντικές, εξευγενιστικές. Προπαρασκευαστικές σποράς, φωτοδότιδες, τελικές. Αναγωγικές υλοτομίες στα πρεμνοβλαστήματα Οξυάς ώστε να ατομικοποιηθούν τα πρεμνοβλαστήματα (αποβλέποντας μελλοντικά στην δημιουργία συστάδων σπερμοφυούς μορφής. Εξυγιαντικές υλοτομίες στις ενώσεις Οξυάς και Ελάτης (στα γηραιά, κουφαλερά κακόμερφα, βεβλαμένα, κ.λ.π. άτομα) ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του ξυλαποθέματος με την πλήρη απομάκρυνσή τους. Παρακράτηση ορισμένων κουφαλερών, κλαδοβριθών ατόμων 1-2/ Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων στην συστάδα για διατροφή και φωλεοποίησης της ορνιθοπανίδας. Απαγόρευση μετά την υλοτομία της βοσκής αιγών επί 10ετία, μεγάλων ζώων επί 7ετία και προβάτων επί 5ετία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
24α	Οξ.,Ελ. άτομα Μ.π	0,8-1,1	Οξ.,Ελ: 1-140	Οξ.:διφ.,ακ., Ελ: Σπ.,ακ.	Οξ:14.631 Ελ:1.169	Οξ:8.476 Ελ:697	Οξ:208,71 Ελ:121,65	Οξ:120,91 Ελ:72,60	Οξ:57,93 Ελ:59,62	Αναγωγικές εξυγιαντικές, εξευγενιστικές. Προπαρασκευαστικές σποράς, φωτοδότιδες, τελικές. Αναγωγικές υλοτομίες στα πρεμνοβλαστήματα Οξυάς ώστε να ατομικοποιηθούν τα πρεμνοβλαστήματα (αποβλέποντας μελλοντικά στην δημιουργία συστάδων σπερμοφυούς μορφής. Εξυγιαντικές υλοτομίες στις ενώσεις Οξυάς και Ελάτης (στα γηραιά, κουφαλερά κακόμερφα, βεβλαμένα, κ.λ.π. άτομα) ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του ξυλαποθέματος με την πλήρη απομάκρυνσή τους. Παρακράτηση ορισμένων κουφαλερών, κλαδοβριθών ατόμων 1-2/ Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων στην συστάδα για διατροφή και φωλεοποίησης της ορνιθοπανίδας. Απαγόρευση μετά την υλοτομία της βοσκής αιγών επί 10ετία, μεγάλων ζώων επί 7ετία και προβάτων επί 5ετία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
24β	Οξ.,Ελ., Μ.π.	0,8-1,2	Οξ., Ελ., Μ.π.: 1-120	Μ.π., Ελ: Σπ.,ακ. Οξ.: διφ.,ομ.	Μ.Π:830 Οξ:22.749 Ελ:918	Μ.Π:0 Οξ:8.582 Ελ:329	Μ.Π:133,8 ⁴ Οξ:327,79 Ελ:148,16	Μ.Π:0 Οξ:123,66 Ελ:53,06	Μ.Π:0 Οξ:37,72 Ελ:35,84	Αναγωγικές εξυγιαντικές, εξευγενιστικές. Προπαρασκευαστικές σποράς, φωτοδότιδες, τελικές. Αναγωγικές υλοτομίες στα πρεμνοβλαστήματα Οξυάς ώστε να ατομικοποιηθούν τα πρεμνοβλαστήματα (αποβλέποντας μελλοντικά στην δημιουργία συστάδων σπερμοφυούς μορφής. Εξυγιαντικές υλοτομίες στα γηραιά, κουφαλερά κακόμερφα, βεβλαμένα, κ.λ.π. άτομα ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του ξυλαποθέματος με την πλήρη απομάκρυνσή τους. Παρακράτηση ορισμένων κουφαλερών, κλαδοβριθών ατόμων 1-2/ Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων στην συστάδα για διατροφή και φωλεοποίησης της ορνιθοπανίδας. Απαγόρευση μετά την υλοτομία της βοσκής αιγών επί 10ετία, μεγάλων ζώων επί 7ετία και προβάτων επί 5ετία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
24γ	Οξ., άτομα Ελ., Μ.π.	0,8-1,1	1-140	διφ.,ακ.	16.007	6.859	341,32	146,25	42,85	Γηραιά άτομα Οξυάς πολύκλαδα στις βραχώδεις θέσεις. Αναγωγικές εξυγιαντικές, εξευγενιστικές. Προπαρασκευαστικές σποράς, φωτοδότιδες, τελικές. Αναγωγικές υλοτομίες στα πρεμνοβλαστήματα Οξυάς ώστε να ατομικοποιηθούν τα πρεμνοβλαστήματα (αποβλέποντας μελλοντικά στην δημιουργία συστάδων σπερμοφυούς μορφής. Εξυγιαντικές υλοτομίες στα γηραιά, κουφαλερά κακόμερφα, βεβλαμένα, κ.λ.π. άτομα ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του ξυλαποθέματος με την πλήρη απομάκρυνσή τους. Παρακράτηση ορισμένων κουφαλερών, κλαδοβριθών ατόμων 1-2/ Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων στην συστάδα για διατροφή και φωλεοποίησης της ορνιθοπανίδας. Απαγόρευση μετά την υλοτομία της βοσκής αιγών επί 10ετία, μεγάλων ζώων επί 7ετία και προβάτων επί 5ετία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
25	Μ.π,Δρ.,Ελ.,Ο ξ	0,8-1,1	1-100	Μ.π., Ελ: Σπ.,ακ. Οξ.:Δρ: διφ.,ομ.	Μ.Π:11.876 Οξ:402 Ελ:8.006 Δρ:2.019	Μ.Π:9.561 Οξ:219 Ελ:6.924 Δρ:694	Μ.Π:180,7 ⁷ Οξ:193,80 Ελ:230,02 Δρ:157,70	Μ.Π:146,6 ⁴ Οξ:104,29 Ελ:198,97 Δρ:54,22	Μ.Π:81,12 Οξ:53,94 Ελ:86,49 Δρ:34,37	Αναγωγικές εξυγιαντικές, εξευγενιστικές. Προπαρασκευαστικές σποράς, φωτοδότιδες, τελικές. Αναγωγικές υλοτομίες στα πρεμνοβλαστήματα Δρυός και Οξυάς ώστε να ατομικοποιηθούν τα πρεμνοβλαστήματα. Εξυγιαντικές υλοτομίες στα γηραιά, κουφαλερά κακόμερφα, βεβλαμένα, κ.λ.π. άτομα ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του ξυλαποθέματος με την πλήρη απομάκρυνσή τους. Παρακράτηση ορισμένων κουφαλερών, κλαδοβριθών ατόμων 1-2/ Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων στην συστάδα για διατροφή και φωλεοποίησης της ορνιθοπανίδας. Απαγόρευση μετά την υλοτομία της βοσκής αιγών επί 10ετία, μεγάλων ζώων επί 7ετία και προβάτων επί 5ετία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
26α	Μ.π,Δρ.,Ελ.	0,8-1,1	Μ.π.,Δρ: 1-100 , Ελ:10-30	Μ.π.: Σπ.,ακ. Ελ: Σπ.,ομ. Δρ: διφ.,κορμ.,ακ.	Μ.Π:8.458 Ελ:1.468 Δρ:3.106	Μ.Π:4.161 Ελ:0 Δρ:219	Μ.Π:145,0 ⁶ Ελ:38,96 Δρ:65,11	Μ.Π:71,37 Ελ:0 Δρ:17,32	Μ.Π:49,20 Ελ:0 Δρ:26,59	Αναγωγικές εξυγιαντικές, εξευγενιστικές. Προπαρασκευαστικές σποράς, φωτοδότιδες, τελικές. Αναγωγικές υλοτομίες στα πρεμνοβλαστήματα Δρυός ώστε να ατομικοποιηθούν τα πρεμνοβλαστήματα (αποβλέποντας μελλοντικά στην δημιουργία συστάδων σπερμοφυούς μορφής. Εξυγιαντικές υλοτομίες στις ενώσεις Μ. Πεύκης και Δρυός (στα γηραιά, κουφαλερά κακόμερφα, βεβλαμένα, κ.λ.π. άτομα) ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του ξυλαποθέματος με την πλήρη απομάκρυνσή τους. Παρακράτηση ορισμένων κουφαλερών, κλαδοβριθών ατόμων 1-2/ Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων στην συστάδα για διατροφή και φωλεοποίησης της ορνιθοπανίδας.Απαγόρευση μετά την υλοτομία της βοσκής αιγών επί 10ετία, μεγάλων ζώων επί 7ετία και προβάτων επί 5ετία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
26β	Μ.π,Δρ.	0,8-1,1	Μ.π.,Δρ: 30-80	Μ.π.: Σπ.,ακ. Δρ: διφ.,κορμ.,ακ.	Μ.Π:18.428 Δρ:646	Μ.Π:10.129 Δρ:0	Μ.Π:313,9 ³ Δρ:124,24	Μ.Π:172,5 ⁶ Δρ:0	Μ.Π:54,97 Δρ:0	Αναγωγικές εξυγιαντικές, εξευγενιστικές. Προπαρασκευαστικές σποράς, φωτοδότιδες, τελικές. Αναγωγικές υλοτομίες στα πρεμνοβλαστήματα Δρυός ώστε να ατομικοποιηθούν τα πρεμνοβλαστήματα (αποβλέποντας μελλοντικά στην δημιουργία συστάδων σπερμοφυούς μορφής. Εξυγιαντικές υλοτομίες στις ενώσεις Μ. Πεύκης και Δρυός (στα γηραιά, κουφαλερά κακόμερφα, βεβλαμένα, κ.λ.π. άτομα) ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του ξυλαποθέματος με την πλήρη απομάκρυνσή τους. Παρακράτηση ορισμένων κουφαλερών, κλαδοβριθών ατόμων 1-2/ Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων στην συστάδα για διατροφή και	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	ΣV συστάδας	V κλάσεων διαμέτρου >34 cm	ΣV συστάδας / ha	V κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
										φωλεοποίησης της ορνιθοπανίδας.Απαγόρευση μετά την υλοτομία της βοσκής αιγών επί 10ετία, μεγάλων ζώων επί 7ετία και προβάτων επί 5ετία.	
26γ	Μ.π,Δρ.	0,8-1,1	Μ.π.,Δρ: 50-100	Μ.π.: Σπ.,ακ. Δρ: διφ.,κορμ.,ακ.	Μ.Π:14.526 Δρ:406	Μ.Π:4.560 Δρ:0	Μ.Π:370,5 6 Δρ:228,80	Μ.Π:116,3 3 Δρ:104,29	Μ.Π:31,39 Δρ:0	Αναγωγικές εξυγιαντικές, εξευγενιστικές. Προπαρασκευαστικές σποράς, φωτοδότιδες, τελικές. Αναγωγικές υλοτομίες στα πρεμνοβλαστήματα Δρυός ώστε να ατομικοποιηθούν τα πρεμνοβλαστήματα (αποβλέποντας μελλοντικά στην δημιουργία συστάδων σπερμοφυούς μορφής. Εξυγιαντικές υλοτομίες στις ενώσεις Μ. Πεύκης και Δρυός (στα γηραιά, κουφαλερά κακόμερφα, βεβλαμένα, κ.λ.π. άτομα) ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του ξυλαποθέματος με την πλήρη απομάκρυνσή τους. Παρακράτηση ορισμένων κουφαλερών, κλαδοβριθών ατόμων 1-2/ Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων στην συστάδα για διατροφή και φωλεοποίησης της ορνιθοπανίδας.Απαγόρευση μετά την υλοτομία της βοσκής αιγών επί 10ετία, μεγάλων ζώων επί 7ετία και προβάτων επί 5ετία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
26δ	Μ.π,άτομα Ελ.,Οξ., Δρ.	0,7-1,1	Μ.π.,Ελ: 1-100	Μ.π.,Ελ: Σπ.,ακ.	Μ.Π:9.808	Μ.Π:4.529	Μ.Π:281,0 5	Μ.Π:129,7 7	Μ.Π:46,18	Εξυγιαντικές, εξευγενιστικές. Προπαρασκευαστικές σποράς, φωτοδότιδες, τελικές. Εξυγιαντικές υλοτομίες στα γηραιά, κουφαλερά κακόμερφα, βεβλαμένα, κ.λ.π. άτομα ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του ξυλαποθέματος με την πλήρη απομάκρυνσή τους. Η Οξυά δεν θα υλοτομηθεί λόγω ισχυρών κλίσεων και αδυναμίας εξωδάσωσης των δασικών προϊόντων. Παρακράτηση ορισμένων κουφαλερών, κλαδοβριθών ατόμων 1-2/ Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων στην συστάδα για διατροφή και φωλεοποίησης της ορνιθοπανίδας.Απαγόρευση μετά την υλοτομία της βοσκής αιγών επί 10ετία, μεγάλων ζώων επί 7ετία και προβάτων επί 5ετία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
26ε	Μ.π,Δρ.	0,7-1,1	Μ.π.:30-90 Δρ:20-50	Μ.π.: Σπ.,ακ. Δρ: διφ.,ακ.	Μ.Π:26.011 Δρ:1.525	Μ.Π:13.606 Δρ:192	Μ.Π:264,0 7 Δρ:114,60	Μ.Π:138,1 3 Δρ:14,44	Μ.Π:52,31 Δρ:12,59	Αναγωγικές εξυγιαντικές, εξευγενιστικές. Προπαρασκευαστικές σποράς, φωτοδότιδες, τελικές. Αναγωγικές υλοτομίες στα πρεμνοβλαστήματα Δρυός ώστε να ατομικοποιηθούν τα πρεμνοβλαστήματα (αποβλέποντας μελλοντικά στην δημιουργία συστάδων σπερμοφυούς μορφής. Εξυγιαντικές υλοτομίες στις ενώσεις Μ. Πεύκης και Δρυός (στα γηραιά, κουφαλερά κακόμερφα, βεβλαμένα, κ.λ.π. Άτομα) ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του ξυλαποθέματος με την πλήρη απομάκρυνσή τους. Παρακράτηση ορισμένων κουφαλερών, κλαδοβριθών ατόμων 1-2/ Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων στην συστάδα για διατροφή και φωλεοποίησης της ορνιθοπανίδας.Απαγόρευση μετά την υλοτομία της βοσκής αιγών επί 10ετία, μεγάλων ζώων επί 7ετία και προβάτων επί 5ετία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
27α	Μ.π, άτομα Οξ., Δρ.	0,7-1,1	30-90	Σπ.,ακ.	25.582	15.988	218,84	136,77	62,5	Αναγωγικές εξυγιαντικές, εξευγενιστικές. Προπαρασκευαστικές σποράς, φωτοδότιδες, τελικές. ξυγιαντικές υλοτομίες στις ενώσεις Μ. Πεύκης (στα γηραιά, κουφαλερά κακόμερφα, βεβλαμένα, κ.λ.π. Άτομα) ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του ξυλαποθέματος με την πλήρη απομάκρυνσή τους. Παρακράτηση ορισμένων κουφαλερών, κλαδοβριθών ατόμων 1-2/ Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων στην συστάδα για διατροφή και φωλεοποίησης της ορνιθοπανίδας.Απαγόρευση μετά την υλοτομία της βοσκής αιγών επί 10ετία, μεγάλων ζώων επί 7ετία και προβάτων επί 5ετία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
27β	Μ.π,Δρ.	0,6-1,0	Μ.π.:30-80 Δρ:20-40	Μ.π.: Σπ.,ακ. Δρ: πρεμ.,ομ.	Μ.Π:7.916 Δρ:1.045	Μ.Π:1.180 Δρ:0	Μ.Π:348,7 2 Δρ:120,16	Μ.Π:51,98 Δρ:0	Μ.Π:14,91 Δρ:0	Η συστάδα είχε τεθεί εκτός διαχείρισης την προηγούμενη 10ετία διότι ασκεί προστατευτική επί του εδάφους επίδραση λόγω της ολίσθησης του εδάφους άνωθεν του οικισμού. Για την τρέχουσα περίοδο προτείνονται: Αναγωγικές εξυγιαντικές, εξευγενιστικές. Προπ/σκευαστικές. Αναγωγικές υλοτομίες στα πρεμνοβλαστήματα Δρυός ώστε να ατομικοποιηθούν τα πρεμνοβλαστήματα (αποβλέποντας μελλοντικά στην δημιουργία συστάδων σπερμοφυούς μορφής. Εξυγιαντικές υλοτομίες στις ενώσεις Μ. Πεύκης και Δρυός (στα γηραιά, κουφαλερά κακόμερφα, βεβλαμένα, κ.λ.π. Άτομα) ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του ξυλαποθέματος με την πλήρη απομάκρυνσή τους. Παρακράτηση ορισμένων κουφαλερών, κλαδοβριθών ατόμων 1-2/ Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων στην συστάδα για διατροφή και φωλεοποίησης της ορνιθοπανίδας. Απαγόρευση μετά την υλοτομία της βοσκής αιγών επί 10ετία, μεγάλων ζώων επί 7ετία και προβάτων επί 5ετία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
27γ	Μ.π,Δρ.,Ελ.,Ο ξ	0,7-1,1	Μ.π.,Ελ: 30-100 Δρ: 20-50	Μ.π., Ελ: Σπ.,ακ. Οξ.,Δρ: διφ.,ακ.	Μ.Π:9.968 Οξ:752 Ελ:450 Δρ:1.168	Μ.Π:2.483 Οξ:63 Ελ:110 Δρ:240	Μ.Π:358,5 5 Οξ:193,00 Ελ:115,16 Δρ:131,20	Μ.Π:89,32 Οξ:16,15 Ελ:28,21 Δρ:26,97	Μ.Π:24,91 Οξ:8,38 Ελ:24,44 Δρ:20,55	Αναγωγικές εξυγιαντικές, εξευγενιστικές. Προπαρασκευαστικές σποράς, φωτοδότιδες, τελικές. Εξυγιαντικές υλοτομίες (Μ.πεύκη) στα γηραιά, κουφαλερά κακόμερφα, βεβλαμένα, κ.λ.π. άτομα ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του ξυλαποθέματος με την πλήρη απομάκρυνσή τους. Παρακράτηση ορισμένων κουφαλερών, κλαδοβριθών ατόμων 1-2/ Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων στην συστάδα για διατροφή και φωλεοποίησης της ορνιθοπανίδας. Απαγόρευση μετά την υλοτομία της βοσκής αιγών επί 10ετία, μεγάλων ζώων επί 7ετία και προβάτων επί 5ετία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
27δ	Μ.π,Δρ.	0,6-1,1	Μ.π.:30-100 Δρ:20-50	Μ.π.: Σπ.,ακ. Δρ: διφ.,ομ.	Μ.Π:10.321 Δρ:1.524	Μ.Π:3.763 Δρ:0	Μ.Π:255,4 7 Δρ:119,05	Μ.Π:93,14 Δρ:0	Μ.Π:36,46 Δρ:0	Αναγωγικές εξυγιαντικές, εξευγενιστικές. Προπαρασκευαστικές σποράς, φωτοδότιδες. Αναγωγικές υλοτομίες στα πρεμνοβλαστήματα Δρυός ώστε να ατομικοποιηθούν τα πρεμνοβλαστήματα (αποβλέποντας μελλοντικά στην δημιουργία συστάδων σπερμοφυούς μορφής. Εξυγιαντικές υλοτομίες στις ενώσεις Μ. Πεύκης και Δρυός (στα γηραιά, κουφαλερά κακόμερφα, βεβλαμένα, κ.λ.π. άτομα) ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του ξυλαποθέματος με	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	ΣΥ συστάδας	V κλάσεων διαμέτρου >34 cm	ΣΥ συστάδας / ha	V κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
										την πλήρη απομάκρυνσή τους. Παρακράτηση ορισμένων κουφαλερών, κλαδοβριθών ατόμων 1-2/ Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων στην συστάδα για διατροφή και φωλεοποίησης της ορνιθοπανίδας. Απαγόρευση μετά την υλοτομία της βοσκής αιγών επί 10ετία, μεγάλων ζώων επί 7ετία και προβάτων επί 5ετία.	
27ε	Μ.π,Δρ.,Ελ.	0,6-1,1	Μ.π.,Ελ: 30-100 Δρ: 20-40	Μ.π., Ελ: Σπ.,ακ. Δρ: διφ.,ομ.	Μ.Π:17.097 Ελ:317 Δρ:236	Μ.Π:5.759 Ελ:209 Δρ:0	Μ.Π:374,5 3 Ελ:158,26 Δρ:107,16	Μ.Π:126,2 9 Ελ:104,50 Δρ:0	Μ.Π:33,68 Ελ:65,93 Δρ:0	Αναγωγικές εξυγιαντικές, εξευγενιστικές. Προπαρασκευαστικές σποράς, φωτοδότιδες. Αναγωγικές υλοτομίες στα πρεμνοβλαστήματα Δρυός ώστε να ατομικοποιηθούν τα πρεμνοβλαστήματα (αποβλέποντας μελλοντικά στην δημιουργία συστάδων σπερμοφυούς μορφής. Εξυγιαντικές υλοτομίες στα γηραιά, κουφαλερά κακόμορφα, βεβλαμένα, κ.λ.π. άτομα ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του ξυλαποθέματος με την πλήρη απομάκρυνσή τους. Παρακράτηση ορισμένων κουφαλερών, κλαδοβριθών ατόμων 1-2/ Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων στην συστάδα για διατροφή και φωλεοποίησης της ορνιθοπανίδας. Απαγόρευση μετά την υλοτομία της βοσκής αιγών επί 10ετία, μεγάλων ζώων επί 7ετία και προβάτων επί 5ετία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
34β	Μ.π,Δρ.,ΟΞ	0,6-1,1	Μ.π.:40-100 ΟΞ., Δρ: 30-70	Μ.π.: Σπ.,ακ. ΟΞ.,Δρ: διφ.,κορμ.ακ.	Μ.Π:2.176 ΟΞ:6.264 Δρ:5.728	Μ.Π:505 ΟΞ:0 Δρ:0	Μ.Π:50,38 ΟΞ:175,46 Δρ:95,63	Μ.Π:11,69 ΟΞ:0 Δρ:0	Μ.Π:23,21 ΟΞ:0 Δρ:0	Η συστάδα διακόπτεται από γυμνές, μερικώς δασοσκεπείς και άγονες-βραχώδεις εκτάσεις. Πιθανή ύπαρξη ναρκοπεδίων στην δασική θέση Προφήτης Ηλίας. Αναγωγικές εξυγιαντικές, εξευγενιστικές. Προπαρασκευαστικές σποράς, φωτοδότιδες, τελικές. Αναγωγικές υλοτομίες στα πρεμνοβλαστήματα Δρυός και Οξυάς ώστε να ατομικοποιηθούν τα πρεμνοβλαστήματα (αποβλέποντας μελλοντικά στην δημιουργία συστάδων σπερμοφυούς μορφής. Εξυγιαντικές υλοτομίες στις ενώσεις Μ. Πεύκης, Δρυός και Οξυάς (στα γηραιά, κουφαλερά κακόμορφα, βεβλαμένα, κ.λ.π. άτομα) ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του ξυλαποθέματος με την πλήρη απομάκρυνσή τους. Παρακράτηση ορισμένων κουφαλερών, κλαδοβριθών ατόμων 1-2/ Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων στην συστάδα για διατροφή και φωλεοποίησης της ορνιθοπανίδας. Απαγόρευση μετά την υλοτομία της βοσκής αιγών επί 10ετία, μεγάλων ζώων επί 7ετία και προβάτων επί 5ετία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
36α	Μ.π,Ελ.,ΟΞ	0,8-1,1	Μ.π, Ελ.:40-110 ΟΞ.: 20-120	Μ.π.,Ελ: Σπ.,ακ. ΟΞ.: διφ.ακ.	Μ.Π:3.873 ΟΞ:4.770 Ελ:599	Μ.Π:3.467 ΟΞ:1.363 Ελ:286	Μ.Π:210,5 1 ΟΞ:150,00 Ελ:58,74	Μ.Π:188,4 2 ΟΞ:42,86 Ελ:28,04	Μ.Π:89,52 ΟΞ:28,57 Ελ:47,75	Αναγωγικές εξυγιαντικές, εξευγενιστικές. Προπαρασκευαστικές σποράς, φωτοδότιδες, τελικές.Αναγωγικές υλοτομίες στα πρεμνοβλαστήματα Οξυάς ώστε να ατομικοποιηθούν τα πρεμνοβλαστήματα (αποβλέποντας μελλοντικά στην δημιουργία συστάδων σπερμοφυούς μορφής. Εξυγιαντικές υλοτομίες στις ενώσεις Μ. Πεύκης, Ελάτης και Οξυάς (στα γηραιά, κουφαλερά κακόμορφα, βεβλαμένα, κ.λ.π. άτομα) ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του ξυλαποθέματος με την πλήρη απομάκρυνσή τους. Παρακράτηση ορισμένων κουφαλερών, κλαδοβριθών ατόμων 1-2/ Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων στην συστάδα για διατροφή και φωλεοποίησης της ορνιθοπανίδας. Απαγόρευση μετά την υλοτομία της βοσκής αιγών επί 10ετία, μεγάλων ζώων επί 7ετία και προβάτων επί 5ετία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
36β	Μ.π,Ελ.,ΟΞ	0,8-1,1	Μ.π, Ελ.:40-110 ΟΞ.: 20-120	Μ.π.,Ελ: Σπ.,ακ. ΟΞ.: διφ.ακ.	Μ.Π:5.158 ΟΞ:11.668 Ελ:3.554	Μ.Π:4.856 ΟΞ:4.934 Ελ:3.140	Μ.Π:143,6 6 ΟΞ:161,38 Ελ:157,20	Μ.Π:135,2 6 ΟΞ:68,24 Ελ:138,94	Μ.Π:94,15 ΟΞ:42,29 Ελ:88,35	Αναγωγικές εξυγιαντικές, εξευγενιστικές. Προπαρασκευαστικές σποράς, φωτοδότιδες, τελικές. Αναγωγικές υλοτομίες στα πρεμνοβλαστήματα Οξυάς ώστε να ατομικοποιηθούν τα πρεμνοβλαστήματα (αποβλέποντας μελλοντικά στην δημιουργία συστάδων σπερμοφυούς μορφής. Εξυγιαντικές υλοτομίες στις ενώσεις Μ. Πεύκης, Ελάτης και Οξυάς (στα γηραιά, κουφαλερά κακόμορφα, βεβλαμένα, κ.λ.π. άτομα) ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του ξυλαποθέματος με την πλήρη απομάκρυνσή τους. Παρακράτηση ορισμένων κουφαλερών, κλαδοβριθών ατόμων 1-2/ Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων στην συστάδα για διατροφή και φωλεοποίησης της ορνιθοπανίδας. Απαγόρευση μετά την υλοτομία της βοσκής αιγών επί 10ετία, μεγάλων ζώων επί 7ετία και προβάτων επί 5ετία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
36γ	Μ.π,ΟΞ	0,9-1,1	Μ.π:20-110 ΟΞ.: 20-120	Μ.π.: Σπ.,ακ. ΟΞ.: διφ.ακ.	Μ.Π:24.254 ΟΞ:10.496	Μ.Π:18.379 ΟΞ:1.530	Μ.Π:295,5 ΟΞ:180,65	Μ.Π:224,6 8 ΟΞ:26,33	Μ.Π:75,78 ΟΞ:88,35	Αναγωγικές εξυγιαντικές, εξευγενιστικές. Προπαρασκευαστικές σποράς, φωτοδότιδες, τελικές. Αναγωγικές υλοτομίες στα πρεμνοβλαστήματα Οξυάς ώστε να ατομικοποιηθούν τα πρεμνοβλαστήματα (αποβλέποντας μελλοντικά στην δημιουργία συστάδων σπερμοφυούς μορφής. Εξυγιαντικές υλοτομίες στις ενώσεις Μ. Πεύκης και Οξυάς (στα γηραιά, κουφαλερά κακόμορφα, βεβλαμένα, κ.λ.π. άτομα) ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του ξυλαποθέματος με την πλήρη απομάκρυνσή τους. Παρακράτηση ορισμένων κουφαλερών, κλαδοβριθών ατόμων 1-2/ Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων στην συστάδα για διατροφή και φωλεοποίησης της ορνιθοπανίδας. Απαγόρευση μετά την υλοτομία της βοσκής αιγών επί 10ετία, μεγάλων ζώων επί 7ετία και προβάτων επί 5ετία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
36δ	Μ.π,Δρ.,ΟΞ	0,8-1,1	Μ.π.:20-110 ΟΞ., Δρ: 20-40	Μ.π.: Σπ.,ακ. ΟΞ.,Δρ: διφ.,ομ.	Μ.Π:15.296 ΟΞ:128 Δρ:440	Μ.Π:6.252 ΟΞ:0 Δρ:55	Μ.Π:245,8 7 ΟΞ:98,40 Δρ:100,20	Μ.Π:100,6 8 ΟΞ:0,0 Δρ:12,50	Μ.Π:40,87 ΟΞ:0,0 Δρ:12,50	Αναγωγικές εξυγιαντικές, εξευγενιστικές. Προπαρασκευαστικές σποράς, φωτοδότιδες, τελικές. Αναγωγικές υλοτομίες στα πρεμνοβλαστήματα Οξυάς και Δρυός ώστε να ατομικοποιηθούν τα πρεμνοβλαστήματα (αποβλέποντας μελλοντικά στην δημιουργία συστάδων σπερμοφυούς μορφής. Εξυγιαντικές υλοτομίες στις ενώσεις Μ. Πεύκης, Δρυός και Οξυάς (στα γηραιά,	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	ΣΥ συστάδας	V κλάσεων διαμέτρου >34 cm	ΣΥ συστάδας / ha	V κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
										κουφαλερά κακόμερφα, βεβλαμένα, κ.λ.π. άτομα) ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του ξυλαποθέματος με την πλήρη απομάκρυνσή τους. Παρακράτηση ορισμένων κουφαλερών, κλαδοβριθών ατόμων 1-2/ Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων στην συστάδα για διατροφή και φωλεοποίησης της ορνιθοπανίδας. Απαγόρευση μετά την υλοτομία της βοσκής αιγών επί 10ετία, μεγάλων ζώων επί 7ετία και προβάτων επί 5ετία.	
37α	Μ.π,Δρ.,Οξ	0,8-1,1	Μ.π.:20-110 Οξ., Δρ: 20-40	Μ.π.: Σπ.,ακ. Οξ.,Δρ: πρεμ.,ομ.	Μ.Π:7.582 Δρ:237	Μ.Π:3.579 Δρ:0	Μ.Π:246,14 Δρ:84,48	Μ.Π:116,20 Δρ:0	Μ.Π:47,20 Δρ:0	Αναγωγικές εξυγιαντικές, εξευγενιστικές. Προπαρασκευαστικές σποράς, φωτοδότιδες, τελικές. Αναγωγικές υλοτομίες στα πρεμνοβλαστήματα Δρυός ώστε να ατομικοποιηθούν τα πρεμνοβλαστήματα (αποβλέποντας μελλοντικά στην δημιουργία συστάδων σπερμοφυούς μορφής. Εξυγιαντικές υλοτομίες στις ενώσεις Μ. Πεύκης, Δρυός (στα γηραιά, κουφαλερά κακόμερφα, βεβλαμένα, κ.λ.π. άτομα) ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του ξυλαποθέματος με την πλήρη απομάκρυνσή τους. Παρακράτηση ορισμένων κουφαλερών, κλαδοβριθών ατόμων 1-2/ Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων στην συστάδα για διατροφή και φωλεοποίησης της ορνιθοπανίδας.Απαγόρευση μετά την υλοτομία της βοσκής αιγών επί 10ετία, μεγάλων ζώων επί 7ετία και προβάτων επί 5ετία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
37β	Μ.π,Οξ	0,8-1,1	Μ.π.:20-110 Οξ.: 20-80	Μ.π.: Σπ.,ακ. Οξ., διφ.,ακ.	Μ.Π:16.575 Οξ:693	Μ.Π:10.651 Οξ:581	Μ.Π:345,32 Οξ:111,90	Μ.Π:221,90 Οξ:93,71	Μ.Π:64,26 Οξ:83,84	Αναγωγικές εξυγιαντικές, εξευγενιστικές. Προπαρασκευαστικές σποράς, φωτοδότιδες, τελικές. Αναγωγικές υλοτομίες στα πρεμνοβλαστήματα Οξυάς ώστε να ατομικοποιηθούν τα πρεμνοβλαστήματα. Εξυγιαντικές υλοτομίες στις ενώσεις Μ. Πεύκης και Οξυάς (στα γηραιά, κουφαλερά κακόμερφα, βεβλαμένα, κ.λ.π. Άτομα) ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του ξυλαποθέματος με την πλήρη απομάκρυνσή τους. Παρακράτηση ορισμένων κουφαλερών, κλαδοβριθών ατόμων 1-2/ Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων στην συστάδα για διατροφή και φωλεοποίησης της ορνιθοπανίδας. Απαγόρευση μετά την υλοτομία της βοσκής αιγών επί 10ετία, μεγάλων ζώων επί 7ετία και προβάτων επί 5ετία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
38α	Μ.π,Ελ.,Οξ	0,8-1,1	Μ.π, Ελ.:20-110 Οξ.: 20-80	Μ.π.,Ελ: Σπ.,ακ. Οξ.: διφ.ακ.	Μ.Π:10.988 Οξ:3.071 Ελ:594	Μ.Π:7.453 Οξ:832 Ελ:397	Μ.Π:345,53 Οξ:160,79 Ελ:269,43	Μ.Π:234,37 Οξ:43,56 Ελ:180,45	Μ.Π:67,83 Οξ:27,09 Ελ:66,84	Αναγωγικές εξυγιαντικές, εξευγενιστικές. Προπαρασκευαστικές σποράς, φωτοδότιδες, τελικές. Αναγωγικές υλοτομίες στα πρεμνοβλαστήματα Οξυάς ώστε να ατομικοποιηθούν τα πρεμνοβλαστήματα. Εξυγιαντικές υλοτομίες στις ενώσεις Μ. Πεύκης, Ελάτης και Οξυάς (στα γηραιά, κουφαλερά κακόμερφα, βεβλαμένα, κ.λ.π. άτομα). Παρακράτηση ορισμένων κουφαλερών, κλαδοβριθών ατόμων 1-2/ Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων στην συστάδα για διατροφή και φωλεοποίησης της ορνιθοπανίδας. Απαγόρευση μετά την υλοτομία της βοσκής αιγών επί 10ετία, μεγάλων ζώων επί 7ετία και προβάτων επί 5ετία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
38β	Μ.π,Ελ.,Οξ	0,8-1,1	Μ.π, Ελ.:20-110 Οξ.: 20-100	Μ.π.,Ελ: Σπ.,ακ. Οξ.: διφ.ακ.	Μ.Π:883 Οξ:5.866 Ελ:7.545	Μ.Π:373 Οξ:2.262 Ελ:2.832	Μ.Π:315,54 Οξ:189,84 Ελ:244,19	Μ.Π:133,21 Οξ:73,20 Ελ:93,59	Μ.Π:42,24 Οξ:38,56 Ελ:38,33	Αναγωγικές εξυγιαντικές, εξευγενιστικές. Προπαρασκευαστικές σποράς, φωτοδότιδες, τελικές. Αναγωγικές υλοτομίες στα πρεμνοβλαστήματα Οξυάς ώστε να ατομικοποιηθούν τα πρεμνοβλαστήματα. Εξυγιαντικές υλοτομίες στις ενώσεις Μ. Πεύκης, Ελάτης και Οξυάς (στα γηραιά, κουφαλερά κακόμερφα, βεβλαμένα, κ.λ.π. άτομα). Παρακράτηση ορισμένων κουφαλερών, κλαδοβριθών ατόμων 1-2/ Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων στην συστάδα για διατροφή και φωλεοποίησης της ορνιθοπανίδας. Απαγόρευση μετά την υλοτομία της βοσκής αιγών επί 10ετία, μεγάλων ζώων επί 7ετία και προβάτων επί 5ετία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
38γ	Μ.π,Ελ.,Οξ	0,8-1,1	Μ.π, Ελ.:20-110 Οξ.: 20-100	Μ.π.,Ελ: Σπ.,ακ. Οξ.: διφ.ακ.	Μ.Π:13.241 Οξ:1.952 Ελ:532	Μ.Π:7.896 Οξ:1.334 Ελ:164	Μ.Π:315,26 Οξ:205,37 Ελ:72,92	Μ.Π:188,00 Οξ:140,42 Ελ:22,47	Μ.Π:59,63 Οξ:68,34 Ελ:30,83	Αναγωγικές εξυγιαντικές, εξευγενιστικές. Προπαρασκευαστικές σποράς, φωτοδότιδες, τελικές. Αναγωγικές υλοτομίες στα πρεμνοβλαστήματα Οξυάς ώστε να ατομικοποιηθούν τα πρεμνοβλαστήματα. Εξυγιαντικές υλοτομίες στις ενώσεις Μ. Πεύκης, Ελάτης και Οξυάς (στα γηραιά, κουφαλερά κακόμερφα, βεβλαμένα, κ.λ.π. άτομα). Παρακράτηση ορισμένων κουφαλερών, κλαδοβριθών ατόμων 1-2/ Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων στην συστάδα για διατροφή και φωλεοποίησης της ορνιθοπανίδας. Απαγόρευση μετά την υλοτομία της βοσκής αιγών επί 10ετία, μεγάλων ζώων επί 7ετία και προβάτων επί 5ετία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
39α	Μ.π,Ελ.,Οξ	0,8-1,1	Μ.π, Ελ.:20-110 Οξ.: 20-100	Μ.π.,Ελ: Σπ.,ακ. Οξ.: διφ.ακ.	Μ.Π:6.399 Οξ:8.654 Ελ:272	Μ.Π:3.380 Οξ:2.372 Ελ:0	Μ.Π:216,21 Οξ:195,36 Ελ:39,34	Μ.Π:114,19 Οξ:53,54 Ελ:0	Μ.Π:52,82 Οξ:27,41 Ελ:0	Αναγωγικές εξυγιαντικές, εξευγενιστικές. Προπαρασκευαστικές σποράς, φωτοδότιδες, τελικές. Αναγωγικές υλοτομίες στα πρεμνοβλαστήματα Οξυάς ώστε να ατομικοποιηθούν τα πρεμνοβλαστήματα. Εξυγιαντικές υλοτομίες στις ενώσεις Μ. Πεύκης, Ελάτης και Οξυάς (στα γηραιά, κουφαλερά κακόμερφα, βεβλαμένα, κ.λ.π. άτομα). Παρακράτηση ορισμένων κουφαλερών, κλαδοβριθών ατόμων 1-2/ Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων στην συστάδα για διατροφή και φωλεοποίησης της ορνιθοπανίδας. Απαγόρευση μετά την υλοτομία της βοσκής αιγών επί 10ετία, μεγάλων ζώων επί 7ετία και προβάτων επί 5ετία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
39β	Μ.π,Οξ	0,7-1,1	Μ.π.:20-110 Οξ.: 20-100	Μ.π.: Σπ.,ακ. Οξ., διφ.,ακ.	Μ.Π:7.326 Οξ:843	Μ.Π:4.004 Οξ:85	Μ.Π:190,79 Οξ:147,75	Μ.Π:104,27 Οξ:14,,91	Μ.Π:54,65 Οξ:10,08	Αναγωγικές εξυγιαντικές, εξευγενιστικές. Προπαρασκευαστικές σποράς, φωτοδότιδες, τελικές. Αναγωγικές υλοτομίες στα πρεμνοβλαστήματα Οξυάς ώστε να ατομικοποιηθούν τα πρεμνοβλαστήματα. Εξυγιαντικές υλοτομίες στις ενώσεις Μ. Πεύκης και Οξυάς (στα γηραιά, κουφαλερά κακόμερφα, βεβλαμένα, κ.λ.π. Άτομα) ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του ξυλαποθέματος με την πλήρη απομάκρυνσή τους. Παρακράτηση ορισμένων κουφαλερών, κλαδοβριθών ατόμων 1-2/ Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων στην συστάδα για διατροφή και φωλεοποίησης της ορνιθοπανίδας.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	ΣV συστάδας	V κλάσεων διαμέτρου >34 cm	ΣV συστάδας / ha	V κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
										Απαγόρευση μετά την υλοτομία της βοσκής αιγών επί 10ετία, μεγάλων ζώων επί 7ετία και προβάτων επί 5ετία.	
39γ	Μ.π,Δρ.,Οξ	0,7-1,1	Μ.π.:20-110 Οξ., Δρ: 10-40	Μ.π.: Σπ.,ακ. Οξ.,Δρ: διφ.,ομ.	Μ.Π:8.798 Οξ.:228 Δρ:574	Μ.Π:3.466 Οξ.:40 Δρ:0	Μ.Π:143,98 Οξ.:76,14 Δρ:72,64	Μ.Π:56,73 Οξ.:13,33 Δρ:0	Μ.Π:39,40 Οξ.:17,54 Δρ:0	Αναγωγικές εξυγιαντικές, εξευγενιστικές. Προπαρασκευαστικές σποράς, φωτοδότιδες, τελικές. Αναγωγικές υλοτομίες στα πρεμνοβλαστήματα Δρυός και Οξυάς ώστε να ατομικοποιηθούν τα πρεμνοβλαστήματα. Εξυγιαντικές υλοτομίες στις ενώσεις Μ. Πεύκης, Δρυός και Οξυάς (στα γηραιά, κουφαλερά κακόμορφα, βεβλαμένα, κ.λ.π. Άτομα) ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του ξυλαποθέματος με την πλήρη απομάκρυνσή τους. Παρακράτηση ορισμένων κουφαλερών, κλαδοβριθών ατόμων 1-2/ Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων στην συστάδα για διατροφή και φωλεοποίησης της ορνιθοπανίδας. Απαγόρευση μετά την υλοτομία της βοσκής αιγών επί 10ετία, μεγάλων ζώων επί 7ετία και προβάτων επί 5ετία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
39δ	Μ.π,Δρ.,Οξ	0,7-1,1	Μ.π.:20-110 Οξ.: 20-100	Μ.π.: Σπ.,ακ. Οξ.,Δρ: διφ.,ακ.	Μ.Π:14.795 Οξ.:6.251 Δρ:661	Μ.Π:3.421 Οξ.:2.180 Δρ:0	Μ.Π:160,12 Οξ.:193,54 Δρ:93,20	Μ.Π:37,02 Οξ.:67,49 Δρ:0	Μ.Π:23,12 Οξ.:34,87 Δρ:0	Αναγωγικές εξυγιαντικές, εξευγενιστικές. Προπαρασκευαστικές σποράς, φωτοδότιδες, τελικές. Αναγωγικές υλοτομίες στα πρεμνοβλαστήματα Δρυός και Οξυάς ώστε να ατομικοποιηθούν τα πρεμνοβλαστήματα. Εξυγιαντικές υλοτομίες στις ενώσεις Μ. Πεύκης, Ελάτης και Οξυάς (στα γηραιά, κουφαλερά κακόμορφα, βεβλαμένα, κ.λ.π. Άτομα) ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του ξυλαποθέματος με την πλήρη απομάκρυνσή τους. Παρακράτηση ορισμένων κουφαλερών, κλαδοβριθών ατόμων 1-2/ Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων στην συστάδα για διατροφή και φωλεοποίησης της ορνιθοπανίδας. Απαγόρευση μετά την υλοτομία της βοσκής αιγών επί 10ετία, μεγάλων ζώων επί 7ετία και προβάτων επί 5ετία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
39ε	Μ.π,Ελ.,Οξ	0,8-1,1	Μ.π, Ελ.:20-110 Οξ.: 20-100	Μ.π.,Ελ: Σπ.,ακ. Οξ.: διφ.ακ.	Μ.Π:5.223 Οξ:11.153 Ελ:4.113	Μ.Π:3.208 Οξ:1.311 Ελ:2.454	Μ.Π:103,03 Οξ:293,50 Ελ:127,35	Μ.Π:63,27 Οξ:34,50 Ελ:75,98	Μ.Π:61,42 Οξ:11,75 Ελ:59,66	Αναγωγικές εξυγιαντικές, εξευγενιστικές. Προπαρασκευαστικές σποράς, φωτοδότιδες, τελικές. Αναγωγικές υλοτομίες στα πρεμνοβλαστήματα Οξυάς ώστε να ατομικοποιηθούν τα πρεμνοβλαστήματα. Εξυγιαντικές υλοτομίες στις ενώσεις Μ. Πεύκης, Ελάτης και Οξυάς (στα γηραιά, κουφαλερά κακόμορφα, βεβλαμένα, κ.λ.π. άτομα). Παρακράτηση ορισμένων κουφαλερών, κλαδοβριθών ατόμων 1-2/ Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων στην συστάδα για διατροφή και φωλεοποίησης της ορνιθοπανίδας. Απαγόρευση μετά την υλοτομία της βοσκής αιγών επί 10ετία, μεγάλων ζώων επί 7ετία και προβάτων επί 5ετία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
40α	Μ.π,Ελ.,Οξ	0,8-1,1	Μ.π, Ελ.:20-110 Οξ.: 20-100	Μ.π.,Ελ: Σπ.,ακ. Οξ.: διφ.ακ.,ομ.	Μ.Π:169 Οξ:14.054 Ελ:151	Μ.Π:25 Οξ:3.914 Ελ:25	Μ.Π:88,90 Οξ:357,61 Ελ:79,44	Μ.Π:13,16 Οξ:99,59 Ελ:13,16	Μ.Π:14,79 Οξ:27,85 Ελ:16,56	Αναγωγικές εξυγιαντικές, εξευγενιστικές. Προπαρασκευαστικές σποράς, φωτοδότιδες, τελικές. Αναγωγικές υλοτομίες στα πρεμνοβλαστήματα Οξυάς ώστε να ατομικοποιηθούν τα πρεμνοβλαστήματα. Εξυγιαντικές υλοτομίες στις ενώσεις Μ. Πεύκης, Ελάτης και Οξυάς (στα γηραιά, κουφαλερά κακόμορφα, βεβλαμένα, κ.λ.π. άτομα). Παρακράτηση ορισμένων κουφαλερών, κλαδοβριθών ατόμων 1-2/ Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων στην συστάδα για διατροφή και φωλεοποίησης της ορνιθοπανίδας. Απαγόρευση μετά την υλοτομία της βοσκής αιγών επί 10ετία, μεγάλων ζώων επί 7ετία και προβάτων επί 5ετία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
40β	Οξ.	0,8-1,1	20-150	Διφ.,ακ.	5.795	3.007	327,4	169,89	51,89	Αναγωγικές εξυγιαντικές, εξευγενιστικές. Προπαρασκευαστικές σποράς, φωτοδότιδες, τελικές. Αναγωγικές υλοτομίες στα πρεμνοβλαστήματα Οξυάς ώστε να ατομικοποιηθούν τα πρεμνοβλαστήματα. Εξυγιαντικές υλοτομίες Οξυάς (στα γηραιά, κουφαλερά κακόμορφα, βεβλαμένα, κ.λ.π. άτομα). Παρακράτηση ορισμένων κουφαλερών, κλαδοβριθών ατόμων 1-2/ Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων στην συστάδα για διατροφή και φωλεοποίησης της ορνιθοπανίδας. Απαγόρευση μετά την υλοτομία της βοσκής αιγών επί 10ετία, μεγάλων ζώων επί 7ετία και προβάτων επί 5ετία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
40γ	Ελ.,Οξ	0,8-1,1	Ελ.:20-150 Οξ.: 20-150	Ελ: Σπ.,ακ. Οξ.: διφ.ακ.	Οξ:15.684 Ελ:451	Οξ:7.705 Ελ:180	Οξ:309,98 Ελ:205,42	Οξ:152,27 Ελ:81,82	Οξ:49,13 Ελ:39,91	Κατά την τελευταία δεκαετία δεν διενεργήθηκε ουδεμία υλοτομία ενώ προβλεπόταν να υλοτομηθεί το έτος 2011. Την τρέχουσα περίοδο προτείνονται: Αναγωγικές εξυγιαντικές, εξευγενιστικές. Προπαρασκευαστικές σποράς, φωτοδότιδες, τελικές. Αναγωγικές υλοτομίες στα πρεμνοβλαστήματα Οξυάς ώστε να ατομικοποιηθούν τα πρεμνοβλαστήματα. Εξυγιαντικές υλοτομίες στις ενώσεις Ελάτης και Οξυάς (στα γηραιά, κουφαλερά κακόμορφα, βεβλαμένα, κ.λ.π. άτομα). Παρακράτηση ορισμένων κουφαλερών, κλαδοβριθών ατόμων 1-2/ Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων στην συστάδα για διατροφή και φωλεοποίησης της ορνιθοπανίδας. Απαγόρευση μετά την υλοτομία της βοσκής αιγών επί 10ετία, μεγάλων ζώων επί 7ετία και προβάτων επί 5ετία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
40δ	Οξ	0,8-1,1	Οξ.: 20-150	Οξ.: διφ.ακ.	18.039,00	8.606	277,08	132,2	47,71	Αναγωγικές εξυγιαντικές, εξευγενιστικές. Προπαρασκευαστικές σποράς, φωτοδότιδες, τελικές. Αναγωγικές υλοτομίες στα πρεμνοβλαστήματα Οξυάς ώστε να ατομικοποιηθούν τα πρεμνοβλαστήματα. Εξυγιαντικές υλοτομίες στις ενώσεις Ελάτης και Οξυάς (στα γηραιά, κουφαλερά κακόμορφα, βεβλαμένα, κ.λ.π. άτομα). Παρακράτηση ορισμένων κουφαλερών, κλαδοβριθών ατόμων 1-2/ Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων στην συστάδα για διατροφή και φωλεοποίησης της ορνιθοπανίδας. Απαγόρευση μετά την υλοτομία της βοσκής αιγών επί 10ετία, μεγάλων ζώων επί 7ετία και προβάτων επί 5ετία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
40ε	Ελ.,Οξ	0,9-1,1	Ελ.:20-150 Οξ.: 20-150	Ελ: Σπ.,ακ. Οξ.: διφ.ακ.	Οξ:10.112 Ελ:1.531	Οξ:4.511 Ελ:1.050	Οξ:277,82 Ελ:273,49	Οξ:123,93 Ελ:187,50	Οξ:44,61 Ελ:68,58	Αναγωγικές εξυγιαντικές, εξευγενιστικές. Προπαρασκευαστικές σποράς, φωτοδότιδες, τελικές. Αναγωγικές υλοτομίες στα πρεμνοβλαστήματα Οξυάς ώστε να ατομικοποιηθούν τα πρεμνοβλαστήματα. Εξυγιαντικές υλοτομίες στις ενώσεις Ελάτης και Οξυάς (στα γηραιά, κουφαλερά κακόμορφα, βεβλαμένα, κ.λ.π. άτομα). Παρακράτηση ορισμένων κουφαλερών,	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	ΣΥ συστάδας	V κλάσεων διαμέτρου >34 cm	ΣΥ συστάδας / ha	V κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
										κλαδοβριθών ατόμων 1-2/ Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων στην συστάδα για διατροφή και φώλεοποίησης της ορνιθοπανίδας. Απαγόρευση μετά την υλοτομία της βοσκής αιγών επί 10ετία, μεγάλων ζώων επί 7ετία και προβάτων επί 5ετία.	
41α	Ελ.,Οξ	0,9-1,1	Ελ.:20-150 Οξ.: 20-150	Ελ., Οξ: Σπ.,ακ.	Οξ:27.605 Ελ:379	Οξ:17.668 Ελ:83	Οξ:354,36 Ελ:270,88	Οξ:226,80 Ελ:14,82	Οξ:64,00 Ελ:21,90	Αναγωγικές εξυγιαντικές, εξευγενιστικές. Προπαρασκευαστικές σποράς, φωτοδότιδες, τελικές. Αναγωγικές υλοτομίες στα πρεμνοβλαστήματα Οξυάς ώστε να ατομικοποιηθούν τα πρεμνοβλαστήματα. Εξυγιαντικές υλοτομίες στις ενώσεις Ελάτης και Οξυάς (στα γηραιά, κουφαλερά κακόμορφα, βεβλαμένα, κ.λ.π. άτομα). Παρακράτηση ορισμένων κουφαλερών, κλαδοβριθών ατόμων 1-2/ Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων στην συστάδα για διατροφή και φώλεοποίησης της ορνιθοπανίδας. Απαγόρευση μετά την υλοτομία της βοσκής αιγών επί 10ετία, μεγάλων ζώων επί 7ετία και προβάτων επί 5ετία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
41β	Ελ.,Οξ	0,8-1,1	Ελ.:20-150 Οξ.: 20-150	Ελ: Σπ.,ακ. Οξ.: διφ.ακ.	Οξ:6.433 Ελ:144	Οξ:4.775 Ελ:33	Οξ:297,89 Ελ:205,76	Οξ:221,06 Ελ:47,14	Οξ:74,23 Ελ:22,92	Κατά την τελευταία δεκαετία δεν διενεργήθηκε ουδεμία υλοτομία στην συστάδα καθώς τέθηκε εκτός διαχείρισης με τροποποίηση της διαχειριστικής μελέτης λόγω απότομων κλίσεων και αδυναμίας εξωδάσωσης των δασικών προϊόντων. Εκτός διαχείρισης και την παρούσα 10ετία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
41γ	Μ.π,Ελ.,Οξ	0,8-1,1	Μ.π, Ελ.:20-150 Οξ.: 20-150	Μ.π.,Ελ: Σπ.,ακ. Οξ.: διφ.ακ..	Μ.Π:834 Οξ:13.028 Ελ:7.438	Μ.Π:314 Οξ:5.658 Ελ:3.545	Μ.Π:160,3 8 Οξ:219,68 Ελ:193,68	Μ.Π:60,38 Οξ:95,41 Ελ:92,32	Μ.Π:37,65 Οξ:43,43 Ελ:47,66	Αναγωγικές εξυγιαντικές, εξευγενιστικές. Προπαρασκευαστικές σποράς, φωτοδότιδες, τελικές. Αναγωγικές υλοτομίες στα πρεμνοβλαστήματα Οξυάς ώστε να ατομικοποιηθούν τα πρεμνοβλαστήματα. Εξυγιαντικές υλοτομίες στις ενώσεις Μ. Πεύκης, Ελάτης και Οξυάς (στα γηραιά, κουφαλερά κακόμορφα, βεβλαμένα, κ.λ.π. άτομα). Παρακράτηση ορισμένων κουφαλερών, κλαδοβριθών ατόμων 1-2/ Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων στην συστάδα για διατροφή και φώλεοποίησης της ορνιθοπανίδας. Απαγόρευση μετά την υλοτομία της βοσκής αιγών επί 10ετία, μεγάλων ζώων επί 7ετία και προβάτων επί 5ετία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
42α	Ελ.,Οξ	0,8-1,1	Ελ.:20-150 Οξ.: 20-150	Ελ: Σπ.,ακ. Οξ.: διφ.ακ.	Οξ:14.117 Ελ:1.087	Οξ:8.796 Ελ:458	Οξ:266,88 Ελ:92,94	Οξ:166,68 Ελ:39,15	Οξ:62,31 Ελ:42,13	Αναγωγικές εξυγιαντικές, εξευγενιστικές. Προπ/σκευαστικές. Αναγωγικές υλοτομίες στα πρεμνοβλαστήματα Οξυάς ώστε να ατομικοποιηθούν τα πρεμνοβλαστήματα. Εξυγιαντικές υλοτομίες στις ενώσεις Ελάτης και Οξυάς (στα γηραιά, κουφαλερά κακόμορφα, βεβλαμένα, κ.λ.π. άτομα). Παρακράτηση ορισμένων κουφαλερών, κλαδοβριθών ατόμων 1-2/ Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων στην συστάδα για διατροφή και φώλεοποίησης της ορνιθοπανίδας. Απαγόρευση μετά την υλοτομία της βοσκής αιγών επί 10ετία, μεγάλων ζώων επί 7ετία και προβάτων επί 5ετία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
42β	Ελ.,Οξ	0,8-1,1	Ελ.:20-200 Οξ.: 20-200	Ελ: Σπ.,ακ. Οξ.: διφ.ακ.	Οξ:13.918 Ελ:1.449	Οξ:6.901 Ελ:776	Οξ:284,03 Ελ:216,32	Οξ:140,84 Ελ:115,82	Οξ:49,58 Ελ:53,55	Αναγωγικές εξυγιαντικές, εξευγενιστικές. Προπαρασκευαστικές σποράς, φωτοδότιδες, τελικές. Αναγωγικές υλοτομίες στα πρεμνοβλαστήματα Οξυάς ώστε να ατομικοποιηθούν τα πρεμνοβλαστήματα. Εξυγιαντικές υλοτομίες στις ενώσεις Ελάτης και Οξυάς (στα γηραιά, κουφαλερά κακόμορφα, βεβλαμένα, κ.λ.π. άτομα). Παρακράτηση ορισμένων κουφαλερών, κλαδοβριθών ατόμων 1-2/ Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων στην συστάδα για διατροφή και φώλεοποίησης της ορνιθοπανίδας. Απαγόρευση μετά την υλοτομία της βοσκής αιγών επί 10ετία, μεγάλων ζώων επί 7ετία και προβάτων επί 5ετία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
42γ	Οξ	0,9-1,2	Οξ.: 20-200	Οξ.: διφ.ακ.	7.812,00	3.872	329,58	60,38	37,65	Κατά την τελευταία δεκαετία δεν διενεργήθηκε ουδεμία υλοτομία στην συστάδας λόγω απότομων κλίσεων, αδυναμίας εξωδάσωσης των δασικών προϊόντων και μη ύπαρξη δασικού οδικού δικτύου. Εκτός διαχείρισης την παρούσα 10ετία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
42δ	Οξ	0,1-0,7	Οξ.: 20-200	Οξ.: διφ.ακ.	798	154	266,1	51,3	19,3	Κατά την τελευταία δεκαετία δεν διενεργήθηκε ουδεμία υλοτομία στην συστάδα καθώς τέθηκε εκτός διαχείρισης λόγω μη ύπαρξης επαρκούς ξυλώδους κεφαλαίου για υλοτομία και αδυναμίας εξωδάσωσης δασικών προϊόντων. Εκτός διαχείρισης και την παρούσα 10ετία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
43α	Οξ	0,7-1,1	Οξ.: 20-200	Οξ.: διφ.ακ.	3.116	1.094	302,52	106,21	35,11	Κατά την τελευταία δεκαετία δεν διενεργήθηκε ουδεμία υλοτομία στην συστάδα ενώ προβλεπόταν να υλοτομηθεί το έτος 2015. Εκτός διαχείρισης την παρούσα 10ετία λόγω ισχυρών κλίσεων και αδυναμίας εξωδάσωσης των δασικών προϊόντων. Μη ύπαρξη δασικού οδικού δικτύου.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
43β										Η συστάδα καλύπτεται σε όλη την έκτασή της από χορτολιβαδικές και άγονες εκτάσεις. Η συστάδα χρησιμοποιείται ως βοσκότοπος.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
44α	Μ.π,Ελ.,Οξ	0,8-1,1	Μ.π, Ελ.:20-110 Οξ.: 20-200	Μ.π.,Ελ: Σπ.,ακ. Οξ.: διφ.ακ.	Μ.Π:516 Οξ:6.405 Ελ:2.828	Μ.Π:186 Οξ:2.493 Ελ:1.327	Μ.Π:166,4 8 Οξ:167,65 Ελ:135,33	Μ.Π:60,00 Οξ:65,26 Ελ:63,49	Μ.Π:36,05 Οξ:38,92 Ελ:46,92	Αναγωγικές εξυγιαντικές, εξευγενιστικές. Προπαρασκευαστικές σποράς, φωτοδότιδες, τελικές. Αναγωγικές υλοτομίες στα πρεμνοβλαστήματα Οξυάς ώστε να ατομικοποιηθούν τα πρεμνοβλαστήματα. Εξυγιαντικές υλοτομίες στις ενώσεις Μ. Πεύκης, Ελάτης και Οξυάς (στα γηραιά, κουφαλερά κακόμορφα, βεβλαμένα, κ.λ.π. άτομα). Παρακράτηση ορισμένων κουφαλερών, κλαδοβριθών ατόμων 1-2/ Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων στην συστάδα για διατροφή και φώλεοποίησης της ορνιθοπανίδας. Απαγόρευση μετά την υλοτομία της βοσκής αιγών επί 10ετία, μεγάλων ζώων επί 7ετία και προβάτων επί 5ετία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	ΣV συστάδας	V κλάσεων διαμέτρου >34 cm	ΣV συστάδας / ha	V κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
44β	Μ.π,Ελ.,Οξ	0,7-1,1	Μ.π, Ελ.:20-140 Οξ.: 20-140	Μ.π.,Ελ: Σπ.,ακ. Οξ.: διφ.ακ.	Μ.Π:5.146 Οξ:8.694 Ελ:2.689	Μ.Π:4.722 Οξ:2.003 Ελ:885	Μ.Π:145,36 Οξ:211,00 Ελ:184,11	Μ.Π:133,39 Οξ:48,62 Ελ:60,62	Μ.Π:91,76 Οξ:23,04 Ελ:32,91	Αναγωγικές εξυγιαντικές, εξευγενιστικές. Προπαρασκευαστικές σποράς, φωτοδοτίδες, τελικές. Αναγωγικές υλοτομίες στα πρεμνοβλαστήματα Οξυάς ώστε να ατομικοποιηθούν τα πρεμνοβλαστήματα. Εξυγιαντικές υλοτομίες στις ενώσεις Μ. Πεύκης, Ελάτης και Οξυάς (στα γηραιά, κουφαλερά κακόμερφα, βεβλαμένα, κ.λ.π. άτομα). Παρακράτηση ορισμένων κουφαλερών, κλαδοβριθών ατόμων 1-2/ Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων στην συστάδα για διατροφή και φώλεοποίησης της ορνιθοπανίδας. Απαγόρευση μετά την υλοτομία της βοσκής αιγών επί 10ετία, μεγάλων ζώων επί 7ετία και προβάτων επί 5ετία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
44γ	Μ.π,Ελ.,Οξ	0,7-1,1	Μ.π, Ελ.:10-100 Οξ.: 20-160	Μ.π.,Ελ: Σπ.,ακ. Οξ.: διφ.ακ.	Μ.Π:634 Οξ:7.506 Ελ:769	Μ.Π:425 Οξ:2.309 Ελ:152	Μ.Π:76,35 Οξ:156,07 Ελ:102,61	Μ.Π:51,20 Οξ:48,00 Ελ:20,27	Μ.Π:67,03 Οξ:30,76 Ελ:19,77	Αναγωγικές εξυγιαντικές, εξευγενιστικές. Προπαρασκευαστικές σποράς, φωτοδοτίδες, τελικές. Αναγωγικές υλοτομίες στα πρεμνοβλαστήματα Οξυάς ώστε να ατομικοποιηθούν τα πρεμνοβλαστήματα. Εξυγιαντικές υλοτομίες στις ενώσεις Μ. Πεύκης, Ελάτης και Οξυάς (στα γηραιά, κουφαλερά κακόμερφα, βεβλαμένα, κ.λ.π. άτομα). Παρακράτηση ορισμένων κουφαλερών, κλαδοβριθών ατόμων 1-2/ Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων στην συστάδα για διατροφή και φώλεοποίησης της ορνιθοπανίδας. Απαγόρευση μετά την υλοτομία της βοσκής αιγών επί 10ετία, μεγάλων ζώων επί 7ετία και προβάτων επί 5ετία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
44δ	Ελ.,Οξ	0,7-1,1	Ελ.:10-100 Οξ.: 20-160	Ελ: Σπ.,ακ. Οξ.: Σπ.ακ.	Οξ:5.892 Ελ:1.110	Οξ:2.739 Ελ:308	Οξ:165,51 Ελ:127,60	Οξ:76,94 Ελ:35,4	Οξ:46,49 Ελ:27,75	Αναγωγικές εξυγιαντικές, εξευγενιστικές. Προπαρασκευαστικές σποράς, φωτοδοτίδες, τελικές.. Αναγωγικές υλοτομίες στα πρεμνοβλαστήματα Οξυάς ώστε να ατομικοποιηθούν τα πρεμνοβλαστήματα. Εξυγιαντικές υλοτομίες στις ενώσεις Ελάτης και Οξυάς (στα γηραιά, κουφαλερά κακόμερφα, βεβλαμένα, κ.λ.π. άτομα). Παρακράτηση ορισμένων κουφαλερών, κλαδοβριθών ατόμων 1-2/ Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων στην συστάδα για διατροφή και φώλεοποίησης της ορνιθοπανίδας. Απαγόρευση μετά την υλοτομία της βοσκής αιγών επί 10ετία, μεγάλων ζώων επί 7ετία και προβάτων επί 5ετία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
44ε	Ελ.,Οξ	0,7-1,1	Ελ.:10-100 Οξ.: 20-160	Ελ: Σπ.,ακ. Οξ.: Σπ.ακ.	Οξ:10.336 Ελ:45	Οξ:4.787 Ελ:27	Οξ:289,55 Ελ:49,40	Οξ:134,09 Ελ:30,00	Οξ:46,31 Ελ:60,00	Αναγωγικές εξυγιαντικές, εξευγενιστικές. Προπαρασκευαστικές σποράς, φωτοδοτίδες, τελικές.. Αναγωγικές υλοτομίες στα πρεμνοβλαστήματα Οξυάς ώστε να ατομικοποιηθούν τα πρεμνοβλαστήματα. Εξυγιαντικές υλοτομίες στις ενώσεις Ελάτης και Οξυάς (στα γηραιά, κουφαλερά κακόμερφα, βεβλαμένα, κ.λ.π. άτομα). Παρακράτηση ορισμένων κουφαλερών, κλαδοβριθών ατόμων 1-2/ Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων στην συστάδα για διατροφή και φώλεοποίησης της ορνιθοπανίδας. Απαγόρευση μετά την υλοτομία της βοσκής αιγών επί 10ετία, μεγάλων ζώων επί 7ετία και προβάτων επί 5ετία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
44σ τ	Μ.π,Ελ.,Οξ	0,8-1,1	Μ.π, Ελ.:10-100 Οξ.: 20-160	Μ.π.,Ελ: Σπ.,ακ. Οξ.: διφ.ακ.	Μ.Π:775 Οξ:10.950 Ελ:221	Μ.Π:688 Οξ:2.852 Ελ:59	Μ.Π:44,80 Οξ:192,11 Ελ:81,70	Μ.Π:39,77 Οξ:50,04 Ελ:21,85	Μ.Π:88,77 Οξ:26,05 Ελ:26,70	Αναγωγικές εξυγιαντικές, εξευγενιστικές. Προπαρασκευαστικές σποράς, φωτοδοτίδες, τελικές. Αναγωγικές υλοτομίες στα πρεμνοβλαστήματα Οξυάς ώστε να ατομικοποιηθούν τα πρεμνοβλαστήματα. Εξυγιαντικές υλοτομίες στις ενώσεις Μ. Πεύκης, Ελάτης και Οξυάς (στα γηραιά, κουφαλερά κακόμερφα, βεβλαμένα, κ.λ.π. άτομα). Παρακράτηση ορισμένων κουφαλερών, κλαδοβριθών ατόμων 1-2/ Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων στην συστάδα για διατροφή και φώλεοποίησης της ορνιθοπανίδας. Απαγόρευση μετά την υλοτομία της βοσκής αιγών επί 10ετία, μεγάλων ζώων επί 7ετία και προβάτων επί 5ετία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
1α	Ελ.,Οξ	0,8-1,0	-140 και γηραιότ.	Ελ.,Οξ.: Σπ.,αν. η Οξ.: με ώριμα πρεμ.ατομα.	Οξ:1.719 Ελ:117	Οξ:1.341 Ελ:108	Οξ:191 Ελ:13	Οξ:149 Ελ:12	Οξ:78,01 Ελ:92,31	Εκτός διαχείρισης. Η δασοσκεπής έκταση που υπάρχει είναι περιορισμένη. Οι λοιπές εκτάσεις της συστάδας βόσκονται. Το κτηνοτροφικό κεφάλαιο ασκεί πιέσεις και στις δασοσκεπείς εκτάσεις της, τουλάχιστον περιφερειακά. Με την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΡΑΜΜΟΥ – ΒΔ ΒΟΪΟΥ, που συντάχθηκε το 1999 και εγκρίθηκε από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., η έκταση που καταλαμβάνει η συστάδα περιλαμβάνεται σε μια ευρύτερη ζώνη προστασίας «Περιοχές Προστασίας της Φύσης», λόγω κυρίως της ύπαρξης πληθυσμού του βαλκανικού αγριόγιδου και οι δραστηριότητες που προτείνονται εκεί είναι : Επιτρέπεται η διεξαγωγή επιστημονικών εργασιών και η εκτέλεση εργασιών που αποσκοπούν στη διατήρηση των χαρακτηριστικών της περιοχής εφόσον εξασφαλίζεται υψηλός βαθμός προστασίας. Επιτρέπεται η συντήρηση των υπαρχόντων μονοπατιών. Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση μαντριών ή άλλων υποδομών για την κτηνοτροφία. Δεν επιτρέπεται η διάνοιξη νέων δασικών ή άλλων αμαξιών οδών	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΠΛΗΚΑΤΙΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ
1β	Ελ.,Οξ	0,6-1,0	-140 και γηραιότ.	Ελ.,Οξ.: Σπ.,αν. η Οξ.: με ώριμα πρεμ.ατομα.	Οξ:2.674 Ελ:182	Οξ:2.086 Ελ:168	Οξ:191 Ελ:13	Οξ:149 Ελ:12	Οξ:78,01 Ελ:92,31	Εκτός διαχείρισης. Η δασοσκεπής έκταση που υπάρχει είναι περιορισμένη. Οι λοιπές εκτάσεις της συστάδας βόσκονται. Το κτηνοτροφικό κεφάλαιο ασκεί πιέσεις και στις δασοσκεπείς εκτάσεις της, τουλάχιστον περιφερειακά. Με την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΡΑΜΜΟΥ – ΒΔ ΒΟΪΟΥ, που συντάχθηκε το 1999 και εγκρίθηκε από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., η έκταση που καταλαμβάνει η συστάδα περιλαμβάνεται σε μια ευρύτερη ζώνη προστασίας «Περιοχές Προστασίας της Φύσης», λόγω κυρίως της ύπαρξης πληθυσμού του βαλκανικού αγριόγιδου και οι δραστηριότητες που προτείνονται εκεί είναι : Επιτρέπεται η διεξαγωγή επιστημονικών εργασιών και η εκτέλεση εργασιών που αποσκοπούν στη διατήρηση των χαρακτηριστικών της περιοχής εφόσον εξασφαλίζεται υψηλός βαθμός προστασίας. Επιτρέπεται η συντήρηση των υπαρχόντων μονοπατιών. Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση μαντριών ή άλλων υποδομών για την κτηνοτροφία. Δεν επιτρέπεται η διάνοιξη νέων δασικών ή άλλων αμαξιών οδών	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΠΛΗΚΑΤΙΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	ΣΥ συστάδας	V κλάσεων διαμέτρου >34 cm	ΣΥ συστάδας / ha	V κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
2α	Οξ., άτομα ΕΛ.	0,8-1,1	-150	Σπ.,αν.	11.052	6.804	307	189	62	Προπαρασκευαστικές υλοτομίες, με την απομάκρυνση γενετικά ανεπιθύμητων ατόμων αλλά και τη προετοιμασία του εδάφους προς υποδοχή των σπόρων. Θα διενεργηθούν ομοιόμορφα στη συστάδα και ιδιαίτερα σε θέσεις με πυκνή συγκόμωση, ανυλοτόμητες θέσεις εντός αυτής. Κρίνονται απαραίτητες σε ακαλλιέργητες συστάδες. Φωτοδοτίδες υλοτομίες. Άτομα Ελάτης που θεωρούνται κρίσιμα – υπερήλικα επίσης θα απομακρύνονται με παράλληλη προστασία της αναγέννησης. Καλλιέργεια ξυλαποθέματος που θα συνίσταται στη θετική επιλογή και ανατροφή στη μέση κλάση διαμέτρου με αραιώση και στόχο την ποιοτική αναβάθμιση του ξυλαποθέματος και την επίτευξη κανονικής κηπευτής δομής. Απαγόρευση της βοσκής για τα επόμενα 10 έτη.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΠΛΗΚΑΤΙΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ
2β	ΕΛ.,Οξ	0,8-1,1	-120 και γηραιότ.	ΕΛ.,Οξ.: Σπ.,αν. η Οξ.: με ώριμα πρεμ.ατομα.	Οξ:8.022 Ελ:546	Οξ:6.258 Ελ:504	Οξ:191 Ελ:13	Οξ:149 Ελ:12,00	Οξ:78,01 Ελ:92,,31	Στο κατώτατο όριο της συστάδας εγκαταλειμμένοι αγροί. Προπαρασκευαστικές υλοτομίες, με την απομάκρυνση γενετικά ανεπιθύμητων ατόμων αλλά και τη προετοιμασία του εδάφους προς υποδοχή των σπόρων. Θα διενεργηθούν ομοιόμορφα στη συστάδα και ιδιαίτερα σε θέσεις με πυκνή συγκόμωση, ανυλοτόμητες θέσεις εντός αυτής. Κρίνονται απαραίτητες σε ακαλλιέργητες συστάδες. Φωτοδοτίδες υλοτομίες. Άτομα Ελάτης που θεωρούνται κρίσιμα – υπερήλικα επίσης θα απομακρύνονται με παράλληλη προστασία της αναγέννησης. Καλλιέργεια ξυλαποθέματος που θα συνίσταται στη θετική επιλογή και ανατροφή στη μέση κλάση διαμέτρου με αραιώση και στόχο την ποιοτική αναβάθμιση του ξυλαποθέματος και την επίτευξη κανονικής κηπευτής δομής. Απαγόρευση της βοσκής για τα επόμενα 10 έτη.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΠΛΗΚΑΤΙΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ
2γ	Οξ., άτομα ΕΛ.	0,8-1,1	-150	Σπ.,αν.	14.472	10.314	268	191	71,27	Προπαρασκευαστικές υλοτομίες, με την απομάκρυνση γενετικά ανεπιθύμητων ατόμων αλλά και τη προετοιμασία του εδάφους προς υποδοχή των σπόρων. Θα διενεργηθούν ομοιόμορφα στη συστάδα και ιδιαίτερα σε θέσεις με πυκνή συγκόμωση, ανυλοτόμητες θέσεις εντός αυτής. Κρίνονται απαραίτητες σε ακαλλιέργητες συστάδες. Φωτοδοτίδες υλοτομίες. Άτομα Ελάτης που θεωρούνται κρίσιμα – υπερήλικα επίσης θα απομακρύνονται με παράλληλη προστασία της αναγέννησης. Καλλιέργεια ξυλαποθέματος που θα συνίσταται στη θετική επιλογή και ανατροφή στη μέση κλάση διαμέτρου με αραιώση και στόχο την ποιοτική αναβάθμιση του ξυλαποθέματος και την επίτευξη κανονικής κηπευτής δομής.Απαγόρευση της βοσκής για τα επόμενα 10 έτη.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΠΛΗΚΑΤΙΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ
2δ	ΕΛ.,Οξ	0,8-1,0	-120	ΕΛ.,Οξ.: Σπ.,αν. η Οξ.: χαμηλά πρεμ.ατομα.	Οξ:5.928 Ελ:1.131	Οξ:4.602 Ελ:546	Οξ:152 Ελ:29	Οξ:118 Ελ:14	Οξ:77,63 Ελ:48,28	Προπαρασκευαστικές υλοτομίες, με την απομάκρυνση γενετικά ανεπιθύμητων ατόμων αλλά και τη προετοιμασία του εδάφους προς υποδοχή των σπόρων. Θα διενεργηθούν ομοιόμορφα στη συστάδα και ιδιαίτερα σε θέσεις με πυκνή συγκόμωση, ανυλοτόμητες θέσεις εντός αυτής. Κρίνονται απαραίτητες σε ακαλλιέργητες συστάδες. Φωτοδοτίδες υλοτομίες. Άτομα Ελάτης που θεωρούνται κρίσιμα – υπερήλικα επίσης θα απομακρύνονται με παράλληλη προστασία της αναγέννησης. Καλλιέργεια ξυλαποθέματος που θα συνίσταται στη θετική επιλογή και ανατροφή στη μέση κλάση διαμέτρου με αραιώση και στόχο την ποιοτική αναβάθμιση του ξυλαποθέματος και την επίτευξη κανονικής κηπευτής δομής. Απαγόρευση της βοσκής για τα επόμενα 10 έτη.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΠΛΗΚΑΤΙΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ
3α	Οξ., άτομα ΕΛ.	0,8-1,2	-150	Σπ.,αν.	11.472	7.344	239	153	64,02	Προπαρασκευαστικές υλοτομίες, με την απομάκρυνση γενετικά ανεπιθύμητων ατόμων αλλά και τη προετοιμασία του εδάφους προς υποδοχή των σπόρων. Θα διενεργηθούν ομοιόμορφα στη συστάδα και ιδιαίτερα σε θέσεις με πυκνή συγκόμωση, ανυλοτόμητες θέσεις εντός αυτής. Κρίνονται απαραίτητες σε ακαλλιέργητες συστάδες. Φωτοδοτίδες υλοτομίες. Άτομα Ελάτης που θεωρούνται κρίσιμα – υπερήλικα επίσης θα απομακρύνονται με παράλληλη προστασία της αναγέννησης. Καλλιέργεια ξυλαποθέματος που θα συνίσταται στη θετική επιλογή και ανατροφή στη μέση κλάση διαμέτρου με αραιώση και στόχο την ποιοτική αναβάθμιση του ξυλαποθέματος και την επίτευξη κανονικής κηπευτής δομής. Απαγόρευση της βοσκής για τα επόμενα 10 έτη.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΠΛΗΚΑΤΙΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ
3β	ΕΛ.,Οξ	0,8-1,2	-140	ΕΛ.,Οξ.: Σπ.,αν. η Οξ.: χαμηλά πρεμ.ατομα.	Οξ:6.780 Ελ:480	Οξ:3.090 Ελ:210	Οξ:226 Ελ:16	Οξ:103 Ελ:7	Οξ:45,58 Ελ:43,75	Προπαρασκευαστικές υλοτομίες, με την απομάκρυνση γενετικά ανεπιθύμητων ατόμων αλλά και τη προετοιμασία του εδάφους προς υποδοχή των σπόρων. Θα διενεργηθούν ομοιόμορφα στη συστάδα και ιδιαίτερα σε θέσεις με πυκνή συγκόμωση, ανυλοτόμητες θέσεις εντός αυτής. Κρίνονται απαραίτητες σε ακαλλιέργητες συστάδες. Φωτοδοτίδες υλοτομίες. Άτομα Ελάτης που θεωρούνται κρίσιμα – υπερήλικα επίσης θα απομακρύνονται με παράλληλη προστασία της αναγέννησης. Καλλιέργεια ξυλαποθέματος που θα συνίσταται στη θετική επιλογή και ανατροφή στη μέση κλάση διαμέτρου με αραιώση και στόχο την ποιοτική αναβάθμιση του ξυλαποθέματος και την επίτευξη κανονικής κηπευτής δομής. Απαγόρευση της βοσκής για τα επόμενα 10 έτη.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΠΛΗΚΑΤΙΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ
3γ	Οξ., άτομα ΕΛ.,Μ.Π	0,6-1,0	-150	Σπ.,αν.& πρεμ.ατομα.	10.922	6.063	254	141	55,51	Προπαρασκευαστικές υλοτομίες, με την απομάκρυνση γενετικά ανεπιθύμητων ατόμων αλλά και τη προετοιμασία του εδάφους προς υποδοχή των σπόρων. Θα διενεργηθούν ομοιόμορφα στη συστάδα και ιδιαίτερα σε θέσεις με πυκνή συγκόμωση, ανυλοτόμητες θέσεις εντός αυτής. Κρίνονται απαραίτητες σε ακαλλιέργητες συστάδες. Φωτοδοτίδες υλοτομίες. Άτομα Ελάτης που θεωρούνται κρίσιμα – υπερήλικα επίσης θα απομακρύνονται με παράλληλη προστασία της αναγέννησης. Καλλιέργεια ξυλαποθέματος που θα συνίσταται	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΠΛΗΚΑΤΙΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	ΣV συστάδας	V κλάσεων διαμέτρου >34 cm	ΣV συστάδας / ha	V κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
										στη θετική επιλογή και ανατροφή στη μέση κλάση διαμέτρου με αραιώση και στόχο την ποιοτική αναβάθμιση του ξυλαποθέματος και την επίτευξη κανονικής κηπευτής δομής. Απαγόρευση της βοσκής για τα επόμενα 10 έτη.	
3δ	ΕΛ.,ΟΞ	0,6-1,0	-130	ΕΛ.,ΟΞ.: Σπ.,αν. η ΟΞ.: & πρεμ.ατομα.	ΟΞ:10.160 ΕΛ:440	ΟΞ:5.640 ΕΛ:0	ΟΞ:254 ΕΛ:11	ΟΞ:141 ΕΛ:0	ΟΞ:55,51 ΕΛ:0	Προπαρασκευαστικές υλοτομίες, με την απομάκρυνση γενετικά ανεπιθύμητων ατόμων αλλά και τη προετοιμασία του εδάφους προς υποδοχή των σπόρων. Θα διενεργηθούν ομοιόμορφα στη συστάδα και ιδιαίτερα σε θέσεις με πυκνή συγκόμωση, ανυλοτόμητες θέσεις εντός αυτής. Κρίνονται απαραίτητες σε ακαλλιέργητες συστάδες. Φωτοδοτίδες υλοτομίες. Άτομα Ελάτης που θεωρούνται κρίσιμα – υπερήλικα επίσης θα απομακρύνονται με παράλληλη προστασία της αναγέννησης. Καλλιέργεια ξυλαποθέματος που θα συνίσταται στη θετική επιλογή και ανατροφή στη μέση κλάση διαμέτρου με αραιώση και στόχο την ποιοτική αναβάθμιση του ξυλαποθέματος και την επίτευξη κανονικής κηπευτής δομής. Απαγόρευση της βοσκής για τα επόμενα 10 έτη.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΠΛΗΚΑΤΙΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ
3ε	ΟΞ., άτομα ΕΛ.,	0,6-1,0	-140	Σπ.,αν.& πρεμ.ατομα.	7.106	3.952	187	104	55,61	Στις γυμνές εκτάσεις αναδάσωση από λίγα άτομα πλατυφύλλων. Προπαρασκευαστικές υλοτομίες, με την απομάκρυνση γενετικά ανεπιθύμητων ατόμων αλλά και τη προετοιμασία του εδάφους προς υποδοχή των σπόρων. Θα διενεργηθούν ομοιόμορφα στη συστάδα και ιδιαίτερα σε θέσεις με πυκνή συγκόμωση, ανυλοτόμητες θέσεις εντός αυτής. Κρίνονται απαραίτητες σε ακαλλιέργητες συστάδες. Φωτοδοτίδες υλοτομίες. Άτομα Ελάτης που θεωρούνται κρίσιμα – υπερήλικα επίσης θα απομακρύνονται με παράλληλη προστασία της αναγέννησης. Καλλιέργεια ξυλαποθέματος που θα συνίσταται στη θετική επιλογή και ανατροφή στη μέση κλάση διαμέτρου με αραιώση και στόχο την ποιοτική αναβάθμιση του ξυλαποθέματος και την επίτευξη κανονικής κηπευτής δομής. Απαγόρευση της βοσκής για τα επόμενα 10 έτη.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΠΛΗΚΑΤΙΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ
4α	ΟΞ., άτομα ΕΛ.,	0,6-1,0	-130	Σπ.,αν.& πρεμ.ατομα.	14.210	9.686	245	167	68,16	Προπαρασκευαστικές υλοτομίες, με την απομάκρυνση γενετικά ανεπιθύμητων ατόμων αλλά και τη προετοιμασία του εδάφους προς υποδοχή των σπόρων. Θα διενεργηθούν ομοιόμορφα στη συστάδα και ιδιαίτερα σε θέσεις με πυκνή συγκόμωση, ανυλοτόμητες θέσεις εντός αυτής. Κρίνονται απαραίτητες σε ακαλλιέργητες συστάδες. Φωτοδοτίδες υλοτομίες. Άτομα Ελάτης που θεωρούνται κρίσιμα – υπερήλικα επίσης θα απομακρύνονται με παράλληλη προστασία της αναγέννησης. Καλλιέργεια ξυλαποθέματος που θα συνίσταται στη θετική επιλογή και ανατροφή στη μέση κλάση διαμέτρου με αραιώση και στόχο την ποιοτική αναβάθμιση του ξυλαποθέματος και την επίτευξη κανονικής κηπευτής δομής. Απαγόρευση της βοσκής για τα επόμενα 10 έτη.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΠΛΗΚΑΤΙΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ
4β	ΟΞ., άτομα ΕΛ.,	0,8-1,2	-120	Σπ.,αν.& πρεμ.ατομα.	12.300	1.000	246	20	8,13	Άτομα Οξυάς και Ελάτης που θεωρούνται κρίσιμα – υπερήλικα θα απομακρύνονται με παράλληλη προστασία της αναγέννησης. Καλλιέργεια ξυλαποθέματος που θα συνίσταται στη θετική επιλογή και ανατροφή στη μέση κλάση διαμέτρου με αραιώση και στόχο την ποιοτική αναβάθμιση του ξυλαποθέματος και την επίτευξη κανονικής κηπευτής δομής. Απαγόρευση της βοσκής για τα επόμενα 10 έτη.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΠΛΗΚΑΤΙΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ
5α	ΟΞ., Δρ. άτομα ΕΛ.,	0,7-1,2	-150	Σπ.,αν.	ΟΞ: 11.804 Δρ.: 273	ΟΞ: 8.268 Δρ.: 0	ΟΞ: 227 Δρ.: 91	ΟΞ:159 Δρ.: 0	ΟΞ:70,04 Δρ.: 0	Στα 22 από τα 40Ha της συστάδας, λόγω ύπαρξης ναρκοπεδίου: Άτομα Οξυάς και Ελάτης που θεωρούνται κρίσιμα – υπερήλικα θα απομακρύνονται με παράλληλη προστασία της αναγέννησης. Καλλιέργεια ξυλαποθέματος που θα συνίσταται στη θετική επιλογή και ανατροφή στη μέση κλάση διαμέτρου με αραιώση και στόχο την ποιοτική αναβάθμιση του ξυλαποθέματος και την επίτευξη κανονικής κηπευτής δομής.Απαγόρευση της βοσκής για τα επόμενα 10 έτη.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΠΛΗΚΑΤΙΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ
5β	ΟΞ., άτομα ΕΛ.,Δρ.	0,8-1,2	-140	Σπ.,αν.& πρεμ.ατομα.	7.760	4.280	194	107	55,15	Προπαρασκευαστικές υλοτομίες, με την απομάκρυνση γενετικά ανεπιθύμητων ατόμων αλλά και τη προετοιμασία του εδάφους προς υποδοχή των σπόρων. Θα διενεργηθούν ομοιόμορφα στη συστάδα και ιδιαίτερα σε θέσεις με πυκνή συγκόμωση, ανυλοτόμητες θέσεις εντός αυτής. Κρίνονται απαραίτητες σε ακαλλιέργητες συστάδες. Φωτοδοτίδες υλοτομίες. Άτομα Ελάτης που θεωρούνται κρίσιμα – υπερήλικα επίσης θα απομακρύνονται με παράλληλη προστασία της αναγέννησης. Καλλιέργεια ξυλαποθέματος που θα συνίσταται στη θετική επιλογή και ανατροφή στη μέση κλάση διαμέτρου με αραιώση και στόχο την ποιοτική αναβάθμιση του ξυλαποθέματος και την επίτευξη κανονικής κηπευτής δομής. Απαγόρευση της βοσκής για τα επόμενα 10 έτη.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΠΛΗΚΑΤΙΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ
5γ	ΟΞ., Δρ., ΕΛ.,Φυλ.πλ.	0,6-1,20	ΟΞ:-120 Δρ:-80	ΟΞ:Σπ.,αν.& πρεμ.ατομα. Δρ: Διφ.,αν.	ΟΞ: 6.020 ΕΛ:1.505 Δρ.&Φυλ.πλ: 5.120	ΟΞ: 2.205 ΕΛ:385 Δρ.&Φυλ.π λ: 2.380	ΟΞ: 172 ΕΛ:43 Δρ.&Φυλ. πλ: 78,77	ΟΞ: 63 ΕΛ:11 Δρ.&Φυλ. πλ: 36,62	ΟΞ:36,63 ΕΛ:25,58 Δρ.&Φυλ.πλ: 46,48	Οξυά: Προπαρασκευαστικές υλοτομίες, με την απομάκρυνση γενετικά ανεπιθύμητων ατόμων αλλά και τη προετοιμασία του εδάφους προς υποδοχή των σπόρων. Θα διενεργηθούν ομοιόμορφα στη συστάδα και ιδιαίτερα σε θέσεις με πυκνή συγκόμωση, ανυλοτόμητες θέσεις εντός αυτής. Κρίνονται απαραίτητες σε ακαλλιέργητες συστάδες. Φωτοδοτίδες υλοτομίες. Άτομα Ελάτης που θεωρούνται κρίσιμα – υπερήλικα επίσης θα απομακρύνονται με παράλληλη προστασία της αναγέννησης. Καλλιέργεια ξυλαποθέματος όλων των ειδών που θα συνίσταται στη θετική επιλογή και ανατροφή στη μέση κλάση διαμέτρου με αραιώση και στόχο την ποιοτική αναβάθμιση του ξυλαποθέματος και την επίτευξη κανονικής κηπευτής	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΠΛΗΚΑΤΙΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	ΣΥ συστάδας	V κλάσεων διαμέτρου >34 cm	ΣΥ συστάδας / ha	V κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
										δομής. Απομάκρυνση των κακόμορφων, κουφαλερών ατόμων Δρυός πρεμνοφυούς προέλευσης. Απαγόρευση της βοσκής για τα επόμενα 10 έτη.	
6α	Οξ.,Δρ. άτομα Ελ.,Φυλ.πλ	0,7-1,20	Οξ:-150 Δρ:-90	Οξ:Σπ.,αν.& πρεμ.ατομα. Δρ: Διφ.,αν.	Οξ: 1.728 Δρ.&Φυλ.πλ: 6.380	Οξ: 448 Δρ.&Φυλ.π λ:0	Οξ: 216 Δρ.&Φυλ. πλ:113	Οξ: 56 Δρ.&Φυλ. πλ:0	Οξ: 25,93 Δρ.&Φυλ.πλ:0	Οξυά και Δρυς: Καλλιέργεια ξυλαποθέματος όλων των ειδών που θα συνίσταται στη θετική επιλογή και ανατροφή στη μέση κλάση διαμέτρου με αραιώση και στόχο την ποιοτική αναβάθμιση του ξυλαποθέματος και την επίτευξη κανονικής κηπευτής δομής. Απομάκρυνση γενετικά ανεπιθύμητων ατόμων στους μέτριους κορμούς της Οξυάς στη συστάδα και σε θέσεις με πυκνή συγκόμωση, ανυλοτόμητες θέσεις εντός αυτής. Απομάκρυνση των κακόμορφων, κουφαλερών ατόμων Δρυός πρεμνοφυούς προέλευσης. Άτομα Ελάτης που θεωρούνται κρίσιμα – υπερήλικα επίσης θα απομακρύνονται με παράλληλη προστασία της αναγέννησης. Ευνόηση των ατόμων Σφενδάμου. Απαγόρευση της βοσκής για τα επόμενα 10 έτη.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΠΛΗΚΑΤΙΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ
6β	Οξ.,Δρ. άτομα Ελ.,Φυλ.πλ	0,7-1,20	Οξ:-140 Δρ:-90	Οξ:Σπ.,αν.& πρεμ.ατομα. Δρ: Διφ.,αν.	Οξ: 1.728 Δρ.&Φυλ.πλ: 4.104	Οξ: 448 Δρ.&Φυλ.π λ:1.566	Οξ: 216 Δρ.&Φυλ. πλ:152	Οξ: 56 Δρ.&Φυλ. πλ:58	Οξ: 25,93 Δρ.&Φυλ.πλ:38 ,16	Οξυά και Δρυς: Καλλιέργεια ξυλαποθέματος όλων των ειδών που θα συνίσταται στη θετική επιλογή και ανατροφή στη μέση κλάση διαμέτρου με αραιώση και στόχο την ποιοτική αναβάθμιση του ξυλαποθέματος και την επίτευξη κανονικής κηπευτής δομής. Απομάκρυνση γενετικά ανεπιθύμητων ατόμων στους μέτριους κορμούς της Οξυάς στη συστάδα και σε θέσεις με πυκνή συγκόμωση, ανυλοτόμητες θέσεις εντός αυτής. Απομάκρυνση των κακόμορφων, κουφαλερών ατόμων Δρυός πρεμνοφυούς προέλευσης. Άτομα Ελάτης που θεωρούνται κρίσιμα – υπερήλικα επίσης θα απομακρύνονται με παράλληλη προστασία της αναγέννησης. Ευνόηση των ατόμων Σφενδάμου. Απαγόρευση της βοσκής για τα επόμενα 10 έτη.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΠΛΗΚΑΤΙΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ
6γ	Δρ. άτομα Φυλ.πλ	0,7-1,10	Δρ:-90	Δρ: Διφ.,αν.	Δρ.&Φυλ.πλ: 3.172	Δρ.&Φυλ.π λ:494	Δρ.&Φυλ. πλ:122	Δρ.&Φυλ. πλ:19	Δρ.&Φυλ.πλ: 15,57	Καλλιέργεια ξυλαποθέματος που θα συνίσταται στη θετική επιλογή και ανατροφή στη μέση κλάση διαμέτρου με αραιώση και στόχο την ποιοτική αναβάθμιση του ξυλαποθέματος και την επίτευξη κανονικής κηπευτής δομής. Απομάκρυνση των κακόμορφων, κουφαλερών ατόμων Δρυός πρεμνοφυούς προέλευσης. Ευνόηση των ατόμων Σφενδάμου. Απαγόρευση της βοσκής για τα επόμενα 10 έτη.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΠΛΗΚΑΤΙΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ
6δ	Δρ. άτομα Φυλ.πλ	0,7-1,20	Δρ:-90	Δρ: Διφ.,αν.	Δρ.&Φυλ.πλ: 4.216	Δρ.&Φυλ.π λ:480	Δρ.&Φυλ. πλ:132	Δρ.&Φυλ. πλ:15	Δρ.&Φυλ.πλ: 11,39	Καλλιέργεια ξυλαποθέματος που θα συνίσταται στη θετική επιλογή και ανατροφή στη μέση κλάση διαμέτρου με αραιώση και στόχο την ποιοτική αναβάθμιση του ξυλαποθέματος και την επίτευξη κανονικής κηπευτής δομής. Απομάκρυνση των κακόμορφων, κουφαλερών ατόμων Δρυός πρεμνοφυούς προέλευσης. Ευνόηση των ατόμων Σφενδάμου. Απαγόρευση της βοσκής για τα επόμενα 10 έτη.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΠΛΗΚΑΤΙΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ
7α	Δρ. άτομα Φυλ.πλ	0,6-1,00	Δρ:-90	Δρ: Διφ.,αν.	Δρ.&Φυλ.πλ: 4.095	Δρ.&Φυλ.π λ:735	Δρ.&Φυλ. πλ:117	Δρ.&Φυλ. πλ:21	Δρ.&Φυλ.πλ: 17,95	Καλλιέργεια ξυλαποθέματος που θα συνίσταται στη θετική επιλογή και ανατροφή στη μέση κλάση διαμέτρου με αραιώση και στόχο την ποιοτική αναβάθμιση του ξυλαποθέματος και την επίτευξη κανονικής κηπευτής δομής. Απομάκρυνση των κακόμορφων, κουφαλερών ατόμων Δρυός πρεμνοφυούς προέλευσης. Ευνόηση των ατόμων Σφενδάμου. Απαγόρευση της βοσκής για τα επόμενα 10 έτη.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΠΛΗΚΑΤΙΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ
7β	Δρ. άτομα Φυλ.πλ	0,6-1,00	Δρ:-90	Δρ: Διφ.,αν.	Δρ.&Φυλ.πλ: 3.567	Δρ.&Φυλ.π λ:783	Δρ.&Φυλ. πλ:123	Δρ.&Φυλ. πλ:27	Δρ.&Φυλ.πλ: 21,95	Καλλιέργεια ξυλαποθέματος που θα συνίσταται στη θετική επιλογή και ανατροφή στη μέση κλάση διαμέτρου με αραιώση και στόχο την ποιοτική αναβάθμιση του ξυλαποθέματος και την επίτευξη κανονικής κηπευτής δομής. Απομάκρυνση των κακόμορφων, κουφαλερών ατόμων Δρυός πρεμνοφυούς προέλευσης. Ευνόηση των ατόμων Σφενδάμου. Απαγόρευση της βοσκής για τα επόμενα 10 έτη.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΠΛΗΚΑΤΙΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ
7γ	Δρ. , Φυλ.πλ	0,6-1,00	Δρ:-90	Διφ.,αν.	Δρ.&Φυλ.πλ: 3.104 Φυλ.πλ:300	Δρ.&Φυλ.π λ:160 Φυλ.πλ:0	Δρ.&Φυλ. πλ:97 Φυλ.πλ:30	Δρ.&Φυλ. πλ:5 Φυλ.πλ:0	Δρ.&Φυλ.πλ:5, 15 Φυλ.πλ:0	Εντός της συστάδας, στις ηπιότερες θέσεις αυτής, αγροί που έχουν εγκαταλειφθεί και δασώνονται. Στο κατώτερο τμήμα αυτής έντονα τα σημάδια της βοσκής και κλαδονομής. Καλλιέργεια ξυλαποθέματος που θα συνίσταται στη θετική επιλογή και ανατροφή στη μέση κλάση διαμέτρου με αραιώση και στόχο την ποιοτική αναβάθμιση του ξυλαποθέματος και την επίτευξη κανονικής κηπευτής δομής. Απομάκρυνση των κακόμορφων, κουφαλερών ατόμων Δρυός πρεμνοφυούς προέλευσης. Ευνόηση των ατόμων Σφενδάμου. Απαγόρευση της βοσκής για τα επόμενα 10 έτη.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΠΛΗΚΑΤΙΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ
8	Δρ. , Φυλ.πλ	0,6-1,00	Δρ:-90	Διφ.,αν.	Δρ.&Φυλ.πλ: 5.430 Φυλ.πλ:420	Δρ.&Φυλ.π λ:340 Φυλ.πλ:0	Δρ.&Φυλ. πλ:79,85 Φυλ.πλ:30	Δρ.&Φυλ. πλ:5 Φυλ.πλ:0	Δρ.&Φυλ.πλ:6, 26 Φυλ.πλ:0	Εντός του τμήματος, στις ηπιότερες θέσεις αυτής, αγροί που έχουν εγκαταλειφθεί και είτε δασώνονται είτε χρησιμοποιούνται ως χορτολίβαδα ενώ λίγοι από αυτούς, πλησίον του οικισμού, καλλιεργούνται. Στις θέσεις που είναι εύκολα προσβάσιμες από τον οικισμό, έντονα τα σημάδια της βοσκής και κλαδονομής. Στις προσχωσεις του ποταμού, νεαρό δάσος Μ. πεύκης. Εκτός διαχείρισης και την προσεχή δεκαετία γιατί : Οι δασοσκεπείς εκτάσεις του διακόπτονται από άλλες εδαφοπονικές μορφές και δεν έχουν συνοχή. Σχεδόν σε όλη την έκταση του τμήματος ασκείται ακόμη και σήμερα η βοσκή και η κλαδονομή αν και το κτηνοτροφικό κεφάλαιο της περιοχής έχει μειωθεί σημαντικά. Οι δασοσκεπείς εκτάσεις του τμήματος σε όλη την έκτασή που αυτές καταλαμβάνουν ασκούν προστασία, όχι μόνο στον οικισμό αλλά στο σύνολο του κεφαλαίου Έδαφος που αυτές εδράζονται, σε σχέση πάντα και με τις πιέσεις που αυτό, το έδαφος, δέχεται.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΠΛΗΚΑΤΙΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	ΣV συστάδας	V κλάσεων διαμέτρου >34 cm	ΣV συστάδας / ha	V κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
9α	Δρ. άτομα Φυλ.πλ	0,6-0,80	Δρ:-90	Δρ: Διφ.,αν.	Δρ.&Φυλ.πλ: 1.672	Δρ.&Φυλ.π λ:190	Δρ.&Φυλ. πλ:44	Δρ.&Φυλ. πλ:5	Δρ.&Φυλ.πλ: 11,36	Εντός της συστάδας, στις ηπιότερες θέσεις αυτής, αγροί που έχουν εγκαταλειφθεί και είτε δασώνονται είτε χρησιμοποιούνται ως χορτολίβαδα ενώ λίγοι από αυτούς, πλησίον του οικισμού, καλλιεργούνται. Έντονα τα σημάδια της βοσκής και κλαδονομής. Εκτός διαχείρισης γιατί : Σχεδόν σε όλη την έκταση της συστάδας ασκείται ακόμη και σήμερα η βοσκή και η κλαδονομή αν και το κτηνοτροφικό κεφάλαιο της περιοχής έχει μειωθεί σημαντικά. Οι δασοσκεπείς εκτάσεις της συστάδας σε όλη την έκτασή που αυτές καταλαμβάνουν ασκούν προστασία, στο σύνολο του κεφαλαίου Έδαφος που αυτές εδράζονται, σε σχέση πάντα και με τις πιέσεις που αυτό, το έδαφος δέχεται. Οι δασοσκεπείς εκτάσεις της διακόπτονται από άλλες εδαφοπονικές μορφές και δεν έχουν συνοχή. Ο αποληπτός όγκος θα είναι μικρός και μόνο για καυσόξυλα θα χρησιμοποιηθεί. Οι ανάγκες των κατοίκων σε καύσιμη ύλη, έχουν μειωθεί δεδομένου της μείωσης του πληθυσμού εκεί, καλύπτονται δε από τις λοιπές συστάδες του δάσους.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΠΛΗΚΑΤΙΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ
9β	Οξ., Δρ., Ελ.,Φυλ.πλ.	0,7-1,20	-90	Ελ:Σπ.,αν. Οξ., Δρ: Διφ.,αν.	Οξ: 4.778 Ελ:976 Δρ.: 3.271	Οξ: 1.116 Ελ:343 Δρ: 457	Οξ: 113,76 Ελ:23,24 Δρ: 69,60	Οξ: 26,57 Ελ:8,17 Δρ: 9,72	Οξ: 23,36 Ελ:35,14 Δρ: 13,97	Εντός της συστάδας εγκαταλειμμένοι αγροί που είτε δασώνονται είτε έχουν χορτολιβαδική μορφή σήμερα. Οξυά και Δρυς: Καλλιέργεια ξυλαποθέματος όλων των ειδών που θα συνίσταται στη θετική επιλογή και ανατροφή στη μέση κλάση διαμέτρου με αραιώση και στόχο την ποιοτική αναβάθμιση του ξυλαποθέματος και την επίτευξη κανονικής κηπευτής δομής. Απομάκρυνση γενετικά ανεπιθύμητων ατόμων στους μέτριους κορμούς της Οξυάς στη συστάδα και σε θέσεις με πυκνή συγκόμωση, ανυλοτόμητες θέσεις εντός αυτής.Απομάκρυνση των κακόμορφων, κουφαλερών ατόμων Δρυός πρεμνοφυούς προέλευσης. Άτομα Ελάτης που θεωρούνται κρίσιμα – υπερήλικα επίσης θα απομακρύνονται με παράλληλη προστασία της αναγέννησης. Ευνόηση των ατόμων Σφενδάμου. Να ενταχθεί στο Πρόγραμμα Βελτίωσης υποβαθμισμένων δασών, μετά τη σύνταξη ειδικής μελέτης. Απαγόρευση της βοσκής για τα επόμενα 10 έτη.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΠΛΗΚΑΤΙΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ
9γ	Οξ., Ελ.,Δρ.,Φυλ.π λ.	0,7-1,20	-100	Ελ:Σπ.,αν. Οξ., Δρ: Διφ.,αν.	Οξ: 8.428 Ελ:55 Δρ.: 79	Οξ: 10 Ελ:13 Δρ.: 9	Οξ: 91,55 Ελ:55 Δρ.: 79	Οξ:0,23 Ελ:13 Δρ.: 9	Οξ:0,12 Ελ:23,64 Δρ.: 11,39	Οξυά : Καλλιέργεια ξυλαποθέματος που θα συνίσταται στη θετική επιλογή και ανατροφή στη μέση κλάση διαμέτρου με αραιώση και στόχο την ποιοτική αναβάθμιση του ξυλαποθέματος και την επίτευξη κανονικής κηπευτής δομής. Απομάκρυνση των κακόμορφων, κουφαλερών ατόμων Οξυάς πρεμνοφυούς προέλευσης. Άτομα Ελάτης που θεωρούνται κρίσιμα – υπερήλικα επίσης θα απομακρύνονται με παράλληλη προστασία της αναγέννησης. Να ενταχθεί στο Πρόγραμμα Βελτίωσης υποβαθμισμένων δασών, μετά τη σύνταξη ειδικής μελέτης. Απαγόρευση της βοσκής για τα επόμενα 10 έτη.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΠΛΗΚΑΤΙΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ
9δ	Οξ., άτομα Ελ.	0,7-1,20	-100	Ελ:Σπ.,αν. Οξ.: Διφ.,αν.	Οξ: 12.212	Οξ: 1.207	Οξ: 172	Οξ: 17	Οξ: 9,88	Οξυά : Καλλιέργεια ξυλαποθέματος που θα συνίσταται στη θετική επιλογή και ανατροφή στη μέση κλάση διαμέτρου με αραιώση και στόχο την ποιοτική αναβάθμιση του ξυλαποθέματος και την επίτευξη κανονικής κηπευτής δομής. Απομάκρυνση των κακόμορφων, κουφαλερών ατόμων Οξυάς πρεμνοφυούς προέλευσης. Άτομα Ελάτης που θεωρούνται κρίσιμα – υπερήλικα επίσης θα απομακρύνονται με παράλληλη προστασία της αναγέννησης. Να ενταχθεί στο Πρόγραμμα Βελτίωσης υποβαθμισμένων δασών, μετά τη σύνταξη ειδικής μελέτης. Απαγόρευση της βοσκής για τα επόμενα 10 έτη.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΠΛΗΚΑΤΙΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ
9ε	Οξ., άτομα Ελ.	0,8-1,20	-100	Οξ.: Διφ.,αν.	Οξ: 5.796	Οξ: 1.188	Οξ: 161	Οξ: 33	Οξ: 20,50	Εκτός διαχείρισης διότι: Η δασοσκεπής έκταση που υπάρχει είναι περιορισμένη Οι εκτάσεις οι λοιπές της συστάδας βόσκονται. Το κτηνοτροφικό κεφάλαιο ασκεί πιέσεις και στις δασοσκεπείς εκτάσεις της, τουλάχιστον περιφερειακά. Με την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΡΑΜΜΟΥ – ΒΔ ΒΟΪΟΥ, που συντάχθηκε το 1999 και εγκρίθηκε από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., η έκταση που καταλαμβάνει η συστάδα περιλαμβάνεται σε μια ευρύτερη ζώνη προστασίας "Περιοχές Προστασίας της Φύσης", λόγω κυρίως της ύπαρξης πληθυσμού του βαλκανικού αγριόγιδου και οι δραστηριότητες που προτείνονται εκεί είναι : Επιτρέπεται η διεξαγωγή επιστημονικών εργασιών και η εκτέλεση εργασιών που αποσκοπούν στη διατήρηση των χαρακτηριστικών της περιοχής εφόσον εξασφαλίζεται υψηλός βαθμός προστασίας. Επιτρέπεται η συντήρηση των υπαρχόντων μονοπατιών Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση μαντριών ή άλλων υποδομών για την κτηνοτροφία. Δεν επιτρέπεται η διάνοιξη νέων δασικών ή άλλων αμαξιών οδών	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΠΛΗΚΑΤΙΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ
9στ	Οξ., άτομα Ελ.	0,8-1,20	-100	Οξ.: Διφ.,αν.	Οξ: 3.220	Οξ: 660	Οξ: 161	Οξ: 33	Οξ: 20,50	Εκτός διαχείρισης διότι: Η δασοσκεπής έκταση που υπάρχει είναι περιορισμένη Οι εκτάσεις οι λοιπές της συστάδας βόσκονται. Το κτηνοτροφικό κεφάλαιο ασκεί πιέσεις και στις δασοσκεπείς εκτάσεις της, τουλάχιστον περιφερειακά. Με την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΡΑΜΜΟΥ – ΒΔ ΒΟΪΟΥ, που συντάχθηκε το 1999 και εγκρίθηκε από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., η έκταση που καταλαμβάνει η συστάδα περιλαμβάνεται σε μια ευρύτερη ζώνη προστασίας "Περιοχές Προστασίας της Φύσης", λόγω κυρίως της ύπαρξης πληθυσμού του βαλκανικού αγριόγιδου και οι δραστηριότητες που προτείνονται εκεί είναι : Επιτρέπεται η διεξαγωγή επιστημονικών εργασιών και η εκτέλεση εργασιών που αποσκοπούν στη διατήρηση των χαρακτηριστικών της περιοχής εφόσον εξασφαλίζεται υψηλός βαθμός προστασίας. Επιτρέπεται η συντήρηση των υπαρχόντων μονοπατιών	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΠΛΗΚΑΤΙΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	ΣV συστάδας	V κλάσεων διαμέτρου >34 cm	ΣV συστάδας / ha	V κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
										Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση μαντριών ή άλλων υποδομών για την κτηνοτροφία. Δεν επιτρέπεται η διάνοιξη νέων δασικών ή άλλων αμαξιών οδών	
10	Οξ., άτομα Ελ.	0,7-1,00	-140	Οξ.,Ελ.:Σπ.,αν.	Οξ: 1.146 Ελ:78	Οξ: 894 Ελ:72	Οξ: 191 Ελ:13	Οξ: 149 Ελ:12	Οξ: 75,39 Ελ:92,31	Το τμήμα 10 του δάσους αποτελεί σημαντικό οικοτόπο λόγω της παρουσίας σπάνιων φυτικών ειδών. Λειτουργεί ως περιοχή αναζήτησης τροφής για μεγάλα αρπακτικά και άγρια οπληφόρα. Υπάρχουν αξιόλογες βιοκοινωνίες ορνιθοπανίδας και εντομοπανίδας. Εκτός διαχείρισης διότι: Η δασοσκεπής έκταση που υπάρχει είναι περιορισμένη. Οι λοιπές εκτάσεις της συστάδας βόσκονται. Το κτηνοτροφικό κεφάλαιο ασκεί πιέσεις και στις δασοσκεπείς εκτάσεις της, τουλάχιστον περιφερειακά. Με την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΡΑΜΜΟΥ – ΒΔ ΒΟΪΟΥ, που συντάχθηκε το 1999 και εγκρίθηκε από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., η έκταση που καταλαμβάνει η συστάδα περιλαμβάνεται σε μια ευρύτερη ζώνη προστασίας "Περιοχές Προστασίας της Φύσης", λόγω κυρίως της ύπαρξης πληθυσμού του βαλκανικού αγριόγιδου και οι δραστηριότητες που προτείνονται εκεί είναι : Επιτρέπεται η διεξαγωγή επιστημονικών εργασιών και η εκτέλεση εργασιών που αποσκοπούν στη διατήρηση των χαρακτηριστικών της περιοχής εφόσον εξασφαλίζεται υψηλός βαθμός προστασίας Επιτρέπεται η συντήρηση των υπάρχοντων μονοπατιών. Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση μαντριών ή άλλων υποδομών για την κτηνοτροφία. Δεν επιτρέπεται η διάνοιξη νέων δασικών ή άλλων αμαξιών οδών.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΠΛΗΚΑΤΙΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ
1α	Μ.π.,άτομα Οξ.Δρ.	1,0	5-120	Σπ.,αν.	3.660	3.660	125	125	100,00	Απομάκρυνση των ώριμων ατόμων σε θέσεις όπου η αναγέννηση της Μ. Πεύκης καλύπτει όλη την επιφάνεια . Στην υπόλοιπη έκταση, όπου απαιτείται θα γίνουν φωτοδοτίδες υλοτομίες, στις δε υπόλοιπες όπου οι ενώσεις είναι ανώριμες προτείνεται να γίνουν καλλιεργητικές υλοτομίες. Δεν θα γίνουν επεμβάσεις και αυτή την διαχειριστική περίοδο στην Δρυ. Απαγόρευση της βοσκής για 10 χρόνια για τα μικρά ζώα και πέντε για τα μεγάλα, μετά την υλοτομία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΑΣ
1β	Μ.π.,άτομα Ελ.,Δρ.	0,8-1,0	Μ.π:5-150 Δρ:1-20	ακ.,αν.	Μ.π:5.308,29 Δρ:252	Μ.π:4.994,1 9 Δρ:151,2	Μ.π:169 Δρ:10	Μ.π:146,8 9 Δρ:6	Μ.π:94,08 Δρ:60,00	Φωτοδοτίδες και καλλιεργητικές υλοτομίες με θετική επιλογή στη Μ. Πεύκη. Η δρυς σε διφυή μορφή καλλιέργεια του ξυλαποθέματος με βασικό στόχο την απομάκρυνση των πρεμνοφυών ατόμων, και την αναγωγή σε σπερμοφυή. Θ α απομακρυνθούν τα κουφαλερά και σρεβλά άτομα. Απαγόρευση της βοσκής για 10 χρόνια για τα μικρά ζώα και πέντε για τα μεγάλα, μετά την υλοτομία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΑΣ
1γ	Μ.π.,Δρ., άτομα Ελ.	0,8-1,0	Μ.π: 5-150 Δρ:1-50	ακ.,αν.	Μ.π:10.981,60 Δρ:112,8	Μ.π:10981,6 Δρ:0	Μ.π:293 Δρ:10	Μ.π:293 Δρ:0	Μ.π:100,0 Δρ:0	Φωτοδοτίδες και καλλιεργητικές υλοτομίες με θετική επιλογή στη Μ. Πεύκη. Απαγόρευση της βοσκής για 10 χρόνια για τα μικρά ζώα και πέντε για τα μεγάλα, μετά την υλοτομία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΑΣ
1δ	Μ.π.,Δρ.	0,8-1,0	Μ.π: 5-150 Δρ:1-90	υπ.,ακ.	Μ.π:9.288,18 Δρ:103,44	Μ.π:9.053,6 3 Δρ:0	Μ.π:193 Δρ:12	Μ.π:81 Δρ:0	Μ.π:97,47 Δρ:0	Υπόσκιες αναγεννητικές και καλλιεργητικές υλοτομίες για Μ. πεύκη. Απαγόρευση της βοσκής για μεν τα μεγάλα ζώα πέντε, για δε τα μικρά δεκα χρόνια μετά την υλοτομία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΑΣ
1ε	Μ.π.,Δρ.	1,0	Μ.π: 1-130 Δρ:1-120	υπ.,ακ.	Μ.π:6.266,26 Δρ:585,31	Μ.π:1.687,0 7 Δρ:275,44	Μ.π:181 Δρ:17	Μ.π:49 Δρ:8	Μ.π:27,07 Δρ:47,06	Υπόσκιες αναγεννητικές και καλλιεργητικές υλοτομίες για Μ. πεύκη. Απαγόρευση της βοσκής για μεν τα μεγάλα ζώα πέντε, για δε τα μικρά δέκα χρόνια μετά την υλοτομία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΑΣ
1στ	Μ.π.,άτομα Δρ.	0,8-1,0	Μ.π:1-120 Δρ:1-20	Μ.π:υπ.,ακ. Δρ:ομ.	Μ.π:2.317,64	Μ.π:645,22	Μ.π:93,68	Μ.π:26,08	Μ.π:27,84	Εκτός διαχείρισης. Υπάρχει χαλαρή σχέση μεταξύ των ατόμων δεν υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ τους οπότε δεν ενδείκνυται η εφαρμογή καλλιεργητικών και άλλων επεμβάσεων.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΑΣ
2α	Μ.π.,Δρ., άτομα Ελ.	1,2	Μ.π: 1-120 Δρ:1-100	ακ.,υπ.	Μ.π:3.274,67 Δρ:1.171,75	Μ.π:1.304,2 Δρ:502,33	Μ.π:72,74 Δρ:48,26	Μ.π:28,97 Δρ:20,69	Μ.π:39,82 Δρ:42,87	Υπόσκιες αναγεννητικές υλοτομίες για Μ. πεύκη. Καμία επέμβαση στη Δρυ. Απαγόρευση της βοσκής για μεν τα μεγάλα ζώα πέντε, για δε τα μικρά 10 χρόνια μετά την υλοτομία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΑΣ
2β	Μ.π.,Δρ.	0,9-1,0	Μ.π: 1-120 Δρ:20-100	υπ.,ακ.	Μ.π:7.956,11 Δρ:30,45	Μ.π:4.731,4 7 Δρ:0	Μ.π:166,6 9 Δρ:8,93	Μ.π:99,13 Δρ:0	Μ.π59,46 Δρ:0	Υπόσκιες αναγεννητικές υλοτομίες: Προτείνεται κάρπωση των ώριμων ατόμων εφόσον δε δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα ζημιών στην υπόλοιπη συστάδα και η ποιοτική τους κατάσταση δικαιολογεί την αναγκαιότητα εκμετάλλευσής τους. Τα λιγοστά άτομα της Δρυός που αναμιγνύονται με την Μ . Πεύκη και έχουν περιέλθει στη φάση του γήρατος θα απομακρυνθούν. Απαγόρευση της βοσκής για μεν τα μικρά ζώα 10 χρόνια, για δε τα μεγάλα πέντε, μετά την υλοτομία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΑΣ
2γ	Μ.π.,άτομα Δρ.	0,8-0,9	1-150	υπ.,ακ.	3.639,18	2.027,94	131	73	55,73	Υπόσκιες αναγεννητικές υλοτομίες: Προτείνεται κάρπωση των ώριμων ατόμων εφόσον δε δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα ζημιών στην υπόλοιπη συστάδα και η ποιοτική τους κατάσταση δικαιολογεί την αναγκαιότητα εκμετάλλευσής τους. Τα λιγοστά άτομα της Δρυός που αναμιγνύονται με την Μ . Πεύκη και έχουν περιέλθει στη φάση του γήρατος θα	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΑΣ

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	ΣΥ συστάδας	V κλάσεων διαμέτρου >34 cm	ΣΥ συστάδας / ha	V κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
										απομακρυνθούν. Απαγόρευση της βοσκής για μεν τα μικρά ζώα 10 χρόνια, για δε τα μεγάλα πέντε, μετά την υλοτομία.	
2δ	Μ.π.,Δρ., άτομα Ελ.	0,8-1,0	Μ.π: 1-120 Δρ:1-90	ακ.,αν.	Μ.π:8.555,18 Δρ:632,76	Μ.π:2.178,3 4 Δρ:171,92	Μ.π:135,6 9 Δρ:16,82	Μ.π:34,55 Δρ:4,57	Μ.π:25,46 Δρ:27,17	Υπόσκιες αναγεννητικές υλοτομίες: Προτείνεται κάρπωση των ώριμων ατόμων εφόσον δε δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα ζημιών στην υπόλοιπη συστάδα και η ποιοτική τους κατάσταση δικαιολογεί την αναγκαιότητα εκμετάλλευσής τους. Τα λιγοστά άτομα της Δρυός που αναμινγούνται με την Μ . Πεύκη και έχουν περιέλθει στη φάση του γήρατος θα απομακρυνθούν. Απαγόρευση της βοσκής για μεν τα μικρά ζώα 10 χρόνια, για δε τα μεγάλα πέντε, μετά την υλοτομία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΑΣ
2ε	Μ.π.,Δρ.,φυλ. πλ.	1,1	Μ.π: 20-120 Δρ:20-80	ακ.,αν.	Μ.π:11.513,04	Μ.π:7.577,4 6	Μ.π:195	Μ.π:129	Μ.π:66,15	Στις ενώσεις Μ. Πεύκης εξευγενιστικές αραιώσεις κάνοντας θετική επιλογή. Τα λιγοστά άτομα Μ. Πεύκης που συμμετέχουν με διάμετρο μεγαλύτερη από 50 εκ θα απομακρυνθούν από την συστάδα διότι, εμποδίζουν την αναγέννηση και η παραμονή τους δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπό . Απόλυτη προσοχή, ιδιαίτερα στις μικρεπιφάνειες, όπου έχουν καεί στο πρόσφατο παρελθόν, τα δε πλήρως καέντα άτομα Μ. Πεύκης, να υλοτομηθούν με τρόπο τέτοιο ώστε να λειτουργούν ως κλαδοπλέγατα. Η ένωση Δρυός σφενδάμου θα μείνει εκτός διαχείρισης γιατί βρίσκεται σε νεαρή ηλικία. Απαγόρευση της βοσκής για μεν τα μικρά ζώα δέκα, για δε τα μεγάλα πέντε χρόνια, μετά την υλοτομία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΑΣ
2στ	Μ.π.,Δρ., άτομα Ελ.	1,0	Μ.π: 1-120 Δρ:1-100	υπ.,ακ.	Μ.π:3.195,33 Δρ:1.133,06	Μ.π:2.739,0 3 Δρ:1.008,7	Μ.π:106,1 6 Δρ:49,20	Μ.π:91 Δρ:43,8	Μ.π:85,71 Δρ:89,02	Στις ενώσεις Μ. Πεύκης εξευγενιστικές αραιώσεις κάνοντας θετική επιλογή. Τα λιγοστά άτομα Μ. Πεύκης που συμμετέχουν με διάμετρο μεγαλύτερη από 50 εκ θα απομακρυνθούν από την συστάδα διότι, εμποδίζουν την αναγέννηση και η παραμονή τους δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπό . Απόλυτη προσοχή, ιδιαίτερα στις μικρεπιφάνειες, όπου έχουν καεί στο πρόσφατο παρελθόν, τα δε πλήρως καέντα άτομα Μ. Πεύκης, να υλοτομηθούν με τρόπο τέτοιο ώστε να λειτουργούν ως κλαδοπλέγατα. Η ένωση Δρυός σφενδάμου θα μείνει εκτός διαχείρισης γιατί βρίσκεται σε νεαρή ηλικία. Απαγόρευση της βοσκής για μεν τα μικρά ζώα δέκα, για δε τα μεγάλα πέντε χρόνια, μετά την υλοτομία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΑΣ
3α	Οξ.	1,0-1,4	1-100	υπ.,ακ.	10.498,07	7.579,61	212,79	153,62	72,19	Απομάκρυνση των ατόμων που έχουν την ώριμο προς υλοτομία διάμετρο, και κυρίως στις θέσεις όπου υπάρχει αναγέννηση είτε στο στάδιο της νεοφυτεία ή των λεπτών κορμιδίων, ώστε να δημιουργηθεί μεγαλύτερος αυξητικός χώρος. Καλλιεργητικές υλοτομίες, οι οποίες θα πρέπει να έχουν στόχο την προετοιμασία του εδάφους για φυσική αναγέννηση, με ταυτόχρονη εξυγίανση και βελτίωση του ξυλαποθέματος.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΑΣ
3β	Οξ.	0,8	1-120	υπ.,ακ.	4.099,32	1.966,27	205,48	98,56	47,96	Κάρπωση των ώριμων ατόμων. Προτείνεται απομάκρυνση των ώριμων ατόμων, εφόσον δεν προκαλούμε ζημιές στην υπάρχουσα αναγέννηση. Καλλιεργητικές υλοτομίες: Αυτές θα έχουν χαρακτήρα εξυγίανσης και βελτίωσης του ξυλαποθέματος. Απαγόρευση της βοσκής για μεν τα μικρά ζώα, 10 χρόνια για δε τα μεγάλα πέντε μετά την υλοτομία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΑΣ
3γ	Οξ.	0,8	1-120	υπ.,ακ.	9.758,54	5.760,82	239,66	141	59,03	Υπόσκιες αναγεννητικές υλοτομίες. Φωτοδοτίδες υλοτομίες για την επίτευξη περισσότερου αυξητικού χώρου και καλύτερων συνθηκών φωτισμού. Καλλιεργητικές υλοτομίες με θετική επιλογή για την ευνόηση των ισχυρότερων και ποιοτικά καλύτερων ατόμων.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΑΣ
3δ	Οξ.,Μ.π.,Ελ	0,8-1,2	1-150	υπ.,ακ.	Οξ:4.560,40 Μ.π:1.422,79	Οξ:2.314,14 Μπ:465,93	Οξ:108,84 Μ.π:48,51	Οξ:55,23 Μ.π:15,83	Οξ:50,74 Μ.π:32,63	Υπόσκιες αναγεννητικές υλοτομίες. Σε θέσεις που λείπει η αναγέννηση αυτές θα έχουν χαρακτήρα προπαρασκευής της συστάδας και του εδάφους. Όπου η αναγέννηση είναι ικανοποιητική θα γίνουν φωτοδοτίδες υλοτομίες για τη δημιουργία νέων κέντρων αναγέννησης. Καλλιεργητικές υλοτομίες με θετική επιλογή για την περιποίηση του ξυλοαποθέματος και τη διαμόρφωση της κατάλληλης δομής της συστάδας. Απαγόρευση της βοσκής για μεν τα μικρά ζώα, 10 χρόνια για δε τα μεγάλα πέντε μετά την υλοτομία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΑΣ
3ε	Οξ., άτομα Ελ	0,8-0,9	1-120	υπ.,ακ.	11.662,70	9.368,26	284,65	228,65	80,32	Υπόσκιες αναγεννητικές υλοτομίες. Σε θέσεις που λείπει η αναγέννηση αυτές θα έχουν χαρακτήρα προπαρασκευής της συστάδας και του εδάφους. Όπου η αναγέννηση είναι ικανοποιητική θα γίνουν φωτοδοτίδες υλοτομίες για τη δημιουργία νέων κέντρων αναγέννησης. Καλλιεργητικές υλοτομίες με θετική επιλογή για την περιποίηση του ξυλοαποθέματος και τη διαμόρφωση της κατάλληλης δομής της συστάδας. Απαγόρευση της βοσκής για μεν τα μικρά ζώα, 10 χρόνια για δε τα μεγάλα πέντε μετά την υλοτομία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΑΣ
3στ	Οξ., Ελ	0,8	1-150	υπ.,ακ.	Οξ:7.825,43 Ελ:373,45	Οξ:5.590,41 Ελ:373,45	Οξ:205,77 Ελ:9,82	Οξ:147 Ελ:9,82	Οξ:71,44 Ελ:100,00	Υπόσκιες αναγεννητικές υλοτομίες. Όπου έχει εγκατασταθεί η αναγέννηση φωτοδοτίδες υλοτομίες για τη δημιουργία του κατάλληλου αυξητικού περιβάλλοντος, έτσι ώστε από το ένα μέρος να προσδίδεται περισσότερο φως στα νεόφυτα και από το άλλο μέρος να περιορίζεται σημαντικά ο ανταγωνισμός των ριζών των δέντρων της μητρικής συστάδας. Σε θέσεις που λείπει η αναγέννηση προπαρασκευαστικές υλοτομίες έτσι ώστε με την χαλάρωση της κομοστέγης να φθάνει μέχρι το έδαφος περισσότερο φως, θερμοκρασία και νερό για την αποσύνθεση της φυλλάδας που έχει συσσωρευτεί. Καλλιεργητικές υλοτομίες με θετική επιλογή για την περιποίηση του ξυλαποθέματος. Απαγόρευση της βοσκής για μεν τα μικρά ζώα, 10 χρόνια για δε τα μεγάλα πέντε μετά την υλοτομία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΑΣ

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	ΣV συστάδας	V κλάσεων διαμέτρου >34 cm	ΣV συστάδας / ha	V κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
3ζ	Οξ., Ελ	0,8	1-150	υπ.,ακ.	Οξ:8.723,64 Ελ:136,48	Οξ:5.805,89 Ελ:58,11	Οξ:208,96 Ελ:18,32	Οξ:141,78 Ελ:18,32	Οξ:66,55 Ελ:100	Υπόσκιες αναγεννητικές υλοτομίες. Όπου έχει εγκατασταθεί η αναγέννηση φωτοδότιδες υλοτομίες για τη δημιουργία του κατάλληλου αυξητικού περιβάλλοντος, έτσι ώστε από το ένα μέρος να προσδίδεται περισσότερο φως στα νεόφυτα και από το άλλο μέρος να περιορίζεται σημαντικά ο ανταγωνισμός των ριζών των δέντρων της μητρικής συστάδας. Σε θέσεις που λείπει η αναγέννηση προπαρασκευαστικές υλοτομίες έτσι ώστε με την χαλάρωση της κορμοστέγης να φθάνει μέχρι το έδαφος περισσότερο φως, θερμοκρασία και νερό για την αποσύνθεση της φυλλάδας που έχει συσσωρευτεί. Καλλιεργητικές υλοτομίες με θετική επιλογή για την περιποίηση του ξυλαποθέματος. Απαγόρευση της βοσκής για μεν τα μικρά ζώα, 10 χρόνια για δε τα μεγάλα πέντε μετά την υλοτομία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΑΣ
3η	Οξ., Ελ., Μ.π	1,0	1-150	υπ.,ακ.	Οξ:2.372,32 Ελ:634,04 Μ.π:1.414,37	Οξ:801,68 Ελ:0 Μ.π:1.318,36	Οξ:42,76 Ελ:22,28 Μ.π:49,35	Οξ:14,45 Ελ:0 Μ.π:46,00	Οξ:33,79 Ελ:0 Μ.π:93,21	Κάρπωση των ώριμων ατόμων. Απομάκρυνση όλων των ώριμων ατόμων της Οξυάς, εφόσον δεν δημιουργούμε σοβαρά προβλήματα ζημιών στην υπόλοιπη συστάδα και η ποιοτική τους κατάσταση δικαιολογεί την αναγκαιότητα εκμετάλλευσής τους. Καλλιεργητικές υλοτομίες, στην μέση και ανώτερη κλάση διαμέτρου με θετική επιλογή ευνοώντας την μείξη Οξυάς - Ελάτης γιατί είναι γνωστό ότι οι μεικτές συστάδες είναι πιο σταθερές απέναντι στους εξωτερικούς κινδύνους.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΑΣ
4α	Οξ.	1,0	1-150	υπ.,ακ.	11.339	5.269,32	353,62	164,33	46,47	Υπόσκιες αναγεννητικές υλοτομίες. Απομάκρυνση όλων των ώριμων ατόμων Οξυάς που βρίσκονται σε καλή ποιοτική κατάσταση και η περαιτέρω παραμονή τους στο δάσος δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπό. Καλλιεργητικές υλοτομίες με ευνόηση στα καλύτερα άτομα απομακρύνοντας τους οξύτερους ανταγωνιστές τους. Απαγόρευση της βοσκής για μεν τα μικρά ζώα, 10 χρόνια για δε τα μεγάλα πέντε μετά την υλοτομία	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΑΣ
4β	Οξ.	0,8	10-80	υπ.,ακ.	3.727,77	1.614,60	322,93	139,87	43,31	Καλλιεργητικές υλοτομίες. Απομάκρυνση όλων των ώριμων ατόμων Οξυάς που βρίσκονται σε καλή ποιοτική κατάσταση και η περαιτέρω παραμονή τους στο δάσος δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπό.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΑΣ
4γ	Οξ.	0,8	10 και άνω	υπ.,ακ.	7.677,58	5.650,69	297,12	218,68	73,59	Καλλιεργητικές υλοτομίες. Απομάκρυνση του οξύτερου ανταγωνιστή του επίλεκτου ατόμου, φροντίζοντας να μην βλάψουμε την υπάρχουσα αναγέννηση (θετική επιλογή). Απαγόρευση της βοσκής για μεν τα μικρά ζώα, 10 χρόνια για δε τα μεγάλα πέντε μετά την υλοτομία	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΑΣ
4δ	Οξ.	0,8	1-120	υπ.,ακ.	16.581,30	9.768,50	388,32	228,77	58,91	Υπόσκιες αναγεννητικές υλοτομίες. Απομάκρυνση ώριμων ατόμων διότι αφενός μεν εμποδίζουν την εξέλιξη της αναγέννησης και αφετέρου η παραμονή τους στο δάσος δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπό. Καλλιεργητικές υλοτομίες. Σκοπός των υλοτομιών αυτών είναι η περιποίηση του ξυλαποθέματος εφαρμόζοντας θετική επιλογή.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΑΣ
5α	Οξ.,Μ.π.	0,9	10-90	υπ.,ακ.	Οξ:9.509,9	Οξ:2.806,20	Οξ: 305	Οξ:90	Οξ: 29,51	Καλλιεργητικές υλοτομίες. Απομάκρυνση του οξύτερου ανταγωνιστή του επίλεκτου ατόμου, για τη δημιουργία μεγαλύτερου αυξητικού χώρου χωρίς να μειώσουμε την συγκόμωση κάτω του 0,8 για τη διατήρηση καλύτερων συνθηκών υγρασίας στο έδαφος και διευκόλυνση της φυσικής αποκλάδωσης	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΑΣ
5β	Οξ.,Μ.π.	0,9	1-90	υπ.,ακ.	Οξ:12.128,54	Οξ:5.021,65	Οξ:317,75	Οξ:131,56	Οξ:41,40	Καλλιεργητικές υλοτομίες. Στους λεπτούς και μέσους κορμούς θετική επιλογή για την καλύτερη εξέλιξη αυξητικά και ποιοτικά των επιλεγμένων καλύτερων ατόμων. Απαγόρευση της βοσκής για 10 χρόνια μετά την υλοτομία.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΑΣ
6	Οξ.,Μ.π.									Γυμνές , χορτολιβαδικές εκτάσεις με λίγες ενώσεις Οξυάς και Μ. πεύκης. Έντονη διάβρωση κατά μήκος των ρεμάτων.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΑΣ
7α	Δρ.,Μ.π	0,7-0,9	30-70	Δρ:Διφ.,αν. κατά θέσεις πρ.αν., Μ.π:Σπ.,αν.						Εκτός διαχείρισης. Απαιτείται ανόρθωση του ξυλώδους κεφαλαίου. Η Μ. πεύκη με άτομα μεγάλης ηλικίας με έντονη κλαδοβρίθεια και δίχαλα. Στη θέση "Βογγούρνο" η δρυς με πρεμνοφυή μορφή. Η συστάδα βόσκεται έντονα	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ ΠΛΑΓΙΑΣ
7β	Δρ.,Μ.π	0,7-0,9	30-70	Δρ:Διφ.,αν. κατά θέσεις πρ.αν., Μ.π:Σπ.,αν.						Εκτός διαχείρισης. Η Μ. πεύκη με άτομα μεγάλης ηλικίας με έντονη κλαδοβρίθεια και δίχαλα. Η συστάδα βόσκεται έντονα.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ ΠΛΑΓΙΑΣ
7γ	Δρ.,Μ.π	0,7-0,9	30-70	Δρ:Διφ.,αν. κατά θέσεις πρ.αν., Μ.π:Σπ.,αν.						Εκτός διαχείρισης. Η Μ. πεύκη με άτομα μεγάλης ηλικίας με έντονη κλαδοβρίθεια και δίχαλα. Η συστάδα βόσκεται έντονα.	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ ΠΛΑΓΙΑΣ
7δ	Δρ.,Μ.π	0,7-0,9	30-70	Δρ:Διφ.,αν. κατά θέσεις						Εκτός διαχείρισης. Η Μ. πεύκη με άτομα μεγάλης ηλικίας με έντονη κλαδοβρίθεια και δίχαλα. Η συστάδα βόσκεται έντονα. (δειγματοληψία του 1994 που έγινε τότε για τη σύνταξη της μελέτης στο τμήμα 7 για τη Δρυ έδωσε 78κ.μ/Ha).	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ ΠΛΑΓΙΑΣ

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	ΣV συστάδας	V κλάσεων διαμέτρου >34 cm	ΣV συστάδας / ha	V κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
				πρ.αν., Μ.π:Σπ.,αν.							
1α	Δρ., Άτομα Φυλ.πλ.	0,6-0,8	-40	Διφ.	418	0	19,4	0	0	Εκτός υλοτομικών επεμβάσεων για λόγους προστασίας, λόγω της ισχυρής πίεσης της βοσκής, του μικρού ύψους ξυλαποθέματος και της κατακερματισμένης δασοσκεπούς έκτασης.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
1β	Δρ., Άτομα Φυλ.πλ.	0,6-0,8	-50	Διφ.	792	0	30,7	0	0	Εκτός υλοτομικών επεμβάσεων για λόγους προστασίας, λόγω της ισχυρής πίεσης της βοσκής, του μικρού ύψους ξυλαποθέματος και της κατακερματισμένης δασοσκεπούς έκτασης.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
1γ	Δρ., Μ.π, Άτομα Φυλ.πλ.	0,6-0,8	-50	Δρ:Διφ. Μ.π:σπ.,υπ.	Δρ: 1.231	Δρ: 67	Δρ: 33	Δρ: 1,8	Δρ: 5,44	Εκτός υλοτομικών επεμβάσεων για λόγους προστασίας, λόγω της ισχυρής πίεσης της βοσκής, του μικρού ύψους ξυλαποθέματος και της κατακερματισμένης δασοσκεπούς έκτασης.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
1δ	Μ.π, Δρ., Άτομα Φυλ.πλ.	0,6-0,8	Μ.π:-80 Δρ:-40	Μ.π:σπ.,υπ. Δρ:Διφ.	Μ.π: 6.656 Δρ: 957	Μ.π: 6.344 Δρ: 0	Μ.π: 149,6 Δρ: 21,50	Μ.π: 142,6 Δρ: 0	Μ.π: 95,32 Δρ: 0	Εκτός υλοτομικών επεμβάσεων για λόγους προστασίας, λόγω της ισχυρής πίεσης της βοσκής, του μικρού ύψους ξυλαποθέματος και της κατακερματισμένης δασοσκεπούς έκτασης.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
2α	Μ.π, Δρ., Άτομα Φυλ.πλ.	0,6-0,9	Μ.π:-100 Δρ:-30	Μ.π:σπ.,υπ. Δρ:Διφ.	Μ.π: 5.184 Δρ: 69	Μ.π: 3.716 Δρ: 0	Μ.π:197,4 0 Δρ:2,6	Μ.π:141,5 0 Δρ:0	Μ.π:71,68 Δρ:0	Ήπιες εξυγιαντικές υλοτομίες, με την απομάκρυνση των κακόμορφων, μισοσάπιων, κρίσιμων ατόμων και γενικά των κακών φαινοτύπων, εφόσον η παραμονή τους στο δάσος δεν εξυπηρετεί κανένα δασοπονικό σκοπό. Οι αναγεννητικές υλοτομίες θα έχουν χαρακτήρα απομάκρυνσης των γηραιών ατόμων που είναι εγκλωβισμένα στον ανώροφο και παρεμποδίζουν την εξέλιξη των ενώσεων κορμιδίων. Καλλιεργητικές υλοτομίες εξευγενιστικού χαρακτήρα, με κριτήριο την θετική επιλογή. Απομάκρυνση των ατόμων δρυός που βρίσκονται διάσπαρτα στο υπόροφο της Μ. πεύκης. Αντίθετα, όπου η μορφή μίξης είναι κατά ομάδες και λόχμες αυτή θα διατηρείται ως εδαφοβελτιωτικό είδος εφόσον δεν παρεμποδίζει την εξέλιξη της Μ.πεύκης. Συλλογή των υπολειμμάτων των υλοτομιών για περαιτέρω αξιοποίησή τους ως καυσόξυλα ή βιομάζα. Απαγόρευση της βοσκής στην υλοτομηθείσα έκταση για 10 χρόνια μετά την υλοτομία.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
2β	Μ.π, Δρ., Άτομα ΟΞ.,Ελ.	0,6-0,9	Μ.π:-100 Δρ.ΟΞ.,Ε λ:-30	Μ.π:σπ.,υπ. - ομ.	Μ.π: 5.298 Δρ: 23	Μ.π: 2.066 Δρ: 0	Μ.π: 139,5 Δρ: 0	Μ.π: 54,4 Δρ: 0	Μ.π: 39 Δρ: 0	Κατά θέσεις η συστάδα έχει υποστεί ζημιές από έρπουσα πυρκαγιά. Ήπιες εξυγιαντικές υλοτομίες, με την απομάκρυνση των κακόμορφων, μισοσάπιων, κρίσιμων ατόμων και γενικά των κακών φαινοτύπων, εφόσον η παραμονή τους στο δάσος δεν εξυπηρετεί κανένα δασοπονικό σκοπό. Οι αναγεννητικές υλοτομίες θα έχουν χαρακτήρα απομάκρυνσης των γηραιών ατόμων που είναι εγκλωβισμένα στον ανώροφο και παρεμποδίζουν την εξέλιξη των ενώσεων κορμιδίων. Καλλιεργητικές υλοτομίες εξευγενιστικού χαρακτήρα, με κριτήριο την θετική επιλογή. Απομάκρυνση των ατόμων δρυός που βρίσκονται διάσπαρτα στο υπόροφο της Μ. πεύκης. Αντίθετα, όπου η μορφή μίξης είναι κατά ομάδες και λόχμες αυτή θα διατηρείται ως εδαφοβελτιωτικό είδος εφόσον δεν παρεμποδίζει την εξέλιξη της Μ.πεύκης. Σε διασπασμένες ενώσεις καμία επέμβαση. Συλλογή των υπολειμμάτων των υλοτομιών για περαιτέρω αξιοποίησή τους ως καυσόξυλα ή βιομάζα. Απαγόρευση της βοσκής στην υλοτομηθείσα έκταση για 10 χρόνια μετά την υλοτομία.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
2γ	Μ.π, Δρ., Άτομα Φυλ.πλ.	0,7-1,0	Μ.π:-80 Δρ:-30	Μ.π:σπ.,υπ. - ομ.	Μ.π: 3.314 Δρ: 20	Μ.π: 2.076 Δρ: 0	Μ.π: 149,9 Δρ: 0,9	Μ.π: 93,9 Δρ: 0	Μ.π: 62,14 Δρ: 0	Εκτός υλοτομικών επεμβάσεων για λόγους προστασίας του εδάφους.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
2δ	Μ.π, Δρ., Άτομα Φυλ.πλ.	0,6-0,9	Μ.π:-100 Δρ:-30	Μ.π:σπ.,υπ. - ομ. Δρ:Διφ.	Μ.π: 11.419 Δρ: 4	Μ.π: 7.926 Δρ: 0	Μ.π: 303,7 Δρ: 0,1	Μ.π: 210,8 Δρ: 0	Μ.π: 69,41 Δρ: 0	Στην Μ. πεύκη: εξυγιαντικές υλοτομίες, με την απομάκρυνση των κακόμορφων, μισοσάπιων, κρίσιμων ατόμων και γενικά των κακών φαινοτύπων, εφόσον η παραμονή τους στο δάσος δεν εξυπηρετεί κανένα δασοπονικό σκοπό. Οι αναγεννητικές υλοτομίες θα έχουν χαρακτήρα απομάκρυνσης των γηραιών ατόμων που είναι εγκλωβισμένα στον ανώροφο και παρεμποδίζουν την εξέλιξη των ενώσεων κορμιδίων και θα πραγματοποιηθούν στην μέση και χαμηλότερη περιοχή. Καλλιεργητικές υλοτομίες εξευγενιστικού χαρακτήρα, με κριτήριο την θετική επιλογή. Απομάκρυνση των ατόμων δρυός που βρίσκονται διάσπαρτα στο υπόροφο της Μ. πεύκης. Αντίθετα όπου η μορφή μίξης είναι κατά ομάδες και λόχμες αυτή θα διατηρείται ως εδαφοβελτιωτικό είδος εφόσον δεν παρεμποδίζει την εξέλιξη της Μ. πεύκης. Οι επεμβάσεις θα περιορισθούν μόνο στην ψηλότερη περιοχή όπου υπάρχουν ώριμες ενώσεις. Ουδεμία επέμβαση θα πραγματοποιηθεί στις νεαρές ενώσεις της μέσης και χαμηλότερης περιοχής. Συλλογή των υπολειμμάτων των υλοτομιών για περαιτέρω αξιοποίησή τους ως καυσόξυλα ή βιομάζα. Απαγόρευση της βοσκής στην υλοτομηθείσα έκταση για 10 χρόνια μετά την υλοτομία. Η Δρυς εκτός υλοτομικών επεμβάσεων για λόγους προστασίας του εδάφους, του μικρού ύψους ξυλαποθέματος και της κατακερματισμένης δασοσκεπούς έκτασης.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	ΣV συστάδας	V κλάσεων διαμέτρου >34 cm	ΣV συστάδας / ha	V κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
2ε	Μ.π, Δρ., Άτομα Φυλ.πλ.	0,6-1,0	Μ.π:-90 Δρ.: -40	Μ.π:σπ.,υπ. - ομ. Δρ:Διφ.	Μ.π: 8.972 Δρ: 379	Μ.π: 5.499 Δρ: 0	Μ.π: 371,2 Δρ:15,7	Μ.π: 227,5 Δρ:0	Μ.π: 61,29 Δρ:0	Εκτός υλοτομικών επεμβάσεων για λόγους προστασίας του εδάφους.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
3α	Μ.π, Δρ., Άτομα Φυλ.πλ.	0,6-0,9	Μ.π:-120 Δρ.: -50	Μ.π:σπ.,υπ. - ομ. Δρ:Διφ.	Μ.π: 11.005 Δρ: 1.675	Μ.π: 10.639 Δρ: 292	Μ.π: 249,1 Δρ: 37,9	Μ.π: 240,8 Δρ: 6,6	Μ.π: 96,67 Δρ:17,43	Μ. πεύκη: εξυγιαντικές υλοτομίες, με την απομάκρυνση των κακόμορφων, μισοσάπιων, κρίσιμων ατόμων και γενικά των κακών φαινοτύπων, εφόσον η παραμονή τους στο δάσος δεν εξυπηρετεί κανένα δασοπονικό σκοπό. Παράλληλα με την εξυγίανση της συστάδας θα επιδιώκεται η διάνοιξη αναγεννητικών κέντρων, με σκοπό την βελτίωση των συνθηκών φωτισμού για την περαιτέρω εξέλιξη της αναγέννησης, στις θέσεις που είναι ήδη εγκατεστημένη. Στην μέση κλάση διαμέτρων καλλιεργητικές υλοτομίες εξευγενιστικού χαρακτήρα, με κριτήριο την θετική επιλογή. Απομάκρυνση των ατόμων δρυός που βρίσκονται διάσπαρτα στο υπόροφο της Μ. πεύκης. Στη Δρυς: Καλλιεργητικές υλοτομίες εξευγενιστικού χαρακτήρα, με κριτήριο την θετική επιλογή. Αθροίσματα δρυός σε πυκνή κατάσταση θα αραιώνονται και η υλοτομία των ατόμων αυτών θα γίνεται ανεξάρτητα από την διάμετρο που έχουν. Το λήμμα της δρυός θα διατεθεί για την κάλυψη των ατομικών των κατοίκων Κεφαλοχωρίου σε καυσόξυλα. Συλλογή των υπολειμμάτων των υλοτομιών για περαιτέρω αξιοποίησή τους ως καυσόξυλα ή βιομάζα. Απαγόρευση της βοσκής στην υλοτομηθείσα έκταση για 10 χρόνια μετά την υλοτομία.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
3β	Μ.π, Δρ., Άτομα Φυλ.πλ.	0,6-0,9	Μ.π:-120 Δρ.: -50	Μ.π:σπ.,υπ. - ομ. Δρ:Διφ.	Μ.π: 10.083 Δρ: 1.865	Μ.π: 9.299 Δρ: 95	Μ.π: 181,2 Δρ: 33,5	Μ.π: 167,1 Δρ: 1,7	Μ.π: 92,22 Δρ: 5,09	Μ. πεύκη & δρυς: εξυγιαντικές υλοτομίες, με την απομάκρυνση των κακόμορφων, μισοσάπιων, κρίσιμων ατόμων και γενικά των κακών φαινοτύπων, εφόσον η παραμονή τους στο δάσος δεν εξυπηρετεί κανένα δασοπονικό κοπό. Παράλληλα με την εξυγίανση της συστάδας θα επιδιώκεται η διάνοιξη αναγεννητικών κέντρων, με σκοπό την βελτίωση των συνθηκών φωτισμού για την περαιτέρω εξέλιξη της αναγέννησης, στις θέσεις που είναι ήδη εγκατεστημένη. Το ποσοστό απόληψης θα κυμανθεί ανάλογα με τις επί μέρους ανάγκες των ενώσεων. Καλλιεργητικές υλοτομίες εξευγενιστικού χαρακτήρα, με κριτήριο την θετική επιλογή. Απομάκρυνση των ατόμων δρυός που βρίσκονται διάσπαρτα στο υπόροφο της Μ. πεύκης. Στις θέσεις όπου ο υπόροφος από γαύρο είναι πυκνής μορφής, παράλληλα με την υλοτομία των ατόμων της δρυός θα γίνεται και η απομάκρυνση του υπορόφου, έτσι ώστε αυτός να μην επικρατήσει σε βάρος της δρυός. Παράλληλα θα ευνοείται η εγκατάσταση και περαιτέρω εξέλιξη της αναγέννησης της Μ. πεύκης σε βάρος της δρυός. Το λήμμα της δρυός θα διατεθεί για την κάλυψη των ατομικών των κατοίκων Κεφαλοχωρίου σε καυσόξυλα. Συλλογή των υπολειμμάτων των υλοτομιών για περαιτέρω αξιοποίησή τους ως καυσόξυλα ή βιομάζα. Απαγόρευση της βοσκής στην υλοτομηθείσα έκταση για 10 χρόνια μετά την υλοτομία	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
3γ	Μ.π, Δρ., Άτομα Φυλ.πλ.	0,6-0,9	Μ.π:-120 Δρ.: -50	Μ.π:σπ.,υπ. - ομ. Δρ:Διφ.	Μ.π: 7.108 Δρ: 4.765	Μ.π: 6.534 Δρ: 0	Μ.π: 101,6 Δρ:68,10	Μ.π: 93,4 Δρ:0	Μ.π: 91,92 Δρ:0	Στη Μ.π: εξυγιαντικές υλοτομίες, με την απομάκρυνση των κακόμορφων, μισοσάπιων, κρίσιμων ατόμων και γενικά των κακών φαινοτύπων, εφόσον η παραμονή τους στο δάσος δεν εξυπηρετεί κανένα δασοπονικό σκοπό. Παράλληλα με την εξυγίανση της συστάδας θα επιδιώκεται η διάνοιξη αναγεννητικών κέντρων, με σκοπό την βελτίωση των συνθηκών φωτισμού για την περαιτέρω εξέλιξη της αναγέννησης, στις θέσεις που είναι ήδη εγκατεστημένη. Καλλιεργητικές υλοτομίες εξευγενιστικού χαρακτήρα, με κριτήριο την θετική επιλογή. Αθροίσματα σε πυκνή κατάσταση θα αραιώνονται και η υλοτομία των ατόμων αυτών θα γίνεται ανεξάρτητα από την διάμετρο που έχουν. Στην Δρυ: Απομάκρυνση των ατόμων δρυός που βρίσκονται διάσπαρτα στο υπόροφο της Μ. πεύκης. Αντίθετα όπου η μορφή μίξης είναι κατά ομάδες και λόχμες αυτή θα διατηρείται ως εδαφοβελτιωτικό είδος εφόσον δεν παρεμποδίζει την εξέλιξη της Μ.πεύκης. Καλλιεργητικές υλοτομίες στις ενώσεις της μέσης κλάσης διαμέτρων της δρυός με κριτήριο τη θετική επιλογή εννοώντας τα άτομα του μέλλοντος. Συλλογή των υπολειμμάτων των υλοτομιών για περαιτέρω αξιοποίησή τους ως καυσόξυλα ή βιομάζα. Το λήμμα της δρυός προορίζεται για την κάλυψη των ατομικών αναγκών των κατοίκων σε καυσόξυλα. Απαγόρευση της βοσκής στην υλοτομηθείσα έκταση για 10 χρόνια	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
4α	Μ.π	0,6-0,9	-60	Σπ.,υπ. -ομ.	3.704	0	231,2	0	0	Εκτός υλοτομικών επεμβάσεων λόγω του ανώριμου ξυλαποθέματος	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
4β	Μ.π, Δρ., Άτομα Οξ.,Φυλ.πλ.	0,6-1,0	Μ.π:-80 Οξ., Δρ.: -30	Μ.π:σπ.,υπ. Οξ., Δρ:Πρεμ. & Διφ.	Μ.π: 7.241 Δρ: 254 Φυλ.πλ:57	Μ.π:3.171 Δρ: 0 Φυλ.πλ:0	Μ.π:190,9 Δρ:6,7 Φυλ.πλ:1,5	Μ.π:83,6 Δρ:0 Φυλ.πλ:0	Μ.π:43,79 Δρ:0 Φυλ.πλ:0	Εξυγιαντικές υλοτομίες, με την απομάκρυνση των κακόμορφων, μισοσάπιων, κρίσιμων ατόμων και γενικά των κακών φαινοτύπων, εφόσον η παραμονή τους στο δάσος δεν εξυπηρετεί κανένα δασοπονικό σκοπό. Σε αυτή την κατεύθυνση θα απομακρύνονται τα διάσπαρτα γηραιά άτομα τα οποία είναι εγκλωβισμένα στον ανώροφο, καταπιέζουν και παρενοχλούν υφιστάμενες ενώσεις κορμιδίων και η παραμονή τους στο δάσος δεν εξυπηρετεί κανένα δασοπονικό σκοπό. Ήπιες καλλιεργητικές υλοτομίες στη μέση κλάση διαμέτρων με ευνόηση των καλύτερων ατόμων του μέλλοντος (θετική επιλογή). Οι ανωτέρω αναφερόμενες επεμβάσεις θα περιορισθούν μόνο στην περιοχή όπου υπάρχουν ώριμες ενώσεις. Ουδεμία	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	ΣV συστάδας	V κλάσεων διαμέτρου >34 cm	ΣV συστάδας / ha	V κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
										επέμβαση θα πραγματοποιηθεί στις νεαρές ενώσεις, στα αθροίσματα κορμιδίων και στις έντονα διασπασμένες ενώσεις της συστάδας. Συλλογή των υπολειμμάτων των υλοτομιών για περαιτέρω αξιοποίησή τους ως καυσόξυλα ή βιομάζα. Απαγόρευση της βοσκής στην υλοτομηθείσα έκταση για 10 χρόνια μετά την υλοτομία	
4γ	Οξ.,Μ.π	0,5-0,9	Οξ:-80 Μ.π:-60	Οξ.:Διφ.& Πρεμ. Μ.π:σπ.,υπ.	Οξ:2.645 Μ.π:20	Οξ:2.405 Μ.π:0	Οξ:156,4 Μ.π:1,2	Οξ:142,20 Μ.π:0	Οξ:90,93 Μ.π:0	Εκτός υλοτομικών επεμβάσεων. Οι ενώσεις της Μ.πεύκης είναι ανώριμες για υλοτομία λόγω του μικρού ύψους ξυλαποθέματος, των πολλών νεαρών ενώσεων που συμμετέχουν στην σύνθεση του ξυλαποθέματος και της έντονα διασπασμένης συγκόμωσης. Οι ενώσεις της οξυάς είναι έντονα υποβαθμισμένες και κακοποιημένες από δυσμενείς ανθρωπογενείς επιδράσεις.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
4δ	Οξ.,Μ.π, άτομα Ελ.	0,6-1,0	Οξ:-80 Μ.π:-90 Ελ:-40	Οξ.:Διφ., υπ. Μ.π:σπ.,υπ.,ο μ.	Οξ:2.297 Μ.π:1.137 Ελ:41	Οξ:1.230 Μ.π:355 Ελ:0	Οξ:130,20 Μ.π:64,40 Ελ:2,3	Οξ:69,70 Μ.π:20,10 Ελ:0	Οξ:53,55 Μ.π:31,22 Ελ:0	Οξυά + Μ.πεύκη: εξυγιαντικές υλοτομίες, με την απομάκρυνση των κακόμορφων, μισοσάπιων, κρίσιμων ατόμων και γενικά των κακών φαινοτύπων, εφόσον η παραμονή τους στο δάσος δεν εξυπηρετεί κανένα δασοπονικό σκοπό. Σταδιακή απελευθέρωση της αναγέννησης της οξυάς με την απομάκρυνση των μητρικών ατόμων, στις θέσεις όπου εκτιμάται ότι καταπιέζεται από την πίεση του ανορόφου. Γενικά σε όλη την έκταση της συστάδας δεν προτείνεται η διάνοιξη αναγεννητικών κέντρων λόγω της έλλειψης ώριμων ενώσεων. Σταδιακή απομάκρυνση των γηραιών ατόμων Μ. πεύκης, τα οποία είναι εγκλωβισμένα στον ανώροφο των ενώσεων της οξυάς, εφόσον η παραμονή τους στο δάσος δεν εξυπηρετεί κανένα δασοπονικό σκοπό. Καλλιεργητικές υλοτομίες εξευγενιστικού χαρακτήρα, με κριτήριο την θετική επιλογή. Αθροίσματα οξυάς σε πυκνή κατάσταση θα αραιώνονται και η υλοτομία των ατόμων αυτών θα γίνεται ανεξάρτητα από την διάμετρο που έχουν. Όπου η οξυά είναι πρεμνοφυούς μορφής σε δέσμες θα υλοτομούνται τα κακόμορφα και υπολειπόμενα πρεμνοβλαστήματα ώστε να μείνουν ανά δέσμη οι καλύτεροι φαινότυποι. Συλλογή των υπολειμμάτων των υλοτομιών για περαιτέρω αξιοποίησή τους ως καυσόξυλα ή βιομάζα. Απαγόρευση της βοσκής στην υλοτομηθείσα έκταση για 10 χρόνια μετά την υλοτομία. Στις ενώσεις Μ. πεύκης (στα χαμηλότερα της συστάδας): Εκτός υλοτομικών επεμβάσεων λόγω του χαμηλού ξυλαποθέματος, της κατακερματισμένης δασοσκεπούς έκτασης και των πολλών νεαρών ενώσεων που συμμετέχουν στην σύνθεση του ξυλαποθέματος	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
4ε	Μ.π, Δρ., Άτομα Φυλ.πλ.	0,5-0,8	Μ.π:-80 Δρ.: -30	Μ.π:σπ.,υπ. - ομ. Δρ:-						Εκτός υλοτομικών επεμβάσεων λόγω του ανώριμου και μικρού ύψους ξυλαποθέματος.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
5α	Οξ.	0,8-1,0	-90	Διφ,υπ.	6.401	1.793	315,6	88,4	28,01	Αναγωγή της ακανόνιστης διαχειριστικής μορφής σε κανονική υποκηπευτή και η αναγωγή της διφυούς μορφής σε σπερμοφυή. Στην ανώτερη και ανώτατη κλάση διαμέτρων εξυγιαντικές υλοτομίες, με την απομάκρυνση των κακόμορφων, μισοσάπιων, κρίσιμων ατόμων και γενικά των κακών φαινοτύπων, εφόσον η παραμονή τους στο δάσος δεν εξυπηρετεί κανένα δασοπονικό σκοπό. Στην μέση και κατώτερη κλάση διαμέτρων καλλιεργητικές υλοτομίες εξευγενιστικού χαρακτήρα, με κριτήριο την θετική επιλογή. Αθροίσματα οξυάς σε πυκνή κατάσταση θα αραιώνονται και η υλοτομία των ατόμων αυτών θα γίνεται ανεξάρτητα από την διάμετρο που έχουν. Όπου η οξυά είναι πρεμνοφυούς μορφής σε δέσμες θα υλοτομούνται τα κακόμορφα και υπολειπόμενα πρεμνοβλαστήματα ώστε να μείνουν ανά δέσμη οι καλύτεροι φαινότυποι. Σε όλες τις περιπτώσεις οι υλοτομικές επεμβάσεις θα είναι ήπιες. Ουδεμία επέμβαση θα εφαρμοσθεί στις πολύ ισχυρές εγκάρσιες κλίσεις και στα πετρώδη εδάφη περιμετρικά της θέσης Πέτρα Μούκα. Συλλογή των υπολειμμάτων των υλοτομιών για περαιτέρω αξιοποίησή τους ως καυσόξυλα ή βιομάζα. Απαγόρευση της βοσκής στην υλοτομηθείσα έκταση για 10 χρόνια μετά την υλοτομία.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
5β	Οξ.	0,6-1,1	-100	Διφ,υπ.	13.691	10.230	547,6	409,2	74,72	Αναγωγή της ακανόνιστης διαχειριστικής μορφής σε κανονική υποκηπευτή και η αναγωγή της διφυούς μορφής σε σπερμοφυή. Στην ανώτερη και ανώτατη κλάση διαμέτρων εξυγιαντικές υλοτομίες, με την απομάκρυνση των κακόμορφων, μισοσάπιων, κρίσιμων ατόμων και γενικά των κακών φαινοτύπων, εφόσον η παραμονή τους στο δάσος δεν εξυπηρετεί κανένα δασοπονικό σκοπό. Στην μέση και κατώτερη κλάση διαμέτρων καλλιεργητικές υλοτομίες εξευγενιστικού χαρακτήρα, με κριτήριο την θετική επιλογή. Αθροίσματα οξυάς σε πυκνή κατάσταση θα αραιώνονται και η υλοτομία των ατόμων αυτών θα γίνεται ανεξάρτητα από την διάμετρο που έχουν. Όπου η οξυά είναι πρεμνοφυούς μορφής σε δέσμες θα υλοτομούνται τα κακόμορφα και υπολειπόμενα πρεμνοβλαστήματα ώστε να μείνουν ανά δέσμη οι καλύτεροι φαινότυποι. Σε όλες τις περιπτώσεις οι υλοτομικές επεμβάσεις θα είναι ήπιες. Ουδεμία επέμβαση θα εφαρμοσθεί στα πετρώδη εδάφη, στις κρασπεδιαίες θέσεις και στις διασπασμένες ενώσεις της συστάδας. Συλλογή των υπολειμμάτων των υλοτομιών για περαιτέρω αξιοποίησή τους ως καυσόξυλα ή βιομάζα. Απαγόρευση της βοσκής στην υλοτομηθείσα έκταση για 10 χρόνια μετά την υλοτομία.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	ΣV συστάδας	V κλάσεων διαμέτρου >34 cm	ΣV συστάδας / ha	V κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
5γ	Οξ.,Μ.π	0,7-1,0	Οξ:~100 Μ.π:~100	Οξ.:Σπ.& Διφ. υπ., Μ.π:ΣΤπ.,υπ.	Οξ:14.098 Μ.π:292	Οξ:9.865 Μ.π:292	Οξ:444,0 Μ.π:9,2	Οξ:310,7 Μ.π:9,2	Οξ:69,97 Μ.π:100	Αναγωγή της ακανόνιστης διαχειριστικής μορφής σε κανονική υποκηπευτή και η αναγωγή της διφυούς μορφής σε σπερμοφυή. Εξυγιαντικές υλοτομίες, με την απομάκρυνση των κακόμορφων, μισοσάπιων, κρίσιμων ατόμων και γενικά των κακών φαινοτύπων, εφόσον η παραμονή τους στο δάσος δεν εξυπηρετεί κανένα δασοπονικό σκοπό. Καλλιεργητικές υλοτομίες εξευγενιστικού χαρακτήρα, με κριτήριο την θετική επιλογή. Όπου η οξυά είναι πρεμνοφυούς μορφής σε δέσμες θα υλοτομούνται τα κακόμορφα και υπολειπόμενα πρεμνοβλαστήματα ώστε να μείνουν ανά δέσμη οι καλύτεροι φαινότυποι. Σε όλες τις περιπτώσεις οι προτεινόμενες επεμβάσεις θα είναι ήπιες. Ουδεμία επέμβαση θα εφαρμοσθεί στα πετρώδη εδάφη, στις κρασπεδιαίες θέσεις και στις διασπασμένες ενώσεις της συστάδας. Συλλογή των υπολειμμάτων των υλοτομιών για περαιτέρω αξιοποίησή τους ως καυσόξυλα ή βιομάζα. Απαγόρευση της βοσκής στην υλοτομηθείσα έκταση για 10 χρόνια μετά την υλοτομία.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
6α	Οξ.	0,6-1,1	-80	Σπ. & πρεμ.,υπ.	10.187	4.645	326,1	148,7	45,6	Αναγωγή της ακανόνιστης διαχειριστικής μορφής σε κανονική υποκηπευτή και η αναγωγή της διφυούς μορφής σε σπερμοφυή. Εξυγιαντικές υλοτομίες, με την απομάκρυνση των κακόμορφων, μισοσάπιων, κρίσιμων ατόμων και γενικά των κακών φαινοτύπων, εφόσον η παραμονή τους στο δάσος δεν εξυπηρετεί κανένα δασοπονικό σκοπό. Καλλιεργητικές υλοτομίες εξευγενιστικού χαρακτήρα, με κριτήριο την θετική επιλογή. Όπου η οξυά είναι πρεμνοφυούς μορφής σε δέσμες θα υλοτομούνται τα κακόμορφα και υπολειπόμενα πρεμνοβλαστήματα ώστε να μείνουν ανά δέσμη οι καλύτεροι φαινότυποι. Σε όλες τις περιπτώσεις οι προτεινόμενες επεμβάσεις θα είναι ήπιες. Συλλογή των υπολειμμάτων των υλοτομιών για περαιτέρω αξιοποίησή τους ως καυσόξυλα ή βιομάζα. Απαγόρευση της βοσκής στην υλοτομηθείσα έκταση για 10 χρόνια μετά την υλοτομία.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
6β	Οξ.	0,9-1,1	-80	Σπ. & πρεμ.,υπ.	8.881	3.125	311,5	109,6	35,19	Αναγωγή της ακανόνιστης διαχειριστικής μορφής σε κανονική υποκηπευτή και η αναγωγή της διφυούς μορφής σε σπερμοφυή. Εξυγιαντικές υλοτομίες, με την απομάκρυνση των κακόμορφων, μισοσάπιων, κρίσιμων ατόμων και γενικά των κακών φαινοτύπων, εφόσον η παραμονή τους στο δάσος δεν εξυπηρετεί κανένα δασοπονικό σκοπό. Καλλιεργητικές υλοτομίες εξευγενιστικού χαρακτήρα, με κριτήριο την θετική επιλογή. Όπου η οξυά είναι πρεμνοφυούς μορφής σε δέσμες θα υλοτομούνται τα κακόμορφα και υπολειπόμενα πρεμνοβλαστήματα ώστε να μείνουν ανά δέσμη οι καλύτεροι φαινότυποι. Σε όλες τις περιπτώσεις οι προτεινόμενες επεμβάσεις θα είναι ήπιες. Συλλογή των υπολειμμάτων των υλοτομιών για περαιτέρω αξιοποίησή τους ως καυσόξυλα ή βιομάζα. Απαγόρευση της βοσκής στην υλοτομηθείσα έκταση για 10 χρόνια μετά την υλοτομία.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
6γ	Οξ.	0,8-1,0	-100	Σπ. & πρεμ.,υπ.	11.694	7.123	346,1	210,8	60,91	Λαθρούλοτομίες στα ψηλότερα κοντά στον δρόμο σε περιορισμένη έκταση. Αναγωγή της ακανόνιστης διαχειριστικής μορφής σε κανονική υποκηπευτή και η αναγωγή της διφυούς μορφής σε σπερμοφυή. Εξυγιαντικές – αναγεννητικές υλοτομίες, με την απομάκρυνση κακόμορφων, μισοσάπιων, κρίσιμων ατόμων και γενικά των κακών φαινοτύπων που έχουν απομείνει, εφόσον η παραμονή τους στο δάσος δεν εξυπηρετεί κανένα δασοπονικό σκοπό. Παράλληλα με την εξυγίανση της συστάδας θα επιδιώκεται η διεύρυνση υπαρχόντων αναγεννητικών κέντρων, με σκοπό την βελτίωση των συνθηκών φωτισμού και την περαιτέρω εξέλιξη της αναγέννησης, στις θέσεις που είναι ήδη εγκατεστημένη. Στην μέση και κατώτερη κλάση διαμέτρων καλλιεργητικές υλοτομίες εξευγενιστικού χαρακτήρα, με κριτήριο την θετική επιλογή. Αθροίσματα οξυάς σε πυκνή κατάσταση θα αραιώνονται και η υλοτομία των ατόμων αυτών θα γίνεται ανεξάρτητα από την διάμετρο που έχουν. Όπου η οξυά είναιπρεμνοφυούς μορφής σε δέσμες θα υλοτομούνται τα κακόμορφα και υπολειπόμενα πρεμνοβλαστήματα ώστε να μείνουν ανά δέσμη οι καλύτεροι φαινότυποι. Συλλογή των υπολειμμάτων των υλοτομιών για περαιτέρω αξιοποίησή τους ως καυσόξυλα ή βιομάζα. Απαγόρευση της βοσκής στην υλοτομηθείσα έκταση για 10 χρόνια.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
7α	Οξ.	0,9-1,1	-80	Σπ. & πρεμ.,υπ.	4.487	1.132	284,7	71,8	25,23	Αρκετές ζημιές από την βοσκή στην αναγέννηση παρατηρήθηκαν στις κρασπεδιαίες θέσεις. Αναγωγή της ακανόνιστης διαχειριστικής μορφής σε κανονική υποκηπευτή και η αναγωγή της διφυούς μορφής σε σπερμοφυή. Εξυγιαντικές υλοτομίες, με την απομάκρυνση των κακόμορφων, μισοσάπιων, κρίσιμων ατόμων και γενικά των κακών φαινοτύπων, εφόσον η παραμονή τους στο δάσος δεν εξυπηρετεί κανένα δασοπονικό σκοπό. Καλλιεργητικές υλοτομίες εξευγενιστικού χαρακτήρα, με κριτήριο την θετική επιλογή. Όπου η οξυά είναι πρεμνοφυούς μορφής σε δέσμες θα υλοτομούνται τα κακόμορφα και υπολειπόμενα πρεμνοβλαστήματα ώστε να μείνουν ανά δέσμη οι καλύτεροι φαινότυποι. Σε όλες τις περιπτώσεις οι προτεινόμενες επεμβάσεις θα είναι ήπιες. Συλλογή των υπολειμμάτων των υλοτομιών για περαιτέρω αξιοποίησή τους ως καυσόξυλα ή βιομάζα. Απαγόρευση της βοσκής στην υλοτομηθείσα έκταση για 10 χρόνια μετά την υλοτομία.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	ΣV συστάδας	V κλάσεων διαμέτρου >34 cm	ΣV συστάδας / ha	V κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
7β	Οξ.	0,8-1,0	-100	Σπ. & πρεμ.,υπ.	7.792	7.127	413,4	378,1	91,47	Αναγωγή της ακανόνιστης διαχειριστικής μορφής σε κανονική υποκηπευτή και η αναγωγή της διφυούς μορφής σε σπερμοφυή. Εξυγιαντικές υλοτομίες, με την απομάκρυνση των κακόμορφων, μισοσάπιων, κρίσιμων ατόμων και γενικά των κακών φαινοτύπων, εφόσον η παραμονή τους στο δάσος δεν εξυπηρετεί κανένα δασοπονικό σκοπό. Καλλιεργητικές υλοτομίες εξευγενιστικού χαρακτήρα, με κριτήριο την θετική επιλογή. Όπου η οξυά είναι πρεμνοφυούς μορφής σε δέσμες θα υλοτομούνται τα κακόμορφα και υπολειπόμενα πρεμνοβλαστήματα ώστε να μείνουν ανά δέσμη οι καλύτεροι φαινότυποι. Σε όλες τις περιπτώσεις οι προτεινόμενες επεμβάσεις θα είναι ήπιες. Συλλογή των υπολειμμάτων των υλοτομιών για περαιτέρω αξιοποίησή τους ως καυσόξυλα ή βιομάζα. Απαγόρευση της βοσκής στην υλοτομηθείσα έκταση για 10 χρόνια μετά την υλοτομία.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
7γ	Οξ.	0,9-1,0	-100	Σπ. & πρεμ.,υπ.	11.457	8.208	297,6	213,2	71,64	Αναγωγή της ακανόνιστης διαχειριστικής μορφής σε κανονική υποκηπευτή και η αναγωγή της διφυούς μορφής σε σπερμοφυή. Εξυγιαντικές υλοτομίες, με την απομάκρυνση των κακόμορφων, μισοσάπιων, κρίσιμων ατόμων και γενικά των κακών φαινοτύπων, εφόσον η παραμονή τους στο δάσος δεν εξυπηρετεί κανένα δασοπονικό σκοπό. Καλλιεργητικές υλοτομίες εξευγενιστικού χαρακτήρα, με κριτήριο την θετική επιλογή. Όπου η οξυά είναι πρεμνοφυούς μορφής σε δέσμες θα υλοτομούνται τα κακόμορφα και υπολειπόμενα πρεμνοβλαστήματα ώστε να μείνουν ανά δέσμη οι καλύτεροι φαινότυποι. Σε όλες τις περιπτώσεις οι προτεινόμενες επεμβάσεις θα είναι ήπιες. Συλλογή των υπολειμμάτων των υλοτομιών για περαιτέρω αξιοποίησή τους ως καυσόξυλα ή βιομάζα. Απαγόρευση της βοσκής στην υλοτομηθείσα έκταση για 10 χρόνια μετά την υλοτομία.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
7δ	Οξ.,Ελ.	0,9-1,0	Οξ:-80 Ελ:-30	Σπ. & πρεμ.,υπ.- κηπ.	Οξ:4.069 Ελ:53	Οξ:3.382 Ελ:0	Οξ:216,3 Ελ:2,8	Οξ:179,8 Ελ:0	Οξ:83,13 Ελ:0	Αναγωγή της ακανόνιστης διαχειριστικής μορφής σε κανονική υποκηπευτή και η αναγωγή της διφυούς μορφής σε σπερμοφυή. Εξυγιαντικές υλοτομίες, με την απομάκρυνση των κακόμορφων, μισοσάπιων, κρίσιμων ατόμων και γενικά των κακών φαινοτύπων, εφόσον η παραμονή τους στο δάσος δεν εξυπηρετεί κανένα δασοπονικό σκοπό. Καλλιεργητικές υλοτομίες εξευγενιστικού χαρακτήρα, με κριτήριο την θετική επιλογή. Όπου η οξυά είναι πρεμνοφυούς μορφής σε δέσμες θα υλοτομούνται τα κακόμορφα και υπολειπόμενα πρεμνοβλαστήματα ώστε να μείνουν ανά δέσμη οι καλύτεροι φαινότυποι. Σε όλες τις περιπτώσεις οι προτεινόμενες επεμβάσεις θα είναι ήπιες. Συλλογή των υπολειμμάτων των υλοτομιών για περαιτέρω αξιοποίησή τους ως καυσόξυλα ή βιομάζα. Απαγόρευση της βοσκής στην υλοτομηθείσα έκταση για 10 χρόνια μετά την υλοτομία.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
8α	Οξ.,Ελ.	0,9-1,0	-80	Σπ. & πρεμ.,υπ.	Οξ:13.769 Ελ:75	Οξ:3.329 Ελ:70	Οξ:294,9 Ελ:1,6	Οξ:71,3 Ελ:1,5	Οξ:24,18 Ελ:93,33	Αναγωγή της ακανόνιστης διαχειριστικής μορφής σε κανονική υποκηπευτή και η αναγωγή της διφυούς μορφής σε σπερμοφυή. Εξυγιαντικές υλοτομίες, με την απομάκρυνση των κακόμορφων, μισοσάπιων, κρίσιμων ατόμων και γενικά των κακών φαινοτύπων, εφόσον η παραμονή τους στο δάσος δεν εξυπηρετεί κανένα δασοπονικό σκοπό. Καλλιεργητικές υλοτομίες εξευγενιστικού χαρακτήρα, με κριτήριο την θετική επιλογή. Όπου η οξυά είναι πρεμνοφυούς μορφής σε δέσμες θα υλοτομούνται τα κακόμορφα και υπολειπόμενα πρεμνοβλαστήματα ώστε να μείνουν ανά δέσμη οι καλύτεροι φαινότυποι. Σε όλες τις περιπτώσεις οι προτεινόμενες επεμβάσεις θα είναι ήπιες. Συλλογή των υπολειμμάτων των υλοτομιών για περαιτέρω αξιοποίησή τους ως καυσόξυλα ή βιομάζα. Απαγόρευση της βοσκής στην υλοτομηθείσα έκταση για 10 χρόνια μετά την υλοτομία.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
8β	Οξ.,Ελ., άτομα Μ.π.	0,8-1,1	Οξ:-100 Ελ:-80	Σπ. & πρεμ.,υπ.	Οξ:10.922 Ελ:3.813 Μ.π:233	Οξ:4.755 Ελ:3.197 Μ.π:233	Οξ:201,9 Ελ:70,5 Μ.π:4,3	Οξ:87,9 Ελ:59,1 Μ.π:4,3	Οξ:43,54 Ελ:83,84 Μ.π:100,0	Αναγωγή της ακανόνιστης διαχειριστικής μορφής σε κανονική υποκηπευτή και η αναγωγή της διφυούς μορφής σε σπερμοφυή. Στην ανώτερη κλάση διαμέτρων εξυγιαντικές υλοτομίες, με την απομάκρυνση των κακόμορφων, μισοσάπιων, κρίσιμων ατόμων και γενικά των κακών φαινοτύπων, εφόσον η παραμονή τους στο δάσος δεν εξυπηρετεί κανένα δασοπονικό σκοπό. Οι αναγεννητικές υλοτομίες θα έχουν χαρακτήρα απομάκρυνσης των μητρικών ατόμων, στις θέσεις όπου εκτιμάται ότι αυτά καταπιέζουν ικανοποιητική και εξελίξιμη αναγέννηση οξυάς και ελάτης. Καλλιεργητικές υλοτομίες εξευγενιστικού χαρακτήρα, με κριτήριο την θετική επιλογή. Αθροίσματα οξυάς σε πυκνή κατάσταση θα αραιώνονται και η υλοτομία των ατόμων αυτών θα γίνεται ανεξάρτητα από την διάμετρο που έχουν. Όπου η οξυά είναι πρεμνοφυούς μορφής σε δέσμες θα υλοτομούνται τα κακόμορφα και υπολειπόμενα πρεμνοβλαστήματα ώστε να μείνουν ανά δέσμη οι καλύτεροι φαινότυποι. Στις ενώσεις ελάτης + οξυάς θα επιδιώκεται η δημιουργία μικτών ενώσεων κατά ομάδες και λόχμες γιατί αποτελεί τον καλύτερο συνδυασμό δάσους με την μεγαλύτερη παραγωγικότητα εφαρμόζοντας καλλιεργητικές υλοτομίες και στα δύο είδη. Συλλογή των υπολειμμάτων των υλοτομιών για περαιτέρω αξιοποίησή τους ως καυσόξυλα ή βιομάζα. Απαγόρευση της βοσκής στην υλοτομηθείσα έκταση για 10 χρόνια	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
8γ	Οξ., άτομα Ελ., Μ.π.	0,6-0,9	Οξ:-120 Ελ, Μ.π:- 25	Οξ:διφ.,υπ.	Οξ:13.674	Οξ:9.308	Οξ:363	Οξ:247,1	Οξ:68,07	Αναγωγή της ακανόνιστης διαχειριστικής μορφής σε κανονική υποκηπευτή και η αναγωγή της διφυούς μορφής σε σπερμοφυή. Στην ανώτερη κλάση διαμέτρων εξυγιαντικές υλοτομίες, με την απομάκρυνση των κακόμορφων, μισοσάπιων, κρίσιμων ατόμων και γενικά των κακών φαινοτύπων, εφόσον η παραμονή τους στο δάσος δεν εξυπηρετεί κανένα δασοπονικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	ΣV συστάδας	V κλάσεων διαμέτρου >34 cm	ΣV συστάδας / ha	V κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
										σκοπό. Οι αναγεννητικές υλοτομίες θα έχουν χαρακτήρα απομάκρυνσης των μητρικών ατόμων, στις θέσεις όπου εκτιμάται ότι αυτά καταπιέζουν ικανοποιητική και εξελίξιμη αναγέννηση οξυάς και ελάτης. Καλλιεργητικές υλοτομίες εξευγενιστικού χαρακτήρα, με κριτήριο την θετική επιλογή. Αθροίσματα οξυάς σε πυκνή κατάσταση θα αραιώνονται και η υλοτομία των ατόμων αυτών θα γίνεται ανεξάρτητα από την διάμετρο που έχουν. Όπου η οξυά είναι πρεμνοφυούς μορφής σε δέσμες θα υλοτομούνται τα κακόμορφα και υπολειπόμενα πρεμνοβλαστήματα ώστε να μείνουν ανά δέσμη οι καλύτεροι φαινότυποι. Στις ενώσεις ελάτης + οξυάς θα επιδιώκεται η δημιουργία μικτών ενώσεων κατά ομάδες και λόχμες γιατί αποτελεί τον καλύτερο συνδυασμό δάσους με την μεγαλύτερη παραγωγικότητα εφαρμόζοντας καλλιεργητικές υλοτομίες και στα δύο είδη. Συλλογή των υπολειμμάτων των υλοτομιών για περαιτέρω αξιοποίησή τους ως καυσόξυλα ή βιομάζα. Απαγόρευση της βοσκής στην υλοτομηθείσα έκταση για 10 χρόνια	
8δ	Οξ., άτομα Ελ., Μ.π.	0,6-1,0	Οξ:-120 Ελ, Μ.π:-30	Οξ:διφ.,υπ.	Οξ:14.102	Οξ:12.132	Οξ:393,7	338,7	Οξ:86,03	Εξυγιαντικές υλοτομίες, με την απομάκρυνση των κακόμορφων, μισοσάπιων, κρίσιμων ατόμων και γενικά των κακών φαινοτύπων, εφόσον η παραμονή τους στο δάσος δεν εξυπηρετεί κανένα δασοπονικό σκοπό. Καλλιεργητικές υλοτομίες εξευγενιστικού χαρακτήρα, με κριτήριο την θετική επιλογή. Αθροίσματα οξυάς σε πυκνή κατάσταση θα αραιώνονται και η υλοτομία των ατόμων αυτών θα γίνεται ανεξάρτητα από την διάμετρο που έχουν. Όπου η οξυά είναι πρεμνοφυούς μορφής σε δέσμες θα υλοτομούνται τα κακόμορφα και υπολειπόμενα πρεμνοβλαστήματα ώστε να μείνουν ανά δέσμη οι καλύτεροι φαινότυποι.Συλλογή των υπολειμμάτων των υλοτομιών για περαιτέρω αξιοποίησή τους ως καυσόξυλα ή βιομάζα. Απαγόρευση της βοσκής στην υλοτομηθείσα έκταση για 10 χρόνια.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
8ε	Οξ., άτομα Μ.π.	0,8-1,0	Οξ:-80 Μ.π:-40	Οξ:διφ.,υπ.	Οξ:5.627	Οξ:1.736	Οξ:240,9	Οξ:74,3	Οξ:30,85	Εξυγιαντικές υλοτομίες, με την απομάκρυνση των κακόμορφων, μισοσάπιων, κρίσιμων ατόμων και γενικά των κακών φαινοτύπων, εφόσον η παραμονή τους στο δάσος δεν εξυπηρετεί κανένα δασοπονικό σκοπό. Καλλιεργητικές υλοτομίες εξευγενιστικού χαρακτήρα, με κριτήριο την θετική επιλογή. Αθροίσματα οξυάς σε πυκνή κατάσταση θα αραιώνονται και η υλοτομία των ατόμων αυτών θα γίνεται ανεξάρτητα από την διάμετρο που έχουν. Όπου η οξυά είναι πρεμνοφυούς μορφής σε δέσμες θα υλοτομούνται τα κακόμορφα και υπολειπόμενα πρεμνοβλαστήματα ώστε να μείνουν ανά δέσμη οι καλύτεροι φαινότυποι.Συλλογή των υπολειμμάτων των υλοτομιών για περαιτέρω αξιοποίησή τους ως καυσόξυλα ή βιομάζα. Απαγόρευση της βοσκής στην υλοτομηθείσα έκταση για 10 χρόνια.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
9α	Οξ.	0,8-1,1	-100	Σπ. & πρεμ.,υπ.	2.822	2.520	226,1	201,9	89,3	Αναγωγή της ακανόνιστης διαχειριστικής μορφής σε κανονική υποκτηπευτή και η αναγωγή της διφυούς μορφής σε σπερμοφυή. Στην ανώτερη κλάση διαμέτρων εξυγιαντικές – αναγεννητικές υλοτομίες, με την απομάκρυνση των κακόμορφων, μισοσάπιων, κρίσιμων ατόμων και γενικά των κακών φαινοτύπων, εφόσον η παραμονή τους στο δάσος δεν εξυπηρετεί κανένα δασοπονικό σκοπό. Διεύρυνση υπαρχόντων αναγεννητικών κέντρων, με σκοπό την βελτίωση των συνθηκών φωτισμού και την περαιτέρω εξέλιξη της αναγέννησης, στις θέσεις που είναι ήδη εγκατεστημένη. Καλλιεργητικές υλοτομίες εξευγενιστικού χαρακτήρα, με κριτήριο την θετική επιλογή. Αθροίσματα οξυάς σε πυκνή κατάσταση θα αραιώνονται και η υλοτομία των ατόμων αυτών θα γίνεται ανεξάρτητα από την διάμετρο που έχουν. Όπου η οξυά είναι πρεμνοφυούς μορφής σε δέσμες θα υλοτομούνται τα κακόμορφα και υπολειπόμενα πρεμνοβλαστήματα ώστε να μείνουν ανά δέσμη οι καλύτεροι φαινότυποι. Συλλογή των υπολειμμάτων των υλοτομιών για περαιτέρω αξιοποίησή τους ως καυσόξυλα ή βιομάζα. Απαγόρευση της βοσκής στην υλοτομηθείσα έκταση για 10 χρόνια	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
9β	Οξ.	0,9-1,1	-100	Σπ. & πρεμ.,υπ.	7.460	6.121	214,5	176	82,05	Αναγωγή της ακανόνιστης διαχειριστικής μορφής σε κανονική υποκτηπευτή και η αναγωγή της διφυούς μορφής σε σπερμοφυή. Στην ανώτερη κλάση διαμέτρων εξυγιαντικές - αναγεννητικέςυλοτομίες, με την απομάκρυνση των κακόμορφων, μισοσάπιων, κρίσιμων ατόμων και γενικά των κακών φαινοτύπων, εφόσον η παραμονή τους στο δάσος δεν εξυπηρετεί κανένα δασοπονικό σκοπό. Διεύρυνση υπαρχόντων αναγεννητικών κέντρων, με σκοπό την βελτίωση των συνθηκών φωτισμού και την περαιτέρω εξέλιξη της αναγέννησης, στις θέσεις που είναι ήδη εγκατεστημένη. Καλλιεργητικές υλοτομίες εξευγενιστικού χαρακτήρα, με κριτήριο την θετική επιλογή. Αθροίσματα οξυάς σε πυκνή κατάσταση θα αραιώνονται και η υλοτομία των ατόμων αυτών θα γίνεται ανεξάρτητα από την διάμετρο που έχουν. Όπου η οξυά είναι πρεμνοφυούς μορφής σε δέσμες θα υλοτομούνται τα κακόμορφα και υπολειπόμενα πρεμνοβλαστήματα ώστε να μείνουν ανά δέσμη οι καλύτεροι φαινότυποι. Συλλογή των υπολειμμάτων των υλοτομιών για περαιτέρω αξιοποίησή τους ως καυσόξυλα ή βιομάζα. Απαγόρευση της βοσκής στην υλοτομηθείσα έκταση για 10 χρόνια	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
9γ	Οξ.	0,9-1,1	-80	Σπ. & πρεμ.,υπ.	6.177	2.750	217,2	96,7	44,52	Αναγωγή της ακανόνιστης διαχειριστικής μορφής σε κανονική υποκτηπευτή και η αναγωγή της διφυούς μορφής σε σπερμοφυή. Στην ανώτερη κλάση διαμέτρων εξυγιαντικές υλοτομίες, με την απομάκρυνση των κακόμορφων, μισοσάπιων, κρίσιμων ατόμων και γενικά των κακών	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	ΣV συστάδας	V κλάσεων διαμέτρου >34 cm	ΣV συστάδας / ha	V κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
										φαινοτύπων, εφόσον η παραμονή τους στο δάσος δεν εξυπηρετεί κανένα δασοπονικό σκοπό. Καλλιεργητικές υλοτομίες εξευγενιστικού χαρακτήρα, με κριτήριο την θετική επιλογή. Αθροίσματα οξυάς σε πυκνή κατάσταση θα αραιώνονται και η υλοτομία των ατόμων αυτών θα γίνεται ανεξάρτητα από την διάμετρο που έχουν. Όπου η οξυά είναι πρεμνοφυούς μορφής σε δέσμες θα υλοτομούνται τα κακόμορφα και υπολειπόμενα πρεμνοβλαστήματα ώστε να μείνουν ανά δέσμη οι καλύτεροι φαινότυποι. Συλλογή των υπολειμμάτων των υλοτομιών για περαιτέρω αξιοποίησή τους ως καυσόξυλα ή βιομάζα. Απαγόρευση της βοσκής στην υλοτομηθείσα έκταση για 10 χρόνια	
9δ	Οξ.	0,9-1,1	-80	Διφ. & πρεμ.,υπ.	8.427	3.274	363,4	141,2	38,85	Αναγωγή της ακανόνιστης διαχειριστικής μορφής σε κανονική υποκηπευτή και η αναγωγή της διφυούς μορφής σε σπερμοφυή. Στην ανώτερη κλάση διαμέτρων εξυγιαντικές υλοτομίες, με την απομάκρυνση των κακόμορφων, μισοσάπιων, κρίσιμων ατόμων και γενικά των κακών φαινοτύπων, εφόσον η παραμονή τους στο δάσος δεν εξυπηρετεί κανένα δασοπονικό σκοπό. Καλλιεργητικές υλοτομίες εξευγενιστικού χαρακτήρα, με κριτήριο την θετική επιλογή. Αθροίσματα οξυάς σε πυκνή κατάσταση θα αραιώνονται και η υλοτομία των ατόμων αυτών θα γίνεται ανεξάρτητα από την διάμετρο που έχουν. Όπου η οξυά είναι πρεμνοφυούς μορφής σε δέσμες θα υλοτομούνται τα κακόμορφα και υπολειπόμενα πρεμνοβλαστήματα ώστε να μείνουν ανά δέσμη οι καλύτεροι φαινότυποι. Οι προτεινόμενες επεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν μόνο σε θέσεις της ψηλότερης περιοχής, όπου υπάρχουν συμπαγείς δασοσκεπείς εκτάσεις. Η υπόλοιπη δασοσκεπής έκταση της συστάδας θα τεθεί εκτός υλοτομικών επεμβάσεων λόγω της έντονα διασπασμένης συγκόμωσης Συλλογή των υπολειμμάτων των υλοτομιών για περαιτέρω αξιοποίησή τους ως καυσόξυλα ή βιομάζα. Απαγόρευση της βοσκής στην υλοτομηθείσα έκταση για 10 χρόνια	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
10α	Οξ., άτομα Μ.π	0,9-1,1	-80	Διφ. & πρεμ.,υπ.	25.139	10.298	358,6	146,9	40,96	Αναγωγή της ακανόνιστης διαχειριστικής μορφής σε κανονική υποκηπευτή και η αναγωγή της διφυούς μορφής σε σπερμοφυή. Στην ανώτερη κλάση διαμέτρων εξυγιαντικές υλοτομίες, με την απομάκρυνση των κακόμορφων, μισοσάπιων, κρίσιμων ατόμων και γενικά των κακών φαινοτύπων, εφόσον η παραμονή τους στο δάσος δεν εξυπηρετεί κανένα δασοπονικό σκοπό. Καλλιεργητικές υλοτομίες εξευγενιστικού χαρακτήρα, με κριτήριο την θετική επιλογή. Αθροίσματα οξυάς σε πυκνή κατάσταση θα αραιώνονται και η υλοτομία των ατόμων αυτών θα γίνεται ανεξάρτητα από την διάμετρο που έχουν. Όπου η οξυά είναι πρεμνοφυούς μορφής σε δέσμες θα υλοτομούνται τα κακόμορφα και υπολειπόμενα πρεμνοβλαστήματα ώστε να μείνουν ανά δέσμη οι καλύτεροι φαινότυποι. Συλλογή των υπολειμμάτων των υλοτομιών για περαιτέρω αξιοποίησή τους ως καυσόξυλα ή βιομάζα. Απαγόρευση της βοσκής στην υλοτομηθείσα έκταση για 10 χρόνια	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
10β	Οξ.,Μ.π.	0,8-1,1	Οξ:-80 Μ.π:-100	Οξ.:Διφ., υπ. Μ.π:σπ.,υπ.	Οξ:6.789 Μ.π:1.437	Οξ:5.010 Μ.π:1.437	Οξ:228,6 Μ.π:48,4	Οξ:168,7 Μ.π:48,4	Οξ:73,8 Μ.π:100	Εξυγιαντικές – αναγεννητικές υλοτομίες, με την απομάκρυνση των κακόμορφων, μισοσάπιων, κρίσιμων ατόμων και γενικά των κακών φαινοτύπων, όλων των δασοπονικών ειδών, εφόσον η παραμονή τους στο δάσος δεν εξυπηρετεί κανένα δασοπονικό σκοπό. Παράλληλα με την εξυγίανση της συστάδας θα επιδιώκεται η διάνοιξη αναγεννητικών κέντρων, με σκοπό την βελτίωση των συνθηκών φωτισμού και την εγκατάσταση της αναγέννησης της οξυάς ή την περαιτέρω εξέλιξή της, στις θέσεις που είναι ήδη εγκατεστημένη. Στην μέση και κατώτερη κλάση διαμέτρων καλλιεργητικές υλοτομίες εξευγενιστικού χαρακτήρα, με κριτήριο την θετική επιλογή. Αθροίσματα οξυάς σε πυκνή κατάσταση θα αραιώνονται και η υλοτομία των ατόμων αυτών θα γίνεται ανεξάρτητα από την διάμετρο που έχουν. Όπου η οξυά είναι πρεμνοφυούς μορφής σε δέσμες θα υλοτομούνται τα κακόμορφα και υπολειπόμενα πρεμνοβλαστήματα ώστε να μείνουν ανά δέσμη οι καλύτεροι φαινότυποι. Απομάκρυνση των διάσπαρτων ατόμων Μ. πεύκης από τις ενώσεις της οξυάς, εφόσον η παραμονή τους στο δάσος δεν εξυπηρετεί κανένα δασοπονικό σκοπό. Όπου η μορφή μίξης είναι κατά ομάδες και λόχμες (χαμηλότερη περιοχή) θα ευνοείται η οξυά στα καλύτερα κλιματοεδαφικά περιβάλλοντα, η δε Μ.πεύκη θα περιορίζεται στα περιβάλλοντα κατώτερης παραγωγικότητας. Συλλογή των υπολειμμάτων των υλοτομιών για περαιτέρω αξιοποίησή τους ως καυσόξυλα ή βιομάζα. Απαγόρευση της βοσκής στην υλοτομηθείσα έκταση για 10 χρόνια μετά.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
10γ	Οξ., άτομα Μ.π, Δρ.	0,8-1,1	Οξ&Μ.π: -100 Δρ.: -30	Μ.π:σπ.,υπ. Οξ.πρεμ.	Οξ:2.475 Μ.π: 2.751 Δρ: 874	Οξ:299 Μ.π: 2.751 Δρ: 0	Οξ:89,4 Μ.π: 99,4 Δρ: 31,6	Οξ:10,8 Μ.π: 99,4 Δρ: 0	Οξ:12,08 Μ.π:100,00 Δρ: 0	Εξυγιαντικές υλοτομίες, με την απομάκρυνση των κακόμορφων, μισοσάπιων, κρίσιμων ατόμων και γενικά των κακών φαινοτύπων, εφόσον η παραμονή τους στο δάσος δεν εξυπηρετεί κανένα δασοπονικό σκοπό. Στην μέση και κατώτερη κλάση διαμέτρων ήπιες καλλιεργητικές υλοτομίες εξευγενιστικού χαρακτήρα, με κριτήριο την θετική επιλογή. Αθροίσματα οξυάς σε πυκνή κατάσταση θα αραιώνονται και η υλοτομία των ατόμων αυτών θα γίνεται ανεξάρτητα από την διάμετρο που έχουν. Όπου η οξυά είναι πρεμνοφυούς μορφής σε δέσμες θα υλοτομούνται τα κακόμορφα και υπολειπόμενα πρεμνοβλαστήματα ώστε να μείνουν ανά δέσμη οι καλύτεροι φαινότυποι. Στις μικτές ενώσεις θα ευνοείται η οξυά με απομάκρυνση των μεγάλων διαμέτρων ατόμων Μ. πεύκης και την απομάκρυνση της δρυός ανεξάρτητα από την διάμετρο αυτής. Το λήμμα της	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	ΣV συστάδας	V κλάσεων διαμέτρου >34 cm	ΣV συστάδας / ha	ν κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
										δρυός προορίζεται για την κάλυψη των ατομικών αναγκών των κατοίκων σε καυσόξυλα. Συλλογή των υπολειμμάτων των υλοτομιών για περαιτέρω αξιοποίησή τους ως καυσόξυλα ή βιομάζα. Απαγόρευση της βοσκής στην υλοτομηθείσα έκταση για 10 χρόνια.	
106	Οξ.,Μ.π, Δρ.	0,7-1,1	Οξ:-60 Μ.π:-120 Δρ.: -30	Μ.π:σπ.,υπ. Οξ.διφ.	Οξ:1.466 Μ.π: 5.128 Δρ: 217	Οξ:466 Μ.π: 5.027 Δρ: 0	Οξ:64,2 Μ.π: 224,5 Δρ:9,5	Οξ:20,4 Μ.π: 220,1 Δρ:0	Οξ:31,79 Μ.π: 98,03 Δρ:0	Αρκετές ζημιές από την βοσκή στην αναγέννηση στις κρασπεδιαίες θέσεις της δασοσκεπούς έκτασης.Στα νότια της συστάδας :Εξυγιαντικές υλοτομίες τόσο στην μ. πεύκη όσο και στην οξυά, με την απομάκρυνση των κακόμορφων, μισοσάπιων, κρίσιμων ατόμων και γενικά των κακών φαινοτύπων, εφόσον η παραμονή τους στο δάσος δεν εξυπηρετεί κανένα δασοπονικό σκοπό. Καλλιεργητικές επεμβάσεις στη μέση και κατώτερη κλάση διαμέτρων στην οξυά με κριτήριο τη θετική επιλογή.Οι παραπάνω προτεινόμενες επεμβάσεις δεν θα επεκταθούν σε όλη την έκταση των ενώσεων παρά μόνο στις κλειστές ενώσεις. Ουδεμία επέμβαση θα πραγματοποιηθεί στις διασπασμένες ενώσεις και στις κρασπεδιαίες θέσεις. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις θέσεις με μεγάλη πυκνότητα υπορόφου όπου παράλληλα με την υλοτομία της Μ. πεύκης να απομακρύνεται ο πυκνός υπόροφος, ώστε αυτός να μην επικρατήσει πριν εγκατάσταση της αναγέννησης της Μ. πεύκης. Συλλογή των υπολειμμάτων των υλοτομιών για περαιτέρω αξιοποίησή τους ως καυσόξυλα ή βιομάζα. Απαγόρευση της βοσκής στην υλοτομηθείσα έκταση για 10 χρόνια μετά την υλοτομία. Στα βόρεια της συστάδας : Εκτός υλοτομικών επεμβάσεων λόγω της μορφολογίας του εδάφους και του μικρού και της κακής ποιοτικής κατάστασης ξυλαποθέματος.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
11α	Οξ.,Μ.π. άτομα Ελ.,Δρ.	0,7-1,0	Οξ:-120 Μ.π:-80	Μ.π:σπ.,υπ. Οξ.διφ.&πρ.	Οξ:5.165 Μ.π: 2.593	Οξ:2.282 Μ.π: 1.197	Οξ:166,6 Μ.π: 83,6	Οξ:73,6 Μ.π: 38,6	Οξ:44,18 Μ.π: 46,16	Οξυά: Εξυγιαντικές υλοτομίες, με την απομάκρυνση των κακόμορφων, μισοσάπιων, κρίσιμων ατόμων και γενικά των κακών φαινοτύπων, εφόσον η παραμονή τους στο δάσος δεν εξυπηρετεί κανένα δασοπονικό σκοπό. Οι αναγεννητικές υλοτομίες θα έχουν χαρακτήρα απομάκρυνσης των μητρικών ατόμων, στις θέσεις όπου εκτιμάται ότι αυτά καταπιézουν ικανοποιητική και εξελίξιμη αναγέννηση οξυάς και ελάτης. Καλλιεργητικές υλοτομίες εξευγενιστικού χαρακτήρα, με κριτήριο την θετική επιλογή. Αθροίσματα οξυάς σε πυκνή κατάσταση θα αραιώνονται και η υλοτομία των ατόμων αυτών θα γίνεται ανεξάρτητα από την διάμετρο που έχουν. Όπου η οξυά είναι πρεμνοφυούς μορφής σε δέσμες θα υλοτομούνται τα κακόμορφα και υπολειπόμενα πρεμνοβλαστήματα ώστε να μείνουν ανά δέσμη οι καλύτεροι φαινότυποι. Μ.πεύκη: Στην ανώτερη και ανώτατη κλάση διαμέτρων ήπιες εξυγιαντικές υλοτομίες, με την απομάκρυνση των κακόμορφων, μισοσάπιων, κρίσιμων ατόμων και γενικά των κακών φαινοτύπων, εφόσον η παραμονή τους στο δάσος δεν εξυπηρετεί κανένα δασοπονικό σκοπό. Σε αυτή την κατεύθυνση θα απομακρύνονται τα διάσπαρτα γηραιά άτομα τα οποία είναι εγκλωβισμένα στον ανώροφο, καταπιézουν και παρενοχλούν υφιστάμενες ενώσεις κορμιδίων και η παραμονή τους στο δάσος δεν εξυπηρετεί κανένα δασοπονικό σκοπό. Σταδιακή απομάκρυνση των γηραιών ατόμων Μ. πεύκης, τα οποία είναι εγκλωβισμένα στον ανώροφο των ενώσεων της οξυάς, εφόσον η παραμονή τους στο δάσος δεν εξυπηρετεί κανένα δασοπονικό σκοπό. Οι προτεινόμενες επεμβάσεις δεν θα επεκταθούν σε όλη την έκταση, αλλά θα περιορισθούν μόνο στην περιοχή όπου υπάρχουν ώριμες ενώσεις. Ουδεμία επέμβαση θα πραγματοποιηθεί στις νεαρές ενώσεις, στα αθροίσματα κορμιδίων και στις διασπασμένες ενώσεις. Συλλογή των υπολειμμάτων των υλοτομιών για περαιτέρω αξιοποίησή τους ως καυσόξυλα ή βιομάζα. Απαγόρευση της βοσκής στην υλοτομηθείσα έκταση για 10 χρόνια μετά την υλοτομία.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
11β	Ελ.,Οξ., Μ.π.	0,6-1,0	Ελ: 100 Οξ:-30 Μ.π:80-100	Μ.π,Ελ:σπ., υπ. Οξ:διφ.	Ελ:3.355 Οξ:553 Μ.π: 263	Ελ:2.825 Οξ:123 Μ.π: 263	Ελ:172,3 Οξ:28,4 Μ.π: 13,50	Ελ:145,1 Οξ:6,3 Μ.π: 13,50	Ελ:84,20 Οξ:22,24 Μ.π:100,00	Εξυγιαντικές – αναγεννητικές υλοτομίες, με την απομάκρυνση των κακόμορφων, βεβλαμένων, μισοσάπιων, κρίσιμων ατόμων και γενικά των κακών φαινοτύπων όλων των δασοπονικών ειδών, εφόσον η παραμονή τους στο δάσος δεν εξυπηρετεί κανένα δασοπονικό σκοπό. Σε αυτή την κατεύθυνση θα απομακρύνονται τα μητρικά άτομα που τυχόν παρεμποδίζουν την εξέλιξη υφιστάμενης αναγέννησης. Στις μικτές ενώσεις Ελάτης- πεύκης προτείνεται η επέκταση της Ελάτης λόγω της πλούσιας αναγέννησής της και η σταδιακή απομάκρυνση των ατόμων Μ.πεύκης τα οποία βρίσκονται εγκλωβισμένα στον ανώροφο, εφόσον βέβαια η παραμονή τους στο δάσος δεν εξυπηρετεί κανένα δασοπονικό σκοπό. Συλλογή των υπολειμμάτων των υλοτομιών για περαιτέρω αξιοποίησή τους ως καυσόξυλα ή βιομάζα. Απαγόρευση της βοσκής στην υλοτομηθείσα έκταση για 10 χρόνια μετά την υλοτομία. Στις ενώσεις Μ.πεύκης: Εκτός υλοτομικών επεμβάσεων κατά την παρούσα περίοδο λόγω του έντονου κατακερματισμού της δασοσκεπούς έκτασης.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
11γ	Οξ.,Μ.π, άτομα Δρ	0,6-1,0	Οξ:-80 Μ.π:80-100	Οξ.:Διφ., υπ. Μ.π:σπ.,υπ.	Οξ:2.042 Μ.π:3.383 Δρ:6	Οξ:1.269 Μ.π:1.343 Δρ:0	Οξ:72,10 Μ.π:119,4 0 Δρ:0,2	Οξ:44,80 Μ.π:47,40 Δρ:0	Οξ:62,14 Μ.π:39,70 Δρ:0	Οξυά + Μ.πεύκη: Εξυγιαντικές – αναγεννητικές υλοτομίες, με την απομάκρυνση των κακόμορφων, βεβλαμένων, μισοσάπιων, κρίσιμων ατόμων και γενικά των κακών φαινοτύπων όλων των δασοπονικών ειδών, εφόσον η παραμονή τους στο δάσος δεν εξυπηρετεί κανένα δασοπονικό σκοπό. Προτείνεται η ευνόηση της Οξυάς λόγω της πλούσιας αναγέννησής της και η σταδιακή απομάκρυνση των ατόμων Μ. πεύκης τα οποία βρίσκονται εγκλωβισμένα στον ανώροφο, εφόσον βέβαια η παραμονή τους στο δάσος δεν εξυπηρετεί κανένα	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	ΣV συστάδας	V κλάσεων διαμέτρου >34 cm	ΣV συστάδας / ha	V κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
										δασοπονικό σκοπό. Στις ενώσεις Μ.πεύκης: Ήπιες εξυγιαντικές υλοτομίες, με την απομάκρυνση των κακόμορφων, μισοσάπιων, κρίσιμων ατόμων και γενικά των κακών φαινοτύπων, εφόσον η παραμονή τους στο δάσος δεν εξυπηρετεί κανένα δασοπονικό σκοπό. Σε αυτή την κατεύθυνση θα απομακρύνονται τα διάσπαρτα γηραιά άτομα τα οποία είναι εγκλωβισμένα στον ανώροφο, καταπιέζουν και παρενοχλούν υφιστάμενες ενώσεις κορμιδίων και η παραμονή τους στο δάσος δεν εξυπηρετεί κανένα δασοπονικό σκοπό. Οι προτεινόμενες επεμβάσεις δεν θα επεκταθούν σε όλη την έκταση των ενώσεων αυτών, αλλά θα περιορισθούν μόνο στην περιοχή όπου υπάρχουν ώριμες ενώσεις. Ουδεμία επέμβαση θα πραγματοποιηθεί στις νεαρές ενώσεις, στα αθροίσματα κορμιδίων και στις διασπασμένες ενώσεις. Συλλογή των υπολειμμάτων των υλοτομιών για περαιτέρω αξιοποίησή τους ως καυσόξυλα ή βιομάζα. Απαγόρευση της βοσκής στην υλοτομηθείσα έκταση για 10 χρόνια μετά την υλοτομία	
11δ	Οξ.,Μ.π, άτομα Δρ	0,6-0,9	Οξ:-80 Μ.π:-80 Δρ.: -30	Οξ.:Πρεμ. & Διφ., Μ.π:σπ.,υπ.	Οξ:1.842 Μ.π:2.160 Δρ:217	Οξ:625 Μ.π:932 Δρ:0	Οξ:65,4 Μ.π:76,70 Δρ:7,70	Οξ: 22,2 Μ.π:33,10 Δρ:0	Οξ: 33,93 Μ.π:43,15 Δρ:0	Εκτός υλοτομικών επεμβάσεων λόγω της κατακερματισμένης δασοσκεπούς έκτασης	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
12	Οξ.,Μ.π, Δρ	0,6-0,8	Οξ:-60 Μ.π:-80 Δρ.: -40	Δρ.:Διφ., Μ.π:σπ.,υπ.						Εκτός υλοτομικών επεμβάσεων. Το τμήμα 12 διατίθεται για την βόσκηση του κτηνοτροφικού κεφαλαίου της Τ.Κ. Κεφαλοχωρίου.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
13α	Μ.π, Δρ	0,6-0,9	Μ.π:-120 Δρ.: -50	Δρ.:πρεμ.,αν. Μ.π & Δρ:σπ.,υπ.	Μ.π:4.222 Δρ:1.576	Μ.π:3.964 Δρ:0	Μ.π:127,5 0 Δρ:47,60	Μ.π:119,7 0 Δρ:0	Μ.π:93,89 Δρ:0	Μ.πεύκη + Δρυς: Ήπιες εξυγιαντικές υλοτομίες, με την απομάκρυνση των κακόμορφων, μισοσάπιων, κρίσιμων ατόμων και γενικά των κακών φαινοτύπων, εφόσον η παραμονή τους στο δάσος δεν εξυπηρετεί κανένα δασοπονικό σκοπό. Οι αναγεννητικές υλοτομίες θα έχουν χαρακτήρα απομάκρυνσης των γηραιών ατόμων που είναι εγκλωβισμένα στον ανώροφο και παρεμποδίζουν την εξέλιξη των ενώσεων κορμιδίων. Απομάκρυνση των ατόμων δρυός που βρίσκονται διάσπαρτα στο υπόροφο της Μ.πεύκης. Αντίθετα όπου η μορφή μίξης είναι κατά ομάδες και λόχμες αυτή θα διατηρείται ως εδαφοβελτιωτικό είδος εφόσον δεν παρεμποδίζει την εξέλιξη της Μ.πεύκης.Στις ενώσεις Δρυός: Καλλιεργητικές υλοτομίες εξευγενιστικού χαρακτήρα, με κριτήριο την θετική επιλογή. Αθροίσματα δρυός σε πυκνή κατάσταση θα αραιώνονται και η υλοτομία των ατόμων αυτών θα γίνεται ανεξάρτητα από την διάμετρο που έχουν. Το λήμμα της δρυός θα διατεθεί για την κάλυψη των ατομικών των κατοίκων Κεφαλοχωρίου σε καυσόξυλα. Συλλογή των υπολειμμάτων των υλοτομιών για περαιτέρω αξιοποίησή τους ως καυσόξυλα ή βιομάζα. Απαγόρευση της βοσκής στην υλοτομηθείσα έκταση για 10 χρόνια μετά την υλοτομία.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
13β	Μ.π, Δρ	0,8-1,0	Μ.π:-120 Δρ.: -40	Δρ.:πρεμ.,αν. Μ.π & Δρ:σπ.,υπ.	Μ.π:6.826 Δρ:245	Μ.π:4.338 Δρ:0	Μ.π:211,8 0 Δρ:7,6	Μ.π:134,6 0 Δρ:0	Μ.π:63,55 Δρ:0	Ήπιες εξυγιαντικές υλοτομίες, με την απομάκρυνση των κακόμορφων, μισοσάπιων, κρίσιμων ατόμων και γενικά των κακών φαινοτύπων, εφόσον η παραμονή τους στο δάσος δεν εξυπηρετεί κανένα δασοπονικό σκοπό. Στην μέση κλάση διαμέτρων καλλιεργητικές υλοτομίες εξευγενιστικού χαρακτήρα, με κριτήριο την θετική επιλογή. Οι αναγεννητικές υλοτομίες θα έχουν χαρακτήρα απομάκρυνσης των γηραιών ατόμων που είναι εγκλωβισμένα στον ανόροφο και παρεμποδίζουν την εξέλιξη των ενώσεων κορμιδίων. Απομάκρυνση των ατόμων δρυός που βρίσκονται διάσπαρτα στο υπόροφο της Μ. πεύκης. Αντίθετα όπου η μορφή μίξης είναι κατά ομάδες και όχμες αυτή θα διατηρείται ως εδαφοβελτιωτικό είδος εφόσον δεν παρεμποδίζει την εξέλιξη της Μ.πεύκης. Συλλογή των υπολειμμάτων των υλοτομιών για περαιτέρω αξιοποίησή τους ως καυσόξυλα ή βιομάζα. Απαγόρευση της βοσκής στην υλοτομηθείσα έκταση για 10 χρόνια μετά την υλοτομία. Εκτός υλοτομικών επεμβάσεων οι ενώσεις δρυός και φυλλοβόλων πλατυφύλλων στα νότια της συστάδας λόγω του ανώριμου ξυλαποθέματος.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
13γ	Μ.π.άτομα Δρ., Ελ.,Οξ.	0,5-0,8	Μ.π:-100 Δρ.: -30	υπ.	Μ.π:18.141 Δρ:330 Ελ:43 Οξ:5	Μ.π:17.299 Δρ:0 Ελ:0 Οξ:0	Μ.π:379,2 Δρ:6,9 Ελ:0,9 Οξ:0,1	Μ.π:361,6 Δρ:0 Ελ:0 Οξ:0	Μ.π:95,36 Δρ:0 Ελ:0 Οξ:0	Εξυγιαντικές υλοτομίες, με την απομάκρυνση των κακόμορφων, μισοσάπιων, κρίσιμων ατόμων και γενικά των κακών φαινοτύπων, εφόσον η παραμονή τους στο δάσος δεν εξυπηρετεί κανένα δασοπονικό σκοπό.Στην μέση κλάση διαμέτρων καλλιεργητικές υλοτομίες εξευγενιστικού χαρακτήρα, με κριτήριο την θετική επιλογή. Οι αναγεννητικές υλοτομίες θα έχουν χαρακτήρα απομάκρυνσης των γηραιών ατόμων που είναι εγκλωβισμένα στον ανόροφο και παρεμποδίζουν την εξέλιξη των ενώσεων κορμιδίων. Απομάκρυνση των ατόμων δρυός που βρίσκονται διάσπαρτα στο υπόροφο της Μ. πεύκης. Αντίθετα όπου η μορφή μίξης είναι κατά ομάδες και όχμες αυτή θα διατηρείται ως εδαφοβελτιωτικό είδος εφόσον δεν παρεμποδίζει την εξέλιξη της Μ.πεύκης. Συλλογή των υπολειμμάτων των υλοτομιών για περαιτέρω αξιοποίησή τους ως καυσόξυλα ή βιομάζα. Απαγόρευση της βοσκής στην υλοτομηθείσα έκταση για 10 χρόνια μετά την υλοτομία.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
14α	Δρ., άτομα Μ.π.	0,5-0,8	Δρ.: -40	Δρ.:διφ.,υπ.	1.329	65	40,6	2	4,89	Εκτός υλοτομικών επεμβάσεων. Η συστάδα 14α διατίθεται για την βόσκηση του κτηνοτροφικού κεφαλαίου της Τ.Κ. Κεφαλοχωρίου.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	ΣΥ συστάδας	Υ κλάσεων διαμέτρου >34 cm	ΣΥ συστάδας / ha	Υ κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
14β	Δρ., άτομα Μ.π,Φυλπλ	0,5-0,8	Δρ.: -50	Δρ.:διφ.,υπ.	Δρ:2.796 Φυλ. πλ:77 Μ.π:109	Δρ:179 Φυλ. πλ:0 Μ.π:109	Δρ:87,3 Φυλ. πλ:2,4 Μ.π:3,4	Δρ:5,6 Φυλ. πλ:0 Μ.π:3,4	Δρ:6,41 Φυλ. πλ:0 Μ.π:100	Εκτός υλοτομικών επεμβάσεων για λόγους προστασίας, λόγω της ισχυρής πίεσης της βοσκής και της γειννίαςσης με τον οικισμό Κεφαλοχωρίου.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
14γ	Μ.π,Δρ.,Φυλ. Πλ.	0,6-0,9	Μ.π:-100 Δρ.,Φυλ πλ.: -40	Δρ.,Φυλ.πλ:π ρεμ.,αν. Μ.π :σπ.,υπ.	Δρ:1.705 Φυλ. πλ:77 Μ.π:2.610	Δρ:0 Φυλ. πλ:0 Μ.π:1.406	Δρ:50,7 Φυλ. πλ:2,3 Μ.π:77,60	Δρ:0 Φυλ. πλ:0 Μ.π:41,8	Δρ:0 Φυλ. πλ:0 Μ.π:53,87	Εκτός υλοτομικών επεμβάσεων για λόγους προστασίας.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
14δ	Μ.π,Δρ.,Φυλ. Πλ.	0,6-0,9	Μ.π:-120 Δρ.,Φυλ πλ.: -30	Δρ.,Φυλ.πλ:π ρεμ.,αν. Μ.π :σπ.,υπ.	Μ.π:5.201 Δρ:30	Μ.π:4.985 Δρ:0	Μ.π:240,7 0 Δρ:1,4	Μ.π:230,7 0 Δρ:0	Μ.π:95,85 Δρ:0	Ήπιες εξυγιαντικές υλοτομίες, με την απομάκρυνση των κακόμορφων, μισοσάπιων, κρίσιμων ατόμων και γενικά των κακών φαινοτύπων, εφόσον η παραμονή τους στο δάσος δεν εξυπηρετεί κανένα δασοπονικό σκοπό. Οι αναγεννητικές υλοτομίες θα έχουν χαρακτήρα απομάκρυνσης των γηραιών ατόμων που είναι εγκλωβισμένα στον ανώροφο και παρεμποδίζουν την εξέλιξη των ενώσεων κορμιδίων και θα πραγματοποιηθούν στην μέση και χαμηλότερη περιοχή. Στις θέσεις με μεγάλη πυκνότητα υπορόφου παράλληλα με την υλοτομία των ατόμων της Μ. πεύκης θα απομακρύνονται και ο υπορόφος, έτσι ώστε αυτός να μην επικρατήσει πριν την εγκατάσταση της αναγέννησης της Μ. πεύκης. Οι προτεινόμενες επεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν μόνο στην ψηλότερη περιοχή. Ουδεμία επέμβαση θα πραγματοποιηθεί στις νεαρές ενώσεις της μέσης περιοχής, καθώς και στις θέσεις όπου είναι δυσχερής η εξωδάσωση των παραγομένων προϊόντων. Επίσης εκτός υλοτομικών επεμβάσεων προτείνεται να παραμείνουν οι ενώσεις της δρυός & λοιπών φυλ. πλατυφύλλων της χαμηλότερης περιοχής. Συλλογή των υπολειμμάτων των υλοτομιών για περαιτέρω αξιοποίησή τους ως καυσόξυλα ή βιομάζα. Απαγόρευση της βοσκής στην υλοτομηθείσα έκταση για 10 χρόνια μετά την υλοτομία	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
14ε	Μ.π,Δρ.,Φυλ. Πλ.	0,6-0,9	Μ.π:-100 Δρ.,Φυλ πλ.: -30	Δρ.,Φυλ.πλ:π ρεμ.,αν. Μ.π :σπ.,υπ.	Μ.π:6.936 Δρ:40	Μ.π:5.003 Δρ:0	Μ.π:225,4 Δρ:1,3	Μ.π:162,6 Δρ:0	Μ.π:72,14 Δρ:0	Ήπιες εξυγιαντικές υλοτομίες, με την απομάκρυνση των κακόμορφων, μισοσάπιων, κρίσιμων ατόμων και γενικά των κακών φαινοτύπων, εφόσον η παραμονή τους στο δάσος δεν εξυπηρετεί κανένα δασοπονικό σκοπό. Οι αναγεννητικές υλοτομίες θα έχουν χαρακτήρα απομάκρυνσης των γηραιών ατόμων που είναι εγκλωβισμένα στον ανώροφο και παρεμποδίζουν την εξέλιξη των ενώσεων κορμιδίων και θα πραγματοποιηθούν στην μέση και χαμηλότερη περιοχή. Στις θέσεις με μεγάλη πυκνότητα υπορόφου παράλληλα με την υλοτομία των ατόμων της Μ. πεύκης θα απομακρύνονται και ο υπορόφος, έτσι ώστε αυτός να μην επικρατήσει πριν την εγκατάσταση της αναγέννησης της Μ. πεύκης. Οι προτεινόμενες επεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν μόνο στην ψηλότερη περιοχή. Ουδεμία επέμβαση θα πραγματοποιηθεί στις νεαρές και στις υποβαθμισμένες ενώσεις της μέσης και χαμηλότερης περιοχής. Επίσης εκτός υλοτομικών επεμβάσεων οι ενώσεις δρυός & λοιπών φυλλοβόλων πλατυφύλλων της χαμηλότερης περιοχής της συστάδας. Συλλογή των υπολειμμάτων των υλοτομιών για περαιτέρω αξιοποίησή τους ως καυσόξυλα ή βιομάζα. Απαγόρευση της βοσκής στην υλοτομηθείσα έκταση για 10 χρόνια μετά την υλοτομία	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
14σ τ	Δρ.,Φυλ.Πλ.	0,6-0,9	Δρ.,Φυλ πλ.: -40	Δρ.:διφ.-πρεμ.,υπ.						Εκτός υλοτομικών επεμβάσεων για λόγους προστασίας, λόγω της ισχυρής πίεσης της βοσκής, του μικρού ύψους ξυλαποθέματος και της γειννίαςσης με τον οικισμό Κεφαλοχωρίου.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
37	Δρ., άτομα Μ.π,Φυλ.πλ.	0,6-1,0	5, παρακρ α-τηματα5 5-75	πρ., ακ	871	10	96,75	1,06	1,15	Διενεργήθηκαν αποψιλωτικές υλοτομίες με παρακρατήματα το 2012. Οι υπολογισμοί που παρατίθενται για το ξυλαπόθεμα αφορούν τα παρακρατήματα. Έντονη αιγοβοσκή και εκτεταμένες διαβρώσεις. Εκτός διαχείρισης έως ότου η υλοτομηθείσα έκταση της συστάδας θα κριθεί ώριμη για υλοτομία (20ετής)	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ
38	Δρ., άτομα Μ.π,Φυλ.πλ.	0,6-1,0	3-4, παρακρ α-τηματα5 5-75	πρ., κορμ. ακ	2.951	60	68,99	1,41	2,03	Διενεργήθηκαν αποψιλωτικές υλοτομίες με παρακρατήματα το 2013-2014. Οι υπολογισμοί που παρατίθενται για το ξυλαπόθεμα αφορούν τα παρακρατήματα. Υποβαθμισμένη συστάδα η οποία διασπάται και από καλλιεργούμενους ή εγκατ. αγρούς. Εκτός διαχείρισης έως ότου η υλοτομηθείσα έκταση της συστάδας θα κριθεί ώριμη για υλοτομία (20ετής)	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ
39α	Δρ., άτομα Μ.π,Φυλ.πλ.	0,8-1,0	55-65 & 8	πρ., κορμ. ακ	6.973	445	156,87	10,01	6,38	Η συστάδα διασπάται από αγρούς, μερ. δασοσκ. Εκτάσεις γυμνά και άγονα. Μεγάλης έκτασης ζημιές από βόσκηση κατά θέσεις. Διενεργήθηκε περιορισμένη υλοτομία κατά θέσεις το 2009. Εκτός διαχείρισης την προσεχή δεκαετία.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ
39β	Μ.π., Δρ., άτομα Ελ.,Φυλ.πλ.	0,6-1,0	Μ.π:85-105 Δρ:55-75 & 8	Μ.π:Σπ.,υπ.,α κ Δρ:πρεμ. Κορμ ακ.	Δρ:1.160 Μ.π:1.532	Δρ:88 Μ.π:792	Δρ:73,58 Μ.π:141,6 9	Δρ:5,56 Μ.π:73,27	Δρ:7,56 Μ.π:51,71	Έντονη η πίεση από τη βόσκηση. Διενεργήθηκε περιορισμένη υλοτομία κατά θέσεις το 2009. Εκτός διαχείρισης την προσεχή δεκαετία.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	ΣV συστάδας	V κλάσεων διαμέτρου >34 cm	ΣV συστάδας / ha	V κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
40α	Μ.π., Δρ., άτομα, Φυλ.πλ.	0,6-1,0	Μ.π.:1-135 Δρ:45-50 & 8	Μ.π:Σπ.,υπ.,α κ Δρ:πρεμ. Ομ.	Δρ:4.925 Μ.π:1.674	Δρ:178 Μ.π:269	Δρ:111,65 Μ.π:124,46	Δρ:4,04 Μ.π:20,03	Δρ:3,61 Μ.π:16,07	Στη δρυ διενεργήθηκε εξυγιαντική αποψιλωτική υλοτομία το 2009 με παρακράτηση ποσοστού 50% στα καλύτερα μικροπεριβάλλοντα. Στην έκταση που παρακρατήθηκε θα πραγματοποιηθούν καλλιεργητική αναγωγική υλοτομία. Στη Μ. πεύκη εξυγιαντική καλλιεργητική υλοτομία.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ
40β	Μ.π., Δρ., άτομα, Φυλ.πλ.	0,8-1,0	Μ.π.:1-135 Δρ:56-75 & 7	Μ.π:Σπ.,υπ.,α κ Δρ:πρεμ. ακ.	Δρ:2.131 Μ.π:3.892	Δρ:0 Μ.π:2.649	Δρ:38,01 Μ.π:99,01	Δρ:0 Μ.π:67,39	Δρ:0 Μ.π:68,06	Στη δρυ διενεργήθηκε εξυγιαντική αποψιλωτική υλοτομία το 20010-2011 με παρακράτηση ποσοστού 50% στα καλύτερα μικροπεριβάλλοντα. Στην έκταση που παρακρατήθηκε θα πραγματοποιηθούν καλλιεργητική αναγωγική υλοτομία. Στη Μ.π εξυγιαντική καλλιεργητική υλοτομία.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ
41α	Μ.π., Δρ., άτομα, Ελ,Οξ.,Λ.π, Φυλ.πλ.	0,6-1,0	Μ.π:115-135 Δρ:50-60	Σπ.,υπ.,ακ.	Μ.π:6.913 Δρ:2.139	Μ.π:3.172 Δρ:56	Μ.π:95,57 Δρ:29,57	Μ.π:43,85 Δρ:0,78	Μ.π:45,88 Δρ:2,64	Αναγεννητικές υλοτομίες. Προπαρασκευαστικές σποράς, φωτοδοτίδες με διάσπαρτα αναγεννητικά κέντρα 2 στρ. Εξευγενιστικές αραιώσεις και υπεραραιώσεις. Παρακράτηση ορισμένων κουφαλερών, γηραιών ατόμων 1-2/ Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων στην συστάδα για διατροφή και φωλεοποίησης της πανίδας. Απαγόρευση μετά την υλοτομία της βοσκής αιγών επί 10ετία, μεγάλων ζώων επί 7ετία και προβάτων επί 5ετία.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ
41β	Μ.π., Δρ.	0,8-1,0	Μ.π:1-130 Δρ:1-55	Μ.π:Σπ.,υπ.,α κ. Δρ:πρεμ.,ομ.	Μ.π:5.000 Δρ:1.793	Μ.π:3.872 Δρ:0	Μ.π:147,07 Δρ:56,04	Μ.π:113,89 Δρ:0	Μ.π:77,45 Δρ:0	Υπεραραιώσεις στη πεύκη με σκοπό την καλλιέργεια και φωτοδοτίδες για τη διευκόλυνση της φυσικής αναγέννησης. Καλλιεργητικές εξευγενιστικές αραιώσεις επίσης στην πεύκη και στα ατομικοποιημένα πρεμνοβλαστήματα Δρυός. Εξυγιαντικές για την απομάκρυνση γηραιών, κουφαλερών και ασθενικών ατόμων. Παρακράτηση ορισμένων κουφαλερών, γηραιών ατόμων 1-2/ Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων στην συστάδα για διατροφή και φωλεοποίησης της πανίδας. Αναγωγικές υλοτομίες στη Δρυ. Απαγόρευση μετά την υλοτομία της βοσκής αιγών επί 10ετία, μεγάλων ζώων επί 7ετία και προβάτων επί 5ετία	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ
41γ	Μ.π., Δρ.	0,6-0,9	Μ.π:1-135 επικρ:70-100	Σπ.,υπ.,ακ.	Μ.π:1.360 Δρ:367	Μ.π:335 Δρ:0	Μ.π:23,15 Δρ:6,25	Μ.π:5,71 Δρ:0	Μ.π:24,67 Δρ:0	Εκτός διαχείρισης. Υποβαθμισμένη και αραιωμένη συστάδα λόγω μορφοεδαφολογικών συνθηκών.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ
1α	Οξ.,Ελ., Μ.π,Δρ.	0,6-1,0	Ελ,Μ.π:90 Οξ.,Δρ:60	Μ.π,Ελ:υπ.ακ. Οξ.:Διφ., Δρ.:Διφ.ομ.	Ελ:4.555 Οξ:1.327 Δρ:2.715 Μ.π: 1.758	Ελ:1.668 Οξ:0 Δρ:977 Μ.π: 493	Ελ:83,84 Οξ:129,59 Δρ:51,14 Μ.π: 33,11	Ελ:30,70 Οξ:0 Δρ:18,40 Μ.π: 9,29	Ελ:36,62 Οξ:0 Δρ:35,99 Μ.π: 28,04	Εξυγιαντικές υλοτομίες, με την απομάκρυνση των κακόμορφων και κρίσιμων ατόμων όλων των δασοπονικών ειδών, εφόσον η παραμονή τους στο δάσος δεν εξυπηρετεί κανένα δασοπονικό σκοπό. Εξευγενιστικές αραιώσεις, με κριτήριο την θετική επιλογή. Ευνόηση της ελάτης στα καλύτερα κλιματοεδαφικά περιβάλλοντα, περιορισμός της Μ.πεύκης στα περιβάλλοντα κατώτερης παραγωγικότητας και σταδιακή απομάκρυνση των ατόμων δρυός και λοιπών φυλλοβόλων πλατυφύλλων που βρίσκονται σε μίξη με τις ενώσεις κωνοφόρων. Όπου η οξυά είναι πρεμνοφυούς προέλευσης σε δέσμες θα υλοτομούνται τα καχεκτικά και υπολειπόμενα πρεμνοβλαστήματα ώστε να απομείνουν σε κάθε δέσμη οι καλύτεροι φαινότυποι.Αναγωγικές – καλλιεργητικές υλοτομίες με την απομάκρυνση των κακόμορφων και κρίσιμων ατόμων δρυός και λοιπών φυλλοβόλων πλατυφύλλων. Παράλληλα θα απομακρύνονται τα άτομα φυλλοβόλων πλατυφύλλων στις θέσεις που παρεμποδίζουν την περαιτέρω εξέλιξη της αναγέννησης Μ.πεύκης. Το λήμμα δρυός και φυλλοβόλων πλατυφύλλων θα καλύψει τμήμα των αναγκών των κατοίκων του Ασημοχωρίου σε καυσόξυλα.Πλήρης απαγόρευση της βοσκής στην υλοτομηθείσα δασοσκεπή έκταση μετά την υλοτομία.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΑΣΗΜΟΧΩΡΙΟΥ
1γ	Οξ.,Ελ.	0,6-1,1	Ελ:90 Οξ.:50	Ελ:υπ.. Οξ.:Διφ.	Οξ:1.389 Ελ:365	Οξ:0 Ελ:273	Οξ:95,06 Ελ:25,00	Οξ:0 Ελ:18,67	Οξ:0 Ελ:74,68	Εκτός διαχείρισης, λόγω του μικρού βαθμού συγκόμωσης των ενώσεων, για λόγους προστασίας λόγω των πολλών διαβρώσεων και ολισθήσεων, του ανώριμου ξυλαποθέματος.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΑΣΗΜΟΧΩΡΙΟΥ
6α	Δρ.Φυλ.πλ, άτομα Μ.π,Ελ.	0,6-0,9	50	υπ.,ακ. Φυλ.πλ:διφ.	Δρ.Φυλ.πλ:753	Δρ.Φυλ.πλ:62	Δρ.Φυλ.π λ:24,22	Δρ.Φυλ.π λ:2,00	Δρ.Φυλ.πλ:8,26	Εκτός διαχείρισης λόγω του μικρού ξυλαποθέματος	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΑΣΗΜΟΧΩΡΙΟΥ
6β	Μ.π,Ελ.,Δρ.Φ υλ.πλ,	0,6-1,0	Ελ:80 Μ.π.:100 Δρ.,Φυλ. πλ:40	υπ.,ακ.	Ελ:4.515 Μ.π: 1.314 Δρ. Φυλ.πλ:614	Ελ:2.404 Μ.π: 721 Δρ. Φυλ.πλ:0	Ελ:163,47 Μ.π: 32,42 Δρ. Φυλ.πλ:15,15	Ελ:87,04 Μ.π: 17,79 Δρ. Φυλ.πλ:0	Ελ:53,24 Μ.π: 54,87 Δρ. Φυλ.πλ:0	Εξυγιαντικές υλοτομίες και στην μέση κλάση καλλιεργητικές υλοτομίες (εξευγενιστικές αραιώσεις), με κριτήριο την θετική επιλογή. Ευνόηση της ελάτης στα καλύτερα κλιματοεδαφικά περιβάλλοντα και περιορισμός της Μ.πεύκης στα περιβάλλοντα κατώτερης παραγωγικότητας. Οι επεμβάσεις θα περιορισθούν στις θέσεις όπου είναι δυνατή η εξωδάσωση των δασικών προϊόντων καθώς και στις θέσεις με μικρές εγκάρσιες κλίσεις, ενώ οι θέσεις που υπέρκεινται του οικισμού καθώς και η περιοχή κατά μήκος του Μέγα λάκκου θα τεθούν εκτός διαχείρισης, για λόγους προστασίας. Στο χαμηλότερο τμήμα της συστάδας που καλύπτεται από μικτές ενώσεις Φυλ. πλατ. (δρυς και γαύρος) με μίξη ατόμων ως ομάδων Μ.πεύκης στον ανόροφο εκτός διαχείρισης. Πλήρης απαγόρευση της βοσκής στην υλοτομηθείσα δασοσκεπή έκταση μετά την υλοτομία	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΑΣΗΜΟΧΩΡΙΟΥ

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	ΣV συστάδας	V κλάσεων διαμέτρου >34 cm	ΣV συστάδας / ha	V κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
6γ	Μ.π,Ελ.,Δρ.Φ υλ.πλ,	0,6-1,0	Ελ:70 Μ.π.:80 Δρ.,Φυλ. πλ:40	υπ.,ακ. Φυλ.πλ:δίφ.	Ελ:1.317 Μ.π: 5.387 Δρ. Φυλ.πλ:1.279	Ελ:348 Μ.π: 2.159 Δρ. Φυλ.πλ:42	Ελ:37,74 Μ.π: 64,37 Δρ. Φυλ.πλ:57 ,50	Ελ:9,97 Μ.π: 33,54 Δρ. Φυλ.πλ:0, 73	Ελ:26,42 Μ.π:40,08 Δρ. Φυλ.πλ:3,28	Εξυγιαντικές υλοτομίες και στην μέση κλάση καλλιεργητικές υλοτομίες (εξευγενιστικές αραιώσεις), με κριτήριο την θετική επιλογή. Ευνόηση της ελάτης στα καλύτερα κλιματοεδαφικά περιβάλλοντα και περιορισμός της Μ.πεύκης στα περιβάλλοντα κατώτερης παραγωγικότητας και σταδιακή απομάκρυνση των ατόμων δρυός και λοιπών φυλλοβόλων πλατυφύλλων που βρίσκονται σε μίξη με τις ενώσεις κωνοφόρων. Οι επεμβάσεις θα περιορισθούν στις θέσεις όπου είναι δυνατή η εξωδάσωση των δασικών προϊόντων καθώς και στις θέσεις με μικρές εγκάρσιες κλίσεις, ενώ σε θέσεις κατά μήκος ρεμάτων να αποφεύγονται. Στην έκταση που καλύπτεται από μικτές ενώσεις Φυλ. πλατ. (δρυς και γαύρος) με μίξη ατόμων ως ομάδων Μ.πεύκης στον ανόροφο εκτός διαχείρισης. Πλήρης απαγόρευση της βοσκής στην υλοτομηθείσα δασοσκεπή έκταση μετά την υλοτομία	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΑΣΗΜΟΧΩΡΙΟΥ
6δ	Μ.π,Ελ.,Δρ.Φ υλ.πλ,	0,6-1,0	Ελ:80 Μ.π.:80 Δρ.,Φυλ. πλ:60	υπ.,ακ. Φυλ.πλ:δίφ.	Ελ:2.029 Μ.π: 733 Δρ. Φυλ.πλ:1.702	Ελ:525 Μ.π: 313 Δρ. Φυλ.πλ:262	Ελ:153,60 Μ.π: 14,73 Δρ. Φυλ.πλ:46 ,58	Ελ:39,74 Μ.π: 6,29 Δρ. Φυλ.πλ:7, 17	Ελ:25,87 Μ.π:42,70 Δρ. Φυλ.πλ:15,39	Εξυγιαντικές υλοτομίες και στην μέση κλάση καλλιεργητικές υλοτομίες (εξευγενιστικές αραιώσεις), με κριτήριο την θετική επιλογή. Ευνόηση της ελάτης στα καλύτερα κλιματοεδαφικά περιβάλλοντα και περιορισμός της Μ. πεύκης στα περιβάλλοντα κατώτερης παραγωγικότητας και σταδιακή απομάκρυνση των ατόμων δρυός και λοιπών φυλλοβόλων πλατυφύλλων που βρίσκονται σε μίξη με τις ενώσεις κωνοφόρων. Οι επεμβάσεις θα είναι ήπιας μορφής ή και θα αποφεύγονται στις θέσεις με απότομες κλίσεις για λόγους προστασίας του εδάφους. Στην έκταση που καλύπτεται από μικτές ενώσεις Φυλ. πλατ. (δρυς και γαύρος) με μίξη ατόμων ως ομάδων Μ. πεύκης αναγωγικές – καλλιεργητικές υλοτομίες με την απομάκρυνση των κακόμορφων και κρίσιμων ατόμων δρυός και λοιπών φυλλοβόλων πλατυφύλλων. Παράλληλα θα απομακρύνονται τα άτομα φυλλοβόλων πλατυφύλλων στις θέσεις που παρεμποδίζουν την περαιτέρω εξέλιξη της αναγέννησης Μ. πεύκης. Πλήρης απαγόρευση της βοσκής στην υλοτομηθείσα δασοσκεπή έκταση μετά την υλοτομία	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΑΣΗΜΟΧΩΡΙΟΥ
1α	Μ.π,Οξ., άτομα Ελ., Δρυός	0,6-1,1	Μ.π.:1- 190 Οξ:90	Μ.π.:Σπ.,υπ. Οξ:Σπ. Ομ.	Μ.π.:8.471 Οξ:1.446	Μ.π.:7.310 Οξ:1.416	Μ.π.:197 Οξ:241	Μ.π.:170 Οξ:236	Μ.π.:86,29 Οξ:97,93	Μ. πεύκη: Καλλιεργητικές υλοτομίες με θετική επιλογή και ανατροφή με σκοπό την ποιοτική βελτίωση του ξυλαποθέματος και μελλοντικά την αύξηση της αναλογίας πολύτιμου τεχνικού ξύλου. Προπαρασκευαστικές υλοτομίες στην ανώτερη κλάση με την απομάκρυνση γενετικά ανεπιθύμητων ατόμων αλλά και τη προετοιμασία του εδάφους προς υποδοχή των σπόρων. Οι υλοτομίες αυτές μπορούν να καταστήσουν τη συστάδα ανθεκτική έναντι εξωτερικών επιδράσεων (ανεμορριψίες κ.λ.π.). Σε διάκενα όπου έχει εγκατασταθεί αναγέννηση, διεύρυνσή τους έως το πολύ 2 στρ. και απομάκρυνση των γηραιών ατόμων και ογκοδέστερων αυτών τα οποία επιφέρουν αργότερα ζημία στην αναγέννηση και τη συγκομιδή του ξύλου. Τελική υλοτομία σε θέσεις όπου ήδη υπάρχει νεοφυτεία ή πυκνοφυτεία, παρόλο που μπορεί να προκληθούν ζημιές σ'αυτή τη φάση. Εκτιμάται όμως ότι αν παραμείνουν τα άτομα της μητρικής συστάδας αργότερα οι κίνδυνοι θα είναι μεγαλύτεροι, αφού πρόκειται για άτομα αποκορυφωμένα, γηραιά ή και κεκλιμένα. Οξυά: Αναγεννητικές υλοτομίες στις ενώσεις της οξυάς με υπόσκιες υλοτομίες. Αυτές θα έχουν προπαρασκευαστικό χαρακτήρα με στόχο να προετοιμαστεί το έδαφος προς υποδοχή των σπόρων, να προετοιμαστούν τα δένδρα προς σπιροπαραγωγή, να καταστήσουν τις ενώσεις αυτές ανθεκτικές έναντι των εξωτερικών επιδράσεων.Κατά τη διενέργειά τους θα απομακρύνονται άτομα γενετικά ανεπιθύμητα (διχαλωτά, στρεβλά κ.λ.π.) τα ογκοδέστερα άτομα καθώς και τα αυξητικά ώριμα. Απαγόρευση της βοσκής για τα επόμενα 10 έτη.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΑΣ
1β	Μ.π, άτομα Ελ., Δρυός	0,6-0,9	1-150	Σπ., αν.	6.123	3.939	157	101	64,33	Καλλιεργητικές υλοτομίες με θετική επιλογή και ανατροφή με σκοπό την ποιοτική βελτίωση του ξυλαποθέματος και μελλοντικά την αύξηση της αναλογίας πολύτιμου τεχνικού ξύλου. Προπαρασκευαστικές υλοτομίες στην ανώτερη κλάση με την απομάκρυνση γενετικά ανεπιθύμητων ατόμων αλλά και τη προετοιμασία του εδάφους προς υποδοχή των σπόρων. Οι υλοτομίες αυτές μπορούν να καταστήσουν τη συστάδα ανθεκτική έναντι εξωτερικών επιδράσεων (ανεμορριψίες κ.λ.π.). Σε διάκενα όπου έχει εγκατασταθεί αναγέννηση, διεύρυνσή τους έως το πολύ 2 στρ. και απομάκρυνση των γηραιών ατόμων και ογκοδέστερων αυτών τα οποία επιφέρουν αργότερα ζημία στην αναγέννηση και τη συγκομιδή του ξύλου. Πλήρη απομάκρυνση των κεκλιμένων ή αποκορυφωμένων ατόμων. Απαγόρευση της βοσκής για τα επόμενα 10 έτη.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΑΣ
1γ	Μ.π, άτομα Οξ.,Ελ., Δρυός	0,6-1,0	1-190	Σπ., αν.	3.752	2.660	134	95	70,9	Καλλιεργητικές υλοτομίες με θετική επιλογή και ανατροφή με σκοπό την ποιοτική βελτίωση του ξυλαποθέματος και μελλοντικά την αύξηση της αναλογίας πολύτιμου τεχνικού ξύλου. Προπαρασκευαστικές υλοτομίες στην ανώτερη κλάση με την απομάκρυνση γενετικά ανεπιθύμητων ατόμων αλλά και τη προετοιμασία του εδάφους προς υποδοχή των σπόρων. Οι υλοτομίες αυτές μπορούν να καταστήσουν τη συστάδα ανθεκτική έναντι εξωτερικών επιδράσεων (ανεμορριψίες κ.λ.π.). Σε διάκενα όπου έχει εγκατασταθεί αναγέννηση, διεύρυνσή τους έως το πολύ 2 στρ. και απομάκρυνση των γηραιών ατόμων και ογκοδέστερων αυτών τα	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΑΣ

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	ΣV συστάδας	V κλάσεων διαμέτρου >34 cm	ΣV συστάδας / ha	V κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
										οποία επιφέρουν αργότερα ζημία στην αναγέννηση και τη συγκομιδή του ξύλου. Πλήρη απομάκρυνση των κεκλιμένων ή αποκορυφωμένων ατόμων. Απαγόρευση της βοσκής για τα επόμενα 10 έτη.	
1δ	Μ.π., άτομα Οξ.,Ελ.	0,6-1,0	1-170	Σπ., αν.	3.060	2.430	102	81	79,41	Καλλιέργεια στις ενώσεις των λεπτών κορμών με αραιώσεις, θετική επιλογή και ανατροφή επίλεκτων ατόμων, με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση του ξυλαποθέματος. Απ' όλη τη συστάδα απομάκρυνση των κεκλιμένων ατόμων. Επίσης των γηραιών ή αποκορυφωμένων τέτοιων. Σε διάκενα όπου έχει εγκατασταθεί αναγέννηση, διεύρυνσή τους έως το πολύ 2 στρ. και απομάκρυνση των γηραιών ατόμων και ογκοδέστερων αυτών. Απαγόρευση της βοσκής για τα επόμενα 10 έτη.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΑΣ
2α	Μ.π, Ελ., άτομα Οξ.	0,8-1,1	1-150(70)	Σπ., αν.	Ελ: 6.291 Μ.π:7.942	Ελ: 5.886 Μ.π:7.851	Ελ: 233 Μ.π:184,7 0	Ελ: 218 Μ.π:182,5 8	Ελ: 93,56 Μ.π:98,85	Ελάτη: Έμφαση θα δοθεί στην καλλιέργεια του ξυλαποθέματος που θα συνίσταται στη θετική επιλογή και ανατροφή στην κατώτερη και μέση κλάση με αραιώση και στόχο την ποιοτική αναβάθμιση του ξυλαποθέματος και τη διατήρηση της κηπευτής δομής. Οι αναγεννητικές υλοτομίες θα έχουν προπαρασκευαστικό χαρακτήρα στα πλαίσια των υπόσκιων υλοτομιών που ενδείκνυνται για το είδος αυτό. Καρπώσεις θα πραγματοποιούνται από την ανώτατη κλάση διαμέτρου. Για τη Μ.πεύκη στο τμήμα της συστάδας που αυτή μίγνυται με την ελάτη, κατ' άτομο, θα πραγματοποιηθούν καρπώσεις από την ανώτατη κλάση διαμέτρου αυτής με σκοπό τη ρευστοποίηση μέρους του ξυλαποθέματος του είδους αφού δεν παρουσιάζει καθόλου φυσική αναγέννηση ή αυτή είναι ελάχιστη. Αντίθετα στο ανατολικό τμήμα της συστάδας όπου επικρατεί η Μ.πεύκη σε αμιγή σχεδόν μορφή θα πραγματοποιηθούν καλλιεργητικές και αναγεννητικές υλοτομίες. Καλλιέργεια θα πραγματοποιηθεί στις ενώσεις των λεπτών κορμών με αραιώσεις και θετική επιλογή με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση του ξυλαποθέματος. Προπαρασκευαστικές υλοτομίες στην ανώτερη κλάση. Κατά την διενέργειά τους θα απομακρύνονται άτομα γενετικά ανεπιθύμητα (δίχαλα, στρεβλά) τα ογκοδέστερα άτομα και τα αυξητικά ώριμα. Οι προπαρασκευαστικές υλοτομίες προκύπτουν από την έλλειψη καλλιεργητικών επεμβάσεων έως σήμερα.Σε διάκενα που ήδη λόγω συνθηκών έχει εγκατασταθεί αναγέννηση, διεύρυνσή τους, έως το πολύ 2 στρ. και απομάκρυνση των γηραιών ατόμων και ογκοδέστερων αυτών. Απαγόρευση της βοσκής για τα επόμενα 10 έτη.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΑΣ
2β	Μ.π, Ελ., Οξ.	0,8-1,1	1-170(70)	Σπ., αν.	Ελ: 3.210 Οξ.: 880 Μ.π:2.820	Ελ: 1.290 Οξ.: 688 Μ.π:2.250	Ελ: 107 Οξ.: 55 Μ.π:94	Ελ: 43 Οξ.: 43 Μ.π:75	Ελ: 40,19 Οξ.: 78,18 Μ.π:79,79	Η συστάδα συγκροτείται σήμερα πλέον ουσιαστικά, από σκιόφυτα είδη αφού η Μ.πεύκη δεν αναγεννάται ικανοποιητικά και άλλωστε κάτι τέτοιο θεωρείται φυσιολογικό. Σκοπός για τη συστάδα θα είναι μακροπρόθεσμα η δημιουργία κανονικού κηπευτού δάσους Ελάτης με μίξη Οξυάς σε αναλογία 8:2. Ο σκοπός αυτός θα επιτευχθεί με τις κηπεύσεις. Στην παρούσα φάση έμφαση θα δοθεί στην καλλιέργεια του ξυλαποθέματος και τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών σπερμογέννησης και σπερμοβλάστησης. Η καλλιέργεια θα συνίσταται στη θετική επιλογή και ανατροφή στην κατώτερη και μέση κλάση με αραιώση και στόχο την ποιοτική αναβάθμιση του ξυλαποθέματος και τη διατήρηση της κηπευτής δομής. Η φροντίδα για την αναγέννηση θα περιλαμβάνει προστασία της ήδη υπάρχουσας αναγέννησης και δημιουργία ευνοϊκών, ενδοδασογενών οικολογικών συνθηκών για τη βλάστηση των σπórων και την προστασία των αρτιφύτρων. Οι υλοτομίες αυτές θα έχουν προπαρασκευαστικό χαρακτήρα στα πλαίσια των υπόσκιων υλοτομιών που ενδείκνυνται για το είδος αυτό. Καρπώσεις θα πραγματοποιούνται από την ανώτατη κλάση διαμέτρου. Η καλλιέργεια νεοφυτείας και πυκνοφυτείας με αρνητική επιλογή.Απαγόρευση της βοσκής για τα επόμενα 10 έτη.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΑΣ
2γ	Μ.π, άτομα Ελ., Οξ.	0,7-0,9	1-160(90)	Σπ., αν.	3.906	3.129	186	149	80,11	Καλλιέργεια στις ενώσεις των λεπτών κορμών με αραιώσεις, θετική επιλογή και ανατροφή επίλεκτων ατόμων, με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση του ξυλαποθέματος. Σε διάκενα όπου έχει εγκατασταθεί αναγέννηση, διεύρυνσή τους έως το πολύ 2 στρ. και απομάκρυνση των γηραιών ατόμων και ογκοδέστερων αυτών. Απ'όλη τη συστάδα απομάκρυνση των κεκλιμένων ατόμων. Επίσης των γηραιών ή αποκορυφωμένων τέτοιων. Απαγόρευση της βοσκής για τα επόμενα 10 έτη.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΑΣ
2δ	Μ.π, Ελ., άτομα Οξ.	0,6-0,9	1-180(90)	Σπ., αν.	Μ.π:4.284 Ελ: 782	Μ.π:2.244 Ελ: 648	Μ.π:126 Ελ: 61	Μ.π:66 Ελ:54	Μ.π:52,38 Ελ:88,52	Η συστάδα δέχεται έντονες πιέσεις από τη βοσκή. Μ. πεύκη: Καλλιεργητικές υλοτομίες στην κατώτερη και μέση κλάση με θετική επιλογή και ανατροφή. Προπαρασκευαστικές υλοτομίες στην ανώτερη κλάση. Κατά τη διενέργειά τους θα απομακρύνονται άτομα γενετικά ανεπιθύμητα (δίχαλα, στρεβλά) τα ογκοδέστερα άτομα καθώς και τα αυξητικά ώριμα. Σε διάκενα όπου έχει εγκατασταθεί αναγέννηση, διεύρυνσή τους έως το πολύ 2 στρ. και απομάκρυνση των γηραιών ατόμων και ογκοδέστερων αυτών. Πλήρη απομάκρυνση των κεκλιμένων ή αποκορυφωμένων ατόμων. Ελάτη: Οι καρπώσεις θα προέρχονται από την ανώτερη κλάση, άτομα γηραιά, αποκορυφωμένα, τα ογκοδέστερα που η παρουσία τους δεν εξυπηρετεί κανένα δασοκομικό σκοπό. Απαγόρευση της βοσκής για τα επόμενα 10 έτη.	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΑΣ
2στ	Μ.π, άτομα Ελ., Δρ.	0,7-0,9	1-150(80)	Σπ., αν.	3.240	2.286	180	127	70,56	Η συστάδα δέχεται έντονες πιέσεις από τη βοσκή. Καλλιέργεια στις ενώσεις των λεπτών και μετρίων κορμών με αραιώσεις, θετική επιλογή και ανατροφή επίλεκτων ατόμων, με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση του ξυλαποθέματος. Σε διάκενα όπου έχει εγκατασταθεί αναγέννηση, διεύρυνσή τους έως το πολύ 2 στρ. και απομάκρυνση των γηραιών ατόμων και	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΑΣ

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	ΣΥ συστάδας	V κλάσεων διαμέτρου >34 cm	ΣΥ συστάδας / ha	V κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	Δάσος
										ογκωδέστερων αυτών, τα οποία επιφέρουν αργότερα ζημία στην αναγέννηση και τη συγκομιδή του ξύλου. Τελική υλοτομία σε θέσεις όπου ήδη υπάρχει νεοφυτεία ή πυκνοφυτεία, παρόλο που μπορεί να προκληθούν ζημίες σ' αυτή τη φάση. Εκτιμάται όμως ότι αν παραμείνουν τα άτομα της μητρικής συστάδας αργότερα οι κίνδυνοι θα είναι μεγαλύτεροι, αφού πρόκειται για άτομα αποκορυφωμένα, γηραιά ή και κεκλιμένα. Απ' όλη τη συστάδα απομάκρυνση των κεκλιμένων ατόμων. Επίσης των γηραιών ή αποκορυφωμένων τέτοιων. Απαγόρευση της βοσκής για τα επόμενα 10 έτη.	
3	Μ.π, Οξ., άτομα Ελ.		1-200	Σπ., αν.	Μ.π:3.456	Μ.π:3.040	Μ.π:108	Μ.π:95	Μ.π:87,96	Εκτός διαχείρισης. Το τμήμα θα διατεθεί για τη βόσκηση του κτηνοτροφικού κεφαλαίου της κοινότητας	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΑΣ
1α	Δρ., άτομα Φυλ.Πλ.	0,7-1,0	30-150	Πρεμ.,αν	1.702	0	45	0	0	Ο πίνακας υλοτομίας όπως συντάχθηκε πρότεινε αποφυλατικές υλοτομίες στη συστάδα με παρακράτηση του 20-30% της δασοσκεπούς έκτασης. Κατά τη διαδικασία έγκρισης δε έγινε αποδεκτή η προτεινόμενη μέθοδος διαχείρισης λόγω του ότι αυτή διαταράσσει ριζικά την βιοκοινωνική ισορροπία του οικοσυστήματος για μεγάλο χρονικό διάστημα. Επίσης λόγω μορφολογίας του εδάφους όπου θα δημιουργηθούν φαινόμενα έντονης επιφανειακής απογύμνωσης και χαραδρωτική διάβρωση (φαινόμενα που ήδη απαντώνται στην εγγύς και ευρύτερη περιοχή). Ο Π.Υ. εγκρίθηκε και υλοποιήθηκε τελικά με τη διενέργεια αναγωγικών υλοτομιών.	ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΔΑΣΟΣ ΑΣΗΜΟΠΗΓΑΔΟ - ΚΑΡΟΥΤΙ
1β	Δρ., άτομα Φυλ.Πλ.	0,7-1,0	30-150	Πρεμ.,αν	1.015	0	27,96	0	0	Ο πίνακας υλοτομίας όπως συντάχθηκε πρότεινε αποφυλατικές υλοτομίες στη συστάδα με παρακράτηση του 20-30% της δασοσκεπούς έκτασης. Κατά τη διαδικασία έγκρισης δε έγινε αποδεκτή η προτεινόμενη μέθοδος διαχείρισης λόγω του ότι αυτή διαταράσσει ριζικά την βιοκοινωνική ισορροπία του οικοσυστήματος για μεγάλο χρονικό διάστημα. Επίσης λόγω μορφολογίας του εδάφους όπου θα δημιουργηθούν φαινόμενα έντονης επιφανειακής απογύμνωσης και χαραδρωτική διάβρωση (φαινόμενα που ήδη απαντώνται στην εγγύς και ευρύτερη περιοχή). Ο Π.Υ. εγκρίθηκε και υλοποιήθηκε τελικά με τη διενέργεια αναγωγικών υλοτομιών.	ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΔΑΣΟΣ ΑΣΗΜΟΠΗΓΑΔΟ - ΚΑΡΟΥΤΙ
1γ	Δρ., άτομα Φυλ.Πλ.	0,7-1,0	30-150	Πρεμ.,αν	2.084	0	45	0	0	Ο πίνακας υλοτομίας όπως συντάχθηκε πρότεινε αποφυλατικές υλοτομίες στη συστάδα με παρακράτηση του 20-30% της δασοσκεπούς έκτασης. Κατά τη διαδικασία έγκρισης δε έγινε αποδεκτή η προτεινόμενη μέθοδος διαχείρισης λόγω του ότι αυτή διαταράσσει ριζικά την βιοκοινωνική ισορροπία του οικοσυστήματος για μεγάλο χρονικό διάστημα. Επίσης λόγω μορφολογίας του εδάφους όπου θα δημιουργηθούν φαινόμενα έντονης επιφανειακής απογύμνωσης και χαραδρωτική διάβρωση (φαινόμενα που ήδη απαντώνται στην εγγύς και ευρύτερη περιοχή). Ο Π.Υ. εγκρίθηκε και υλοποιήθηκε τελικά με τη διενέργεια αναγωγικών υλοτομιών.	ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΔΑΣΟΣ ΑΣΗΜΟΠΗΓΑΔΟ - ΚΑΡΟΥΤΙ

ΟΡΟΣ ΒΕΡΝΟΝ - ΚΟΡΥΦΗ ΒΙΤΣΙ: ΕΖΔ GR1340006

ΥΠΟΜΝΗΜΑ:

Δασοπονικά Είδη: Δ/Δρ.= Δρυς, Δ.π.= Δρυς Πρεμνοφυής Μ.π.= Μαύρη Πεύκη, Πευκ.= Πεύκη Ο/Οξ.=Οξυά, Ελ.=Ελάτη, Γ.= Γαύρος, Λ.= Λεύκη Κασ.= Καστανιά, Φυλ.πλ./Φυλ.πλατ.= Φυλλοβόλα πλατύφυλλα, Αειφ.πλ.= Αείφυλλα πλατύφυλλα, Αναδ.= Αναδασώσεις, Ατ./α.= Άτομα

Διαχειριστική, μορφή: Πρ./Πρεμν.= Πρεμνοφυής, Σπ.= Σπερμοφυής, Διφ.=Διφυής

Δασοπονική μορφή: Αν./Ανομ.= Αναμοιόμορφη, Ομ.= Ομοιόμορφη, Ακ.= Ακανόνιστη, Υποκ./Υπ.= Υποκτηπευτή, Παρακρατ.= Παρακρατήματα

Ηλικία: Γηραιοτ.= Γηραιότερα, Νεότ.= Νεότερα

Συγκόμωση: Συμπ./Συμ.= Σύμπικνη, Αρ.= Αραιή, Χαλ.= Χαλαρή

Πίνακας 2.2.5 -6 Συγκρότηση δασικής βλάστησης στη περιοχή όρους Βέρνον

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας / ha	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις
ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΔΑΣΟΣ ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (2006-2015)										
1α	Ο	0,8-1,1	5-120 (~60)	Διφ. υπ. αν. & ομ. κατά θέσεις	21.519,60	14.412,00	298,88	200,17	66,97	Οξυά αμιγής. Ξυλοβριθής συστάδα. 1-2 άτομα/στρ. ξερά. Αναγωγικές υλοτομίες με εξυγιαντικές αναγεννητικές υλοτομίες απομάκρυνση κρίσιμων, κακόμορφων, κακών φαινοτύπων. Καλλιεργητικές εξευγενιστικές με θετική επιλογή. Απόληψη περί του 12% του ξυλαποθέματος (7%-15% κατά θέσεις) Απαγόρευση βόσκησης.
1β	Ο	0,8-1,1	5-120 (~60)	Διφ. υπ. αν. & ομ. κατά θέσεις	18.492,80	5.635,00	280,19	85,38	30,47	Οξυά αμιγής. Ξυλοβριθής συστάδα. 1-2 άτομα/στρ. ξερά. Αναγωγικές υλοτομίες με εξυγιαντικές αναγεννητικές υλοτομίες απομάκρυνση κρίσιμων, κακόμορφων, κακών φαινοτύπων. Καλλιεργητικές εξευγενιστικές με θετική επιλογή. Απόληψη περί του 12% του ξυλαποθέματος (7%-15% κατά θέσεις) Απαγόρευση βόσκησης.
1γ	Ο	0,8-1,1	5-120 (~60)	Διφ. υπ. αν. & ομ. κατά θέσεις	10.660,00	2.744,00	266,5	68,6	25,74	Οξυά αμιγής. Ξυλοβριθής συστάδα. 1-2 άτομα/στρ. ξερά. Αναγωγικές υλοτομίες με εξυγιαντικές αναγεννητικές υλοτομίες απομάκρυνση κρίσιμων, κακόμορφων, κακών φαινοτύπων. Καλλιεργητικές εξευγενιστικές με θετική επιλογή. Απόληψη περί του 12% του ξυλαποθέματος (7%-15% κατά θέσεις) Απαγόρευση βόσκησης.
2α	Ο	0,8-1,1	5-120 (~60)	Διφ. υπ. αν. & ομ. κατά θέσεις	12.114,40	412,2	168,26	5,73	3,4	Οξυά αμιγής. 4Ha μεικτό Δρυός και Οξυάς. Ξυλοβριθής συστάδα. 1-2 άτομα/στρ. ξερά. Αναγωγικές υλοτομίες με εξυγιαντικές αναγεννητικές υλοτομίες απομάκρυνση κρίσιμων, κακόμορφων, κακών φαινοτύπων. Καλλιεργητικές εξευγενιστικές με θετική επιλογή. Απόληψη περί του 12% του ξυλαποθέματος (7%-15% κατά θέσεις) Απαγόρευση βόσκησης. Το 1968 αποφιλωτική υλοτομία.
	Δ+Ο			Διφ. υπ. αν. & ομ. κατά θέσεις						
2β	Ο	0,8-1,1	5-120 (~60)	Διφ. υπ. αν. & ομ. κατά θέσεις	29.440,30	2.176,10	270,1	19,96	7,39	Οξυά αμιγής. Ξυλοβριθής συστάδα. 1-2 άτομα/στρ. ξερά. Το 2004 άρχισε η υλοτομία της χωρίς να έχει κλείσει κατά την εκπόνηση της μελέτης και δεν συμπεριλήφθηκε στην νέα περίοδο διαχείρισης.
				Διφ. υπ. αν. & ομ. κατά θέσεις						
3α	Ο	0,8-1,1	5-120 (~60)	Διφ. υπ. αν. & ομ. κατά θέσεις	7.260,30	484,1	268,9	17,93	6,67	Οξυά αμιγής. Ξυλοβριθής συστάδα. 1-2 άτομα/στρ. ξερά. Το 2004 άρχισε η υλοτομία της χωρίς να έχει κλείσει κατά την εκπόνηση της μελέτης και δεν συμπεριλήφθηκε στην νέα περίοδο διαχείρισης.
				Διφ. υπ. αν. & ομ. κατά θέσεις						
3β	Ο	0,8-1,1	5-120 (~60)	Διφ. υπ. αν. & ομ. κατά θέσεις	15.805,30	3.967,20	267,89	67,24	25,1	Οξυά αμιγής. Ξυλοβριθής συστάδα. 1-2 άτομα/στρ. ξερά. Αναγωγικές υλοτομίες με εξυγιαντικές αναγεννητικές υλοτομίες απομάκρυνση κρίσιμων, κακόμορφων, κακών φαινοτύπων. Καλλιεργητικές εξευγενιστικές με θετική επιλογή. Απόληψη περί του 12% του ξυλαποθέματος (7%-15% κατά θέσεις) Απαγόρευση βόσκησης. Καλύπτει ατομικές ανάγκες κατοίκων.
				Διφ. υπ. αν. & ομ. κατά θέσεις						
3γ	Ο	0,8-1,1	5-120 (~60)	Διφ. υπ. αν. & ομ. κατά θέσεις	9.327,00	1.124,80	239,15	28,84	12,06	Οξυά αμιγής. Ξυλοβριθής συστάδα. 1-2 άτομα/στρ. ξερά. Αναγωγικές υλοτομίες με εξυγιαντικές αναγεννητικές υλοτομίες απομάκρυνση κρίσιμων, κακόμορφων, κακών φαινοτύπων. Καλλιεργητικές εξευγενιστικές με θετική επιλογή. Απόληψη περί του 12% του ξυλαποθέματος (7%-15% κατά θέσεις) Απαγόρευση βόσκησης. Καλύπτει ατομικές ανάγκες κατοίκων.
				Διφ. υπ. αν. & ομ. κατά θέσεις						
3δ	Ο	0,8-1,1	5-120 (~60)	Διφ. υπ. αν. & ομ. κατά θέσεις	18.479,30	5.220,90	260,27	73,53	28,25	Οξυά αμιγής. Ξυλοβριθής συστάδα. 1-2 άτομα/στρ. ξερά. Αναγωγικές υλοτομίες με εξυγιαντικές αναγεννητικές υλοτομίες απομάκρυνση κρίσιμων, κακόμορφων, κακών φαινοτύπων. Καλλιεργητικές εξευγενιστικές με θετική επιλογή. Απόληψη περί του 12% του ξυλαποθέματος (7%-15% κατά θέσεις) Απαγόρευση βόσκησης. Καλύπτει ατομικές ανάγκες κατοίκων.
4α	Ο	0,8-1,1	5-120 (~60)	Διφ. υπ. αν. & ομ.	17.878,40	6.316,40	235,24	104,34	44,35	

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας / ha	Ξυλαπόθεμα κλάσεων >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις
				κατά θέσεις						Οξυά αμιγής. Ξυλοβριθής συστάδα. 1-2 άτομα/στρ. ξερά. Αναγωγικές υλοτομίες με εξυγιαντικές αναγεννητικές υλοτομίες απομάκρυνση κρίσιμων, κακόμορφων, κακών φαινοτύπων. Καλλιεργητικές εξευγενιστικές με θετική επιλογή. Απόληψη περί του 12% του ξυλαποθέματος (7%-15% κατά θέσεις) Απαγόρευση βόσκησης.
4β	Ο	0,8-1,1	5-120 (~60)	Διφ. υπ. αν. & ομ. κατά θέσεις	15.501,30	5.187,60	271,95	119,32	43,87	Οξυά αμιγής. Ξυλοβριθής συστάδα. 1-2 άτομα/στρ. ξερά. Αναγωγικές υλοτομίες με εξυγιαντικές αναγεννητικές υλοτομίες απομάκρυνση κρίσιμων, κακόμορφων, κακών φαινοτύπων. Καλλιεργητικές εξευγενιστικές με θετική επιλογή. Απόληψη περί του 12% του ξυλαποθέματος (7%-15% κατά θέσεις) Απαγόρευση βόσκησης.
4γ	Ο	0,8-1,1	5-120 (~60)	Διφ. υπ. αν. & ομ. κατά θέσεις	21.141,40	10.833,00	285,69	146,39	51,24	Οξυά αμιγής. Ξυλοβριθής συστάδα. 1-2 άτομα/στρ. ξερά. Αναγωγικές υλοτομίες με εξυγιαντικές αναγεννητικές υλοτομίες απομάκρυνση κρίσιμων, κακόμορφων, κακών φαινοτύπων. Καλλιεργητικές εξευγενιστικές με θετική επιλογή. Απόληψη περί του 12% του ξυλαποθέματος (7%-15% κατά θέσεις) Απαγόρευση βόσκησης.
4δ	Ο	0,8-1,1	5-120 (~60)	Διφ. υπ. αν. & ομ. κατά θέσεις	10.070,20	601	173,62	10,36	5,97	Οξυά αμιγής. Ξυλοβριθής συστάδα. 1-2 άτομα/στρ. ξερά. Αναγωγικές υλοτομίες με εξυγιαντικές αναγεννητικές υλοτομίες απομάκρυνση κρίσιμων, κακόμορφων, κακών φαινοτύπων. Καλλιεργητικές εξευγενιστικές με θετική επιλογή. Απόληψη περί του 12% του ξυλαποθέματος (7%-15% κατά θέσεις) Απαγόρευση βόσκησης.
5α	Ο	0,8-1,1	5-120 (~60)	Διφ. υπ. αν. & ομ. κατά θέσεις	17.667,20	3.400,00	280,19	85,38	30,47	Οξυά αμιγής. Ξυλοβριθής συστάδα. 1-2 άτομα/στρ. ξερά. Αναγωγικές υλοτομίες με εξυγιαντικές αναγεννητικές υλοτομίες απομάκρυνση κρίσιμων, κακόμορφων, κακών φαινοτύπων. Καλλιεργητικές εξευγενιστικές με θετική επιλογή. Απόληψη περί του 12% του ξυλαποθέματος (7%-15% κατά θέσεις) Απαγόρευση βόσκησης. Καλύπτει ατομικές ανάγκες κατοίκων και εμπόριο.
5β	Ο	0,8-1,1	5-120 (~60)	Διφ. υπ. αν. & ομ. κατά θέσεις	9.978,50	2.671,00	249,46	66,78	26,77	Οξυά αμιγής. Ξυλοβριθής συστάδα. 1-2 άτομα/στρ. ξερά. Αναγωγικές υλοτομίες με εξυγιαντικές αναγεννητικές υλοτομίες απομάκρυνση κρίσιμων, κακόμορφων, κακών φαινοτύπων. Καλλιεργητικές εξευγενιστικές με θετική επιλογή. Απόληψη περί του 12% του ξυλαποθέματος (7%-15% κατά θέσεις) Απαγόρευση βόσκησης. Καλύπτει ατομικές ανάγκες κατοίκων και εμπόριο.
5γ	Ο	0,8-1,1	5-120 (~60)	Διφ. υπ. αν. & ομ. κατά θέσεις	10.645,00	5.082,00	177,42	84,7	47,74	Οξυά αμιγής. Ξυλοβριθής συστάδα. 1-2 άτομα/στρ. ξερά. Αναγωγικές υλοτομίες με εξυγιαντικές αναγεννητικές υλοτομίες απομάκρυνση κρίσιμων, κακόμορφων, κακών φαινοτύπων. Καλλιεργητικές εξευγενιστικές με θετική επιλογή. Απόληψη περί του 12% του ξυλαποθέματος (7%-15% κατά θέσεις) Απαγόρευση βόσκησης. Καλύπτει ατομικές ανάγκες κατοίκων και εμπόριο.
5δ	Ο	0,8-1,1	5-120 (~60)	Διφ. υπ. αν. & ομ. κατά θέσεις	9.282,50	2.186,00	232,06	54,65	23,55	Οξυά αμιγής. Ξυλοβριθής συστάδα. 1-2 άτομα/στρ. ξερά. Αναγωγικές υλοτομίες με εξυγιαντικές αναγεννητικές υλοτομίες απομάκρυνση κρίσιμων, κακόμορφων, κακών φαινοτύπων. Καλλιεργητικές εξευγενιστικές με θετική επιλογή. Απόληψη περί του 12% του ξυλαποθέματος (7%-15% κατά θέσεις) Απαγόρευση βόσκησης. Καλύπτει ατομικές ανάγκες κατοίκων και εμπόριο.
6α	Ο	0,8-1,1	5-120 (~60)	Διφ. υπ. αν. & ομ. κατά θέσεις	6.005,50	1.012,50	250,23	42,19	16,86	Οξυά αμιγής. Ξυλοβριθής συστάδα. 1-2 άτομα/στρ. ξερά. Αναγωγικές υλοτομίες με εξυγιαντικές αναγεννητικές υλοτομίες απομάκρυνση κρίσιμων, κακόμορφων, κακών φαινοτύπων. Καλλιεργητικές εξευγενιστικές με θετική επιλογή. Απόληψη περί του 12% του ξυλαποθέματος (7%-15% κατά θέσεις) Απαγόρευση βόσκησης. Καλύπτει ατομικές ανάγκες κατοίκων και εμπόριο.
6β	Ο	0,8-1,1	5-120 (~60)	Διφ. υπ. αν. & ομ. κατά θέσεις	9.293,70	951,6	281,63	28,84	10,24	Οξυά αμιγής. Ξυλοβριθής συστάδα. 1-2 άτομα/στρ. ξερά. Αναγωγικές υλοτομίες με εξυγιαντικές αναγεννητικές υλοτομίες απομάκρυνση κρίσιμων, κακόμορφων, κακών φαινοτύπων. Καλλιεργητικές εξευγενιστικές με θετική επιλογή. Απόληψη περί του 12% του ξυλαποθέματος (7%-15% κατά θέσεις) Απαγόρευση βόσκησης. Καλύπτει ατομικές ανάγκες κατοίκων και εμπόριο.
6γ	Ο	0,8-1,1	5-120 (~60)	Διφ. υπ. αν. & ομ. κατά θέσεις	15.125,00	2.245,50	275	40,83	14,85	Οξυά αμιγής. Ξυλοβριθής συστάδα. 1-2 άτομα/στρ. ξερά. Αναγωγικές υλοτομίες με εξυγιαντικές αναγεννητικές υλοτομίες απομάκρυνση κρίσιμων, κακόμορφων, κακών φαινοτύπων. Καλλιεργητικές εξευγενιστικές με θετική επιλογή. Απόληψη περί του 12% του ξυλαποθέματος (7%-15% κατά θέσεις) Απαγόρευση βόσκησης. Καλύπτει ατομικές ανάγκες κατοίκων και εμπόριο.
7α	Ο	0,8-1,1	5-120 (~60)	Διφ. υπ. αν. & ομ. κατά θέσεις	13.109,30	2.586,90	238,35	47,03	19,73	Οξυά αμιγής &. 13 Ha μεικτό Δρυός και Οξυάς. Ξυλοβριθής συστάδα. 1-2 άτομα/στρ. ξερά. Αναγωγικές υλοτομίες με εξυγιαντικές αναγεν-νητικές υλοτομίες απομάκρυνση κρίσιμων, κακόμορφων, κακών φαινοτύπων. Καλλιεργητικές εξευγενιστικές με θετική επιλογή. Απόληψη περί του 12% του ξυλαποθέματος (7%-15% κατά θέσεις) Απαγόρευση βόσκησης.
	Ο+Δ			κατά θέσεις						Καλύπτει ατομικές ανάγκες κατοίκων και εμπόριο.
7β	Ο+Δ	0,8-1,1	5-120 (~60)	Διφ. υπ. αν. & ομ. κατά θέσεις	5.728,80	306	197,54	10,55	5,34	Μεικτό Δρυός και Οξυάς Ξυλοβριθής συστάδα. 1-2 άτομα/στρ. ξερά. Αναγωγικές υλοτομίες με εξυγιαντικές αναγεννητικές υλοτομίες απομάκρυνση κρίσιμων, κακόμορφων, κακών φαινοτύπων. Καλλιεργητικές εξευγενιστικές με θετική επιλογή. Απόληψη περί του 12% του ξυλαποθέματος (7%-15% κατά θέσεις) Απαγόρευση βόσκησης.
7γ	Ο	0,8-1,1	5-120 (~60)	Διφ. υπ. αν. & ομ. κατά θέσεις	7.988,20	1.236,00	210,22	32,53	15,47	Οξυά αμιγής. Ξυλοβριθής συστάδα. 1-2 άτομα/στρ. ξερά. Αναγωγικές υλοτομίες με εξυγιαντικές αναγεννητικές υλοτομίες απομάκρυνση κρίσιμων, κακόμορφων, κακών φαινοτύπων. Καλλιεργητικές εξευγενιστικές με θετική επιλογή. Απόληψη περί του 12% του ξυλαποθέματος (7%-15% κατά θέσεις) Απαγόρευση βόσκησης. Καλύπτει ατομικές ανάγκες κατοίκων.
7δ	Ο	0,8-1,1	5-120 (~60)	Διφ. υπ. αν. & ομ.	19.440,80	9.603,00	290,16	156,9	54,07	

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας / ha	Ξυλαπόθεμα κλάσεων >34 διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις
				κατά θέσεις						Οξυά αμιγής. Ξυλοβριθής συστάδα. 1-2 άτομα/στρ. ξερά. Αναγωγικές υλοτομίες με εξυγιαντικές αναγεννητικές υλοτομίες απομάκρυνση κρίσιμων, κακόμορφων, κακών φαινοτύπων. Καλλιεργητικές εξευγενιστικές με θετική επιλογή. Απόληψη περί του 12% του ξυλαποθέματος (7%-15% κατά θέσεις) Απαγόρευση βόσκησης.
8α	Δ	0,8-1,1	Δ:14-28 & 40	Δ: πρ. ομ.	4.057,00	0	80,23	0	0	Δρυς πλατύφυλλη αμιγής ή και σε μείξη με άλλα είδη Δρυός. Οξυά αμιγής σε 6,21 Ha.
	Ο		Ο: 5-120 (~60)	Ο: Διφ. υπ. αν. & ομ.						Τελευταία υλοτομία το 1992 (αποψιλωτική). Εκτός διαχείρισης την τρέχουσα διαχειριστική περίοδο (δεν έχει ανακάμψει η δρυς-μη επιθυμητή διάμετρο).
				κατά θέσεις						
8β	Ο	0,8-1,1	5-120 (~60)	Διφ. υπ. αν. & ομ. κατά θέσεις	22.264,60	604,8	236,85	6,43	2,72	Οξυά αμιγής. Ξυλοβριθής συστάδα. 1-2 άτομα/στρ. ξερά. Αναγωγικές υλοτομίες με εξυγιαντικές αναγεννητικές υλοτομίες απομάκρυνση κρίσιμων, κακόμορφων, κακών φαινοτύπων. Καλλιεργητικές εξευγενιστικές με θετική επιλογή. Απόληψη περί του 12% του ξυλαποθέματος (7%-15% κατά θέσεις) Απαγόρευση βόσκησης.
9α	Δ	0,8-1,1	Δ:14-28 & 40	Δ: πρ. ομ.	6.321,40	0	77,2	0	0	Δρυς πλατύφυλλη αμιγής ή και σε μείξη με άλλα είδη Δρυός. Οξυά αμιγής σε 0,55 Ha.
	Ο		Ο: 5-120 (~60)	Ο: Διφ. υπ. αν. & ομ.						Τελευταία υλοτομία το 1989 (αποψιλωτική) και 1980-1983. Εκτός διαχείρισης την τρέχουσα διαχειριστική περίοδο (δεν έχει ανακάμψει η δρυς-μη επιθυμητή διάμετρο).
				κατά θέσεις						
9β	Δ	0,8-1,1	14-28 & 40	Πρ. ομ.	1.418,90	0	40,9	0	0	Δρυς πλατύφυλλη αμιγής ή και σε μείξη με άλλα είδη Δρυός. Αποψιλωτικές υλοτομίες με παρακρατήματα κατά ομάδες και λόχμες σε ποσοστό 12% στις καλύτερες ποιότητες τόπου ή 12-15 παρακρατήματα ανά στρέμμα. Παρακράτηση για οικολογικούς λόγους 1-2 άτομα το στρέμμα.
9γ	Δ	0,8-1,1	14-28 & 40	Πρ. ομ.	2.815,70	0	50,6	0	0	Δρυς πλατύφυλλη αμιγής ή και σε μείξη με άλλα είδη Δρυός. Τελευταία υλοτομία το 1995-1996 (αποψιλωτική). Εκτός διαχείρισης την τρέχουσα διαχειριστική περίοδο (δεν έχει ανακάμψει η δρυς-μη επιθυμητή διάμετρο). Πάνω από τον Οικισμό 10Ha δάσους διαχειρίζονται αναγωγικά για λόγους προστασίας του Οικισμού.
9δ	Δ	0,8-1,1	14-28 & 40	Πρ. ομ.	2.150,90	0	51,3	0	0	Δρυς πλατύφυλλη αμιγής ή και σε μείξη με άλλα είδη Δρυός. Τελευταία υλοτομία το 1997-1998 (αποψιλωτική). Εκτός διαχείρισης την τρέχουσα διαχειριστική περίοδο (δεν έχει ανακάμψει η δρυς-μη επιθυμητή διάμετρο). Πάνω από τον Οικισμό 10Ha δάσους διαχειρίζονται αναγωγικά για λόγους προστασίας του Οικισμού.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΤΚ ΝΥΜΦΑΙΟΥ ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (2016-2025)										
1α	Ο	0,9-1,0	~60	Διφ.,ακ. ομ.	3.530,88	1.274,08	271,61	98,01	36,08	Οξυά αμιγής. Έρπουσα πυρκαγιά το 2004 και αποψιλώθηκαν 18 στρ. με καθολική ξήρανση για αποφυγή δευτερογενούς προσβολής.. Προτείνονται αναγωγικές υλοτομίες, καλλιεργητικού χαρακτήρα με απόληψη έως του 12% του ξυλαποθέματος, Παρακράτηση κακόμορφων- κουφαλερών ατόμων, 2-3 ατόμων /Ha, για οικολογικούς λόγους.
			&							
			90-110							
1β	Ο	0,9-1,0	~60	Διφ.,ακ. ομ.	4.451,93	1.369,23	159	48,9	30,76	Οξυά αμιγής. Προτείνονται αναγωγικές υλοτομίες, καλλιεργητικού χαρακτήρα με απόληψη έως του 10% της δασοσκεπούς επιφάνειας, Παρακράτηση γηραιών, κακόμορφων- κουφαλερών ατόμων, 2-3 ατόμων /Ha, για οικολογικούς λόγους. Εκτός υλοτομίας στο νότιο όριο λωρίδα έκτασης 9,14 Ha λόγω ισχυρών κλίσεων.
			&							
			90-110							
1γ	Ο	0,9-1,0	~60	Διφ.,ακ. ομ.	5.022,36	1.194,35	159,39	37,9	23,78	Οξυά αμιγής. Προτείνονται αναγωγικές υλοτομίες, καλλιεργητικού χαρακτήρα με απόληψη έως του 12% του ξυλαποθέματος
			&							
			90-110							
1δ	Ο	1,0-1,2	40-75	Διφ.,ακ. αν.	9.942,73	4.262,37	178,83	76,66	42,87	Οξυά αμιγής. Έγιναν αναγωγικές υλοτομίες, καλλιεργητικού χαρακτήρα με απόληψη έως του 12% του ξυλαποθέματος. Εκτός διαχείρισης τον χρόνο ισχύος της μελέτης.(!!!!!!)
			Με παρα-κρατή-ματα							Εκτός υλοτομίας στο νότιο όριο λωρίδα έκτασης 10-11 Ha λόγω ισχυρών κλίσεων.
3α	Ο	1,0-1,2	40-75	Διφ.,ακ. αν.	13.833,83	5.905,08	251,52	107,37	42,69	Οξυά αμιγής. Λίγα άτομα δρυός στη ράχη της συστάδας. Προτείνονται αναγωγικές υλοτομίες, καλλιεργητικού χαρακτήρα με απόληψη έως 10% του ξυλαποθέματος. Στα ΝΑ έκταση 12,34 Ha άτομα λεπτών διαστάσεων εκτός διαχείρισης.
			Με παρα-κρατή-ματα							

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας / ha	Ξυλαπόθεμα κλάσεων >34 διαμέτρου cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις
3β	Ο	1,0-1,2	40-75 Με παρα-κρατή-ματα	Διφ.,ακ. αν.	13.755,80	5.184,82	195,73	73,77	37,69	Οξυά αμιγής. Λίγα άτομα δρυός στη ράχη της συστάδας. Προτείνονται αναγωγικές υλοτομίες, καλλιεργητικού χαρακτήρα με απόληψη έως 8% του ξυλαποθέματος
3γ	Ο	0,9-1,0	~60 & 90-110 ανώρο-φο	Διφ.,ακ. ομ.	10.746,25	5.568,15	190,54	98,73	51,81	Οξυά αμιγής. Έγιναν αναγωγικές υλοτομίες, καλλιεργητικού χαρακτήρα με απόληψη έως του 8% του ξυλαποθέματος. Εκτός διαχείρισης τον χρόνο ισχύος της μελέτης (!)
3δ	Ο	0,8-1,1	30-70	Διφ., αν. Πρ. ομ.	2.441,26	708,74	244,13	70,87	29,03	Οξυά αμιγής. Αρκετά κατακείμενα (κλαδιά & κορμοί) από ανεμορριψίες και χιονοθλασίες. Προτείνονται αναγωγικές υλοτομίες, καλλιεργητικού χαρακτήρα με απόληψη έως 12% του ξυλαποθέματος. Καλύπτει ατομικές ανάγκες κατοίκων.
3ε	Ο	0,8-1,1	50-130	Διφ., αν.	4.793,20	738,7	91,3	14,07	15,41	Οξυά αμιγής. Αρκετά κατακείμενα (κλαδιά & κορμοί) από ανεμορριψίες και χιονοθλασίες. Πολλά δίχαλα και κουφαλερά. Προτείνονται αναγωγικές υλοτομίες, καλλιεργητικού χαρακτή-ρα με απόληψη έως 12% του ξυλαποθέματος. Καλύπτει ατομικές ανάγκες κατοίκων. Καθαρισμοί στα κατακείμενα.
6α	Ο	0,9-1,0	90-100	Διφ., ομ.	11.332,95	1.296,89	226,66	25,94	11,44	Οξυά αμιγής. Προτείνονται αναγωγικές υλοτομίες, καλλιεργητικού χαρακτήρα με απόληψη έως 10% του ξυλαποθέματος. Στα Δ έκταση 7 Ha εκτός διαχείρισης λόγω ισχυρών κλίσεων.
6β	Ο	0,9-1,0	95-105	Διφ., ομ.	11.130,37	2.048,01	185,51	34,13	18,4	Οξυά αμιγής. Προτείνονται αναγωγικές υλοτομίες, καλλιεργητικού χαρακτήρα με απόληψη έως 10% του ξυλαποθέματος. Στα Δ έκταση 9 Ha εκτός διαχείρισης λόγω ισχυρών κλίσεων.
6γ	Ο	0,9-1,0	95-105	Διφ., ομ.	9.191,87	2.408,85	229,8	60,22	26,21	Οξυά αμιγής. Προτείνονται αναγωγικές υλοτομίες, καλλιεργητικού χαρακτήρα με απόληψη έως 10% του ξυλαποθέματος. Σε έκταση 2 Ha εκτός διαχείρισης λόγω ισχυρών κλίσεων
6δ	Ο	1,0-1,1	90-100	Διφ., ομ.	14.710,05	2.419,42	207,18	34,08	16,45	Οξυά αμιγής. Προτείνονται αναγωγικές υλοτομίες, καλλιεργητικού χαρακτήρα με απόληψη έως του 10% του ξυλαποθέματος. Παρακράτηση γηραιών, κακόμορφων- κουφαλερών ατόμων, για οικολογικούς λόγους. Εκτός υλοτομίας έκταση 15 Ha (κάτω του δρόμου) λόγω ισχυρών κλίσεων.
7α	Ο	1,0-1,1	95-115	Διφ., αν.	10.277,35	3.449,04	146,82	60,82	41,42	Οξυά αμιγής. Προτείνονται αναγωγικές υλοτομίες, καλλιεργητικού χαρακτήρα με απόληψη έως του 10% του ξυλαποθέματος. Παρακράτηση γηραιών, κακόμορφων- κουφαλερών ατόμων, για οικολογικούς λόγους.
7β	Ο	1,0-1,1	70-105	Διφ., αν.	10.146,09	593,46	150,09	8,78	5,85	Οξυά αμιγής. Προτείνονται αναγωγικές υλοτομίες, καλλιεργητικού χαρακτήρα με απόληψη έως του 12% του ξυλαποθέματος. Παρακράτηση γηραιών, κακόμορφων- κουφαλερών ατόμων, για οικολογικούς λόγους. Λαθροϋλοτομίες παλαιότερα.
8α	Ο	1,1-1,2	55-70 & 80-100 ομάδες	Διφ., ακ. ομ.	9.808,67	4.616,96	242,19	127,51	52,65	Οξυά αμιγής. Προτείνονται αναγωγικές υλοτομίες, καλλιεργητικού χαρακτήρα με απόληψη έως του 12% του ξυλαποθέματος. Παρακράτηση γηραιών, κακόμορφων- κουφαλερών ατόμων, για οικολογικούς λόγους. (Πυρκαγιά το 1915).
8β	Ο	0,9-1,0	60 & 90-110 ανωροφος	Διφ., ακ. ομ.	11.016,82	4.089,07	174,87	64,91	37,12	Οξυά αμιγής. Προτείνονται αναγωγικές υλοτομίες, καλλιεργητικού χαρακτήρα με απόληψη έως του 10% του ξυλαποθέματος. Παρακράτηση γηραιών, κακόμορφων- κουφαλερών ατόμων, για οικολογικούς λόγους
8γ	Ο	0,9-1,0	60-70 & 90-115 ομάδες	Διφ., ακ. ομ.	6.257,93	1.834,82	162,54	47,66	29,32	Οξυά αμιγής. Προτείνονται αναγωγικές υλοτομίες, καλλιεργητικού χαρακτήρα με απόληψη έως του 10% του ξυλαποθέματος. Καλύπτει τις ατομικές ανάγκες κατοίκων.
8δ	Ο	0,9-1,0	90-105	Διφ., ομ.	4.027,20	1.827,50	163,71	74,29	45,38	Οξυά αμιγής. Προτείνονται αναγωγικές υλοτομίες, καλλιεργητικού χαρακτήρα με απόληψη έως του 10% του ξυλαποθέματος. Στα ανάντη άτομα κακόμορφα, χαμηλόκορμα.
9β	Ο	0,9-1,0	60 & 90-110 ανωρ.	Διφ., ακ. ομ.	8.001,92	5.705,34	130,11	92,77	71,3	Οξυά αμιγής. Προτείνονται αναγωγικές υλοτομίες, καλλιεργητικού χαρακτήρα με απόληψη έως του 12% του ξυλαποθέματος. Καλύπτει τις ατομικές ανάγκες κατοίκων.
ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΣΚΟΠΙΑΣ-ΑΝΩ ΥΔΡΟΥΣΑΣ-ΥΔΡΟΥΣΑΣ-ΚΟΛΧΙΚΗΣ ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (2010-2019)										
3β	Ο Ο+Δ	0,8-1,0	Ο: -90 (~55) Δ:-50 (~35)	Υπ. ακ. Διφ., αν.	7.404,51	190,24	188,89	4,85	2,57	Οξυά σε σχεδόν αμιγείς ενώσεις. Ανατολικά μείξη με Δρυ. Προτείνονται αναγωγικές υλοτομίες, καλλιεργητικού χαρακτήρα με απόληψη έως του 10% του ξυλαποθέματος. Απομάκρυνση ατόμων με κακή ποιότητα ξύλου, στρεβλά, κλαδοβριθή, μισοσάπια (εξυγίανση). Καλύπτει τις ατομικές ανάγκες κατοίκων. Απαγόρευση βόσκησης (5-10 έτη).
5α	Ο Ο+Δ	0,8-1,0	Ο:-60 Δ:-50	Πρ. αν. Διφ., αν.	7.255,17	232,47	140,88	4,51	3,2	Οξυά σε αμιγείς ενώσεις, μόνο ψηλότερα. Μείξη με Δρυ στο υπόλοιπο με αναλογία 7:3. Προτείνονται αναγωγικές υλοτομίες, καλλιεργητικού χαρακτήρα με απόληψη έως του 10% του ξυλαποθέματος. Απομάκρυνση ατόμων με κακή ποιότητα ξύλου, στρεβλά, κλαδοβριθή, μισοσάπια (εξυγίανση). Καλύπτει τις ατομικές ανάγκες κατοίκων. Απαγόρευση βόσκησης (5-10 έτη).
5β	Δ	0,8-1,0	Ο:~65	Πρ., αν.	8.284,95	303,45	162,45	5,95	3,66	

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας / ha	Ξυλαπόθεμα κλάσεων >34 διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις	
	Δ+Ο		Δ: ~55							Δρυς με αμιγείς ενώσεις και μείξη με Οξυά παρά των ρεμάτων κυρίως και στα ψηλότερα μεικτές ενώσεις με κυριαρχία Οξυάς (7:3). Ενδείξεις λαθροϋλοτομιών, κατά μήκος δασοδρόμων. Προτείνονται αναγωγικές υλοτο-μίες, καλλιεργητικού χαρακτήρα με απόληψη έως του 10% του ξυλαποθέματος. Απομάκρυνση ατόμων με κακή ποιότητα ξύλου, στρεβλά, κλαδοβριθή, μισοσάπια (εξυγίανση). Καλύπτει τις ατομικές ανάγκες κατοίκων. Απαγόρευση βόσκησης (5-10 έτη).	
	Ο		Ο:~65	Πρ., ομ						Δρυς με αμιγείς ενώσεις και μείξη με Οξυά παρά των ρεμάτων κυρίως στα ψηλότερα μεικτές ενώσεις με κυριαρχία Οξυάς. Στα ανώτερα αμιγής Οξυά με άτομα δρυός. Προτείνονται αναγωγικές υλοτο-μίες, καλλιεργητικού χαρακτήρα με απόληψη έως του 10% του ξυλαποθέματος. Απομάκρυνση ατόμων με κακή ποιότητα ξύλου, στρεβλά, κλαδοβριθή, μισοσάπια (εξυγίανση). Καλύπτει τις ατομικές ανάγκες κατοίκων. Απαγόρευση βόσκησης (5-10 έτη)	
	Δ+Ο		Δ: ~55	Διφ., αν.							
5γ		0,8-1,0			2.467,12	275,52	101,95	11,39	11,17		
6α	Δ+Ο	0,8-1,0	Ο:~60	Πρ., αν.	2.601,17	0	121,55	0	0	Δρυς σε μείξη με Οξυά με κυριαρχία της δρυός (7:3) ενώ η Οξυά συμμετέχει περισσότερο με την αύξηση του υψομέτρου Ενδείξεις λαθροϋλοτομιών, κατά μήκος δασοδρόμων. Προτείνονται αναγωγικές υλοτομίες, καλλιεργητικού χαρακτήρα με απόληψη έως του 10% του ξυλαποθέματος. Απομάκρυνση ατόμων με κακή ποιότητα ξύλου, στρεβλά, κλαδοβριθή, μισοσάπια (εξυγίανση). Καλύπτει τις ατομικές ανάγκες κατοίκων. Απαγόρευση βόσκησης (5-10 έτη).	
			Δ: ~50	Διφ., αν.							
7β	Ο,Δ	0,8-1,0	Ο:~75	Δ: Πρ., ομ.	6.584,64	556,67	120,16	10,16	8,45	Στα ανώτερα αμιγής Οξυά με άτομα δρυός. Δρυς με αμιγείς ενώσεις κατά μήκος της κύριας ράχης, κατά το υπόλοιπο μεικτές ενώσεις. Προτείνονται αναγωγικές υλοτομίες, καλλιεργητικού χαρακτήρα με απόληψη έως του 10% του ξυλαποθέματος. Απομάκρυνση ατόμων με κακή ποιότητα ξύλου, στρεβλά, κλαδοβριθή, μισοσάπια, προσβεβλημένα-κρίσιμα άτομα. (εξυγίανση). Απαγόρευση βόσκησης (5-10 έτη).	
	Ο+Δ		Δ: ~64	Διφ., αν.							
7γ	Ο,Δ	0,8-1,0	Ο:~78	Διφ., αν.	6.309,32	3.468,80	125,43	68,96	54,98	Στα ανώτερα αμιγής Οξυά. Δρυς με αμιγείς ενώσεις στ κατώτερο τμήμα, κατά το υπόλοιπο μεικτές ενώσεις. Προτείνονται αναγωγικές υλοτομίες, με απόληψη έως του 10% του ξυλαποθέματος. Απομάκρυνση ατόμων με κακή ποιότητα ξύλου, στρεβλά, κλαδοβριθή, μισο-σάπια, προσβεβλημένα-κρίσιμα άτομα. (εξυγι-ανση). Απαγόρευση βόσκησης (5-10 έτη).	
	Ο+Δ		Δ: ~64								
ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΒΙΤΣΙΟΥ ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (2010-2019)											
1β	Δ	0,9-1,0	Δ:	Πρ., αν.	5.920	0	164,44	0	0	Δρυς στη μεγαλύτερη έκταση, Οξυά σε 4Ha. Λαθροϋλοτομίες & παράνομη βόσκηση σε όλη την έκταση. Καλλιεργητικές – εξυγιαντικές υλοτομίες θετικής επιλογής και στα δύο είδη.	
	Ο		50-65	σε αναγωγή							
			Ο:								
			60-100								
1γ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Εκτός διαχείρισης, χορτολιβαδικές εκτάσεις. Διατίθεται για βόσκηση (κτηνοτροφικό κεφάλαιο ΤΚ Περικοπής).	
2γ	Ο	Ο:	Ο:	Ο & Δ:	7.305	0	158,8	0	0	Οξυά στη μεγαλύτερη έκταση, Δρυς δευτερευόντως και αναδασώσεις Μ. πεύκης.	
	Δ	0,8-1,0	50-70	Πρ., αν.						Εκτός διαχείρισης για τα δύο πρώτα είδη λόγω επικάλυψης της συστάδας με άλλο δασικό σύμπλεγμα (Βασιλειάδας και Μελλισότοπου ΠΕ Καστοριάς). Καλλιέργεια στη Μ. πεύκη και απόληψη έως του 20% του ξυλαποθέματος αυτής με Αραιωτικές υλοτομίες για λόγους προστασίας από πυρκαγιά. Επίσης καθαρισμοί και κλαδεύσεις.	
	ΑναδΜ.π	Δ:	Δ:	σε αναγωγή							
		0,9-1,1	50-60	Μ.π: ομ.							
		Μ.π.:	Μ.π:								
		1,0-1,2	29-30								
3α	Ο	0,8-1,0	50-80	Πρ., αν. σε αναγωγή	5.177	450	143,8	12,5	8,69	Οξυά αμιγής. Αναγωγικές υλοτομίες, καλλιεργητικού χαρακτήρα, θετική επιλογή και απόληψη έως του 10% του ξυλαποθέματος.	
3β	Ο	0,6-0,8	55-80	Πρ., αν. σε αναγωγή	4.229	0	156,6	0	0	Οξυά αμιγής, κατά δέσμες στα ανώτερα. Αναγωγικές υλοτομίες, καλλιεργητικού χαρακτήρα, θετική επιλογή και απόληψη έως του 10% του ξυλαποθέματος.	
3γ	Ο	0,9-1,0	55-80	Πρ., αν. σε αναγωγή	14.766	0	335,6	0	0	Οξυά αμιγής, λίγα άτομα δρυός. Αναγωγικές υλοτομίες, καλλιεργητικού χαρακτήρα, θετική επιλογή και απόληψη έως του 10% του ξυλαποθέματος.	
4α	Ο	Ο:	Ο:	Ο: Διφ., αν.	Ο:5.812	Ο:1.632	Ο: 181,6	51	28,08	Άτομα μεγάλης ηλικίας διάσπαρτα σε όλη την έκταση. Έκταση 2 Ha καμένη. Έκταση 5 Ha, δεξιά του δρόμου ναρκοπέδιο. Ο χειρισμός των πεύκων με βάση μελέτη αντιπυρικής προστασίας αναδασώσεων (121264/3295/23-11-2007). Αναγωγικές υλοτομίες στην Οξυά καλλιεργητικού χαρακτήρα, θετική επιλογή και απόληψη έως του 10% του ξυλαποθέματος.	
	Αναδ	0,8-1,0	60-100	Μ.π, Δ.π:	Μ.π, Δ.π:		Μ.π, Δ.π:				

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας / ha	Ξυλαπόθεμα κλάσεων >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις
	Μ.π Δ π.	Μ.π, Δ.π:	Μ.π	ομ.	1.385		197,85			
		1,0-1,1	Δ.π:							
			33							
4β	Ο	Ο:	Ο:	Ο: Διφ., αν.	Ο:3.186	Ο:776	Ο: 159,3	38,8	24,36	Πυρκαγιά το 1998 που έκαψε 12Ha Οξυάς και 3 Ha πεύκης. Αναγωγικές υλοτομίες στην Οξυά καλλιεργητικού χαρακτήρα, θετική επιλογή και απόληψη έως του 10% του ξυλαποθέματος. Ο χειρισμός των πεύκων με βάση μελέτη αντιπυρικής προστασίας αναδασώσεων (121264/3295/23-11-2007) και απόληψη έως του 20% του ξυλαποθέματος.
	Αναδ	0,8-1,0	60-90	Μ.π, Δ.π:	Μ.π, Δ.π:		Μ.π, Δ.π:			
	Μ.π Δ π.	Μ.π, Δ.π:	Μ.π	ομ	5.357		243,49			
		1,0-1,1	Δ.π:							
			33							
4γ	Ο	Ο:	Ο:	Ο: Πρ., αν.	Ο:6.830	Ο:1.263	Ο: 243,9	45,11	18,49	Οξυά αμιγής με ύπαρξη διχαλωτών και γηραιών ατόμων. Φωτιά το 1998 που έκαψε παρεδαφιαία βλάστηση σε 17Ha Οξυάς. Αναγωγικές υλοτομίες στην Οξυά καλλιεργητικού χαρακτήρα, θετική επιλογή και απόληψη έως του 10% του ξυλαποθέματος. Ο χειρισμός των πεύκων με βάση μελέτη αντιπυρικής προστασίας αναδασώσεων (121264/3295/23-11-2007) και απόληψη έως του 20% του ξυλαποθέματος.
	Αναδ	0,8-1,0	60-90	σε αναγωγή	Δ.π:		Δ.π:			
	Δ π.	Δ.π:	Δ.π:		282		282			
		1,1-1,2	31-32							
4δ	Ο	Ο:	Ο:	Ο: Πρ., αν.	Ο:5.592	0	Ο: 215,1	0	0	Οξυά αμιγής διακόπτεται από γυμνές εκτάσεις. Αναγωγικές υλοτομίες στην Οξυά καλλιεργητικού χαρακτήρα, θετική επιλογή και απόληψη έως του 10% του ξυλαποθέματος. Ο χειρισμός των πεύκων με βάση μελέτη αντιπυρικής προστασίας αναδασώσεων (121264/3295/23-11-2007) και απόληψη έως του 20% του ξυλαποθέματος
	Αναδ	0,9-1,1	55-90	σε αναγωγή	Μ.π, Δ.π:		Μ.π, Δ.π:			
	Μ.π Δ π.	Μ.π, Δ.π:	Μ.π	Μ.π, Δ.π:	564		282			
		1,1-1,2	Δ.π:	ομ.						
			30-31							
4ε	Ο	Ο:	Ο:	Ο: Πρ., αν.	Ο:5.328	Ο:1.524	Ο: 177,6	50,8	28,6	Οξυά αμιγής με ύπαρξη γηραιών ατόμων. Αναγωγικές υλοτομίες στην Οξυά καλλιεργητικού χαρακτήρα, θετική επιλογή και απόληψη έως του 10% του ξυλαποθέματος. Ο χειρισμός των πεύκων με βάση μελέτη αντιπυρικής προστασίας αναδασώσεων (121264/3295/23-11-2007) και απόληψη έως του 20% του ξυλαποθέματος
	Αναδ	0,9-1,1	55-100	σε αναγωγή	Μ.π:		Μ.π:			
	Μ π.	Μ.π:	Μ.π:	Μ.π: ομ.	3.658		182,9			
		1,2-1,3	32-33							
4στ	Ο	Ο:	Ο:	Ο: Πρ., αν.	Ο:3.171	Ο:914	Ο: 226,5	65,29	28,82	Αναγωγικές υλοτομίες στην Οξυά καλλιεργητικού χαρακτήρα, θετική επιλογή και απόληψη έως του 10% του ξυλαποθέματος. Ο χειρισμός των πεύκων με βάση μελέτη αντιπυρικής προστασίας αναδασώσεων (121264/3295/23-11-2007) και απόληψη έως του 20% του ξυλαποθέματος
	Αναδ	0,8-1,0	45-90	σε αναγωγή	Μ.π, Δ.π:		Μ.π:			
	Μ.π Δ π.	Μ.π, Δ.π:	Μ.π	Μ.π, Δ.π:	4.151		188,69			
		1,1-1,2	Δ.π:	ομ						
			32-34							
5α	Ο	0,9-1,0	55-100	Πρ., αν. σε αναγωγή	11.413	2.328	232,9	47,51	28,4	Οξυά αμιγής. Λαθροϋλοτομίες & παράνομη βόσκηση σε όλη την έκταση. Καλλιεργητικές – εξυγιαντικές υλοτομίες θετικής επιλογής και απόληψη έως του 10% του ξυλαποθέματος.
5β	Ο	0,8-1,0	55-90	Πρ., αν. σε αναγωγή	1.447	0	144,7	0	0	Οξυά αμιγής. Καλλιεργητικές – εξυγιαντικές υλοτομίες θετικής επιλογής και απόληψη έως του 10% του ξυλαποθέματος. Οι γυμνές εκτάσεις διατίθενται για βόσκηση (ΤΚ Περικοπής). Υλοτομείται πρώτη φορά.
5γ	Ο	0,8-1,0	55-90	Πρ., αν. σε αναγωγή	1.081	0	180,3	0	0	Οξυά αμιγής. Καλλιεργητικές – εξυγιαντικές υλοτομίες θετικής επιλογής και απόληψη έως του 10% του ξυλαποθέματος. Οι γυμνές εκτάσεις διατίθενται για βόσκηση (ΤΚ Περικοπής). Υλοτομείται πρώτη φορά
6α	Ο	Ο:	Ο:	Ο: Πρ., αν.	Ο:10.405	Ο:2.820	Ο: 208,1	56,4	27,1	

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας / ha	Ξυλαπόθεμα κλάσεων >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις
	Αναδ	0,8-1,0	70-100	σε αναγω- γή	Μ.π:		Μ.π:			Οξυά αμιγής, κατά δέσμες στα ανώτερα. Έκταση 5 Ha, ναρκοπέδιο. Ο χειρισμός των πεύκων με βάση μελέτη αντιπυρικής προστασίας αναδασώσεων (121264/3295/23-11-2007) και απόληψη έως του 20% του ξυλαποθέματος. Αναγωγικές υλοτομίες στην Οξυά καλλιεργητικού χαρακτήρα, θετική επιλογή και απόληψη έως του 10% του ξυλαποθέματος.
	Μ π.	Μ.π:	Μ.π:	Μ.π: ομ.	883		176,46			
		1,1-1,2	32-33							
6β	Ο	Ο:	Ο:	Ο: Πρ., αν.	Ο:13.674	Ο:2.326	Ο: 239,9	40,81	17,01	Οξυά αμιγής. Έκταση 7 Ha, στο ανώτερο τμήμα της ναρκοπέδιο. Ο χειρισμός των πεύκων με βάση μελέτη αντιπυρικής προστασίας αναδασώσεων (121264/3295/23-11-2007) και απόληψη έως του 20% του ξυλαποθέματος. Αναγωγικές υλοτομίες στην Οξυά καλλιεργητικού χαρακτήρα, θετική επιλογή και απόληψη έως του 10% του ξυλαποθέματος.
	Αναδ	0,9-1,1	60-100	σε αναγω- γή	Μ.π:		Μ.π:			
	Μ π.	Μ.π:	Μ.π:	Μ.π: ομ.	353		176,46			
		1,1-1,2	33							
6γ	Ο	Ο:	Ο:	Ο: Πρ., αν.	Ο:5.797	Ο:3.010	Ο: 165,60	86	51,92	Οξυά αμιγής. Ο χειρισμός των πεύκων με βάση μελέτη αντιπυρικής προστασίας αναδασώσεων (121264/3295/23-11-2007) και απόληψη έως του 20% του ξυλαποθέματος. Αναγωγικές υλοτομίες στην Οξυά καλλιεργητικού χαρακτήρα, θετική επιλογή και απόληψη έως του 10% του ξυλαποθέματος.
	Αναδ	0,9-1,1	60-100	σε αναγω- γή	Μ.π:		Μ.π.:218,9			
	Μ π.	Μ.π:	Μ.π:	Μ.π: ομ.	219					
		1,1-1,2	34							
6δ	Ο	Ο:	Ο:	Ο: Πρ., αν.	Ο:8.717	Ο:957	Ο: 150,30	16,5	10,98	Οξυά αμιγής. Ο χειρισμός των πεύκων με βάση μελέτη αντιπυρικής προστασίας αναδασώσεων (121264/3295/23-11-2007) και απόληψη έως του 20% του ξυλαποθέματος. Αναγωγικές υλοτομίες στην Οξυά καλλιεργητικού χαρακτήρα, θετική επιλογή και απόληψη έως του 10% του ξυλαποθέματος.
	Αναδ	0,9-1,1	40-90	σε αναγω- γή	Μ.π:		Μ.π.:218,9			
	Μ π.	Μ.π:	Μ.π:	Μ.π: ομ.	1.095					
		1,1-1,2	31							
7α	Ο	0,8-1,0	50-110	Πρ., αν. σε αναγω- γή	5.858	1.555	225,3	59,81	26,54	Αναγωγικές υλοτομίες στην Οξυά καλλιεργητικού χαρακτήρα, θετική επιλογή και απόληψη έως του 10% του ξυλαποθέματος.
7β	Ο	0,8-1,0	50-110	Πρ., αν. σε αναγω- γή	10.895	3.314	286,7	87,2	30,42	Αναγωγικές υλοτομίες στην Οξυά καλλιεργητικού χαρακτήρα, θετική επιλογή και απόληψη έως του 10% του ξυλαποθέματος. Στο ανώτερο τμήμα ναρκοπέδιο σε έκταση 3Ha.
8α	Ο	1	80-110	Πρ., αν. σε αναγω- γή	15.628	6.173	355,2	140,3	39,5	Αναγωγικές υλοτομίες στην Οξυά καλλιεργητικού χαρακτήρα, θετική επιλογή και απόληψη έως του 10% του ξυλαποθέματος.
8β	Ο	1	80-110	Πρ., αν. σε αναγω- γή	18.877	11.804	343,22	214,62	62,53	Αναγωγικές υλοτομίες στην Οξυά καλλιεργητικού χαρακτήρα, θετική επιλογή και απόληψη έως του 10% του ξυλαποθέματος.
9α	Ο	0,8-1,1	65-100	Πρ., αν. σε αναγω- γή	13.888	8.412	347,2	210,3	60,57	Αναγωγικές υλοτομίες στην Οξυά καλλιεργητικού χαρακτήρα, θετική επιλογή και απόληψη έως του 10% του ξυλαποθέματος. Ναρκοπέδιο σε έκταση 5 Ha.
9β	Ο	1,0-1,2	70-110	Πρ., αν. σε αναγω- γή	8.063	4.296	217,9	116,1	53,28	Αναγωγικές υλοτομίες στην Οξυά καλλιεργητικού χαρακτήρα, θετική επιλογή και απόληψη έως του 10% του ξυλαποθέματος.
9γ	Ο	1,0-1,2	60-110	Πρ., αν. σε αναγω- γή	12.403	5.190	238,5	99,8	41,84	Αναγωγικές υλοτομίες στην Οξυά καλλιεργητικού χαρακτήρα, θετική επιλογή και απόληψη έως του 10% του ξυλαποθέματος. Ναρκοπέδιο σε έκταση 12 Ha.
10α	Ο	Ο:	Ο:	Ο: Πρ., αν.	Ο:7.260	Ο:913	Ο: 259,3	Ο:32,60	12,58	Ο χειρισμός των πεύκων με βάση μελέτη αντιπυρικής προστασίας αναδασώσεων (121264/3295/23-11-2007) και απόληψη έως του 20% του ξυλαποθέματος. Αναγωγικές υλοτομίες στην Οξυά καλλιεργητικού χαρακτήρα, θετική επιλογή και απόληψη έως του 10% του ξυλαποθέματος.
	Αναδ	0,8-1,0	60-100	σε αναγω- γή	Μ.π:		Μ.π.:238,5			
	Μ π.	Μ.π:	Μ.π:	Μ.π: ομ.	954					
		1,0-1,2	35-37							
10β	Ο	1,0-1,2	50-100	Πρ., αν.	12.285	4.308	279,2	97,9	35,07	Αναγωγικές υλοτομίες στην Οξυά καλλιεργητικού χαρακτήρα, θετική επιλογή και απόληψη έως του 10% του ξυλαποθέματος.

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας	Ξυλαπόθεμα κλάσεων >34 διαμέτρου >34 cm	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας / ha	Ξυλαπόθεμα κλάσεων >34 διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις
				σε αναγωγ-γή						
10γ	Ο	0,8-1,1	75-100	Πρ., σε αναγωγ-γή	6.390	664	228,2	23,7	10,39	Αναγωγικές υλοτομίες στην Οξυά καλλιεργητικού χαρακτήρα, θετική επιλογή και απόληψη έως του 10% του ξυλαποθέματος.
10δ	Ο	1,0-1,2	40-100	Πρ., αν σε αναγωγ-γή	7.926	1.978	172,3	43	24,96	Παρακρατήματα μεγάλης ηλικίας σε όλη την έκταση. Αναγωγικές υλοτομίες στην Οξυά καλλιεργητικού χαρακτήρα, θετική επιλογή και απόληψη έως του 10% του ξυλαποθέματος.
10ε	Ο	0,8-1,1	50-100	Πρ., αν σε αναγωγ-γή	3.597	2.994	224,8	187,1	83,24	Παρακρατήματα μεγάλης ηλικίας. Αναγωγικές υλοτομίες στην Οξυά καλλιεργητικού χαρακτήρα, θετική επιλογή και απόληψη έως του 10% του ξυλαποθέματος.
10στ	Ο	0,8-1,1	50-110	Πρ., αν σε αναγωγ-γή	3.551	345	154,4	15	9,72	Παρακρατήματα μεγάλης ηλικίας. Αναγωγικές υλοτομίες στην Οξυά καλλιεργητικού χαρακτήρα, θετική επιλογή και απόληψη έως του 10% του ξυλαποθέματος.
10ζ	Ο	1,0-1,2	50-110	Πρ., αν σε αναγωγ-γή	7.990	2.871	242,1	87	35,93	Παρακρατήματα μεγάλης ηλικίας. Αναγωγικές υλοτομίες στην Οξυά καλλιεργητικού χαρακτήρα, θετική επιλογή και απόληψη έως του 10% του ξυλαποθέματος.
11α	Ο	0,9-1,1	50-100	Πρ., αν σε αναγωγ-γή	2.701	889	158,9	52,29	32,91	Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας στο κάτω μέρος της συστάδας. Αναγωγικές υλοτομίες στην Οξυά καλλιεργητικού χαρακτήρα, θετική επιλογή και απόληψη έως του 10% του ξυλαποθέματος.
11β	Ο	0,8-1,0	50-100	Πρ., ομ σε αναγωγ-γή	1.816	129,7	388	27,71	20,74	Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας στο κάτω μέρος της συστάδας. Αναγωγικές υλοτομίες στην Οξυά καλλιεργητικού χαρακτήρα, θετική επιλογή και απόληψη έως του 10% του ξυλαποθέματος.
11γ	Ο	0,9-1,1	50-100	Πρ., αν σε αναγωγ-γή	5.935	2.765	129	60,11	46,59	Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας στο κάτω μέρος της συστάδας. Αναγωγικές υλοτομίες στην Οξυά καλλιεργητικού χαρακτήρα, θετική επιλογή και απόληψη έως του 10% του ξυλαποθέματος.
12α	Ο	0,8-1,1	40-110	Πρ., αν σε αναγωγ-γή	8.550	1.300	171	26	15,2	Αναγωγικές υλοτομίες στην Οξυά καλλιεργητικού χαρακτήρα, θετική επιλογή και απόληψη έως του 10% του ξυλαποθέματος.
12β	Ο	0,9-1,1	40-90	Πρ., αν σε αναγωγ-γή	9.443	2.425	219,6	56,4	25,68	Αναγωγικές υλοτομίες στην Οξυά καλλιεργητικού χαρακτήρα, θετική επιλογή και απόληψη έως του 10% του ξυλαποθέματος.
12γ	Ο	0,9-1,1	40-90	Πρ., αν σε αναγωγ-γή	9.517	2.950	221,3	68,6	31	Αναγωγικές υλοτομίες στην Οξυά καλλιεργητικού χαρακτήρα, θετική επιλογή και απόληψη έως του 10% του ξυλαποθέματος.
12δ	Ο	0,9-1,1	50-100	Πρ., αν σε αναγωγ-γή	14.403	5.320	257,2	95	36,94	Αναγωγικές υλοτομίες στην Οξυά καλλιεργητικού χαρακτήρα, θετική επιλογή και απόληψη έως του 10% του ξυλαποθέματος.
12ε	Ο	0,9-1,0	40-100	Πρ., αν σε αναγωγ-γή	9.574	769	154,4	12,4	8,03	Αναγωγικές υλοτομίες στην Οξυά καλλιεργητικού χαρακτήρα, θετική επιλογή και απόληψη έως του 10% του ξυλαποθέματος.
12στ	Ο	0,9-1,1	40-100	Πρ., αν σε αναγωγ-γή	4.275	369	137,9	11,9	8,63	Αναγωγικές υλοτομίες στην Οξυά καλλιεργητικού χαρακτήρα, θετική επιλογή και απόληψη έως του 10% του ξυλαποθέματος.
13α	Ο	0,9-1,0	40-90	Πρ., αν σε αναγωγ-γή	17.446	4.307	272,6	67,3	24,69	Σε έκταση 5Ha στο άνω μέρος της συστάδας ναρκοπέδιο. Αναγωγικές υλοτομίες στην Οξυά καλλιεργητικού χαρακτήρα, θετική επιλογή και απόληψη έως του 10% του ξυλαποθέματος.
13β	Ο	0,9-1,1	40-90	Πρ., αν	10.249	3.238	222,8	70,4	31,59	

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας / ha	Ξυλαπόθεμα κλάσεων >34 διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις
				σε αναγωγή						Σε έκταση 5Ha στο άνω μέρος της συστάδας ναρκοπέδιο. Αναγωγικές υλοτομίες στην Οξυά καλλιεργητικού χαρακτήρα, θετική επιλογή και απώληση έως του 10% του ξυλαποθέματος.
13γ	Ο	0,8-0,9	40-80	Πρ., αν σε αναγωγή	2.574	328	128,7	16,4	12,74	Υπέργηρα άτομα Οξυάς στα όρια των παλιών χωραφιών όπου υλοτομήθηκαν χονδροί κορμοί το 2008 (στα πλαίσια αναγωγικών υλοτομιών). Η συστάδα διεκδικήθηκε το ίδιο έτος, κατά νομή από την Τ.Κ. Ατραπού, δεν προσκόμισαν τα αποδεικτικά στοιχεία. Αναγωγικές υλοτομίες στην Οξυά καλλιεργητικού χαρακτήρα, θετική επιλογή και απώληση έως του 10% του ξυλαποθέματος.
13δ	Ο	0,8-0,9	40-90	Πρ., αν σε αναγ.	2.978	638	148,9	31,9	21,42	Αναγωγικές υλοτομίες στην Οξυά καλλιεργητικού χαρακτήρα, θετική επιλογή και απώληση έως του 10% του ξυλαποθέματος.
13ε	Ο	Ο:	Ο:	Ο: Πρ., αν.	Ο:4.706		Ο: 151,8			Ο χειρισμός των πεύκων με βάση καλλιέργεια (αραιωτικές υλοτομίες) και απώληση έως του 20% του ξυλαποθέματος με σκοπό την προστασία από φωτιά. Καθαρισμοί, κλαδεύσεις και απομάκρυνση ξερών ατόμων. Αναγωγικές υλοτομίες στην Οξυά καλλιεργητικού χαρακτήρα, θετική επιλογή και απώληση έως του 10% του ξυλαποθέματος. Πολλοί τρακτερόδρομοι εντός της συστάδας.
	Αναδ	0,8-0,9	40-90	σε αναγωγή	Μ.π:		Μ.π.:202,5			
	Μ π.	Μ.π:	Μ.π:	Μ.π: ομ.	203					
		0,9-1,1	25-26							
14α	Ο	0,7-0,9	40-60	Πρ., αν σε αναγωγή	4.890	642	163	21,4	13,13	Η συστάδα τέθηκε για υλοτομία με την προϋπόθεση διάνοιξης δασοδρόμου για τη μεταφορά των προϊόντων. Υπέργηρα άτομα Οξυάς, κουφαλερά. Αναγωγικές υλοτομίες στην Οξυά καλλιεργητικού χαρακτήρα, θετική επιλογή και απώληση έως του 10% του ξυλαποθέματος.
14β	Ο	Ο:	Ο:	Ο & Δ: Πρ., αν.	Ο:5.616		Ο: 187,2			Η συστάδα τέθηκε για υλοτομία με την προϋπόθεση διάνοιξης δασοδρόμου για τη μεταφορά των προϊόντων. Υπέργηρα άτομα Οξυάς, κουφαλερά. Αναγωγικές υλοτομίες στην Οξυά & Δρυ, καλλιεργητικού χαρακτήρα, θετική επιλογή και απώληση έως του 10% του ξυλαποθέματος.
	Δ	0,7-0,9	40-60	σε αναγωγή	Δ:		Δ.:94,1			
		Δ:	Δ:		564					
		0,6-0,8	30-50							
14γ	Δ	0,6-0,8	30-50	Πρ., αν. σε αναγωγή	3.481	-	94,1	-	-	Φράγμα Τριανταφυλλιάς, απαλλοτριώθηκαν 4Ha με την 30732/1545/27-3-2007 Απόφ. Δ/ντή Δασών Φλώρινας, όπου και αποψιλώθηκαν. Εκτός διαχείρισης (άγνωστο ύψος στάθμης φράγματος.)
15α	Ο	0,6-0,9	40-60	Πρ., αν σε αναγωγή	2.690	-	72,7	-	-	Η συστάδα τέθηκε για υλοτομία με την προϋπόθεση διάνοιξης δασοδρόμου για τη μεταφορά των προϊόντων. Παλαιά ως βοσκότοπος. Τα χωράφια δασώνονται με φυσικό τρόπο. Αναγωγικές υλοτομίες στην Οξυά καλλιεργητικού χαρακτήρα, θετική επιλογή και απώληση έως του 10% του ξυλαποθέματος.
15β	Ο	0,6-0,9	40-60	Πρ., αν σε αναγωγή	1.308	-	72,7	-	-	Η συστάδα τέθηκε για υλοτομία με την προϋπόθεση διάνοιξης δασοδρόμου για τη μεταφορά των προϊόντων. Παλαιά ως βοσκότοπος. Τα χωράφια δασώνονται με φυσικό τρόπο. Αναγωγικές υλοτομίες στην Οξυά καλλιεργητικού χαρακτήρα, θετική επιλογή και απώληση έως του 10% του ξυλαποθέματος.
15γ	Ο	0,6-0,9	40-60	Πρ., αν σε αναγωγή	1.963	-	72,7	-	-	Η συστάδα τέθηκε για υλοτομία με την προϋπόθεση διάνοιξης δασοδρόμου για τη μεταφορά των προϊόντων. Παλαιά ως βοσκότοπος. Τα χωράφια δασώνονται με φυσικό τρόπο. Αναγωγικές υλοτομίες στην Οξυά καλλιεργητικού χαρακτήρα, θετική επιλογή και απώληση έως του 10% του ξυλαποθέματος.
16α	Ο	Ο:	Ο:	Ο & Δ: Πρ., αν.	Ο:5.926		Ο: 174,3			Η συστάδα τέθηκε για υλοτομία με την προϋπόθεση διάνοιξης δασοδρόμου για τη μεταφορά των προϊόντων. Παλαιά έχει υποστεί υπερβόσκηση κατά θέσεις. Το ιδιοκτησιακό πρόβλημα επιλύθηκε. Αναγωγικές υλοτομίες, στην Οξυά & Δρυ, καλλιεργητικού χαρακτήρα, θετική επιλογή και απώληση έως του 10% του ξυλαποθέματος.
	Δ	0,7-0,9	40-70	σε αναγωγή	Δ:		Δ.:60,0			
		Δ:	Δ:		480					
		0,7-0,9	30-60							
16β	Ο	0,8-1,1	40-80	Πρ., αν σε αναγωγή	8.096	4.256	253	133	52,57	Οξυά αμιγής και διάσπαρτα άτομα Δρυός. Η συστάδα τέθηκε για υλοτομία με την προϋπόθεση διάνοιξης δασοδρόμου για τη μεταφορά των προϊόντων. Παλαιά έχει υποστεί υπερβόσκηση κατά θέσεις. Το ιδιοκτησιακό πρόβλημα επιλύθηκε. Αναγωγικές υλοτομίες, στην Οξυά, καλλιεργητικού χαρακτήρα, θετική επιλογή και απώληση έως του 10% του ξυλαποθέματος.
16γ	Ο	Ο:	Ο:	Ο & Δ: Πρ., αν.	Ο:1.871		Ο: 124,7			Η συστάδα τέθηκε για υλοτομία με την προϋπόθεση διάνοιξης δασοδρόμου για τη μεταφορά των προϊόντων. Παλαιά έχει υποστεί υπερβόσκηση κατά θέσεις. Το ιδιοκτησιακό πρόβλημα επιλύθηκε. Αναγωγικές υλοτομίες, στην Οξυά & Δρυ, καλλιεργητικού χαρακτήρα, θετική επιλογή και απώληση έως του 10% του ξυλαποθέματος.
	Δ	0,7-0,9	40-90	σε αναγωγή	Δ:		Δ.:41,7			
		Δ:	Δ:		417					
		0,6-0,9	30-60							

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας / ha	Ξυλαπόθεμα κλάσεων >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις
16δ	Ο	0,8-1,1	40-80	Πρ., αν σε αναγωγ-γή	4.015	-	267,6	-	-	Οξυά αμιγής και διάσπαρτα άτομα Δρυός. Η συστάδα τέθηκε για υλοτομία με την προϋπόθεση διάνοιξης δασοδρόμου για τη μεταφορά των προϊόντων. Παλαιά έχει υποστεί υπερβόσκηση κατά θέσεις. Το ιδιοκτησιακό πρόβλημα επιλύθηκε. Αναγωγικές υλοτομίες, στην Οξυά, καλλιεργητικού χαρακτήρα, θετική επιλογή και απόληψη έως του 10% του ξυλαποθέματος.
17α	Ο	0,8-1,0	60-100	Πρ., αν σε αναγωγ-γή	5.173	-	178,4	-	-	Πρώτη φορά για υλοτομία το 2011 μετά το 1979. Στο κάτω μέρος ίχνη παλιών χωραφιών. Καλλιεργητικές-εξυγιαντικές υλοτομίες με θετική επιλογή με απόληψη στο 10% του ξυλαποθέματος. Απομάκρυνση υπέργηρων –κουφαλερών ατόμων που εντοπίζονται διάσπαρτα κύρια στο άνω μέρος της συστάδας.
17β	Ο	0,8-1,0	50-100	Πρ., αν σε αναγωγ-γή	8.539	-	230,8			Πρώτη φορά για υλοτομία το 2010 μετά το 1979. Στο κάτω μέρος ίχνη παλιών χωραφιών. Καλλιεργητικές-εξυγιαντικές υλοτομίες με θετική επιλογή με απόληψη στο 10% του ξυλαποθέματος. Απομάκρυνση υπέργηρων –κουφαλερών ατόμων που εντοπίζονται διάσπαρτα κύρια στο άνω μέρος της συστάδας.
17γ	Ο	0,9-1,1	50-100	Πρ., αν σε αναγωγ-γή	10.778	2.867	189,1	50,3	26,6	Καλλιεργητικές-εξυγιαντικές υλοτομίες με θετική επιλογή με απόληψη στο 10% του ξυλαποθέματος.
17δ	Ο	0,9-1,1	50-90	Πρ., αν σε αναγωγ-γή	7.692	656	192,3	16,4	8,53	Ίχνη παλιών χωραφιών. Καλλιεργητικές-εξυγιαντικές υλοτομίες με θετική επιλογή με απόληψη στο 10% του ξυλαποθέματος.
18α	Ο	0,8-1,0	40-80	Πρ., σε αναγωγ-γή	9.650	-	193	-	-	Καλλιεργητικές-εξυγιαντικές υλοτομίες με θετική επιλογή με απόληψη στο 10% του ξυλαποθέματος..
18β	Ο	0,8-1,1	40-100	Πρ., σε αναγωγ-γή	11.615	-	207,4	-	-	Καλλιεργητικές-εξυγιαντικές υλοτομίες με θετική επιλογή με απόληψη στο 10% του ξυλαποθέματος.
18γ	Ο	Ο:	Ο:	Ο: Πρ., σε αναγωγ-γή	Ο:10.497	-	Ο: 169,3	-	-	Ο χειρισμός των πεύκων με βάση μελέτη αντιπυρικής προστασίας αναδασώσεων (121264/3295/23-11-2007) και απόληψη έως του 20% του ξυλαποθέματος. Καλλιεργητικές-εξυγιαντικές υλοτομίες με θετική επιλογή στην Οξυά και απόληψη έως του 10% του ξυλαποθέματος. Έκταση 10Ha ναρκοπέδιο (γύρω από τον υψοδείκτη 1881 μ.)
	Αναδ	0,8-1,1	60-110		Μ.π:		Μ.π.:140			
	Μ π.				140					
19α	Ο	Ο:	Ο:	Ο: Πρ., σε αναγωγ-γή	Ο:9.554	Ο:4.003	Ο: 265,4	Ο:111,19	41,9	Ο χειρισμός των πεύκων με βάση μελέτη αντιπυρικής προστασίας αναδασώσεων (121264/3295/23-11-2007) και απόληψη έως του 20% του ξυλαποθέματος. Καλλιεργητικές-εξυγιαντικές υλοτομίες με θετική επιλογή στην Οξυά και απόληψη έως του 10% του ξυλαποθέματος. Έκταση 10Ha ναρκοπέδιο (γύρω από τον υψοδείκτη 1881 μ.)
	Αναδ	0,9-1,0	70-100	Μ.π: ομ	Μ.π:		Μ.π.:102,8			
	Μ π.	Μ.π.	Μ.π.:		308					
		1,1	23-24							
19β	Ο	0,9-1,0	70-100	Πρ., σε αναγωγ-γή	16.088	-	292,5	-	-	Καλλιεργητικές-εξυγιαντικές υλοτομίες με θετική επιλογή στην Οξυά και απόληψη έως του 10% του ξυλαποθέματος.
19γ	Ο	0,8-1,0	70-110	Πρ., σε αναγωγ-γή	14.634	3.828	332,6	87	26,16	Έχουν απομακρυνθεί τα περισσότερα υπέργηρα άτομα της συστάδας. Καλλιεργητικές-εξυγιαντικές υλοτομίες με θετική επιλογή στην Οξυά και απόληψη έως του 10% του ξυλαποθέματος.
20α	Ο	Ο:	Ο:	Ο: Πρ.,αν σε αναγωγ-γή	Ο:11.189	Ο:2.822	Ο: 266,4	Ο:67,2	25,22	Ο χειρισμός των πεύκων με βάση μελέτη αντιπυρικής προστασίας αναδασώσεων (121264/3295/23-11-2007) και απόληψη έως του 20% του ξυλαποθέματος. Καλλιεργητικές-εξυγιαντικές υλοτομίες με θετική επιλογή στην Οξυά και απόληψη έως του 10% του ξυλαποθέματος. Η Οξυά για ατομικές ανάγκες.
	Αναδ	0,7-0,9	50-100	Μ.π: ομ	Μ.π:		Μ.π.:102,8			
	Μ π.	Μ.π.	Μ.π.:		130					
		1,1	23-24							
20β	Ο	0,7-0,9	50-100	Πρ., σε αναγωγ-γή	7.478	-	249,27	-	-	Λαθροϋλοτομίες κατά μήκος του δρόμου Τριανταφυλλιάς – συστάδας. Καλλιεργητικές-εξυγιαντικές υλοτομίες με θετική επιλογή στην Οξυά και απόληψη έως του 10% του ξυλαποθέματος. Η Οξυά για ατομικές ανάγκες.
20γ	Ο	0,7-0,9	50-100	Πρ., σε αναγωγ-γή	1.640	-	117,8	-	-	Λαθροϋλοτομίες κατά μήκος του δρόμου Τριανταφυλλιάς – συστάδας. Εκτός διαχείρισης. (14Ha δασοσκεπής από τα 81Ha συνολικά.)
21α	Δ	0,7-0,9	40-60	Πρ.,αν σε αναγωγ-γή	1.479	416	184,8	52	28,13	Υπάρχουν παλιά χωράφια. 8Ha δάσους Δρυός Καλλιεργητικές-αναγωγικές υλοτομίες με θετική επιλογή και απόληψη έως του 10% του ξυλαποθέματος.
21β	Δ	0,7-0,9	40-60	Πρ.,αν σε αναγωγ-γή	529	188	88,3	31,4	35,54	Πολλά διάκενα (παλιά χωράφια). Λαθροϋλοτομίες κατά μήκος του δρόμου Τριανταφυλλιάς –φράγματος. 6Ha Δρυός. Στο κάτω μέρος μείξη με Οξυά κατ' άτομο. Καλλιεργητικές-αναγωγικές υλοτομίες με θετική επιλογή και απόληψη έως του 10% του ξυλαποθέματος.

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας / ha	Ξυλαπόθεμα κλάσεων >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις
21γ	Δ	0,7-0,9	40-60	Πρ.,αν σε αναγω-γή	920	-	57,5	-	-	Πολλά διάκενα (παλιά χωράφια). Απαλλοτριώθηκαν 4Ha με την αριθμό 30732/1545/27-3-2007 Απόφαση Δ/ντη Δασών Φλώρινας για το φράγμα Τριανταφυλλιάς και αποφιλώθηκαν. Καλλιεργητικές-αναγωγικές υλοτομίες με θετική επιλογή και απόληψη έως του 10% του ξυλαποθέματος.
21δ	Δ	0,7-0,9	40-60	Πρ.,αν σε αναγω-γή	828	-	69	-	-	Πολλά διάκενα (παλιά χωράφια). Απαλλοτριώθηκαν 4Ha με την αριθμό 30732/1545/27-3-2007 Απόφαση Δ/ντη Δασών Φλώρινας για το φράγμα Τριανταφυλλιάς και αποφιλώθηκαν. Καλλιεργητικές-αναγωγικές υλοτομίες με θετική επιλογή και απόληψη έως του 10% του ξυλαποθέματος.
ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΚΟΡΕΣΤΕΙΩΝ ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (2010-2019)										
18δ	Ο	Ο:	Ο:	Ο: Διφ.,ομ	Ο:10.761	Ο:1.943	Ο: 247,31	Ο:44,66	18,06	Καλλιεργητικές (αναγωγικές – εξυγιαντικές) υλοτομίες ανάλογα με τις ανάγκες των κατά χώρο ενώσεων. Εξυγιαντικές υλοτομίες στην Οξυά (γηραιά, κακόμορφα, κουφαλερά, βεβλαμένα άτομα). Εξευγενιστικές αραιώσεις. Παρακράτηση ατόμων κουφαλερών, κλαδοβ-ριθών 1-2/Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων για την ορνιθοπανίδα. Κλαδεύσεις στη Μ. πεύκη. Καμιά απαγόρευση βοσκής.
	Αναδ	0,7-0,9	60-110	Μ.π: ομ	Μ.π:		Μ.π.:55,90			
	Μ π.	Μ.π.	Μ.π.:		552					
		1,1	30							
18ε	Ο	09-1,2	Ο:	Ο: Διφ.,ομ	Ο:11.433	Ο:529	Ο: 214,05	Ο:9,90	4,63	Καλλιεργητικές (αναγωγικές – εξυγιαντικές) υλοτομίες ανάλογα με τις ανάγκες των κατά χώρο ενώσεων. Εξυγιαντικές υλοτομίες στην Οξυά (γηραιά, κακόμορφα, κουφαλερά, βεβλαμένα άτομα). Εξευγενιστικές αραιώσεις. Παρακράτηση ατόμων κουφαλερών, κλαδοβ-ριθών 1-2/Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων για την ορνιθοπανίδα. Κλαδεύσεις στη Μ. πεύκη. Καμιά απαγόρευση βοσκής.
	Αναδ		60-110	Μ.π: ομ	Μ.π:		Μ.π.:55,90			
	Μ π		Μ.π.:	.	1.146					
			15-20							
19α	Ο	06-0,9	Ο:	Ο: Πρ.,ομ	Ο:7.740	Ο:654	Ο: 294,27	Ο:24,86	8,45	Καλλιεργητικές (αναγωγικές – εξυγιαντικές) υλοτομίες ανάλογα με τις ανάγκες των κατά χώρο ενώσεων. Εξυγιαντικές υλοτομίες στην Οξυά (γηραιά, κακόμορφα, κουφαλερά, βεβλαμένα άτομα). Εξευγενιστικές αραιώσεις. Προπαρασκευαστικές υπόσκιες υλοτομίες. Παρακράτηση ατόμων κουφαλερών, κλαδοβρι-θών 1-2/Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων για την ορνιθοπανίδα. Καλλιεργητικές υλοτομίες με θετική επιλογή, ελαφρά αραιώση με κριτήριο την προστασία στις αναδασώσεις Μ. Πεύκης. Απαγόρευση βοσκής.
	Αναδ		30-80	Μ.π: ομ	Μ.π:		Μ.π.:130,9			
	Μ π		Μ.π.:		1.532					
			Οκτ-20							
19β	Ο	06-0,9	Ο:	Ο: Πρ.,ομ	Ο:15.345	Ο:739	Ο: 317,70	Ο:15,30	4,82	Καλλιεργητικές (αναγωγικές – εξυγιαντικές) υλοτομίες ανάλογα με τις ανάγκες των κατά χώρο ενώσεων. Εξυγιαντικές υλοτομίες στην Οξυά (γηραιά, κακόμορφα, κουφαλερά, βεβλαμένα άτομα). Εξευγενιστικές αραιώσεις. Προπαρασκευαστικές και σπερμοδότιδες υπόσκιες Παρακράτηση ατόμων κουφαλερών, κλαδοβριθών 1-2/Ha ομοιόμορφα διασκορπι-ισμένων για την ορνιθοπανίδα. Καλλιεργητικές υλοτομίες με θετική επιλογή, ελαφρά αραιώση με κριτήριο την προστασία στις αναδασώσεις Μ. Πεύκης. Απαγόρευση βοσκής.
	Αναδ		30-80	Μ.π: ομ	Μ.π:		Μ.π.:60,22			
	Μ π		Μ.π.:		60					
			Οκτ-20							
19γ	Ο	0,6-0,8	30-80	Ο: Πρ.,ομ	13.697	1.155	314,88	26,55	8,43	Οξυά αμιγής και λίγα άτομα Μ. πεύκης. Καλλιεργητικές (αναγωγικές – εξυγιαντικές) υλοτομίες ανάλογα με τις ανάγκες των κατά χώρο ενώσεων. Εξυγιαντικές υλοτομίες στην Οξυά (γηραιά, κακόμορφα, κουφαλερά, βεβλαμένα άτομα). Εξευγενιστικές αραιώσεις. Προπαρασκευαστικές και σπερμοδότιδες υπόσκιες Παρακράτηση ατόμων κουφαλερών, κλαδοβριθών 1-2/Ha ομοιόμορφα διασκορπ-ισμένων για την ορνιθοπανίδα. Απαγόρευση βοσκής.
			Μ.π.:	Μ.π: ομ						
			Οκτ-20							
19δ	Ο	0,6-0,9	30-100	Ο: Διφ.,υπ	17.642	2.710,00	395,55	60,76	15,36	Οξυά αμιγής και λίγα άτομα Μ. πεύκης. Καλλιεργητικές (αναγωγικές – εξυγιαντικές) υλοτομίες ανάλογα με τις ανάγκες των κατά χώρο ενώσεων. Εξυγιαντικές υλοτομίες στην Οξυά (γηραιά, κακόμορφα, κουφαλερά, βεβλαμένα άτομα). Εξευγενιστικές αραιώσεις. Προπαρασκευαστικές και σπερμοδότιδες υπόσκιες Παρακράτηση ατόμων κουφαλερών, κλαδοβριθών 1-2/Ha ομοιόμορφα διασκορπ-ισμένων για την ορνιθοπανίδα. Απαγόρευση βοσκής.
			Μ.π.:	Μ.π: ομ						
			Οκτ-20							
20α	Ο	0,8-1,0	Ο:	Ο: Διφ.,υπ	Ο:4.814	Ο:1.081	Ο: 180,32	Ο:40,49	22,46	Καλλιεργητικές (αναγωγικές – εξυγιαντικές) υλοτομίες ανάλογα με τις ανάγκες των κατά χώρο ενώσεων. Εξυγιαντικές υλοτομίες στην Οξυά (γηραιά, κακόμορφα, βεβλαμένα άτομα). Εξευγενιστικές αραιώσεις. Προπαρασκευαστικές και σπερμοδότιδες υπόσκιες Παρακράτηση ατόμων κουφαλερών, κλαδοβριθών 1-2/Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων για την ορνιθοπανίδα. Καλλιεργητικές υλοτομίες με θετική επιλογή, ελαφρά αραιώση με κριτήριο την προστασία στις αναδασώσεις Μ. Πεύκης. Απαγόρευση βοσκής
	Αναδ		30-100	Μ.π: ομ	Μ.π:		Μ.π.:49,56			
	Μ π		Μ.π.:		84					
			Οκτ-20							
20β	Ο	0,7-0,9	Ο:	Ο: Διφ.,υπ	Ο:10.433	6.687	239,82	153,72	64,09	Οξυά αμιγής και λίγα άτομα Μ. πεύκης. Καλλιεργητικές (αναγωγικές – εξυγιαντικές) υλοτομίες ανάλογα με τις ανάγκες των κατά χώρο ενώσεων. Εξυγιαντικές υλοτομίες στην Οξυά (γηραιά, κακόμορφα, κουφαλερά, βεβλαμένα άτομα). Εξευγενιστικές αραιώσεις. Προπαρασκευαστικές και σπερμοδότιδες υπόσκιες Παρακράτηση ατόμων κουφαλερών, κλαδοβριθών 1-2/Ha ομοιόμορφα διασκορπ-ισμένων για την ορνιθοπανίδα. Απαγόρευση βοσκής.
	Αναδ		30-100	Μ.π: ομ						
	Μ π		Μ.π.:							
20γ	Ο	0,7-0,9	30-100	Διφ.,υπ	7.751	2.335	210,63	63,45	30,13	Οξυά αμιγής και λίγα άτομα Μ. πεύκης. Καλλιεργητικές (αναγωγικές – εξυγιαντικές) υλοτομίες ανάλογα με τις ανάγκες των κατά χώρο ενώσεων. Εξυγιαντικές υλοτομίες στην Οξυά (γηραιά, κακόμορφα, κουφαλερά, βεβλαμένα άτομα). Εξευγενιστικές αραιώσεις.

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	Συνολικό ξυλαπόμεμα συστάδας	Ξυλαπόμεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm	Συνολικό ξυλαπόμεμα συστάδας / ha	Ξυλαπόμεμα κλάσεων >34 διαμέτρου >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόμεμα / %	Παρατηρήσεις
										Προπαρασκευαστικές και σπερμοδότιδες υπόσκιες Παρακράτηση ατόμων κουφαλερών, κλαδοβριθών 1-2/Ha ομοιόμορφα διασκορ-πισμένων για την ορنيθοπανίδα. Απαγόρευση βοσκής.
206	Ο	0,8-1,0	30-100	Διφ.,υπ	6.230	1.210	278,12	54,02	19,42	Οξυά αμιγής. Καλλιεργητικές (αναγωγικές – εξυγιαντικές) υλοτομίες ανάλογα με τις ανάγκες των κατά χώρο ενώσεων. Εξυγιαντικές υλοτομίες στην Οξυά (γηραιά, κακόμορφα, κουφαλερά, βεβλαμένα άτομα). Εξευγενιστικές αραιώσεις. Προπαρασκευαστικές υπόσκιες υλοτομίες. Παρακράτηση ατόμων κουφαλερών, κλαδοβριθών 1-2/Ha ομοιόμορφα διασκορπ-ισμένων για την ορنيθοπανίδα. Απαγόρευση βοσκής.
21α	Ο	0,7-1,0	60-140	Διφ.,υπ	12.123	5.066	216,88	90,63	41,79	Οξυά αμιγής. Καλλιεργητικές (αναγωγικές – εξυγιαντικές) υλοτομίες ανάλογα με τις ανάγκες των κατά χώρο ενώσεων. Εξυγιαντικές υλοτομίες στην Οξυά (γηραιά, κακόμορφα, κουφαλερά, βεβλαμένα άτομα). Εξευγενιστικές αραιώσεις. Προπαρασκευαστικές υπόσκιες υλοτομίες, αναγεννητικές υλοτομίες. Παρακρά-τηση ατόμων κουφαλερών, κλαδοβριθών 1-2/Ha ομοιόμορφα διασκορπ-ισμένων για την ορنيθοπανίδα. Απαγόρευση βοσκής.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΤΚ ΟΞΥΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (2020-2029)										
1	Ο	0,9-1,0	70-120	Υπ.ακ.	2.151	792	223,36	82,24	36,82	Καλλιεργητικές (εξευγενιστικές – εξυγιαντικές) υλοτομίες ανάλογα με τις ανάγκες των κατά χώρο ενώσεων. Εξυγιαντικές υλοτομίες στην Οξυά (γηραιά, ασθενικά, δίχαλα, άτομα).Η περιοχή άνω του δασοδρόμου έκτασης 3,45 Ha παλιό ναρκοπέδιο δεν υλοτομείται.
2α	Ο	0,9-1,0	70-90	Πρ. ακ.	3.301	981	331,79	98,61	29,72	Καλλιεργητικές (εξευγενιστικές – εξυγιαντικές) υλοτομίες ανάλογα με τις ανάγκες των κατά χώρο ενώσεων. Εξυγιαντικές υλοτομίες στην Οξυά (γηραιά, ασθενικά, δίχαλα, άτομα).Η περιοχή άνω του δασοδρόμου έκτασης 3,45 Ha παλιό ναρκοπέδιο δεν υλοτομείται.
4	Ο	0,9-1,0	50-90	Διφ. ομ με παρα- κρατήματα	4.826	69	225,81	3,22	1,43	Καλλιεργητικές (αναγωγικές – εξευγενιστικές) υλοτομίες ανάλογα με τις ανάγκες των κατά χώρο ενώσεων. Εξυγιαντικές υλοτομίες (γηραιά, ασθενικά, δίχαλα, άτομα).
				Πρ. ομ με παρα- κρατήματα						
5	Ο	0,9-1,0	50-60		5.442	935	169,17	29,07	17,18	Καλλιεργητικές (αναγωγικές – εξευγενιστικές) υλοτομίες ανάλογα με τις ανάγκες των κατά χώρο ενώσεων. Εξυγιαντικές υλοτομίες (γηραιά, ασθενικά, δίχαλα, άτομα). Παρακράτηση ατόμων κουφαλερών, κλαδοβριθών για την ορنيθοπανίδα.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΤΚ ΑΣΠΡΟΓΓΕΙΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ, ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (2015-2024)										
4β	Ο	0,8-1,2	35-95	Πρ. αν..	8.623,20	2.386,80	278,17	76,99	27,68	Καλλιεργητικές (αναγωγικές – εξυγιαντικές) υλοτομίες ανάλογα με τις ανάγκες των κατά χώρο ενώσεων. Εξυγιαντικές υλοτομίες (στρεβλά, δίχαλα, άτομα). Εφόσον υπάρξει ικανοποιητική αναγέννηση απαγόρευση βοσκής 10 έτη για τις αίγες, 5 έτη για τα πρόβρατα και 7 έτη τα μεγάλα ζώα..
Περιοχή επέκτασης των ορίων της μελέτης										
ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΚΟΡΕΣΤΕΙΩΝ ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (2010-2019)										
196	Ο	0,6-0,9	30-100	Ο: Διφ.,υπ	17.642	2.710,00	395,55	60,76	15,36	Οξυά αμιγής και λίγα άτομα Μ. πεύκης. Καλλιεργητικές (αναγωγικές – εξυγιαντικές) υλοτομίες ανάλογα με τις ανάγκες των κατά χώρο ενώσεων. Εξυγιαντικές υλοτομίες στην Οξυά (γηραιά, κακόμορφα, κουφαλερά, βεβλαμένα άτομα). Εξευγενιστικές αραιώσεις. Προπαρασκευαστικές και σπερμοδότιδες υπόσκιες Παρακράτηση ατόμων κουφαλερών, κλαδοβριθών 1-2/Ha ομοιόμορφα διασκορπ-ισμένων για την ορنيθοπανίδα. Απαγόρευση βοσκής.
			Μ.π.:	Μ.π: ομ						
			Οκτ-20							
20α	Ο	0,8-1,0	Ο:	Ο: Διφ.,υπ	Ο:4.814	Ο:1.081	Ο: 180,32	Ο:40,49	22,46	Καλλιεργητικές (αναγωγικές – εξυγιαντικές) υλοτομίες ανάλογα με τις ανάγκες των κατά χώρο ενώσεων. Εξυγιαντικές υλοτομίες στην Οξυά (γηραιά, κακόμορφα, κουφαλερά, βεβλαμένα άτομα). Εξευγενιστικές αραιώσεις. Προπαρασκευαστικές και σπερμοδότιδες υπόσκιες Παρακράτηση ατόμων κουφαλερών, κλαδοβριθών 1-2/Ha ομοιόμορφα διασκορπ-ισμένων για την ορنيθοπανίδα. Καλλιεργητικές υλοτομίες με θετική επιλογή, ελαφρά αραιώση με κριτήριο την προστασία στις αναδασώσεις Μ. Πεύκης. Απαγόρευση βοσκής
	Αναδ		30-100	Μ.π: ομ			Μ.π.:49,56			
	Μ π		Μ.π.:							
			Οκτ-20							
20β	Ο	0,7-0,9	Ο:	Ο: Διφ.,υπ	Ο:10.433	6.687	239,82	153,72	64,09	Οξυά αμιγής και λίγα άτομα Μ. πεύκης. Καλλιεργητικές (αναγωγικές – εξυγιαντικές) υλοτομίες ανάλογα με τις ανάγκες των κατά χώρο ενώσεων. Εξυγιαντικές υλοτομίες στην Οξυά (γηραιά, κακόμορφα, κουφαλερά, βεβλαμένα άτομα). Εξευγενιστικές αραιώσεις. Προπαρασκευαστικές και σπερμοδότιδες υπόσκιες Παρακράτηση ατόμων κουφαλερών, κλαδοβριθών 1-2/Ha ομοιόμορφα διασκορπ-ισμένων για την ορنيθοπανίδα. Απαγόρευση βοσκής.
	Αναδ		30-100	Μ.π: ομ						
	Μ π		Μ.π.:							
			Οκτ-20							
20γ	Ο	0,7-0,9	30-100	Διφ.,υπ	7.751	2.335	210,63	63,45	30,13	Οξυά αμιγής και λίγα άτομα Μ. πεύκης. Καλλιεργητικές (αναγωγικές – εξυγιαντικές) υλοτομίες ανάλογα με τις ανάγκες των κατά χώρο ενώσεων. Εξυγιαντικές υλοτομίες στην Οξυά (γηραιά, κακόμορφα, κουφαλερά, βεβλαμένα άτομα). Εξευγενιστικές αραιώσεις. Προπαρασκευαστικές και σπερμοδότιδες υπόσκιες Παρακράτηση ατόμων κουφαλερών, κλαδοβριθών 1-2/Ha ομοιόμορφα διασκορ-πισμένων για την ορنيθοπανίδα. Απαγόρευση βοσκής.
206	Ο	0,8-1,0	30-100	Διφ.,υπ	6.230	1.210	278,12	54,02	19,42	Οξυά αμιγής. Καλλιεργητικές (αναγωγικές – εξυγιαντικές) υλοτομίες ανάλογα με τις ανάγκες των κατά χώρο ενώσεων. Εξυγιαντικές υλοτομίες στην Οξυά (γηραιά, κακόμορφα, κουφαλερά, βεβλαμένα άτομα). Εξευγενιστικές αραιώσεις. Προπαρασκευαστικές

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας	Ξυλαπόθεμα κλάσεων >34 διαμέτρου cm	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας / ha	Ξυλαπόθεμα κλάσεων >34 διαμέτρου cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις
										υπόσκιες υλοτομίες. Παρακράτηση ατόμων κουφαλερών, κλαδοβριθών 1-2/Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων για την ορνιθοπανίδα. Απαγόρευση βοσκής.
21α	Ο	0,7-1,0	60-140	Διφ.,υπ	12.123	5.066	216,88	90,63	41,79	Οξυά αμιγής. Καλλιεργητικές (αναγωγικές – εξυγιαντικές) υλοτομίες ανάλογα με τις ανάγκες των κατά χώρο ενώσεων. Εξυγιαντικές υλοτομίες στην Οξυά (γηραιά, κακόμορφα, κουφαλερά, βεβλαμένα άτομα). Εξευγενιστικές αραιώσεις. Προπαρασκευαστικές υπόσκιες υλοτομίες, αναγεννητικές υλοτομίες. Παρακράτηση ατόμων κουφαλερών, κλαδοβριθών 1-2/Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων για την ορνιθοπανίδα. Απαγόρευση βοσκής.
21β	Ο	0,6-1,1	Ο:	Ο: Διφ.,υπ	Ο:6.375	Ο:202	Ο:141,99	Ο:4,50	3,17	Καλλιεργητικές (αναγωγικές – εξυγιαντικές) υλοτομίες ανάλογα με τις ανάγκες των κατά χώρο ενώσεων. Εξυγιαντικές υλοτομίες στην Οξυά (γηραιά, κακόμορφα, κουφαλερά, βεβλαμένα άτομα). Εξευγενιστικές αραιώσεις. Προπαρασκευαστικές και σπερμοδότιδες υπόσκιες υλοτομίες. Παρακράτηση ατόμων κουφαλερών, κλαδοβριθών 1-2/Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων για την ορνιθοπανίδα. Καλλιεργητικές υλοτομίες με θετική επιλογή ελαφρά αραιώση με κριτήριο την προστασία στις αναδασώσεις Μ. πεύκης. Απαγόρευση βοσκής.
	Αναδ		60-140	Μ.π: ομ	Μ.π:534		Μ.π:58,05			
	Μ π		Μ.π.:							
			Οκτ-20							
21γ	Ο	0,7-0,9	Ο:	Ο: Διφ.,υπ	Ο:10.095	Ο:806,00	Ο:317,45	25,35	7,98	Καλλιεργητικές (αναγωγικές – εξυγιαντικές) υλοτομίες ανάλογα με τις ανάγκες των κατά χώρο ενώσεων. Εξυγιαντικές υλοτομίες στην Οξυά (γηραιά, κακόμορφα, κουφαλερά, βεβλαμένα άτομα). Εξευγενιστικές αραιώσεις. Προπαρασκευαστικές και σπερμοδότιδες υπόσκιες υλοτομίες. Παρακράτηση ατόμων κουφαλερών, κλαδοβριθών 1-2/Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων για την ορνιθοπανίδα. Καλλιεργητικές υλοτομίες με θετική επιλογή ελαφρά αραιώση με κριτήριο την προστασία στις αναδασώσεις Μ. πεύκης. Απαγόρευση βοσκής.
	Αναδ		60-140	Μ.π: ομ	Μ.π:491		Μ.π:55,80			
	Μ π		Μ.π.:							
			Οκτ-20							
21δ	Ο	0,6-1,0	Ο:	Ο: Διφ.,υπ	Ο:12.042	Ο:357	Ο:308,77	9,15	2,96	Καλλιεργητικές (αναγωγικές – εξυγιαντικές) υλοτομίες ανάλογα με τις ανάγκες των κατά χώρο ενώσεων. Εξυγιαντικές υλοτομίες στην Οξυά (γηραιά, κακόμορφα, κουφαλερά, βεβλαμένα άτομα). Εξευγενιστικές αραιώσεις. Προπαρασκευαστικές και σπερμοδότιδες υπόσκιες υλοτομίες. Παρακράτηση ατόμων κουφαλερών, κλαδοβριθών 1-2/Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων για την ορνιθοπανίδα. Καλλιεργητικές υλοτομίες με θετική επιλογή ελαφρά αραιώση με κριτήριο την προστασία στις αναδασώσεις Μ. πεύκης. Απαγόρευση βοσκής.
	Αναδ		60-140	Μ.π: ομ	Μ.π:2.009		Μ.π:220,7			
	Μ π		Μ.π.:							
			Οκτ-20							
21ε	Ο	0,9-1,1	Ο:	Ο: Διφ.,υπ	Ο:3.657	-	Ο:127,44	-	-	Καλλιεργητικές (αναγωγικές – εξυγιαντικές) υλοτομίες ανάλογα με τις ανάγκες των κατά χώρο ενώσεων. Εξυγιαντικές υλοτομίες στην Οξυά (γηραιά, κακόμορφα, κουφαλερά, βεβλαμένα άτομα). Εξευγενιστικές αραιώσεις. Προπαρασκευαστικές και σπερμοδότιδες υπόσκιες υλοτομίες. Παρακράτηση ατόμων κουφαλερών, κλαδοβριθών 1-2/Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων για την ορνιθοπανίδα. Καλλιεργητικές υλοτομίες με θετική επιλογή ελαφρά αραιώση με κριτήριο την προστασία στις αναδασώσεις Μ. πεύκης. Απαγόρευση βοσκής.
	Αναδ		50-80	Μ.π: ομ	Μ.π:942		Μ.π:59,98			
	Μ π		Μ.π.:							
			Οκτ-20							
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΤΚ ΟΞΥΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (2020-2029)										
1	Ο	0,9-1,0	70-120	Υπ.ακ.	2.151	792	223,36	82,24	36,82	Καλλιεργητικές (εξευγενιστικές – εξυγιαντικές) υλοτομίες ανάλογα με τις ανάγκες των κατά χώρο ενώσεων. Εξυγιαντικές υλοτομίες στην Οξυά (γηραιά, ασθενικά, δίχαλα, άτομα).Η περιοχή άνω του δασοδρόμου έκτασης 3,45 Ha παλιό ναρκοπέδιο δεν υλοτομείται.
2α	Ο	0,9-1,0	70-90	Πρ. ακ.	3.301	981	331,79	98,61	29,72	Καλλιεργητικές (εξευγενιστικές – εξυγιαντικές) υλοτομίες ανάλογα με τις ανάγκες των κατά χώρο ενώσεων. Εξυγιαντικές υλοτομίες στην Οξυά (γηραιά, ασθενικά, δίχαλα, άτομα).Η περιοχή άνω του δασοδρόμου έκτασης 3,45 Ha παλιό ναρκοπέδιο δεν υλοτομείται.
2β	Ο	0,9-1,0	70-100	Πρ. ακ.	7.389	3.614,00	253,31	123,89	48,91	Καλλιεργητικές (εξευγενιστικές – εξυγιαντικές) υλοτομίες ανάλογα με τις ανάγκες των κατά χώρο ενώσεων. Εξυγιαντικές υλοτομίες στην Οξυά (γηραιά, ασθενικά, δίχαλα, άτομα). Προπαρασκευαστικές υπόσκιες υλοτομίες (αναγεννητικές) στις ώριμες ενώσεις. Απαγόρευση βόσκησης προβάτων, μεγάλων ζώων, αιγών για 5, 7, 10 έτη αντίστοιχα. Η έκταση που καλύπτει η Μ. π. προέρχεται από δάσωση γεωργικών γαιών (ιδιώτες).
6	Ο	0,9-1,0	65-75	Πρ. ομ με παρα- κρατήματα	8.623	5.040,00	236,96	138,5	58,45	Καλλιεργητικές (αναγωγικές – εξευγενιστικές) υλοτομίες ανάλογα με τις ανάγκες των κατά χώρο ενώσεων. Εξυγιαντικές υλοτομίες (γηραιά, ασθενικά, δίχαλα, άτομα). Παρακράτηση ατόμων κουφαλερών, κλαδοβριθών για την ορνιθοπανίδα. Προπαρασκευαστικές υπόσκιες υλοτομίες (αναγεννητικές) στις ώριμες ενώσεις. Απαγόρευση βόσκησης προβάτων, μεγάλων ζώων, αιγών για 5, 7, 10 έτη αντίστοιχα.
ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΒΙΤΣΙΟΥ, ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (2016-2025)										
25α	Ο	0,8-1,1	30-60	Διφ.ομ	25.562	7.667,00	335,88	100,88	30,03	Καλλιεργητικές (αναγωγικές – εξυγιαντικές) υλοτομίες ανάλογα με τις ανάγκες των κατά χώρο ενώσεων. Εξυγιαντικές υλοτομίες στην Οξυά (γηραιά, κακόμορφα, κουφαλερά, βεβλαμένα άτομα). Εξευγενιστικές αραιώσεις. Προπαρασκευαστικές υπόσκιες και φωτοδότιδες υλοτομίες. Παρακράτηση ατόμων κουφαλερών, κλαδοβριθών 1-2/Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων για την ορνιθοπανίδα. Απαγόρευση βοσκής 10 έτη για τις αίγες, 5 έτη για τα πρόβατα και 7 έτη τα μεγάλα ζώα. Ύπαρξη ναρκοπεδίου.
25β	Ο	0,8-1,2	25-70	Διφ.ομ	19.608	1.766	243,58	21,94	9,01	Οξυά αμιγής με διάσπαρτα άτομα Δρυός σε όλη την έκταση. Καλλιεργητικές (αναγωγικές – εξυγιαντικές) υλοτομίες ανάλογα με τις ανάγκες των κατά χώρο ενώσεων. Εξυγιαντικές υλοτομίες στην Οξυά (γηραιά, κακόμορφα, κουφαλερά, βεβλαμένα άτομα). Εξευγενιστικές αραιώσεις. Προπαρασκευαστικές υπόσκιες και φωτοδότιδες υλοτομίες. Παρακράτηση ατόμων κουφαλερών, κλαδοβριθών 1-2/Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων για την ορνιθοπανίδα. Απαγόρευση βοσκής 10 έτη για τις αίγες, 5 έτη για τα πρόβρατα και 7 έτη τα μεγάλα ζώα..
25δ	Ο	0,7-1,1	25-50	Διφ.ομ	Ο:1.777	Ο:859	Ο:83,83	Ο:40,50	Ο:48,34	

Συστάδα	Δασοπονικά είδη	Συγκόμωση	Ηλικία έτη	Διαχειριστική /Δασοπονική μορφή	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας	Ξυλαπόθεμα κλάσεων διαμέτρου >34 cm	Συνολικό ξυλαπόθεμα συστάδας / ha	Ξυλαπόθεμα κλάσεων >34 cm /ha	Συμβολή δέντρων μεγάλης διαμέτρου στο ξυλαπόθεμα / %	Παρατηρήσεις
	Δ				Δ: 1.172	Δ:-	Δ:84,38	Δ-		Οξυά: 18,30Ha, σε μείξη με Δρυ 2,90 Ha και Δρυς με αμιγείς ενώσεις 11 Ha. Υποβαθμισμένη λόγω παράνομων υλοτομιών, την προηγούμενη δεκαετία δεν πραγματοποιήθηκαν οι προτεινόμενες υλοτομίες. Καλλιεργητικές (αναγωγικές – εξυγιαντικές) υλοτομίες ανάλογα με τις ανάγκες των κατά χώρο ενώσεων. Εξυγιαντικές υλοτομίες στην Οξυά και Δρυ (γηραιά, κακόμορφα, κουφαλερά, βεβλαμένα άτομα). Προπαρασκευαστικές υπόσκιες και υλοτομίες σποράς. Παρακράτηση ατόμων κουφαλερών, κλαδοβριθών 1-2/Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων για την ορνιθοπανίδα. Απαγόρευση βοσκής 10 έτη για τις αίγες, 5 έτη για τα πρόβρατα και 7 έτη τα μεγάλα ζώα.
25ε	Ο	0,7-1,1	30-70	Διφ.ακ.	16.245	3.715	322,33	73,71	22,87	Καλλιεργητικές (αναγωγικές – εξυγιαντικές) υλοτομίες ανάλογα με τις ανάγκες των κατά χώρο ενώσεων. Εξυγιαντικές υλοτομίες στην Οξυά (γηραιά, κακόμορφα, κουφαλερά, βεβλαμένα άτομα). Εξευγενιστικές αραιώσεις. Προπαρασκευαστικές υπόσκιες και φωτοδοτίδες υλοτομίες. Παρακράτηση ατόμων κουφαλερών, κλαδοβριθών 1-2/Ha ομοιόμορφα διασκορπισμένων για την ορνιθοπανίδα. Απαγόρευση βοσκής 10 έτη για τις αίγες, 5 έτη για τα πρόβρατα και 7 έτη τα μεγάλα ζώα. Ύπαρξη ναρκοπεδίου.

